



5人

ACTA

SOCIETATIS SCIENTIARUM

FENNICÆ.

RUTABLES

A STATE OF STREET

TOMI TERTII

FASCICULUS I.

LIBRARY NEW YORK BUTANICAL

HELSINGFORSIÆ.

Ex officina typographica A. W. GRÖNDIHL.

MDCCCXLIX.

C765

ATOA

SOCIECOMBENSETEONES: HILL

SOCIETATIS ASCHENTIARUM

IMPRIMATUR:

N. A. GYLDÉN.

TOMI TERTIL

TOM IKOT

- Contracto

LIBRARY NEW YORK BOTANICAL GARDEN.

COMMENTATIONES

SOCIETATIS SCIENTIARUM

FENNICÆ.

том. ш.

ERIOPHORI MONOPRAPHI.

COMMENTATIONES

SOCIETATIS SCIENTIARUM

FENNICE.

The state of the last of the last

TOM. III.

A trap of the second second

many the second second

(time 10, 11, Salappa, of out)

ERIOPHORI MONOGRAPHIA,

AUCTORE

FREDRICO NYLANDER.

(Societ. exhib. die 19 Octobr. 1846.)

Eriophori genus lana conspicua insigne, paludes tristissimas terrarum inprimis borealium ornans, summam jam antiquitus in se convertebat admirationem et studia botanicorum, quorum de hisce plantis judicia brevissime exordii loco exponamus.

Patres rei herbariæ recentioris, qui in conciliandis nominibus Theophrasti, Dioscoridis et Plinii cum plantis nostris versabantur, Gnaphalii nomine Eriophora primum salutabant. Ita Tragus (p. 252, ed. 1595) et Fuchsius (hist. p. 126, ed. 1556), quos castigat Mathiolus (p. 402, ed. Camer. 1586). Alio vero titulo apud Romanos jam inclaruisse hocce Scirpearum genus Sprengelio (Gesch. der Bot. I, p. 165) aliisque vestigia J. Bauhini (Hist. p. 14) haud cante, me judice, prementibus, visum est. Huc enim vix spectare censerem verba Plinii, ubi dicit (Hist. 19, 1): "Ægyptii quartum

Lini grans Orchomenium appellent. Int e palastri vibal arundiat, duntaxat panicula ejus." Quod quidem effatum, cum nullum ex .F.gypto Employum immentriit, neo e locis un le planta Pliniuma nomen duxisse videtur, ad aliud certe genus referendum, cuique, rem accuratius consideranti, in propatulo esse oportet. Præterea vilioris ctiam momenti rationes nonnullas, que a gravissima doctissimorum virorum sententia discedere nos compellunt, hoc loco, ut ut hisce pagellis uimis alienas, sicco transeamus pede. - Linum pratense Cordo, Gramon tomentarium, Linagrostis, Erioschaenus, Linoschoenus Tabernamontano (Ic. stirp. p. 230, ed. 1590), alios ut taceamus auctores, audit genus nostrum, Eriophori vero nomine quod jam apud Theophrastum occurrit, Dodonaum (pempt. 552) Eriophorum angustifolium Roth (?) appellasse constat. denique repudiata Linagrostis denominatione (v. Phil. Bot. §. 224) genus a Tournelortio circumscriptum, Eriophorum designavit. Initio vero liujus sæculi Personnius (Syn. I, p. 70) ab Eriophoru alpino &c. Trichophori genus formavit, quod nunc subgeneris vices gerit, nosque tandem hodie Lachnophori introducinus Lomen.

Quod cæterum ad historiam generis nostri spectat, susius in speciali traditur synonymia, quam, nisi historico respectu sit locupletissima, ad geographicam distributionem illustrandam et specierum rationes extricandas, potius compositam esse, nullum sane sugit æquum rei æstimatorem.

Fam. Nat. Cyperaceæ. Trib. Scirpeæ.

Eriophorum (Linn. gen. n. 68).

Char. ess. Perigonium lamellulæforme vel capillare, achenium demum multoties lana longissima superans.

Char. nat. Herbæ perennes cæspitosæ l. solitariæ, radice fibrosa, stolonifera l. cæspitante. Culmi simplices, angulosi l. teretiusculi, nodis paucissimis instructi. Folia subdisticha, æquitantia, integerrima, parallelinervia, vaginis clausis in mucronem productis 1. in laminam augustissimam abeuntibus, lineari-lanceolatam, semiteretem l. triquetram, interdum ad squamam tumidulam reductam, ligula nulla. Flores imperfecti, hermaphroditi l. rarius polygami, spicati, in capitulum congesti, spiculis solitariis l. paniculatis, singuli bractea solitaria squamacea tecti, multifariam dispositi. Squamæ persistentes, liberæ, undique imbricatæ, infimæ vacuæ, superiores fertiles, homogeneæ, subnaviculares, plus minus lanceolatæ, opacæ 1. diaphanæ. Perigonium e setis sex 1. numerosis, basi connatis, lanam referentibus, longissimis, lamellulæformibus, compressis, l. capillaribus teretiusculis, 'achenium involventibus, cum eodem deciduis formatum. Stamina hypogyna, unum-tria, anticum et duo posteriora. Filamenta libera, filiformia, antheræ basifixæ, lineares, longitudinaliter dehiscentes, apice haud emarginatæ. Ovarium sessile liberum, uniloculare, ovulum unicum anatropum. Stylus ad medium tri-, rarissime quadrifidum. Pericarpium achenii trigoni, bryo basilaris, albumine inclusus I. potius obtectus.

Affinitas cum Scirpo manifesta et difficillima, quam luculenter testatur Erioghorum cyperinum L. ad hoc genus relegatum, ut alia taccam, alio loco exponenda.

Geographia. Eriophora cis cancrum difusa, per plagas arcticas inprimis late vagautur paludicolæ, nec ex alpinis Europæ, Asie et Americæ borealis exsulant. Una species Asiæ priva, montes et convalles Himalayæ inhabitat, altera Americæ borealis incola, cæteræ, unica excepta, omnibus fere borealibus terris communes sunt.

Usus hujus generis in acconomia gentium septentrionis haud exignus, pahulum cuim prahet verno tempore maxime præcox, ideoque astumatissimum, nec lanam hypogynam ad varia opera textoria &c. nounullis Scandinaviæ locis spernunt rustici, quibus etiam remedium in diarrhæa, ad vermes necandos e. s. p. herba subministrat l'aiophori, olim Herbæ Linagrostis nomine in officinis venalis. Foliis E. comosi ante florescentiam resectis incolæ Himalayæ ad restes fabricandas maxime utuntur. (Vide Royle, Illustration that horasy &c. of Himalaya &c. London 1833—40, p. 415).

ERIOPHORUM.

1) Lamellulæ calycinæ senæ. Trichophorum Pers.

Eriophorum alpinum (L. sp. I, 77) culmo triangulari scabro inferne vaginato, vaginis folio brevi, obtuso, scabro terminatis, spica oblonga, squamis obtusiusculis, pallide ferrugineis.

-Gramen junceum lanigerum? Thal. sylv. 55.

Juncus alpinus bombycinus Bauh. Pin. 12, Hist. t. 2, 515.

Linagrostis juncea alpina minima, caule triangulari, capitulo parvo, pappo rariore Mich. gev. p. 54, n. 3.

Eriophorum spica erecta caule triquetro L. Fl. Lapp. n. 24.

Eviophorum alpinum Smith Brit. I, p. 60. Hook. Brit. ed. 4, 1 p. 28. Duby Bot. Gall. I, p. 487. Mutel Fl. Franc. III, p. 364. Bertol. Fl. It. I, p. 317. Mert. & Koch Deutschl. Fl. I, 450. Fl. Dan. t. 620. L. sv. n. 51. Wg. Lapp. p. 16. Sv. p. 30. Hn. Sk. Fl. ed. 3, p. 13. Weinm. Petr. p. 19. Eichw. Skizze p. 121. Hook. Bor. Am. II, 230. Kunth. Cyp. p. 176.

Trichophorum alpinum Pers. syn. I, 70. Pursh. Fl. 1, 57.

Eriophorum hudsonicum Michaux Fl. I, 134, ex specc.
Torrey!

Trichophorum hudsonicum Nutt. Gen. I, 36.

Hab. in paludosis Scotiæ, (ad Forfar 1791 detectum, palude vero natali jam exsiceata evanuit, vid. Hook. l. c.), Alpium Germaniæ, Pedemontii, Vogesorum, Jurassi, montium Ligeris, Germaniæ horealis, Scandinaviæ, Finlandiæ, Petropolis, Gub. Olonetz, Archang I polis, Lithuaniæ et deinde in montosis Americæ borealis et arcticæ. E Sibiria non vidi, nec in Hispania et Italia pr. s. d. adest.

Strictum, cæspitosum. Radix stolones emittit squamis flavo-luscis obsitos. Culmi semipedales et ultra, conferti, basi vaginati, triquetri angulis scabris. Folia radicalia subnulla, l. quando in stolonibus adsint filiformia, triquetra, supra canaliculata scabra, culmeum unicum, 2 l. 3 lineare, carinatum. Capitulum oblongum, lana argentea, vagina amplectente, foliolo terminali suffultum. Squamæ dilute ferrugineæ, subsenæ, ovatæ, obtusæ l. rarius acutæ, dorso convexiusculæ, nervo pallidiore ante apicem evanescente l. rarius excurrente. Setæ calycinæ lamellulæformes, sursum attenuatæ, apice flexuosæ, semipollicares. Stamina 1-3, antheris linearibus apiculatis. Stylus supra medium bi-tri- l. quadrifidus ruber. Achenium oblongo cuncatum, apiculatum, plano-convexum, dorso carinatum.

C. Bauhinus primus hujus plantæ mentionem fecisse videtur, Thalii enim synonymon a variis Auctoribus varie interpretatum, Luc forse non pertinet. Nec e terra Samojedorum nec e Sibiria specimina visa nisi mutila et incerta.

- 2) Lamellulæ calycinæ crebræ. Eriophorum L.
 - a) Capitulis solitariis.
- I. Radice stolonifera.

Ericphorum Scheuchzeri (Hoppe! Taschenb. 1799, p. 109) culmo solitario, foliis canaliculatis, dorso teretibus, lævissimis capitulo juniori subgloboso, squamis lanceolato-acuminatis, acutis fuscis, superne anguste albo-marginatis, antheris oblongis.

Juncus alpinus capitulo tomentoso majori Scheuchz. prodr. p. 27, t. 7 f. dextra.

Eriophorum, Scheuchzeri H p e Taschenb. 1800 p. 104 opp.
t. 7, Roth Neue Beytr. I, 95. Vahl. Enum. 2, 388.
M. et Koch Deutschl. Fl. I, 454. Kunth. Cyperogr.
p. 177. Hook. Fl. Bor. Am. II, p. 231. Blytt.
Flor. Dovrensis in Bot. Årsber.

Eriophorum capitatum Host Gram. I, p. 30 t. 38 (1801).

Engl. Bot. t. 2387. Hook. Brit. ed. 4, 1, p. 29.

Bor. Am. II, p. 231. Duby Bot. Gall. I, p. 487.

Mutel Fl. Franc. III. p. 364. Bert. It. I, p. 316.

Dumort. Flor. Belg. p. 144. Flor. Dan. t. 1502.

Hart. Sk. Fl. ed. 3 p. 13. Wg. Fl. Lapp. p. 18.

Liadbl. Spitzb. Fl. Box Not 1839. Brown Chlor. Melv. p. 26.

Hab. in paludosis alpinis et subalpinis Scotiæ (Benlawers); Pyrenæorum, Alpiniu, Scandinaviæ, Fenniæ ubi usque ad Uloam descendit, Lapponiæ Rossicæ, Americæ arcticæ et Ins. Spitzbergen.

Radix fibrosa, stolones beeves, filiformes adscendentes emi tens. Culmus solitarius, spithamens vel paullo ultra, teres, mollis, luvis, striatulus, kasi vaginis 2—3 foliiferis fuscis cinctus, vagina suprema sesquipollicaris aphylla, apice tomidula, fusco-scariosa, folia culmea, subpollicaris, superme canalism-lata l. apicem versus planiuscula, striatula, lavia, stolonum parum lungiora, culmeis similia, squame tres l. quatture infime vacum vaginantes, infima amplectens, late rotundato-ovata, moltinervis, tota fusco-cinerascens, superiores angustiores uninervia, squame fertiles lancoulato-acominata, fusco-cinerva, margine apiceque anguste hyaline, lana semipollicaris argentez, sete lamellu-laformes. Stamina tria decidua, anthere flavescentes, latitudina sua ter lorgiores. Achenia trigona intus plana extus angulata, fusca, mitentia, chicago-meta rubra.

Var. Chamissonie capitulo juniori globoso-oblongo, luna subrufescente, squamis fuscis lauceolatis, albomarginatis, acutis, culmo gracili, foliis canaliculatis dorso tercubus, læ-

Eriophorum Chamissonis CAM.! Cyp. nov. n. VIII, t. 3, non Fl. Alt.!

Eriophorum intermedium Cham.! in Int. pro p.

Non differt E. Chamissonis CAM. Cyp. nov. nisi spica minus globosa, antheris prorsus linearibus et habitu graciliori a vulgari E. Scheuchzeri. Antherarum vero formæ in Eriophoris ne nimium momenti tribuatur caveas, valde enim variabilem semper inveni.

Adsunt ex insulis Sitcha, Kodjak &c. formæ insignes, quæ ita ad E. russeolum accedunt et inter hoc et præcedens ambigunt ut cautissime distinguantur necesse sit.

Eriophorum russeolum (Fries! IIb. Norm. f. 3 n. 67, 1837) culmo tereti, foliis plano canaliculatis, dorso compressiusculis, lævissimis, capitulo oblongo, squamis fertilibus ovato lanceolatis, obtusis, fusco cinereis, margine apiceque hyalinis, lana fulvescente, antheris linearibus.

Eriophorum russeolum Fries in Hn. Sk. Fl. ed. 3 p. 13. Fr. Nov. Mant. III. p. 170.

Eriophorum Chamissonis Fr. Nov. Mant. II, p. 1. Nyl. Spic. I, p. 4 non CAM.!

- E. fulvellum La Pylaye ined. ex Fr.
- E. vaginatum Turcz. in Hb. Ac. Sc. Petrop.
- E. vaginatum β medium Laest. Nov. Act. Ups. T. XI ex Fries.

E. vaginatum y Hook Fl. Bor. Am. 2 p. 231.

Hab. in paludibus sphagnosis Lapp. Tornensis, Karesuando t..., Kentrali, Prie vocam del Roscine Lumalis us pre ad Trioscome. Al min Dantill. Kentrollance. Insular in Alexticarum, Labradorise et Terræ Novæ ex Fr. II. cc.

Gracile, melle. Radix stolonifera, stolonibus fusco squamatis, fibroso radicantibus, Culmi lanigeri circiter pedales, graciles, teretes, striatuli, basi vaginis emarcidis foliiferi, summa aphylla basi rufa l. pallida, apice scariosa vix tumidula. Folia culmea 1—2 pollicaria filiformia, dorso inprimis sursum compressiuscula, teretic, lavissima, stolonum longiora, mollia. Capitulum florens oblongum, serius fere obovatum. Squame tres inferiores vacue vaginantes, infima subtrinervis, nervis confluentibus, fertiles ovato acuminate obtusiuscula, uninervia, nervo sub apice evanescente, opaca margine apiceque pellucida. Lana vulgo rufescens l. albida uncialis. Lamellula e basi lineari sensim attenuata, cellulis medio angustioribus nervum quasi referentibus Stamina tria, anthera lineares, acuta, quater latitudine sua longiores. Stylus supra medium trifidus, stigmata rubicunda. Achenia plano trigona, obovato elongata, basi styli hand raro persistentis apiculata.

- albidum culmo gracili elongato, soliis silisormi-convolutis subtrigonis, squamis lineari-lanceolatis, lana albida.

Hab. in insula Kodjak ad litus Americæ bor. occidentalis. Vidi in Hb. Ac. Sc. Petr.

Squemis E. Scheuchzeri, culmo gracili et soliis silisormi trigonis E. russeolum ambigit planta hæcce, cujus modo specimica senescentia inspexi. Dubius diu hæsi uhinam esset collocandum Eriophorum notis characteristicis satis polleus, qued vero

facies externa ad russeolum relegandum suadet, nec nisi hujus aberrationem haberem; incertæ attamen manet sedis donec exempla suppetant idonea, quibus examen instituatur accuratius.

Specimina Kamtschatica in Hb. Ac. Petrop. eximie robusta et vegeta variationem majorem efficere videntur.

In tabula nostra I secundum specimina lapponica E. russeo-lum delineatum est.

II. Radice cæspitosa.

Eriophorum vaginatum (L. sp. pl. 1, p. 76) vaginis fibrillosis, culmo tereti, sursum trigono, foliis canaliculato-triquetris apice compressis, scabriusculis, squamis fertilibus ovato-acuminatis, cinereo-hyalinis, capitulo florente oblongo, lana argentea.

Juncus capitulo lanuginoso s. Schoenolagurus C. Bauh.

Juncus alpinus cum cauda leporina J. B. Hist. II, 514. Scheuchz. agr. p. 26 t. 7 f. sinistra.

Gramen juncoides lanatum Danicum Moris. Hist. 3 p. 224 s. 8 t. 9 f. 2.

Eriophorum spica erecta caule tereti L. Fl. Lapp. 23.

Eriophorum spica lauis involuta L. Act. Ups. 1736 p. 47.

L. sv. n. 45. Gan. Sib. I, p. 85 n. 10.

Linagrostis vaginata Scop. Carniol. Lam. Gall. 3, 555.

Eriophorum vaginatum Lights. scot. p. 90. Sm. Brit. I, p. 58. Hook. Brit. ed. 4 p. 28. Bor. Am. II, p. 231. DC. Gall. 3, 132. Duby Bot. Gall. I, p. 487. Bertol. It. I, p. 315. M. & K. Deutschl. Fl. I, p. 454. Fl. Dan. t. 236. Hn. Skand. Fl. ed. 3 p. 12. Wahlenb. Lapp. p. 17. Weinm. Petr. p. 19. Höfft Kursk. p. 5. Eichw. Skiz. p. 121. Bess. Enum. Volkyn. p. 5. CAM. Ind. Cauc. p. 28. Prescett in Bong. Veg. Sitch. p. 50. Pall. It. sib. 3 p. 33.

E. czespitosum Host Gram. I, t. 39 (1801). Pursh Flora I, 57.

Hab. in montanis Britanniæ, Galliæ, in paludosis Alpium, Germaniæ, Scandinaviæ, Lapponiæ, Rossiæ ad Kursk et deinde ranius in alpibus Caucasi occidentalis (alt. 1200—1400 hexap.), per Siliriam omnem et Americam borealem usque ad Virginiam.

Herbz stricta rigidz. Radix emspitosa, fibrosa, vaginis fibrillose dehiscentibus, folnderis ferruzineis 1. sordide flavescentibus, imis emarcidis, striatulis. Calmi stipati, graciles, florentes spithamei 1. pedales, fructiferi elongati,
interdom hipedales, striati, circiter medio una alterave adest vagina 1—2 pollivaris, aphylla, basi rudescens, sursum tumidula, scariosa, striatula, juvenilis
estmie inflata. Felia numerosa, deorsum canaliculato-triquetra, dorso acuto,

sursum compressiuscula, margine scabra l. interdum lævia. Capitulum lanigerum ovatum, squamæ infimæ vaginantes multinerviæ, fusco-cinereæ, vacuæ, superiores ovato-acuminatæ fertiles cinereo-hyalinæ, nervo haud excurrente. Lamellulæ calycinæ sensim attenuatæ, subpollicares. Stamina tria. Antheræ lineares flavescentes. Stylus ultra medium trifidus, ruber. Achenium cuneatooblongum, apiculatum, interiori latere plano, exteriori anguloso, carinatum læve.

 humile Turcz. culmis cæspitosis, vaginis fibrillosis, capitulo subsphærico, squamis ovato-lanceolatis, cinereopellucidis.

Eriophorum Chamissonis CAM. in Led. Fl. Alt.! I, p. 70. Erioph. humile Turcz.! in Hb. Ac. Sc. Petr.

In alpinis Sibiriæ altaicæ ad Fl. Tschuja &c. et Dauriæ ad Urgudei et Schebet.

Eriophorum humile Turcz. ab E. vaginato potissimum recedit statura obesa et foliis latioribus lævissimis, nomenque a speciminibus minutis desumtum etiamsi minus congruum mutandum non censerem, ne oriatur confusio semper evitanda. Nullo enim modo fingas subspeciem hanc eximiam, humilem et depressam, quod in alpinis summis tamen minime rarum videtur, adsunt nempe specimina robusta et elata, sesquipedalia.

n. VII, 1. 2) culmo teretiusculo, foliis canaliculatis, apice compressis, capitulo orbiculari, squamis fertilibus ovato-lanceolatis, obtusiusculis, totis fuligineis opacis.

Eriophorum capitalum β Hook. Fl. Bor. Am. II, p. 231. Erioph. cæspitosum β humilius E. Mey. Pl. Labrad.

Ad sinum Sati Laurentii freti Beriogii et in Americae borealis plagis arcticis.

Spithameum, rigidum. Radix cæspitosa, fibrosa. Culmi teretes, læves, striatuli, superne subtrigoni, basi vaginis foliiferis, haud fibrillosis muniti, medio l. infra medium culmi vagina solitaria, basi rufescens, apice fuligineo, scariosa, tumidula, striata. Folia rigida, antice plano-canaliculata, dorso convexa, superne compressa, lævia l. rarius serrulata. Capitulum florens globosum, lanigerum, argenteum obovato-sphæricum. Squamæ infimæ 2 l. 3 ceteris majores in culmum breviter decurrentes, vaginantes, fuligineæ, acutæ, 3-5 nerviæ. Lamellulæ calycinæ latiusculæ, semipollicares, strictæ rigidiusculæ. Stamina 3. Stylus 2 l. 3 fidus l. rarissime 4 fidus. Achenium obovato-oblongum, plano-triquetrum.

Synonymon Pl. Labr. huc referendum esse nullus dubito, loco enim citato cel. Auctor plantam suam habitu dicit esse E. capitati, characteres vero habere E. vaginati, ab hoc tamen differre spica globosa, statura vix spithamea.

L. c. Cyp. Nov. cel. C. A. Meyeri t. 2 f. c. stylus depingetur quadrifidus, quo l'mihi observare non contigit, bi l. trifidum modo vidi. Ceterum hoc sæpe in Eriophoris variat.

b) Capitulis pluribus.

Eriophorum angustifolium (Roth Neue Beytr. p. 94) culmo tereti soulo, foliis plano-camiliculatis apice triquetris pedunculis lævibus, squamis fertilibus uninerviis.

Gramen eriophorum Dod. pempt. 552.

Gramen tomentarium Frank. spec. 15. Tillandz ab. 32.

Gramen juncum lanigerum Thal. Herc. 53.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa Bauh.

Eriophorum culmo tereti folioso, foliis planis L. n. 45. Gmel. Sib. I, 85.

Eriophorum angustifolium Duby Bot. Gall. I, p. 487.

Mutel Fl. Fr. III, p. 365. Dum. Fl. Belg. 144. M.

et Koch D. Fl. III, p. 455. Bert. It. I, p. 320. Fl.

Dan. t. 1442. Hartm. Skand. p. 13. Weinm. Petrop. p. 19. Eich w. Skiz. p. 121. Bess. Gal. I, p.

58. Höfft Kursk p. 5. Wirsén Kasan p. 115. Bong.

Sitch. p. 51. Hook. Bor. Am. II, 231. Pursh Fl.

I, 58. E. Meyer Pl. Labr. p. 21.

E. polystachyon a L. Fl. sv. n. 16.

E. polystachyon Wg. Lapp. p. 18. Smith. Brit. I, 59. Engl. Bot. t. 563. Hook. Brit. I, 29. Duby Bot. Gall. I, 487. Pursh Flora I, 58 fr. p.

E. intermedium Bast. journ. de bot. 1814, 3 p. 19 ex DC.

- Vaillantii lana squames quadruplo superante, fellis longioribus et latioribus, cultuo tereti.

Linagrostis panicula majori Vaill Paris t. 16, f. 1.

- E. polystachyon ? Vaillantii Duby Bot. Gall. I, p. 487. 3
- E. Vaillantii Poit & Turp. Fl. Paris. 2 52.
- E. augustifolium Smith Brit. I, 59. Eog. Bot. 1. 594 et var. august.
- minus (Koch Syn. p. 74), graellius, calmo subtriquetro,
- E. augustifolium ; alpieum Gaud. belv. I, p. 131.

Habitat in paludibus Sibiriæ Europæ et Americæ borealis arcticæ, et temperatæ, in meridionali vero Europa alpes adscendit v. c. Apencinos et Pyrenæos, nec e Hispania, Lusitania et Sicilia : Lis innotui.

tibus et vaginis marcidis cinetus. Felia plus minus longa, antice canaliculata nicula folio uno alterove vaginante suficila, sparsa 1, contracta et congesta. Capstulum ilorens oblongum, squamo catimo valgo steriles multinervia, interieres fertiles uninervia ci terascentes 1, ferruginea, obtusa, margine late pellucida, derso plana. Lana argentea 1, rarius fuscescens, spica his ter, quaterve longier. Stamina tria, anthera lineares, stylus tribius ruber 1 in ar-

agice styli terminatum, fuscum, adidum, lave.

Synonymia E angustifolii et E. Vaillantii difficillime extricanda, ideoque plurima synonyma loc illudve spectantia collective intelligenda eo potius vellem, cum varietatum in Geographia plantarum notioni parum tribuatur momenti, specierum vero historia et distributio principalis erit res, qua systematica scientia promoveatur.

Eriophorum latifelium (Hoppe Taschenb. 1800 p. 108) culmo subtrigono, feliis planis, sub apice contractis triquetris pedunculis scabris, squamis ovatis uninerviis, planis, lana argentea.

Linegrostis panicula minori Tournef. Instit. 664. Vaill. Bot. Par. 117 t. 16 f. 2.

Eriophorum polystachyon & L. Suec. p. 17.

Eriophorum latifolium Mert. & Koch Deutschl. Fl. I. 454. Dum. Fl. Belg. p. 144. Fl. Dan. t. 1381. Hartm. Skand. p. 12. Weium. Petr. p. 19. Eichw. Skiz. p. 121. Bess. Pod. p. 5. Gal. I. p. 58. Höfft Kursk. p. 5. E. Meyer Pl. Labrad. p. 22.

E. polystachyon Roth. Neue Beytr. I. 94. Mutel Fl. Fr. 3. p. 365. Marsch. Bieb. Fl. Taur. Cauc. I. p. 41. Pursh Fl. I. 58.

E. vulgare Pers. syn. I, p. 70.

E. pubescens Sm. Eugl. Fl. I. p. 68. Hook. Brit. I. p. 29 Eugl. Bot. 2633. Bertol. It. I, p. 318.

Habitat in turfosis regionum temperatarum Europæ, Asiæ et Americæ borealis. A Petropoli ad Causasum, a Jemtlandia ad Liguriam. Dauria! Newyork!

Radix fibrosa. Culmus 1-2 pedalis, basi foliis stipatus, superne acutangulus, lævis. Folia radicalia numerosa, plana 2-4 lineas lata spithamea l. pedalia, dorso plana l. leviter carinata, apice triquetra, margine scabra, culmea 2-4, longe vaginantia, culmo breviora, radicalibus similia. Panicula sparsa, foliis binis ternisve, 1-2 pollicaribus, basi scariosis, subspathaceis, suffulta. Pedunculi teretes, hispiduli. Spicæ, vulgo quinque l. sex, florentes confertæ, fructiferæ exsertæ l. rarius congestæ, squamæ fertiles ovatæ, canescentes l. ferrugineæ, scariosæ, uninerviæ, nervo ante apicem eyanascente. Stamina tria, antheræ angustæ, lineares, flavescentes. Stylus supra medium trifidus, pallide fuscescens. Achenium cuneato-lanceolatum, triquetrum, basi styli apiculatum.

O b s. Specimina nounulla Americana magis augustifolia pedunculis glabratis et squamis ciliatis nounihil discedunt.

E nulla arctica terra speciem hanc videre mihi contigit.

do, triquetro, angulis scabris, foliis canaliculatis apice, plano-compressis, pedunculis teretiusculis, tomentoso-hirsutulis.

E. gracile var. majus Höfft in hb.

E. Höffui Nyl. Tab. II.

In Gubernio Kursk Rossiæ australioris ad Dmitrieff leg. anno 1825 b. m. D:r v. Höfft.

Radix fibrosa. Culmus sesquipedalis, sursum acutangulus. Folia angusta, lineam lata, plana l. canaliculata, dorso tereti, apicem versus compresso-triquetra, margine scabra, culmea duo l. tria culmo breviora. Panicula erecta, sparsa, folio uno alterove basi scarioso dilatato, amplectente, cineta. Spicæ tres l. quattuor, squamæ ovato-lanceolatæ obtusæ, pallidæ, nervo valido ante apicem evanescente. Stamina tria, antheræ flavæ, lineares Stylus trifidus, fuscus. Achenum lanceolato-cuneatum fusco-cinereum, nitidum, læve.

Species hæc characteribus eximiis pollens inter Erioph. angustifolium, cujus habet folia, E. latifolium cujus gerit pedunculos et E. gracile, quod culmus refert, ambigit, ab omnibus vero his scabritie culmi discedere videtur. Formam insignem botanicorum examini penitiori commendandam, ne oblivioni tradatur, heic proposui et delineavi.

EPIOPICEM gracile Koch in Roth catalect. 2 app. 1800) culmo trigono, foliis triquetris, pendunculis tomentoso scabris, squamis multinerviis.

Linagrostis augustifolia, panicula sparsa, pappo rariori Scheuchz. Method. p. 61,

Linagrostis pauiculata & Lam. Dict. 257.

Eriophorum polystachyon y L. Fl. Sv. p. 17.

- E. polystachyon Thuill ex M. et Koch D. Fl. I. 456.
- E. gracile DC. Fl. Franç. 3, 132. Engl. Bot. t. 2402.
 Hook. Brit. 29. Bor. Am. II, p. 232. Bertol. It.
 I, p. 320. Dum. Belg. p. 144. Wg. Fl. Sv. I, p. 23. Mert. & Koch D. Fl. I, 456.
- E. triquetrum Hoppe Taschenb. 1800 p. 106. Fl. Dan. t. 1441. Hartt Skand. p. 12. Weinm. Petr. p. 19. Eichw. Skizze p. 121. Höfft Kursk p. 5.
- E. tenellum Nuttall Gen. 2 add.
- E. augustisolim Big. Bost. cd. 2 p. 23.
- ambiguum, culmo trigono, flaccido, foliis angustissimis pedunculis trigonis, subtilissime hirsutulis l. lævibus, lana scordida, squamis subtrincrviis.
- E. gracile Prescott in Bong. Veg. Sitch. p. 51.

Hab, in uliginosis arcticis et temperatis, Europæ usque ad Liguriam et Charcoviam, nec in Sibiria et America boreali desideratur. In Scotia tantummodo in alpinis Benlawers observatum.

Radix repens, stolonifera. Culmi circiter resquipedales, graciles læves, superne triquetri l. teretiusculi. Folia radicalia pauca vulgo marcida, canaliculata, trigona apicem versus triquetra, culmea bina l. terna, uni l. bipollicaria, triquetra, angulis scabra, vagina sursum tumidula et rufescente. Panicula folio unio l. rarius altero, spathaceo basi scarioso involucrata, pedun-

culi graciles triquetri, striatuli, tomentosi, hispiduli. Spicæ subquattuor, sparsæ l. congestæ, florentes ovato-lanceolatæ. Sqamæ late ovatæ, obtusæ viridicinerascentes l. fuscescentes, 5-3 nerviæ, opacæ nec margine pellucidæ, dorso convexiusculæ. Lana spicam bis superans, albida, setæ angustæ, subtilissime sub lente crispatæ l. punctatæ. Stamina tria, antheræ lineares. Stylus infra medium trifidus, rubellus. Achenium lanceolato-cuneatum, basi styli vulgo terminatum, subtilissime punctulatum, nitens.

Obs. E. tenellum Nuttall et E. angustifolium Big. secundum specimina in Hb. Ac. Sc. Petropolitanæ a Cl. Torrey aliisque communicata ab E. gracili europæo discerni non possunt. E. vero gracile Sitchense haud parum a vulgari forma recedit, ita ut observationibus ulterioribus forsan speciem diversam esse confirmetur.

Eriophorum virginicum (L. sp. I, 77) culmo tereti, glabro, foliis planis margine scabris, spicis umbellato congestis, pedunculis glabris, lana fulva.

Gramen tomentosum virginianum panicula magis compacta aureo colore perfusa. Pluk. Alm. 179, t. 299. f. 4.

Gramen tomentosum capitulo ampliore et foliaceo. Moris-Hist. 3. s. 8. t. 9. f. 2.

Eriophorum virginicum Mich. Fl. I, 34. Pursh Fl. I. 58. Nutt. Gen. I, p. 237. Torr. Fl. I, 58. Kunth Cyperogr. p. 179. Hook. Bor. Am. 2 p. 231.

- gracile, culno gracillimo, soliis silisornibus.

L. virginicum ? gracile Torr. l. c.

Habitat in paludosis America borealis a Georgia ad flumen

Reciz fibresz. Culmus sesqui l. bipedalis, teres, lævissimus. Folia radicalia in ricco convoleta, emaccida, culmea plana, margine incurva l. convoleta, lævia, rursum carinato-triquetra senbra. Bractew subternæ foliaew inflorescentia multoties lengieres, vulgo demum refractæ, supra planæ, dorso convezæ, teretes. Pedanculi spicis breviores, teretes lævissimi. Spicæ florentes subplebesæ, strictæ, demum umbellato-congestæ. Squamæ ovatæ, ferrugineæ, multinerviæ, renvi apicem obtusum versus confluentes. Stamina 2—3. Actheræ objeco-lineares. Styli infra medium trifidi, miniati, Achenia antice plana, derso obtusangula oblengo, caneata, apiculata.

3, Lana capillaris, spicæ supradecomposito-cymosæ.

Lachnophorum Nyl.

Eriophorum comesum, (Wall. cat. n. 3446). Culmo tereti superne trigono, foliis rigidis, carinato complicatis, spiculis oblongis, lanccolatis, squamis ovato-lanceolatis, mucronatis.

Seir us comosus Wall in Roxb. Fl. Ind. 1, 234.

Eriophorum comosum Nees, ab Es, in Wight Bot 110. Kunth Cyp. 179.

Le 111.

Scirpus elongatus Hamilt. in Don predr. p. 40.

Eriophorum cannabinum Royle Illustr. p. 415.

Hab. in montibus et convallibus Himalayæ et Kunawur Indiæ orientalis.

Planta speciosa, arundinacea, bi-, tripedalis et ultra. Radix fibrosa, cæspitosa. Culmus strictus, rigidus, glaber. Folia conferta, longissima culmum sæpe superantia, carinata, scabra, tenacissima. Involucrum subpentaphyllum, comans, cymam supradecompositam valde excedens. Rami et ramuli inflorescentiæ graciles, glabri. Spiculæ lanigeræ semipollicares, albidæ. Squamæ naviculares, ferrugineæ l. fuscæ, nervo valido in mucronem excurrente costatæ. Stamina tria, pallide ferruginea, ½ pollicem longa, antheræ lineares. Stylus ad l. supra medium trifidus, croceus. Achenia fusca, lævia fusiformia, trigona latere interiore latiore.



ADDITAMENTUM ALTERUM

ARREST TO THE OWNER OF THE PARTY OF THE PART

ADNOTATIONUM IN MONO-GRAPHIAM FORMICARUM BOREALIUM,

AUCTORE

WILLIAM NYLANDER.

(Societ. Scient, exhib, die 1 Nov. 1846.)

Adnotationibus nostris prioribus in Monographiam Formicidarum borealium jam editis inter Auctores pro eo capite consulendos prætervisum invenimus meritissimum Gould, enjus Account of English Ants anno 1747 prodiit, ubi optima traditur historia horum insectorum, licet Entomologos sequentes eandem rem tractantes fugisse videtur. Gould multa detexit, quæ deinde ab aliis opus ejus ignorantibus denuo observata et publicata sunt. Notitiæ ejus de speciebus, ovis, larvis, pupis et imaginibus formicarum longe pr stantissimæ adparent pro tempore illo. Ova mares feminasque producentia primo progenerari, tum ova operariarum, æque ac De Geer pupam Myrmicarum folliculo haud circum-

textam esse, folliculos ab operariis, quando maturæ sunt pupæ, aperiri, inter alia, commemorat *).

Observationes de specielus præsertim Fennicis continuantes æstate præterlipsa in Ostrobottnia horeali sequentes adnotavimus species. 1) Formica herculeana sat frequenter. Feminæ exalatæ supe sub cortice truncorum in fossulis oblongis solitarie reperiuntur, interdum una cum' cumulo parvo ovorum. Obscura sane videtur sors progenici ejusmodi curis operariarum omni jam pro nutritu carentis. 2) Formica rufa frequentissime. Individua alata usque sub fine m. Junii obvia. Mesosternum feminæ plus vel minus late nigrum. 3) Formica dominula hand rare, numquam vero hic operarias auxiliarias speciei alius sibi adjungens visa. Alata ad Ulcaborg d. 22 Julii frequenter in nido intra truncum pini (sicut truncicolæ), in paroecia Kunsamo ineunte m. Augusto in accevo ad truncum exstructo. Maris clypeus aliquando apice obsolete sinuatus, abdomen nudum (tantum sericeum) setulis aliquot tenuibus parvis in marginibus segmentorum 2 ultimorum, pedes toti mfo-testacei, coxis sæpe fusco nigris **). 4) Formica truncicola passim. Initio m. Augusti & Q in Kuusamo. 5) For-

^{*)} Vide Kirby. An Introduction to Entomology, London 1823, Edit. 3, Vol. 2, pag. 48 seqq.

^(**) Feminas P. dominulæ ex Ulaburgo cum iis P. cuniculuriæ et varietatem maris P. fuscæ cum maribus ejusdem sub studiis primis confundentes, in Adnotationibus ad "Fenniam maxime borealem, extendimus habitationem P. curiculariæ, sed perperam, num ultra Kareliam septentrionem versus nobis haud obvia fuit.

mica congerens satis frequens. In Kuusamo intra acervum in prato a fragmentis gramineis et ramulis betulinis confectum mares plurimi aderant. Infra cum aliis formis ante ignotis est describendus. 6) Formica exsecta frequenter. Variat squama minus emarginata. Marcs et seminæ versus sinem mensis Julii et usque ad medium m. Augusti. 7) Formica pressilabris parcius, Mares in medio m. Julii. 8) Formica picea passim, Etiam in Kuusamo in sphagnosis. 9) Formica fusca vulgaris in terra, sub lapidibus et sub cortice vel in ligno putrescente truncorum. Individua alata primum fine m. Julii. 10) Formica nigra passim ad Ulcaborg et in parocc. Pudasjärvi. Marcs seminæque inde ab initio m. Augusti. 11) Formica flava ad Uleaborg parcius. Mares et seminæ eodem tempore ac præcedentis. 12) Myrmica lævinodis frequens. Dorsum thoracis operariæ (subtransversim et subreticulatin, metanotum sublongitudinaliter) confuse rugulosum, pleuris longitudinaliter striatulis, nodi sublæves lateribus obsolete paululum (sæpe indistincte) longitudinaliter rugulosi, posterior submitidus, lævior. 13) Myrmica ruginoais frequentissime. Operaria similis præcedenti, at crassius rugosa, spinis longioribus magis aculeiformibus; nodi distincte longitudinaliter confuse rugosi, posterior sape supra sublævis; spinæ nonnumquam curvatiusculæ. Mas subundus; a mare M. lævinodis differt corpore nudiore, pubescentia antennarum pedumque breviore. 14) Myrmica sulcinodis in montosis Kuusamoënsibus passim sub lapidibus. 15) Myrmica scabrinodis. In par. Kuusamo in cæspite muscoso nidum inveni. 16) Myrmica lobicornis passim. Variat

c. rath il rati quique fire ten fosco-lighterit ni libriis, auteauis et pedibus pallide rufescentibus. 17) Myrmica acervorum satis frequens sub lapidibus, muscis et cortice truncorum. 18) Myrmica sublævis n. sp. in nido præcedentis in Kuusamo. 19) Myrmica nitidula, in Pudasjärvi, D. Māklin.

Mense Septembri individua alata ad Helsingfors adhue occurrere Formicarum ligniperdæ, pressilabris ¿, exsectæ ¿, nigræ, flavæ et Myrmicarum lævinodis, ruginedis, seabrinodis. In fine hujus mensis feminæ exalatæ F. nigræ solitariæ in fossulis parvis degentes obviæ; in una fossula sub muscis simul cum femina tali operariæ nonnullæ aderant ejusdem speciei solitis saltem duplo minores, longitudinem 3 millimetrorum haud adtingentes. Similiter eodem tempore et modo feminam P. herculeanæ cum operariis aliquot parvis (6 millimetra longis, var. b Adnotatt psg. 894) cohabitantem vidi. — Operarias F. rufæ adhue initio m. Octobris in nidis excludi observavi.

Inter formicidas a D. v. Motschulski e Rossia meridionali nolis missas species in terris quoque borealibus obvenientes aderant F. pressilabris, cunicularia, nigra, M. scabrinodis, lavinodis, nitidula et fuscula *) (hwc, ut in nostris solet, thorace vel infra et in pleuris sufescente vel obscuriore).

^{*)} Una quoque forma mejor (32-4 millim, longa) et tuberculis metathoracis dentiformibus fere obtusicribus colore corporis, ut in nestra boreali, fusco-rufescente, capitis infra, oris et pedum pallescente. — Hic animadvertamus, quod versimillier M. caspitum Latr. fuscular sit synonymon

E formis nobis novis primo memoranda est formica acervicola quædam circa Helsingfors frequens, quæ forte F. rufæ tautum sit varietas. Nominetur F. major. Est circ. $7-7\frac{1}{2}$ millim. longa (rufa circ. $6\frac{1}{2}$ millim.), similis omnino rufæ, at paulo major, squamâ subpentagona supra (interdum minus distincte) obtusæ subangulatim parum emarginatâ; similis] quoque F. congerenti, sed differens formâ squamæ nuditateque corporis (ut in rufa). Individua minora, ut in omnibus speciebus hujus generis, occurrunt. Sexualia in acervis F. majoris invenire haud contigit. Ulterius observanda est.

F. truncicola.

Mas: niger, parum cinereo nitens, crebre pilosulus pedibus et genitalibus rufis, squama petioli subquadrata crassa supra parum concaviuscula, alis albescenti-hyalinis, fere totis infuscatis, nervis fuscis, stigmate atro, longitudine corporis fere 9 millimetrorum.

Similis est mari F. ru/ce, at distinguitur pilositate corporis crebra, alis paulo obscurius fumatis, nervis et stigmate obscurioribus. Area rontis triangularis nitida. Oculi pilosuli, Alæ, anticæ longitudine 8 millimetr. Pedes rufo-pallescentes femoribus plus minus fuscescentibus. Abdomen crebre breviter pilosulum; valvula analis ventralis rufa nitidissima. — Huic sine dubio referendum est synonymon F. lugubris Zett, Ins. Lapp. 449, 6, cujus specimen typicum nin societate cum F. obsoleta var, b., h, e, nostra truncicola captum est.

F. congerens.

Mas: niger parum cinereo nitens, capite thoraceque crebre nigro-pilosulis, pedibus et genitalibus ad partem rufescentibus; squama subquadrata, margine supero attenuato concaviusculo; alis albescenti-hyalinis fere totis infuscatis, nervis fuscis, stigmate atro; longitudine corporis 9 millimetrorum.

Similis mari F, rufar et præcedentis, distat autem ab illo pilositate crebriori, stigmate adhue obscuriori, ab hoc abdomine multo nudiore, atque ab ambis margine squamæ petiolaris supero acutiore. Area frontis triangularis opaca. Oculi pilosuli. Alæ anticæ 9 millimetr. longæ. Pedes aut fusci articulationibus pallescentibus vel ad maximam partem rufo-pallescentes. Squama morgine supero subacuto (in affinibus obtuso). Abdomen parce pilosulum; genitalia sæpissime sordide rufescentia, valvula ventrali plus minus fusca.

F. fusca.

Operaria: fusco-nigra subnitida dense cinereo-nitens, mandibulis, antennis et pedibus sordide rufis, ocellis parvis, squama late triangulariter rotundata, longitudine corporis circ. 5½ millimetrorum.

Admodum similis in omnibus partibus F. glebariæ nostræ ægreque distinguenda colore corporis nigri paulo magis fuscescente, mandibulis, autennis pedibusque dilutius rufescentibus, canescentia sericea paulo fersan ditiore. Plagella apice fuscescentia, femora basi paululum obscurata, alias color antennarum pedumque sat rufus. — Ut vulgaris est F. glebaria in Finlandia meridionali, jta F. fusca in boreali (in terra et in truncis vetustis nidificans),

Obs. Abdomen nitidius, subænescens, squama supra integra vel subintegra et color pedum marem hujus distinguit a mare F. cunicularice. Raro femora in /usca \mathcal{O} basi fuscescunt, sed etiam tum jam tarsi tibiis concolores læte rufo testacei e pedibus differentiam præbent ab eodem.

M. lobicornis.

Mas: nigro-fuscus nitidus parce tenuiter flavido-pilosulus, mandibulis, antennis et pedibus testaceo-pallescentibus, scapis, femoribus tibiisque obscuratis; fronte, pleuris et nodo primo petioli longitudinaliter striatulis; scapis basi curvatis longitudine tertiæ partis totius antennæ; alis hyalinis obsoletissime cinereo-pallescentibus; pedibus pubescentibus; corpore fere 5 millimetra longo.

In nido maximo hujus in terra sub lapide ad Uleâborg niares d. 11 m. Augusti numerosissimos inveni, feminam vero solum unicam.

Characteribus illis ab affinibus cognitis statim discernendus, M. lavinodi & paulo minor. Caput subtilissime in fronte longitudinaliter et alibi granulatim rugosum; antennæ 13-articulatæ sparse breviter pilosulæ, paululum longiores quam apud M. scabrinodem & (multoque nudiores), scapus pallide fuscescens basi subangulatim (lere ut in M. sulcinodi Q) curvatus, longitudine articulorum 5 sequentium; articuli 3-6 æquales parvi, 7-8 sensim majores; flagellum et apex scapi pallide testacea. Thorax meso-, metapleuris, scutello et metanoto longitudinaliter striatis; metathorax postice processu obtuse-angulato vel subdentiformi utrinque, spatio excavato lævi nitido. Alæ nt in M. scabrinodi, fere pallidiores, anticæ 4½ millim. longæ. Pedes pubescentes olivaceo-pallidi, articulationibus tarsisque testaceo-pallidis. Nodus petioli anterior longitudinaliter parum striatulus posterior lævis. Abdomen sæpe apice et marginibus segmentorum paulo pallescentibus.

Myrmica rugulosa n. sp.

Operaria: sparse flavido-setulosa pallide ferruginea, abdomine supra parum fuscescente, capite thoraceque longitudinaliter rugoso-striatis, spinis metanoti longis, rugis nonnullis in nodis petioli, longitudine corporis $3\frac{3}{4}-4\frac{1}{4}$ millimetrorum.

Femina: similis operariæ præter disserentias sexuales, crassius rugosa, longitudine 5 millim.

Parce ad Helsingfors sub lapidibus. Inter formicas a D. Doctore Dahlbom olim e Succia missas etiam immixta.

- \$\textit{\mathcal{T}}\$. Similis operaria \$M\$, ruginodis (5-5\frac{1}{4}\$ millim, longa), sed minor, capite thoraceque opacis (nec sient in illa subnitidis), colore pallidiore. Caput totum pallide ferrugineum vel rufo-testaceum, confertim rugoso-striatum et subreticulatum, in interstitiis subtiliter coriaceum vel rugulosum; clypeus totus striatus, area frontalis triangularis sapissime indistincta; oculi prominudi. Thorax mesonoto confertim confuse sublongitudinaliter, pleuris et metanoto longitudinaliter sat crasse rugosis; spina fere aquales ac in ruginodi \$\frac{1}{2}\$, forte paululum breviores. Pedes pubescentes (vel decumbenti-pilosuli), subnitidi. Nodi petiolares pallide rufi opaci obsolete longitudinaliter rugosi, nodus posterior sulco solito laterali utrinque. Venter in mortuis basi fuscescens.
- Similis omnino feminæ M. ruginodis, magis autem opaca paulum minor, area frontis triangulari indistincta, nodis lævioribus. Caput supra obsolete fuscanum; clypeus totus et locus areæ triangularis striati. Thorax undique longitudinalitar rugoso-striatus, spinis fere æque longis ut operariæ. Nodi petioli opaci rugulis nonnullis obsoletis longitudinalibus. Abdomen supra infraque fuscescens, apice late præsertim infra pallide rufum. Specimen solum unicum femineum hucusque exalatum inveni.

Myrmica sublævis n. sp.

Operaria: pallide rufa crebre flavescenti setulosa, abdomine fusco-nigro; antennis validiusculis 11-articulatis; capite magno et thorace longitudinaliter striatulis, illo utrinque ad oculos excavato; spinis metathoracis mediocribus; nodo petioli posteriore infra dente valido antice instructo; longitudine corporis circiter 4½ millimetrorum.

Rare in paroecia Kuusamo sub cortice trunci betulini putrescentis capta in nido Myrmicæ acervorum, ubi parasitice sodaliter habitabat, qua vita congruentiam cum sequente ostendit.

Ad M. nitidulam accedens, multo vero major, capite proportione alia, lamina frontali explicata &cet. Caput subnitidum leviter longitudinaliter striatulum magnum, subrectangulare, ad os fere latius quam ad occiput, longitudine 11 millim., abdomine latius; mandibulæ nitidæ, apice fuscescente lævi; clypeus parvus in medio impressiusculus, nitidus; antennæ sat crassæ rufæ subnitidæ, articulis 5 ultimis flagellorum majoribus; pro scapis antennarum intus ab oculis fovea adest' utrinque oblonga in latere frontis acute marginata, unde lamina frontalis lateribus (marginibus acutis) subparallelis ad verticem fere extensa oritur; vertex et occiput lævia, hoc parum concavatum. Thorax leviter sublongitudinaliter striatulus vel rugulosus, suturâ inter meso- et metathoracem (vel rectius inter scutellum et metathoracem) impressa profunde constrictus; spinis sat validis. Pedes paululum pubescentes, femoribus parce setulosis, Nodi petioli subæque longi obsolete rugulosi, rufi, supra visi anterior longitudinalis tenuiter tricarinatus, carina una infra et una in latere utroque, posterior transversus infra processu dentiformi valido, Abdomen politum fusco-nigrum, basi et infra pallescens.

M. nitidula Additam. 1 pag. 1058.

Operaria: levis tota nitidissima, nuda, rufa, abdomine fusco, antennis 12-articulatis, metathorece dente valido horizontali utrinque, nodo petioli posteriori infra spinula valida antice instructo, longitudine corporis 23 millim.

Femina: similis operariæ præter differentias sexuales, obscurior, longitudine corporis 3 millimetrorum.

Ad Helsingfors hoc auctumno frequenter in acervis F. majoris. Cum F. congerente et rufa quoque obvia. Feminas plurimas in acervis singulis invenimus exalatas. Totam vitam verisimiliter intra acervos formicinos peragit hæc species parasitica,
quia nullibi alias occurrit. Pleniorem ejusdem hic dabimus descriptionem.

5. Pili capitis thoracisque rare sparsi tenuissimi, microscopi. Caput ad os paulo latius quam ad occiput; mandibulæ apice denticulatæ; genæ subtilissime rugulosæ, clypeus sat magnus disco planus, areæ triaagularis nullum vestigium; antenæ validiusculæ, processu frontali supra radices earum vix ullo; oculi mediocres atri. (In individuis multis ocellos vidimus). Thoracis dorsum æquale convexiusculum; depressio suturalis inter scutellum et metathoracem leviter immersa. Pedes validiusculi, nudi. Nodi petioli subtilissime microscopice granulato-rugulosi, quare etiam nitore omni (nisi supra) carent; posterior spinula infra sita dentiformi antrorsum versa, (in fuscula ibidem tuberculum), anterior infra processu compresso cariniformi. Abdomen fuscum apice rufescens. Variat color corporis rulus (ut in M. muscorum et tuberum) pallidior vel obscurior.

Q. Statura feminarum solita ocellis, suturis dorsi thoraracis planiusculi et scutelli distinctis. Mandibulæ et genæ striatulæ. Abdomen sæpius totum fuscum. Alæ in speciminibus examinatis desunt, in unico ala postica albohyalina tantum restat.

Occasione hac uti liceat formas quasdam formicarum Europæ meridionalis ante ignotas exponendi, quæ momenta comparationis cum borealibus præbentes jam speciebus nostris strictius accuratiusque circumscribendis conferant itaque proposito Additamenti hujus consulant.

1. Formica nigrata n. sp. \(\frac{1}{2}\): subnitida, sparse flavidopilosa, nigra, antennis piceis; mandibulis, (tibiis et) tarsis rufis; squama crassiuscula oblonga; longitudine corporis 6 millim. et ultra. → \(\frac{1}{2}\): nigra nitida, tarsis rufo-piceis, squama subquadrata, alis albo-hyalinis nervis et stigmate dilute flavo-brunnescentibus; 8 millim. longa. → \(\frac{1}{2}\): subnitidus, totus niger, squama parva humili supra concaviuscula; 6 millim. longus.

E Messina a Cel. Zeller \(\xi\), e Rossia meridionali \(\xi\)\(\pa\) a D.

Motschulski.

\$\tilde{\pi}\$. Pertinet hac species ad subdivisionem nostram generis Formical primam. Caput solito angustius in ea subdivissione vel ut in var. b. F. herculeanæ; palpi fusci; carina clypei distincta; antennæ obscure piceæ; area frontis triangularis parva obsoleta; ocelli nulli. Dorsum thoracis longitrorsum æqualiter convexiusculum; metathorax valde compressus. Pedes picei, articulationibus, tibiis tarsique rufis. Squama mediocris ovali-oblonga

supra convexa, pilis aliquot obsita. Abdomen subnitidum pubescentia depressa et pilis crectis adspersum (situ certo in exemplaribus Linis cocrulescens). Specimen russicum antennas et pedes habet obscuriores, tibras nigropiceas. — Q nigra tota, punctulata et subtiliter coriacea, articulationibus pedum tarsisque piceo-rufis. Alæ anticæ ut in diagnosi statuitur, 9 millim. longæ. Squama supra integra, margine sat tonui. — d'angustus, omnino niger, punctulatus et subtilissime coriaceus. Oculi nudi. Flagella antennarum pedesque pilosa. Alæ sicut feminæ, anticæ 6 millim. longæ.

2. Formica pallens n. sp. 7: subniti la, rare pilosa, pallide rufa, ab iomia: fuscescente, seprama crassiuscula oblonga; longitudine corporis 5—6½ millimetrorum.

E Messina reportata a Cel. Zeller.

Subdivisionis primæ sicut præcedens, cui ad sormam magnitudinemque est similis. Caput, thorax et pedes pallide rusa, oculi atri. Areæ frontalis nullum vestigium visibile. Abdomen suscescens basi pallidum vel sere totum pallide suscum.

2. Formica atricolor u sp. 7: nitida pilis ratis adspersa, pure nigra, antennarum scapis tarsisque rufescentibus, thoracis dorso subæquali metathorace postice angulo recto truncato, squama crassa supra convexa, longitudine corporis 4-5 millim.

E Rossia meridionali a D. Motschulski.

Caput mediocre (sere ut in F. glebaria), subtilissime microscopice crebre punctulatum; clypeus carina obsoleta; area triangularis parva indistincta; mandibulæ nigræ; scapus antennarum basisque slagellorum obscure rusa vel piceo-rusescentia; stemmata nulla. Thorax subtilissime coriacco-rugulosus, præsertim in pleuris, dorso subplano, metanoto subrectangulari, depressio inter scutellum et metathoracem vix ulla; metathorax postice abrupte truncatus. Pedes nigri subnudi, articulationibus tarsisque rufis vel piceo-rufis. Squama mediocris cuneato-ovata postice plana, antice pulvinata, supra convexiuscula, tota coriaceo rugulosa. Abdomen rare albido pilosum.

4. Formica dalmatica n. sp. \$\frac{3}{2}\$: nitida sparsim pilosa, rubido-rufa, capite abdomineque nigris; metanoto longitudinaliter concaviusculo lateribus subacute marginatis, antice sat profunde discreto a scutello; squama crassiuscula supra convexa; longitudine corporis 4—5 millimetrorum.

Ex insula Dalmatica Lagosta Cel. Zeller.

Propriæ pertinere videtur subdivisioni inter nostras primam et secundam. Caput formæ ut in F. herculeana , subtilissime crebre punctato-rugulosum, nigrum, mandibulis et antennis rufis, flagellis apicem versus fusce-scentibus; stemmata nulla. Pulvinar anterius thoracis (a mesonoto scutello-que conformatum) metanoto subrectangulari altius et duplo latius; pleuræ subtiliter punctato rugulosæ; metathorax postice (fere ut in præcedente) abrupte truncatus. Pedes rufi subnudi. Petiolus rufus, squama mediocris subcuneata, superficie posteriore plana, anteriore convexiuscula, margine supero rotundato pilis aliquot longis obsito. Abdomen totum nigrum, pilis raris adspersum.

5. Formica ænescens n. sp. 2: nitida, tenuiter canescenti sericea, nigra subænescens, tarsis rufescentibus, area frontis triangulari indistincta, squama subovata supra subtruncata, abdomine compressiusculo, longitudine corporis fere 7 millimetrorum. — 2: tantum tarsis piceo-rufis, squama supra sinuatim emarginata, alis albescenti hyalinis totis obsolete infuscatis, nervis et stigmate

cinerco suscessentibus, longitudine corporis circ. 8 millimetrorum.

— 3 subsimilis seminæ, subnitidus, abdomine altiore quam thorax, area srontis indistincta, longitudine corporis 61 millim.

E Rossia meridionali a D. v. Motschulski, qui per literas communicavit cam pedes anticos in arena fodiendo adhibere.

🖫. Ad subdivisionem nostram hujus generis tertiam pertinet, assinis F. glebaria, sed major, anescens, squama paulo minori augustiori, abdomine paulo compresso. Subnuda capite thorace et scutello subnitidis tenuiter canescenti-sericois, pili nonnulli in corpore ratissime sparsi. Mandibulæ validæ crasse longitudinaliter striatæ (in glebaria leviter indistincte), valide dentata: area triangularis frontis nitida levissime tantum indicata, carina clypei distincta; antennæ obscure rufescunt; ocelli mediocres. Metathorax convexus. Pedes articulationibus tarsisque plus vel minus pure rufis, tibiis piceorufis; setulæ tenues pareæ in latere interiore tibiarum. Squama subrectangulariter ovalis, supra subtruncata, nuda. Abdomen nitidum nigro-æneum vel fere absque unescentia. - Q nigra paulo unescens, nitida capite thoraceque subtiliter punctulatis et strigulosis. Vestigium areæ frontalis triangularis obsoletum. Flagella piceo-rufescentia. Alæ anticæ ut in diagnosi dictum, dilutissime præter aream costalem brunnescentes, 8 millim. longæ, area dicoidalis satis parva. Pedes geniculis, tibiarum apicibus tarsisque sordide rufis. Squama subrectangularis supra subangulatim sinuata. - of Capite thoraceque subtiliter coriaceis, illo opaco, hoc subnitido, antennis et pedibus nigris, his articulationibus auguste rusescentibus, alis anticis 61 millim, longis, squamasubquadrata aupra leviter concaviuscula, apice abdominis cum genitalibus magnis rusescentibus; valvulæ (vaginæ) externæ lineari-exsertæ longe pilosæ, longitudine majore quam internæ, supra intermedias appendix utrinque tenuis cochlearilormis majuscula, pagina superiore concaviuscula, valvulæ internæ quoque lineares externis paulo angustiores apice rotundato-obtusæ *).

^{*)} Sub nomine Formica glabrella D. v. Motschulski e Tscherkask misit operarias speciei F. nigræ affinis. Est paulo minor, angustior, pure nigra, glabra, geniculis et tarsis rufescentibus, metathorace valde ob-

6. Myrmica mutica n. sp. ♥: sparse flavido pilosa, pallide sordide rusescens, capite supra et tibiis suscescentibus, abdomine supra striis transversis, sat regularibus; nodis petioli rugulosis; longitudine corporis 7 millim. — ♥: nigra, ore cum mandibulis, geniculis pedum et tarsis obscure ferrugineo-rusis, slagellis rusescentibus; capite, pleuris et metathorace striatulis, nodis petioli rugulosis; alis albo-hyalinis, nervis et stigmate suscis, areis cubitalibus tribus; longitudine corporis 11 millim. — ♂: niger slavido pilosus, capite et thorace obsolete striatulis vel rugulosis, præter metathoracem distincte longitudinaliter striatulum, longitudine corporis paululum ultra 5 millim.

E Rossia meridionali D. v. Motschulski.

Magis affinis est M. fusculæ, quam ulli alii in Adnotationibus nostris allatarum, notis autem datis illico distincta, ratione magnitudinis illius gigas. O peraria: Caput magnum, 2 millim, latum, supra visum subquadratum; mandibulæ latæ striatæ; area triangularis frontis obsoleta striatula ut clypeus; antennæ proportione graciliore quam in fuscula Ç, pedicello cylindrico longitudine articulorum 2 sequentium, flagellorum articulis ultimis pauxillum solum crassioribus, quam ceteri; occiput læve nitidiusculum; locus scutelli magni in dorso thoracis nitidiusculus nec striatura ulla distincta, metanotum totum usque ad apicem metathoracis transversim striatum margine utrinque subacuto, nulli vero processus laterales; femora infra canaliculata, tibiæ subfuscæ; nodus petioli anterior gibbo superno altius elevato quam posterior; abdomen (præter petiolum) paululum ultra 2 millim. longum. — Femina: Caput striatulum ore et laminæ frontalis margine summo supra radices antennasum piceo-rufis;

liquo, squama parva nitida. Ex speciminibus missis haud bene describenda.

mesonotum et sentellum subnitida, punctis sparsis pro insertionibus pilorum parvorum, mesoplemæ læviores quam propleuræ et metathorax, hic magis striatus utrinque postice a latere visus obtusissime angulatus; alæ ant. fere 14 millim. longæ, areis cubitalibus 3, fere ut in fig. 4, tertia solum indicata, media subcuneiformis (basin alæ versus subpetiolata incipiens, apice fere in medio apud unum specimen nervo versus apicem vergente appendiculata), abdomen (præter petiolum) 5 millim, longum. — Mas sat similis mari M. fusculæ, at differt pilositate, colore antennarum, pedum, nervorumque alarum et harum areis cubitalibus aliis; mandibulæ apice summo rufescentes, antennæ nigræ; pedes nigri geniculis summis et tarsis obscure rufescentibus, alæ albo-hyaliaæ nervis et stigmate pallide fuscis, anticæ 7½ millim, longæ, area cubitalis media sicut feminæ appendiculata (in specimine unico examinato) metathorax supra utrinque postice obsoletissime subangulatim deflexus.

7. Myrmica striatula n. sp. \$\frac{1}{2}\$: nigra sparse flavido pilosula, ore antenuis et pedibus rufis; capite, thorace nodisque petioli longitudinaliter striatis, thorace postice spinulis validinalite de control longitudine perfectis; longitudine corporis 2\frac{1}{2}\$: millim.

In ligno vetusto Rossiæ meridionalis D. v. Motschulski.

Hand parum speciem fert operariæ M. fusculæ, sed obscurior, sculptura profundiore, crassiore, thorace et tihiis brevioribus, spinulis illius horizontalibus (nec sursum obliquis), nodis aliis, abdomine latiore. Caput rugositate longitudinali minus discreta et profunda quam in thorace, antennis 12-articulatis paululum crassioribus quam in fuscula D. Thorax capite fere brevior, apice paulo piceo-rufescens et etiam nodi petioli subtus; impressio tergi planiusculi thoracis postice declivis transversa distincta nulla (in illa adest). Pedes pilis tenuibus sparsis, præsertim in tibiis breviusculis (in fuscula pili iis breviores, magis æquales). Nodus petioli anterior gibbo superno obsoleto fere in medio sito, nodus posterior supra visus paulo latior quam

longus et subrectangularis (angulis scilicet obtusis), ambo scabri. Abdomen nigrum nitidum supra visum ovato-rotundatum.

S. Myrmica lippula n. sp. \$\foralleq\$: fusca nigricans parcissisime pilosula; ore, antennis et pedihus rufescentibus, abdomine præsertim infra fere ejusdem coloris; rugositate capitis thoracisque irregulari, oculis valde minutis, spinulis metanoti parvis paulo sursum obliquis, petioli nodo primo elongatulo; longitudine corporis fere 3 millim.

E Rossia meridiopali D. v. Motschulski.

Differt a M. fuscula D præcipue capite angustiore, oculis fere triplo minoribus nodis petiolaribus gracilioribus, basi nodi anterioris supra visi lineari longiore quam pars gibbosa (in illa D parte eadem brevior). Caput mediocre, clypeo et area minutissima frontis nitidiusculis, ceteroquin cum thorace confuse confertim rugulosum. Impressio tergi thoracis transversalis distincta, sat profunda; spinulæ minutæ metatheracis oblique sursum paulo versæ. Pubescentia pedum (sicut antennarum) crebrior quam in fuscula et tibiæ robustiores. Nodus posterior supra visus nitidiusculus sublongitudinalis sen longitudinaliter ovato-rotundatus (in fuscula transversim ovalis, vide tabulam Adnotatt, fig. 36). Abdomen superne cum nodis brunneum, infra pallescens. (Unicum solum vidi specimen hujus speciei distinctæ.)

9. Myrmica diluta n. sp. 2: pallide testacea, sparse flavido pilosula, capite supra obsolete et segmento abdominis primo a basi trans medium dilute fuscescentibus, capite longitudinaliter elevatiuscule striato, thorace cum nodis petioli opaco-rugulosis, nodo posteriore læviore, spinis metathoracis longis; longitudine corporis 5 millim.

E Rossia meridionali D. v. Motschulski.

Forte est verz M. rubra Latreillii (seclusis ejus vârietztibus). Valde afficis M. lavinodi, sed fere major, pallidior, rugositzte tenuiore, spinis paulo longioribus, nodis opacis; ut videtur, specie distincta, quam tamen e speciminibus binis lustratis accuratius bic describere nequeo. Fuscescentia dorsi segmenti primi abdominis diluta duas illius tertias partes anteriores occupat, abdomen alibi dilute testaceo-paliidum corpori cetero concolor.

Obe. Feminam in collectione Henningiana vidi buie affinem operaria vel ejusdem speciei, abdomine toto corpori reliquo concolore pallide ruto, spinis metathoracis mediocribus, fere ut in M. ruginodi Q.

10. Myrmica pallida a sp. I: tres pellile sessente levis, a side, sparse p. se, merathorace musica, ped bus decumbenti-pilosulis, longitudine corporis 4 millimetrorum.

E Messina a Cel. Zeller.

Satis similis M. Lavinodi I., sed pallidior, paulo minor, glabra, marginibus lamine frontalis supra radices antennarum minus explicatis, coulis minoribus atris, metathorace mutico. Area frontalis indistincta. Antennarum articuli 4 ultimi majores. Nodus petiolaris anterior declivitate antica nuda duplo longiore quam postica, infra antice dentis vel protuberantia nullum

12. Myrmica pallidula a sp. 7- tota pellide rule, levis mule, spersim longe pilese, acromis longes, clave flegellurum triana data noradiornee muies, pellibus decimbrati pilesulis longitudine corporis 2 millimetrorum.

E Messina a Cel. Zeller.

Forma capitis fere ut in M. nitidula ovato-oblonga; antennæ fere 1½ millim. longæ, 12-articulatæ, scapo ultra occiput adtingente, articulis 10-12 crassioribus, basi paulo angustioribus (unde discretis); area frontalis distincta; oculi mediocres. In medio dorsi thoracis impressiones binæ transversæ, limites scutelli distincte demonstrantes (quod in hoc genere insolitum); metathorax subtilissime paululum rugulosus tuberculo utrinque postice parvo obsoleto vel nullo. Pedes longi.

12. Mayrmica flavidula n. sp. ξ : minuta, tota pallide flavescens lævis, nitida, pilosa, antennis clava flagellorum biarticulata, metathorace declivi mutico, pedibus pubescentibus, longitudine corporis 1, millim. vel adhuc minore.

E Rossia meridionali a D. Motschulski (ad flumen Don in terra sub lapidibus, sec. litt.).

Caput structuræ solitæ lateribus parallelis; antennæ sat breves, (ut apparet) 9-articulatæ, scapo longitudine circ. \$\frac{1}{2}\$ totius antennæ occiput minime adtingente, articulis 2—7 parvis æqualibus, 8 rotundato-conico triplo majori, ultimo priori duplo fere longiore subcylindrico apice subacuto; oculi valde minuti atri. Thorax pone medium suturâ ante metathoracem profunde constrictus. Pedes rigidiuscule decumbenti pilosuli. Nodus petioli anterior gibbo paulo altiore quam posterioris. Abdomen in speciminibus aliis a basi ad medium sensim magis at dilutissime fuscescens. Hæc specimina in trunco querceo, sec. D. Motschulski, inventa, certe vero hujus speciei. Individua minima vix 1 millimetro longiora.

Species sequentes propriæ subdivisionis generis Myrmicæ binas Messinæ captas benignissime communicavit Cel. Zeller, abdomine instructas subtriangulari, supra cujus basin truncatam adfigitur petiolus, ano acuto.

13. Myrmica sordidula n. sp. 7: tota serille brunnea vel pallide fusca, abdomine apice obscuriori, lævis nitida, longe sparsim pilosa, metathorace spinula utrinque; longitudine corporis fere 24 millimetrorum.

Caput (supra visum) rotundatum; antennæ 11-articulatæ; clypeus convexus; areæ frontalis vestigium nullum; oculi mediceres ovales. Thorax obsolete rugulosus sutura ante metathoracem profunde constrictus; spinula validiuscula utrinque sursum paulo directa. Pedes rigidiuscule sparsim pilosi. Petiolus (ut supra dictum) in superficie superiori baseos abdominis adfixus; nodi subnitidi, anterior declivitate antica plana nuda. Abdomen parte dimidia posteriore fusca.

depresso cinerascenti-pubescens, submitida, thorace longitudinaliter ruguloso, metathorace spina utrinque, nodis inæqualibus, anteriore antice dilatata, posteriore transversim didymo; longitudine corporis fere 31 millimetrorum.

Similis priori, at major, aliter colorata et insculpta, nodis aliis; species pulchra. Pili corporis rare sparsi, præter pubescentiam depressam. Caput formæ ut in præcedente testaceo-rubrum; flagella versus apicem fuscescentia; oculi atri. Thorax fusco-niger antice parum rubescens; spinis horizor-taliter porrectis acutis. Pedes fusci subnudi, tantum sparsim depresso pubescentes, articulationibus et tarsis obscure rufescentibus. Nodus petioli anterior antice latior depressior, posterior supra longitudinaliter per sulcum divisus, igitur quasi didymus, ambo leviter rugulosi. Abdomen totum fuscum pubescentia depressa cinerascenti adspersum

Addant addant, quad Myrmica unifasciata Latr. a M. muscorum, cui nostrarum est proxima, secedat operaria: colore panto palluliure, daran thursess planiare, spinis los girribus (proportione ut in *M. lævinodi*), abdominis segmento primo fascia indeterminata poue medium latiuscula et latera exinde versus basin fuscescentià tincta, margines segmentorum obsolete fuscescentes, caput supra obsoletissime. Femina latior, robustior, quam femina ejusdem, et longitudine 4½ millim, colore pallido, præter fasciam segmenti primi abdominis et alias ante summos margines ceterorum fuscas (quare abdomen 4-fasciatum adparet, fascia prima ceteris multo latiore), fuscescentia capitis superna et mesonoti lateribus anticeque in medio obsoleta vel vix ulla, alæ albæ nervis fere ut in *M. tuberum* (vide Tab. fig. 6), area vero radiali pauxillum aperta, anticæ 4 millim. longæ. — Specimina e Rossia meridionali a D. v. Motschulski missa.

Præcedentibus jam conscriptis novam detegere contigit Faunæ Fennicæ speciem generis Myrmicæ, cujus descriptionem hic adnectere liceat. Nominetur

Myrmica hirtula.

Operaria: pallide rufa, crebre longiuscule flavo setulosa, abdomine supra fuscano; capite sat magno, fronte longitudinaliter in medio striatula utrinque excavata; antennis validiusculis 11-articulatis; spinis metathoracis dentiformibus subhorizontalibus; nodo petioli etiam posteriore infra dente antice instructo; longitudine corporis fere 3½ millimetrorum.

Ad Helsingfors in nido parvo Myrmicæ muscerum individua rovem inveni. Inquilina ejus videtur, tamquam M. sublævis Myrmicæ acervorum.

Ad propriam cnm M. sublavi subdivisionem forma capitis, mandibulis inermibus, scapis deplanatis, soveis pro iisdem capitis utrinque et gibbo nodi petiolaris anterioris antice abrupte declivi se ab alii. Myrmicis nostris sejungentem pertinet. Vita parasitica simul ambæ conveniunt. — Simillima est Myrmicæ sublævi, sed multo minor, pilositate lutea rigida præsertim in capite thoraceque longiore, capite paulo magis elongato et abdomine dilutiore. Caput supra visum (præter mandibulas) subrectangulare; mandibulæ læves nitidæ margine apicali concaviusculo lævi, inermi (in M. nitidula subsex-denticulato); antennæ scapo deplanato; genæ reguloso striatulæ. Thorax sublævis, vestigiis obsoletissimis rugulositatis et in pleuris striarum subtilissimarum; sutura ante metathoracem forte minus profunda et dentes metathoracis forte minores quam in M. sublævi; hi dentes sere pauxillum sursum obliqui. In semoribus infra pili nonnulli. Nodi petiolares ambo infra dente antice muniti; anterior altior superne a basi sua sere mox subverticaliter in gibbum ascendit. Abdomen supra pallide surum, apice dilutiore; aculeus solitus.

Corrigenda in Additamento primo:

Pag. 1943 lin. 2 timidæ l. timidi

- 1044 - 23 place l. plaie

- 1049 - 15 豆 4. Q

- 1050 - 19 limites affinem intra & affinem intra limites

_ 1053 - 26 pagg. 926 L pag. 936

- 1054 - 15 rubido-rufa /. pallide rubido-rufa

- 1056 - 32 spinilormibus l. spinilormia

- 1060 - 10 tice l. antice

In Additamento hoc:

- 26 - 12 nigrum & suseum

- 40 - 29 iis L ii

Index specierum.

Genus Formica.

	Subdivis. 1													
1.	F. herculeana L											Pag.	901	1044.
2.	F. ligniperda Latr.	•	•	•	•	•			•		•			1045.
3.	F. pubescens Fabr.	,	•	•		•	•	•	٠	٠	*	_	899.	1040.
	F. nigrata	•	•	•	•	•	•	•	•			_	35.	
	F. nigrata F. pallens	•	Ċ	•	•	۰	•	•	•	•	•	_	36.	
2	F. dalmatica	•	•	٠	•	٠		•	•	*	•	_	37.	
	Subdivis. 2		·	•	•	•	•	•	•	·	,		37.	
4.	F. vividula	٠	٠	٠	•	•	•		•	•	•	_	900.	
	Subdivis, 3	3.												
5.	F. rufa L		٠									_	902.	1047.
n me	- major var. (credo)		,								_	29.	
6.	F. dominula			:						-		_	905,	26.
7.	F. congerens							٠				-	906,	30.
8.	F. truncicola									:	7	_	907.	29.
9.	F. exsecta	٠			٠							_	909,	27.
10.	F. pressilabris			٠		•		٠	0			_	911.	
11.	F. cunicularia Latr.					٠		٠				_	913.	
	F. atricolor					٠	٠	٠	٠			_	36.	
12.	F. fuliginosa Latr.			٠	٠			٠					915.	
	F. cenescens			٠	٠			٠				_	37.	
13.	F. picea	٠			٠	٠		٠	٠	3		-	917,	1059.
14.	F. glebaria	•						4			٠	_	917.	
15.	F. fusca L	٠	٠	٠	٠		٠	ь				_	919,	30.
16.	F. nigra		٠	٠	,n	٠		0	٠	٠	٠	_	920,	38.
	F. glabrella Motsch,		٠		٠	۰	٠	٠			٠	_	38.	
17.	F. flava Fabr									٠		-	922.	
18.	F. umbrata					٠						_	1048.	
19.	F. mixta		٠	•	٠	٠		•	٠	٠	٠		1050.	
	Genus Myrmica													
	Subdivis, 1													
20.	M. lævinodis							+	•	•	0		927,	27.
21.	M. ruginodis			•	•		•		•	٠		_	929,	27.
22,	M. scabrinodis				0				٠		٠		930.	
	M. granulinodis .	•	٠	4	٠		¥	•	•	4		_	1060.	

23.	M. lobicornis :	Pag.	932,	31.
24.	M. sulcinedis	-	934.	
25.	M. rugulosa	-	32.	
	M. diluta	_	41.	
	M. pallida	_	42.	
	M. pallidula	_	42.	
	M. flavidala	_	43.	
26.	M. fuscula	_	935,	1053.
	M. striatula	_	40.	
	M. lippula		41.	
	M. mutica	-	34.	
	M. bicarinata	_	1051.	
	M. unisasciata. Latr	-	44.	
.7.	M. acervorum Zett	_	937,	1057.
28.	M. muscorum		1054.	
29.	M. tuberum Zelt	-	(434, 1	1057.
30.	M. nitidula '	_	10%,	34.
	Subdivis. 2.			
31.			33.	
32.	M. sublavis		41.	
34.	M. Mirtail		٦,,	
	Subdivis. 3.			
	M. sordidula	_	44.	
	M. rubriceps	_	44.	

Obs. Numeri ordinis ante adfixi sunt solum speciebus borealibus Europæ; species asterisco denotata incertæ pertinet subdivisioni, quam ob defectum speciminum sexualium derterminare hand potui. Numeri paginarum inter 894-934 et 1044-1061 Tomum præcedentem Actorum Societatis Scientiarum respiciunt; ceteri præsentis sunt Additamenti alteri. Tribus speciebus iterum additis, Formicidæ cognitæ Fennicæ inveniuntur 31, quarum Formicæ generis 18 et Myrmicæ 13.

UEBER

DAS ATOMISTISCH-CHEMISCHE MINERAL SYSTEM

UND

DAS EXAMINATIONS SYSTEM DER MINERALIEN,

TON

N. NORDENSKIÖLD.

(Vorgetr. in der Societ. d. Wissensch. d. 11 Dec 1848.)

0000

Die von Baron Berzelius im Jahresbericht von 1846 für das chemische Mineral System vorgeschlagenen Veränderungen haben mich zu einer nechmaligen Prüfung meiner früheren chemischen Anordnungsweise der Mineralien*) veranlasst, und in Folge dessen bin ich zu bedeutenden Modificationen derselben geführt worden, durch welche ich eine wesentliche Vervolkomnung des chemischen Mineralsystems erreicht zu haben glaube. — Da das auf diese Weise entstandene System hauptsächlich auf den atomi-

^{*)} Försök till framställning af Kemiska Mineral Systemet; 2:dra upplagan. Helsingfors 1833.

In einem Handbuche der Mineralogie, welches alle bis jetzt im Russland und Finland aufgefundenen Mineralien umfassen soll und mit dessen Ausarbeitung ich bereits seit mehreren Jahren beschiftigt bin, werde ich sowohl dieses atomistisch-chemische System als auch das von mir bereits früher vorgeschlagene Examinations System vollständig entwickeln; da jedoch dieses Werk sobald nicht erscheinen kann, so will ich jetzt doch vorläufig diese beiden Systeme in tabellarischer Form mit kurzer Bevorwortung dem mineralogischen Publicum zur Beurtheilung vorlegen.

In dem atomistisch-chemischen Systeme wird die von mir früher angenommene Klasseneintheilung unverändert beibehalten,

^{*,} Utkast toll ett Examinations System für Mineralicene. Acta Societ. Scient. Fennice. Tom L pag. 625.

so dass also das System Siehen Klassen enthält, welche ich auf folgende Weise bezeichne:

- 1:e Klasse. Haploiten, enthaltend die chemischen Grundstoffe.
- 2:e Diploiten, enthaltend die Grundstoffe unter einander.
- 3:e Bidiploiten, enthaltend die Verbindungen der Diploiten unter einander.
- 4:e Tridiploiten, enthaltend die Verbindungen der Bidiploiten mit Diploiten.
- .5:e Tetradiploiten, enthaltend die Verbindungen der Bidiploiten unter einander.
- 6:e Pentadiploiten, enthaltend die Verbindungen der Tetradiploiten mit Diploiten.
- 7:e Hexadiploiten, enthaltend die Verbindungen der Tetradiploiten mit Bidiploiten ?).

Die Klassen zerfallen auf folgende Weise in Ordnungen, Genera und Species. Für die Ordnungen und Genera wird einzig und allein auf den atomistischen Bau der chemischen Formeln, nicht aber auf die chemische Verschiedenheit der Elemente Rücksicht genommen, und zwar entstehen die Ordnungen durch die Mannigfaltigkeit, welche die Diploiten entweder unter sich

^{*)} Note 1.

darbieten, oder in welcher sie unter einander ohne Rücksicht auf numerische Verhältnisse zu mehr zusammengesetzten Verbindungen zusammentreten; die Genera aber durch die Verschiedenheiten der numerischen Verhältnisse, nach welchen die Verbindungen der Diploiten unter einander stattfinden. Erst bei dem weiteren Zerfallen der Genera in Species kommt die chemische Beschaffenheit der Elemente in Betracht, und zwar zerfällt ein Genus in so viele Species, als wir chemischverschiedene Elemente enthaltende, aber nach einer atomistischen Formel gebaute Mineralien kennen.

Kommt dann der Fall vor, dass zwei oder mehrere Körper sich finden, welche, obgleich sie genau nach einer und derselben Formel zusammengesetzt sind, und in allen Gliedern die gleichen Grundstoffe in einem und demselben Verhältnisse enthalten oder mit andern Worten, chemisch in keiner Weise von einander zu unterscheiden sind, dennoch aber verschiedene physikalische Charaktere besitzen (Krystallform, Härte und specifisches Gewicht), so bilden diese hier im chemischen Systeme nur verschiedene Formen einer und derselben Species. Obgleich uns im Ganzen nur erst sehr wenige solcher Beispiele bekannt sind, bin ich doch der schon früher von mir ausgesprochenen Meinung, dass alle Mineralien, sowohl einfache als zusammengesetzte, in so viel verschiedenen Formen vorkommen können, als es verschiedene Krystallsysteme giebt. Dass alle diese Formen nicht wirklich vorstallsysteme giebt. Dass alle diese Formen nicht wirklich vor-

kommen, liegt darin, dass die Entstehung jeder derselben von eigenthümlichen Bedingungen abhängig ist, und dass die Bedingungen, welche bei der Bildung der in der Erdkruste vorkommenden Mineralien stattgefunden haben, meistens nur die Entstehung einer einzigen Form begünstigt haben. So nur, glaube ich, kann man die bei einzelnen Grundstoffen beobachtete, entweder natürlich oder künstlich hervorgebrachte Dimorphie oder Polymorphie mit den gleichen Erscheinungen bei zusammengesetzten Körpern in Einklang bringen.

Eine solche Anordnungsweise hat vor dem von Berzelius vorgeschlagenen rein chemischen Systeme den grossen Vorzug, dass Körper, welche in jeder Hinsicht nahe mit einander verwandt sind, wie z. B. die verschiedenen Granate, nicht an mehreren ganz verschiedenen Stellen des Systems gleichsam zerstreut, sondern unmittelbar nach einander als verschiedene Species eines und desselben Genus aufgezählt werden. — Es wird ferner dadurch, dass bei dieser Anordnungsweise bis zu den Species auf die Verschiedenheit der Elemente gar keine Rücksicht genommen wird, die Möglichkeit gegeben, weitläuftige Umschreibungen der Ordnungen und Genera dadurch zu vermeiden, dass man sie durch Schemata bezeichnet, welche, während sie die grösste Mannigfaltigkeit hinsichtlich der in den einzelnen Gliedern enthalten seyn könnenden Grundstoffe gestatten, dennoch stets durch den atomistischen Bau der Formeln streng begränzt sind. Diese Schemata nun sind

es, welche das hier entwickelte System hauptsächlich charakterisiren, und ihre Bildung muss ich zuerst so weitläuftig als nöthig erörtern, ehe ich zur systematischen Auseinanderreihung der Ordnungen, Genera und Species übergehen kann.

Wenn man nur auf die mechanische Zusammengruppinung der Atome Rücksicht nimmt, so reduziren sieh alle in der unorganischen Natur fertig gebildet vorkommenden binären Verbindungen fast ausschliesslich auf sechs verschiedene, durch chemische Formeln ausdrückbare, Verhältnisse. Bezeichnet man diese Formeln ihrer natürlichen Reihenfolge nach mit den römischen Zahlen I bis VI auf folgende Weise:

so hat man in diesen 6 Zahlen das Material für die Schemata aller Ordnungen der verschiedenen Klassen ^{co}). Für die Klasse der Diploiten bilden diese Zahlen unmittelbar die Schemata für die

^{*)} Sollte man mit der Zeit im Mineralreiche Verbindungen auffinden, welche den Formeln Mn und Os entsprechen, so müssten diese, der Analogie zufolge, mit VII und VIII bezeichnet werden.

^{**} Der Werth dieser Zahlen lässt sich dadurch sehr leicht dem Gedächtnisse einprägen, dass alle ungeraden Zahlen Doppelatome des Radicals enthalten, verbunden mit der durch die Zahl direct ausgedrückten Anzahl von Atomen eines electronegativen Elements (gleichviel ob dieses Chlor, Sauerstoff, Schwefel u. s. w. ist); und dass alle geraden Zahlen nur ein einfaches Atom des Itadicals enthalten, verbunden mit nur halb so viel Atomen eines electronegativen Elements, als die Zahl ausdrückt.

Ordnungen. Bei den Bidiploiten werden die Schemata für die Ordnungen durch die Combination der obigen Zahlen auf die Weise gebildet, dass, ganz nach Analogie der chemischen Formeln, die den electropositiven Diploiten bezeichnende Zahl jederzeit der des electronegativeren vorangesetzt wird. In den höheren Klassen verbindet man die Schemata der Bidiploiten und Diploiten durch ein +, ganz so, wie es bei den chemischen Formeln geschieht.

Für die Bezeichnung der Genera, welche dem oben angenommenen Principe zufolge aus den Verschiedenheiten der numerischen Verhältnisse hervorgehen, nach denen die Verbindungen der durch obige Zahlen ausgedrückten Diploiten unter einander stattfinden, oder welche mit andern Worten dadurch entstehen, dass ein oder mehrere Atome eines electronegativen Diploiten (Säure) mit einem oder mehreren Atomen eines electropositiven Diploiten (Basis) verbunden vorkommen, könnte man zwar ganz einfach die diese Verhältnisse in den chemischen Formeln ausdrückenden Zahlen in gleicher Weise in die Schemata einschalten, so dass z. B. wenn HI.VI eine Ordnung der Bidiploiten bezeichnet, III3. VI2 ein Genus derselben seyn würde; allein da auf diese Weise kein leichter Überblick über die Genera behufs ihrer folgerechten Anchanderreihung zu erlangen ist, so ziehe ich es vor, für die Genera besondere Schemata zu bilden. Dazu bezeichne ich zuerst die Stellen, an welchen sich in

den chemischen Formeln Zahlen vorfinden können, ein für allemal auf die in der Mathematik für die Exponenten und Coefizienten gebräuchliche VVeise durch Buchstaben, und zwar so, wie es in folgendem, die complicirtesten Verhältnisse umfassenden Schema einer Ordnung aus der Klasse der Hexadiploiten, ausgedrückt ist:

Dadurch erhält man für jede der Klassen, auf welche dies Anwendung findet, eine bestimmte Formel für alle Genera derselben, und zwar für die einzelnen Klassen folgende Formeln:

für die Bidiploiten
$$---\frac{x}{y}$$
.

Tridiploiten $---\frac{x}{y}$; n ; n' .

Tetradiploiten $---\frac{x}{y}$; $\frac{x'}{y'}$; n ; n' .

Pentadiploiten $---\frac{x}{y}$; $\frac{x'}{y'}$; n ; n' ; n'' .

Hexadiploiten $----\frac{x}{y}$; $\frac{x'}{y'}$; $\frac{x'}{y''}$; n ; n' ; n'' .

Durch die Hinzulügung des aus den chemischen Formeln ersichtlichen Werthes der einzelnen Glieder zu diesen Formeln, entstehen aber neue, leichtverständliche und von denen der Ordnungen völlig unabhängige Schemata für die einzelnen Gattungen.

Durch diese Schemata ist die Möglichkeit zu einer folgetechten Aneinanderreihung sowohl der Ordnungen als auch der Genera gegeben. Für die Ordnungen bewirke ich eine solche auf die Weise, dass ich das Schema jederzeit mit dem kleinsten electronegativen Diploiten beginne, und, wenn dieser in verschiedenen Gliedern gleich gross ist, dass ich das, den kleinsten electropositiven Diploiten enthaltende, Glied voransetze. So z. B. geht die Ordnung: II. I der Ordnung II. VI voran und ich schreibe II. I + II. VI nicht aber II. VI + III. I, so wie II. VI + III. VI und nicht III. VI + III. VI; aus demselben Grunde muss das Schema III. I dem Schema II. IV vorangehen u. s. w. Dadurch ergeben sich von selbst einige Veränderungen in der Anordnung der Glieder in einigen Formeln, und es muss z. B. in den Formeln für Hydromagnesit, Antigorit, Chlorit, Ripidolith das Talkerdehydrat das erste, nicht aber das letzte Glied bilden, Veränderungen, welche anzunehmen ich mich genöthigt gesehen habe und welche durch das Princip gerechtfertigt werden.

Für die Aufeinanderfolge der Genera nehme ich als Regel an, dass stets die Exponenten $\left(\frac{x}{y}\right)$ den Coefizienten (n) voranzustellen sind und dass sowohl bei den Exponenten als bei den Coefizienten ein Aufsteigen von den kleineren zu den grösseren zu befolgen ist.

Einige Beispiele aus den Klassen 3 bis 7, auf welche diese Verhältnisse nur allein Anwendung finden, werden zum vollkommenen Verständniss hinreichen:

Die Species Cyanit (Al³ Si²) gehört zu den Bidiploiten, zu der Ordnung III.VI und dem Genus: $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. Dieselbe Ordmung enthalt in genie im system under Reihentolge ungeführte Genera:

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$= 1. \text{ Wenn } y = 1, \text{ wird es nicht ausgeführt.}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$= 2.$$

$$= 3.$$

Die Speries Bann nie: (Ca'Sb + 2 PL'Sh) gehört zu den Frankplainen, zur der Ondaung I. III + II. III und dem Genus: $\frac{\pi}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi'}{y} = \frac{1}{3} \cdot n = 1$. n = 2. Die Ordnung aber, zu welcher dieser Genus gehört, embalt trigende Genera in systemals her Iteihenfolge:

$$\frac{z}{z} = \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{3} = \frac{1}{3} \cdot n = 1 \cdot 3 = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} = 1 \cdot 1$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4} = 2 \cdot 1$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4} = 1 \cdot 2$$

Für die Aneinanderreihung der Species endlich folge ich der von Berzelius im Jahresbericht für 1846 vorgeschlagenen electrochemischen Anordnung der Grundstoffe, nur in umgekehrter Ordnung. Ich ordne also die Species erst nach ihren electronegativen und zuletzt nach ihren electropositiven Bestandtheilen.

Dies sind die Grundzüge meines atomistisch-chemischen Mineralsystems. Über die drei ersten Klassen will ich noch folgendes kurz anführen.

Die erste, nur Grundstoffe in sich begreifende Klasse enthält keine Ordnungen, weil diese Verbindungen voraussetzen, von welchen hier nicht die Rede seyn kann. Sie kann ferner auch keine Genera in der von mir dafür angenommenen Bedeutung enthalten, da sie aber so viele Species in sich schliesst als sich Grundstoffe in ungebundenem Zustande in der Natur vorfinden, so bilden diese dennoch ein Genus in der gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes. Einige Legirungen führe ich bloss als Varietäten auf, weil solche sich in allen Proportionen mit einander verbinden können und man kaum sagen kann, dass der eine Bestandtheil mehr electropositiv ist als der andere.

Die zweite Klasse enthält nur 6 Ordnungen, für welche die für die Diploiten angenommenen römischen Zahlen unmittelbar die Schemata vorstellen; da bei den Diploiten von einer Modification des atomistischen Verhältnisses nicht die Rede seyn kann, so enthält jede Ordnung nur ein einziges Genus.

Für die 36 in der Klasse der Bidiploiten möglichen Ordnungen kann man auf folgende VV eise einen Rahmen bilden:

	II.I	111.1	IV. I	VI.1
1.11	11.11	111.11	ж	
1.111	11.111	111.111		
	II.IV		IV. IV	Ť
	V. 11	111.\	1	
	II.VI	ш.Хі	IV. VI	×

Wenn man in diesem Rahmen die wirklich vorkommenden Ordnungen, wie oben, einträgt, so erhält man nicht nur ein übersichtliches Bild derselben, sondern ersieht auch sogleich, dass sie der oben angegebenen Anordnungsweise zufolge so auf einander folgen müssen. Mit dem Sternehen sind solche Ordnungen bezeichnet, welche nicht für sich allein, sondern nur in complicirteren Verbindungen vorkommen.

In den folgenden Tabellen gebe ich nun eine Aufzählung aller bekannten Mineralien nach dem oben entwickelten Systeme. Ich habe bei jeder Species die Angabe der Krystallform, der Hänte und des specifischen Gewichts hinzugefügt, sowohl deshalb, weil sich daraus in manchen Fällen interessante Folgerungen ableiten

lassen, als auch um dadurch eine Anknüpfung dieses Systems an mein Examinations System der Mineralien zu bewirken. Da dieses letztere bis jetzt, so viel ich weiss, nur im schwedischen Originale gedruckt ist, lasse ich den Tabellen über das atomistischchemische System andere über das Examinations System folgen, um so mehr, da sich beide gegenseitig ergänzen. Man wird nämlich im atomistisch-chemischen Systeme Species finden, welche aus Mangel an physikalischen Charakteren im Examinations Systeme keine Stelle finden könnten, und ebenso enthält das Examinationssystem Species, welche aus Mangel an einer chemischen Analyse nicht in das atomistisch-chemische System aufgenommen werden könnten.

In Bezug auf das Examinations System muss ich noch bemerken, dass dasselbe hier durch zwei neu hinzugekommene Abtheilungen bereichert worden ist, von denen die eine, und zwar die
siebente solche Mineralien enthält, welche, ohne bestimmt krystallisirt zu seyn, doch mehr oder weniger deutliche Spuren von Krystallisation zeigen; die andere aber, die achte, die ganz derben
Mineralien aufzählt.

Die Krystallsysteme benenne ich nach Mohs, wie sie in seinen ersten Arbeiten angeführt sind; neue Benennungen könnten zwar besser seyn, aber die alten sind gut genug, wenn man ihren Sinn kennt; gegen alle kann man mehr oder weniger gegründete Anmerkungen machen. Das Reguläre System bezeichne

ich wie früher mit Te, das Rhomboedrische mit Rh, das Pyramidale mit Py, das Prismatische mit Pr; und um nicht denen zu widersprechen, die bloss ein Prismatisches System annehmen wollen, bezeichne ich das Hemiprismatische mit Pr₂ und das Tetartoprismatische mit Pr₄. — Härtegrade sind auch nach der von Mohs zuerst angegebenen Skala.

Aus den Tabellen wird man im Allgemeinen ersehen, dass in dem Examinations Systeme die Idée der mineralogischen Species im gewöhnlichen Sinne beibehalten worden ist. So kommt z. B. darin die Verbindung kohlensaurer Kalk, welche in dem atomistisch-chemischen Systeme zwar als zwei ungleiche Formen (die prismatische und die rhomboedrische) aber nur als eine Species aufgeführt ist, als zwei ganz getrennte Species (Arragonit und Kalkspath) vor; Hornblende wiederum kommt im Examinations Systeme nur als eine mineralogische Species, im atomistisch-chemischen Systeme aber als mehrere Species vor, welche doch nicht an verschiedenen Stellen des Systemes zerstrent sind, sondern alle unmittelbar auf einander folgen.

Wenn in einer Formel, wie es in der Mineralogie oft vorkömmt, ein Diploit mehrere chemisch verschiedene aber analoge Grundstoffe als Radical oder Säure enthält, was man entweder nach Bonsdorff durch Untereinanderstellen der verschiedenen Diploiten oder nach meinem Vorgange durch Nebeneinanderstellen und Einschliessung in Klammern bezeichnet, z. B.

$$\dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{u}} \\
\dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{u}} \\
\dot{\mathbf{B}}_{\mathbf{a}}$$

$$\dot{\mathbf{M}}_{\mathbf{n}^{2}+2} \dot{\mathbf{H}} = (\dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{a}}, \dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{u}}, \dot{\mathbf{B}}_{\mathbf{a}}) \dot{\mathbf{M}}_{\mathbf{n}^{2}+2} \dot{\mathbf{H}}$$

$$\dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{u}^{4}} \left\{ \ddot{\ddot{\mathbf{A}}}_{\mathbf{s}} \right\} + \dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{u}^{4}} (\ddot{\mathbf{A}}_{\mathbf{s}}, \ddot{\ddot{\mathbf{P}}}) + \dot{\mathbf{H}}$$

Vertretung eines Grundstoffes durch einen oder mehrere andere stets in bestimmten Proportionen stattgefunden hat. Es leuchtet von selbst ein, dass sich für alle diese Fälle durch Rechnung ein atomistisches Verhältniss ausfindig machen lassen muss, nur wird dieses Verhältniss mehr oder weniger complicirt ausfallen und seine Ausmittelung mehr oder weniger Schwierigkeiten verursachen. So z. B. wird im Herschelit*) das Natron durch Kali und Kalkerde zum Theil vertreten und zwar im Verhältnisse wie 34: 10: 1, was ich der Einfachheit wegen so ausdrücke:

$$(\dot{C}a + 10 \dot{K}a + 34 Na)^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i^2 + 15 \dot{H}$$

statt der weitläuftigeren aber ganz richtigen Formel:

$$(\dot{\text{C}}\text{a}^3 \, \ddot{\text{Si}}^2 + 3 \, \ddot{\text{A}} \ddot{\text{I}} \, \ddot{\text{Si}}^2 + 15 \, \dot{\text{H}}) + 10 \, (\dot{\text{K}}\text{a}^3 \, \ddot{\text{Si}}^2 + 3 \, \ddot{\text{A}} \ddot{\text{I}} \, \ddot{\text{Si}}^2 + 15 \, \dot{\text{H}}) + 34 \, (\dot{\text{N}}\text{a}^3 \, \ddot{\text{Si}}^2 + 3 \, \ddot{\text{A}} \ddot{\text{I}} \, \ddot{\text{Si}}^2 + 15 \, \dot{\text{H}}).$$

^{*)} Damours Analyse. Siehe: Drittes Supplement zu Rammelsbergs Handwörterbuch der Mineralogie; pag. 56.

Ebenso wird im Olivenit die Arseniksaure durch 3. Phosphorsaure vertreten und die Formel ist: Cu* (3 P+19 As) + H.

— Auf diese Weise habe ich im Systeme einige solche Verhältnisse angegeben.

Mehrere Mineralogen haben ganz im naturhistorischen Sinn den Mineralien einen generischen und einen specifischen Namen zu dem Hilliager begis zum den Mineralien auch die O. hungsnamen bei, als: Untheilbarer Parachrosallophan; Hemiprismatischer Habronemmalachit. Ich gebe bloss den gewöhnlichsten Trivialnamen, der sich einem jeden Systeme anpassen lässt.

Bemerken werde ich, dass eine grosse Menge Mineralspein. Lei mit au Untersordnung ihre themischen Zusammensetzung
in Hinsicht ihrer Formeln verändert werden oder gar verschwinden muss; es ist jedoch besser, sie fürs erste aufzunehmen, als gar
nicht zu beachten. Wo die Unsicherheit gar zu gross ist habe
ich ein Fragezeichen beigefügt. Bloss beispielsweise sind einige
Minnehmen angeheint, wo Stehle, meh dem organischen Principa
zusammengesetzt, einbegriffen sind. — In einer künstigen Abhandlung werde ich die Anordnungsweise der Substancen vegetabilischen Ursprungs zeigen.

^{*)} Damours Analyse. Oben angesuhrtes Supplement, pag. 67.

neral Systems

mg.

S ech s te Pentadi	Siebente Klasse. Hexadiploiten.	
)rd.Sch. 11 . I+II . IV+II.	10.0rd.Sch.III.V+III.VI+1.	1. Ord. Sch. II. I+II.III+III.IV.
1. Genus.	3. Genera.	1. Genus.
Ord. Sch. II . 1+ II . V+ I.	110rd.Sch.III.V+III.VI+II	2. Ord, Sch. II. I+II. VI+III.VI.
6. Genera.	1. Genus.	6. Genera.
ord. Sch. III. I + II. V+I.	12.Ord,Sch.II.VI+II,VI+I.	3. Ord. Sch. II.II+II.VI+III.VI.
2. Genera.	6. Genera.	1. Genus.
Prd.Sch.III.I+III.V+I.	13. Ord. Sch. II. VI+III. VI+I.	4. Ord. Sch. III. III+II. VI+II. VI.
3. Genera.	60. Genera.	1. Genus.
?rd.Sch,III.I+II.V+IV.	140rd.Sch.II.VI+III.VI+IV	5.Ord.Sch.II.IV+II.VI+III.VI.
1. Genus.	4. Genera.	2. Genera.
rd.Sch. 11. 1+11. V1+1.		6. Ord. Sch. II .V+III.V+IV.VI.
8. Genera.		1. Genus.
ord.Sch.III.I+III.VI+VI.		7. Ord. Sch. II. VI+II. VI+III. VI.
1. Genus.		2. Genera.
rd.Sch. 11.111+11.VI+1.		
3. Genera.		
)rd.Sch. 11.V+111.V+1.		
5. Genera.		

Pag. 64 beizufügen.

Klassen und Ordnungen des Atomistisch-Chemischen Mineral Systems nebst Angabe der Anzahl Genera in jeder Ordnung.

Erste Klasse. Haploiten.	Zweite Klasse. Diploiten.		Klasse.	Vierte Tridip			Klasse. ploiten.	Sechste Pentadi		Siebente Klasse. Hexadiploiten.
1 Ordnang	t. Ord. Schema: I	I. Ord. Sch. II . I.	10.0rd. Sch. 111.111.	1. Ord. Sch. III . I +VI.	10, Ord. Sch. III.VI + 1.	1. Ord. Sch. II . I + II . IV.	10.Ord.Sct. II . III+III .VI.	1.0rd.Sch. 11 . 1+11 . 1V+11.	10.0rd.Sch.111.V+111.VI+1.	1. Ord. Sch. 11. 1+11.111+111.1V.
and	1,G.mit5 Subgenera.	1. Genus.	2. Genera.	1. Genus.	23. Genera.	5. Genera.	1. Genus.	1. Genus.	3. Genera.	1. Genue.
1 Genus mit	2. Ord. Schema: 11.	2. Ord. Sch. III . I.	11.0rd. Sch, 11, IV.	2. Ord. Sch. II. III + I.	11.0rd. Sch. II .VI+IV	2. Ord. Sch. 11 . I + II . V.	11. Ord. Sch. I. IV+II. IV.	2.0rd.Sch. II . 1+ II .V+ I.	11 Ord. Sch. III.V+III.VI+II	2. Ord, Sch. II . I+II. VI+III . VI.
2 Subgeners.	1.G.mit 8 Subgenera.	4. Genera.	3. Genera.	5. Genera,	2. Genera.	3. Genera.	1, Genus.	6. Genera.	1. Genus.	6. Genera.
	3. Ord. Schema: III	3. Ord. Sch. IV . I.	12.0rd. Sch. 1V.1V.	3. Ord. Sch. II. IV + I.	12. Ord. Sch. Ш. VI+IV.	3. Ord. Sch. II , I + II .VI.	12.0rd. Sch. II.1V+II.VI.	3.0rd.Sch. 111.1+11.V+1.	12.0rd,Sch.II.VI+II.VI+I	3. Ord. Sch. II.II+II.VI+III.VI.
	1.G.mit 2Subgeners	1. Genus.	1. Genus.	10. Genera,	1. Genus.	4. Genera,	6. Genera.	2. Genera.	6. Genera.	1. Genur.
	4. Ord. Schema: IV.	1. Ord. Sch. VI . I.	13. Ord. Sch. II . V.	1. Ord. Sch. III , IV+ I.	13. Ord. Sch 111. VI+VI.	4. Ord. Sch. III . I + II.Vl.	13. Ord. Sch. II .VI+II .VI.	4.0rd.Sch.111,1+111.V+1.	13.0rd.Sch.11.VI+III.VI+I.	4.0rd.Sch. 111.111+11.VI+11.VI.
	1.G.mit 8Subgenera.	2. Genera.	4. Genera.	1. Genus.	2. Genera,	2. Genera.	7. Genera.	3. Сепога.	60. Genera.	1. Genus.
	5. Ord. Schema: V.	5. Ord. Sch. 1, II.	14. Ord. Sch. III.V.	5. Ord. Sch. 11. IV+ IV,		5. Ord. Sch. III . I + III .VI.	14.0rd. Sch. II .VI+III .VI.	5.0rd.Sch.III.1+II.V+IV.	140rd.Sch.II.VI+III.VI+IV	5.Ord.Sch.11.1V+11.VI+111.VI.
	1. Genus.	3. Genera,	2. Genera.	1. Genus.		1. Genus.	32. Genera.	1. Genus.	4. Genera.	2. Genera.
	6. Ord. Schema: VI	6. Ord. Sch. 11 . 11.	15. Ord. Sch. II .VI.	6. Ord. Sch. 11. V + 1.		6.0rd. Sch. 1 . III + II . III.	15. Ord. Sch. III. VI+III. VI,	6.0rd.Sch. 11.1+11.V1+1.		6. Ord. Sch. II .V+III.V+IV.VI.
	1G mit.2Subgenera.	6, Genera,	5, Genere,	9. Genera.		4. Genera.	2. Genera.	8. Genera.		1. Genus.
		7. Ord. Sch. 111 . II.	16.0rd, Sch. III.VI.	7, Ord. Sch. III .V + I.		7. Ord. Sch. II . III + II . III.		7.Ord.Sch.III.I+III.VI+VI.		7. Ord. Sch.11. VI+11. VI+111. V1
		2. Genera.	8. Genera.	7. Genera.		2. Genera.		1. Genus.		2. Genera.
		8. Ord. Sch. 1. 111.	17. Ord. Sch. IV. VI.	8. Ord. Sch. 11 .V + IV.		8. Ord. Sch. II . III + II .V.		8. Ord. Sch. 11.111+11.VI+1.		
,		2. Genera.	2. Genera,	3. Genera.	-	1. Genus.		3. Сепета.		
		9. Ord. Sch. 11 . 111.		9. Ord. Sch. II .VI+I.		2. Ord. Sch. 11 . III + II .VI.		9.0rd,Sch.11.V+111.V+1.		
		9. Genera.		25. Genera.		1. Genus.	4	5. Genera,		

DAS

ATOMISTISCH-CHEMISCHE MINERAL SYSTEM.

ERSTE MLASSE.

Genus und Subgenera.	Name der Grundstoffe.
Einziges Genus:	
a. Säurebildende Grundstoffe.	1. Sp. Schwefel
	2. — Selen?
	3. — Arsenik
	4. — Antimon
	5. — Tellur
	6. — Kohlenstoff: 1:r Form: Diamant
	2. — Graphit
	3. — Anthrazit
b. Basbildende Grundstoffe.	7. — Gold
	Var. β. Rhodium Gold
	— γ. Electrum *)
	8. — Platina
	Var. β. Eisenplatin
	9. — Iridium
	Var. β. Iridosmin
	— γ. Osmium-iridium 10. — Palladium
	1 Form:
	2 Form:

^{*)} Note: 2.

Maploiten.

Chemische Zeichen.	Krystall- form.	Härte.	Specifisches Gewicht.
1. Spec. S	Pr	1,6:2,5	1,9:2,0
2. — Se	Am	2	4,3
3. — As	Rh	3,5	5,7:5,8
4. — Sb	Rh	3:3,5	6,5:6,7
5. — Те	Rh	2:2;5	6,1:6,4
6. — C			
	Te	10	3,5:3,6
	Rh	1:1,5	1,8:2,2
	Am	2:2,5	1,3:1,6
7. — Au	Te	2,5	19:19,6
(Au, Rh)	}		15,5:16,8
(Au + 2 Ag)	Те	2,6:3	12:14,7
8. — Pt	Te	4,6:5,5	17:19
(Pt, Fe)	Te	6:6,5	14,6:14,9
9. — (Îr, Pt)	Te	7	22:24
$(\dot{l}r + 0)$	Rh	7	19,0:19,5
(ir + 30)	Rh	7	21:22,6
10. — Pd			
	Te	4,6:5	11,5:12
	Rh	4,6:5	11,5:12

Var. β. Palladiumgold
11. Sp. Silber
12. — Quecksilber
Var. β. Amalgam
— 7. Arquerit
13. — Kupfer
14. — Wismuth
15. — Zinn
Var. β. Kupferstannur
16. — Blei
17. — Eisen

Var. β. Meteoreisen

(Pd, Au)			
11. Spec. Ag	Te	2,6:3	10:10,5
12. — Hg	-		13:14
(IIg, Ag)	Te	3:3,5	12,5:13,7
$(Hg + Ag^6)$	Te	2:2,5	10,8
13. — Cu	Te	2,6:3	8,4:9
14. — Bi	Te-	2:2,5	9,6:9,8
15. — Sn	Py	2	7,1:7,3
(2 Sn + Cu)	Rh		7,5:7,6
16. — Pb ·	Te	1,5	11:11,5
17. — Fe	Te	4,6	7:7,8
(Fe, Ni, Co)	Te	4,6	7,5:7,8

ZWEITE MLASSE.

Ordnungen und Genera.	Nante der Verbindungen.
1:e Ordnung. Schema: I.	
1. Genus a. Sauerstoffverbind.	1. Spec. Eis 2. — Kupferoxydul 1:e Form: Rothkupfererz 2:e Form: Chalkotrikit
b. Schwefelverbindungen c. Selenverbindungen d. Antimonverbindungen	4. — Berzelin
e. Arsenikverbindungen 2:e Ordnung. Schema: II.	
1. Genus a. Chlorverbindungen b. Jodverbindungen c. Sauerstoffverbind.	 Spec. Quecksilberhornerz — Jodquecksilber — Kupferschwärze, Tenori — Bleioxyd — Rothzinkerz V.3. Manganhaltiges Zinkoxyo — Nickeloxyd
	7. — Periklas

^{*)} Nute: 3.

Diploiten.

Chem	ische: Zeichen.	Krystall- form.	Härte.	Specifisches Gewicht.
	- 1			
1. Spec.	₩ ÷	Rh	1,5	0,95:0,97
2. —	Ċu	Те	3,5	5,7:6,0
3. —	€u S	Rh Pr	2,5	5,8 5,4:5,7
4. — 5. —	Cu Se Ag Sb	Xr Pr	1 3, 5	8,9:10,0
6. —	Ni As	Pr	5,0:5,5	7,8:8,1
1. Spec.	Hg Cl	Py	1,0:1,5	6,4:6,5
2. — 3. —	Hg I? Ču	Py? Rh?		
	Pb. Žn	Rh	4,0:4,5	5,4:5,5
6. —	Żn, Mn	2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Mg, Fe	Te	6	3,7:3,8

d.	Sili	vefe.	lverbin	ndungen
		-		0

- S. Sp. Realgar
- 9. Glaserz
- 10. Zinnober
- 11. Covellin, Kupferindig
- 12. Bleiglanz
- 13. Greenockit
- 14. Zinkblende
- 15. Haarkies
- 16. Magnetkies
- 17. Manganglanz
- 18. Selensilber
- 19. Selenblei
- 20. Kupfernickel
- 21. Arsenikmangan
- 22. Antimonnickel
- 23. Tellursilber
- 24. Tellurblei

- e. Selenverbindungen
- f. Arsenikverbindungen
- g. Antimonverbindungen
- h. Tellurverbindungen

Dritte Ordnung. Schema: III.

1. Genus a. Sauerstoffverbind.

- 1. Sp. Arsenikblüthe
- 2. Antimonblüthe
- 3. Wismuthocker
- 4. Eisenoxyd

1:e Form: Martit?

2:e Form: Eisenglanz

8. Sp. As S	Pr_2	1,6:2	3,5:3,6
9. — Ag S	Te	2,0:2,5	6,9:7,2
10. — Hg S	Rh	2:2,5	8:8,2
11. — Cu S	Rh	1,6:2	3,8:3,85
12. — Pb S	Te	2,5	7,4:7,6
13. — Cd S	Rh	3:3,5	4,8:4,9
14. — Zn S	Te	3,5	4:4,1
15. — Ni S	Rh?	3,5	5,2:5,3
16. — Fe S	Rh	3,6:4,5	4,4:4,7
17. — Mn S	Te	3,6:4	3,9:41
18. — Ag Se, Pb Se	Te	2,6	8
19. — Pb Se	Te	2,6:3	8,2:8,8
20. — Ni As	Rh	5:5,5	7,5:7
21. — Mn As	Am		5,5:6
22. — Ni Sb	Rh	5	7,5:7,6
23. — Ag Te	Rh?	2,6:3	8,4:8,6
24. — (Pb, Ag) Te	Te	3:3,5	8,1:8,2
1. Sp. Äs	Pro		
***	Te	3,5	3,6:3,7
2. — Šb	Pr	2,5	5,5:5,6
3. — Bi	~ Am	1	4,4:4,7
4. — Fe			
	Те	6	4,8
	Rh	5,6:6,5	5:5,3

	Var. B. Titaneisen
	5. Sp. Braunit
	6. — Korund
b. Schwefelverbindungen	7. — Auripigment
	8. — Grauspiessglanz
	9. — Wismuthglanz
	10. — Kobaltkies
	11. — Amöbit
Vierte Ordnung.	
Schema: IV.	
1. Genus: a. Fluorverbindungen	1. Sp. Fluocerit, neutraler
	2. — Yttrocerit
	3. — Flussspath
b. Chlorverbindungen	4. — Silberhornerz
	5. — Cotunnit
	6. — Steinsalz
	7. — Salmiak
c. Bromverbindungen	8. — Bromsilher
d. Jodverbindungen	9. — Jodsilber
c. Sauerstoffverbind.	10. — Tellurocker
1	11. — Titanoxid
	1:r Form: Anatas
	2:r — Rutil
	3:r — Brookit
	12. — Schwerbleierz

Fe; Ti	Rh	5:6	4,4:5
5. Sp. \ddot{M}_n	Py	6:6,5	4,8:4,9
6. — Äl	Rh	9	3,9:4
$7 As S^3$	Pr	1,6:2	3,4:3,6
8. — Sb S ³	Pr	2	4,5:4,7
9. — Bi S ³	Pr	2:2,5	6,1:6,4
10. — Co S ³	Te	5,5	4,9:5
11. — Ni (S, As) ³	Te	4	6:6,1
1. Sp. Ce Fl ² , 2 Ca Fl ³	Rh	4	4,7
2. — Y Fl, Ce Fl, Ca Fl	Pr?	5,6	3,4:3,5
3. — Ca Fl	Te	4	3,1:3,2
4. — Ag Cl ²	Te	1:1,5	5,5:5,6
5. — Pb Cl ²	Pr?		5,2:5,3
6. — Na Cl²	Te	2	2,2:2,3
7. — (N H ⁺) Cl ²	Te	1,5	1,4:1,5
8. — Ag Br ²	Te	1:1,5	5,8:6
9. — Ag i²	Te?	1,5	
10. — Ÿe	Xr		
11. — Ti			
	. Py	5,5	3,75:3,9
	Py	6:6,5	4,2:4,3
	Pr	5,6:6	4,1:4,17
12. — Ÿb	Rh		9,3:9,5

	13. — Zinnstein
	14. — Mangansuperoxid
	1:r Form: Pyrolusit
	2:r —— Polianit
f. Schwefelverbind.	15. — Molybdänglanz
	16. — Schweseleisen
	1:r Form: Eisenkies
	2:r — Speerkies
	17. — Hauerit
g. Selenverbindungen	18. — Riolith?
h. Arsenikverbind.	19. — Grauer Speisskobalt
	20. — Arsenikeisen
	21. — Eisenkobaltkies
W. Ga Ouden	22. — Arseniknickel
Fünfte Ordnung. Schema: V.	
1. Genus	1. Sp. Antimonsäure
Sechste Ordnung. Schema: VI.	
1. Genus: a. Sauerstoffverbind.	1. Sp. Molybdanocker
	2. — Wolframocker
	3. — Qwarz
b. Arsenikverbind.	4. — Arsenikantimon
	5. — Tesseralkies
	6. — Arseniknickel von Has-
	selhäne

13. — Sn	Py	6:6,5	6,8:7
14. — Ün	1 3	0.0,5	0,0:7
14. — MII	Pr	2:2,5	10.10
			4,6:4,9
	Pr	6.6:7	4,8:4,9
15. — Mo S ²	Rh	1:1,5	4,5:4,6
16. — Fe S ²	77		
	Te	6:6,5	4,9:5,1
	Pr	6:6,5	4,6:4,9
17. — Mn S ²	Te		
18. — Ag Se ²	Rh		5,5:5,6
19. — Co As ²	Pr	5,5	7:7,3
20. — Fe As ²	Pr	5:5,5	6,4:6,7
21. — (Co, Fe) As ²	Te?	5,5	7,2:7,3
22. — Ni As ²	Te	5,5	6,9:7
1. Sp. $\ddot{\ddot{S}b}$	Am		3,7:3,8
1. Op. 35	Am		0,7.0,0
1. Sp. Mo	Am		
2. — W	Am	1	6
3. — Ši	Rh	7	2,6:2,7
4. — Sb As ³	∘Am	3,5	6,1:6,21
5. — Co As ³	Te	6	6,74:6,84
6. — (Ni, Co, Fe) As3			6,2:6,3

DROTTE BALASSE.

Ordnungen und Genera.	Name der Verbindungen.
Erste Ordnung. Schema: H. S. 1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. Erreite Ordnung. Schema: HA. S.	1. Sp. Brucit
1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$.	1. Sp. Turgit
2 1.	1. — Antimonocker?
	2. — Göthit
	3. — Manganit
	4. — Diaspor
$3 \frac{3}{2}$	1. — Brauneisenerz
	2. — Gibbsit v. Beaux
4. — — 3.	1. — Hydrargillit
Schema: IV. E.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$.	1. Sp. Groroilith
Vierte Ordnung. Schema: VI.I.	
1. Genus: $\frac{\pi}{y} = 1$.	1. Sp. Michaelith
2. — — 3.	1. — Sassolin
	2. — Wasseropal

Bidiploiten.

Chemische Zeichen.	Krystall- form.	Härte.	Specifisches Gewicht.
1. Sp. Mg H	Rh	2	2,3:2,4
1. Sp. $\ddot{F}e^{2}\dot{H}$ 1. — $\ddot{S}\dot{b}\dot{H}^{*}$) 2. — $\ddot{F}e\dot{H}$ 3. — $\ddot{M}n\dot{H}$ 4. — $\ddot{A}\dot{l}\dot{H}$ 1. — $\ddot{F}e^{2}\dot{H}^{3}$ 2. — $(\ddot{F}e+3\ddot{A}\dot{l})^{2}\dot{H}^{3}$ 1. — $\ddot{A}\dot{l}\dot{H}^{3}$	Am Am Pr Pr Pr Ar Pr ₂ Am Rh	5 4,5 5,0:5,3 3,6:4,5 6 5,0:5,5 3:3,5	3,54:3,74 3,7:3,8 4,2:4,37 4,31:4,40 3,4:3,6 3,8:4,1 2,4 2,3:2,4
1. Sp. Ši H 1. Sp. Ši H 1. — B H ³ 2. — Ši H ³	Am Pr ₄ Am	2,6:3 1 6:6,5	1,88 1,4:1,5 1,9:2

^{*)} Note: 4.

Fünfle Ordnung. Schema: I.II.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = 1$$
.

a. Schwefelverbindungen

1. Sp. Silberkupferglanz

b. Selenverbindungen

2. — Eukairit

1. — Cuproplumbit

1. - Digenit

Sechste Ordnung. Schema: II.II*).

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{4}$$
.

$$2. - \frac{1}{2}$$

a.

a.

4. — — 2.

5. — — 4.

1. Sp. Selenkupferblei

1. — D:0 D:0

Schwefelverbindungen

1. — Eisemiickelkies

b. Selenverbindungen

2. — Selenbleikupfer

1. — Tantalit mit braunem
Pulver

Sauerstoff-Schwefelverbind.

1. — Voltzit

b. Schwefel-Selenverbindungen

2. — Onofrit

Schwefel-Tellurverbindungen

^{*)} Note: 5.

1. Sp. Ču Åg	P_{r}	2,6:3	6,2:6,3
2. — Cu Se + Ag Se 1. — Ću Śb² 1. — Ću Ću³	Xr Te Am	2,6 2:2,5	6,4:6,43 4,5:5,7
1. Sp. 4 Pb Se + Cu Se 1. — 2 Pb Se + Cu Se	Am		7,4:7,5 6,96:7,04
1. — Ée + Ńi	Те	3,6:4,5	4,6:4,7
2. — Pb Se + Cu Se			5,6
1. — $(9 \dot{F}e + \dot{M}n) \dot{T}a^2$	Am	6,5	7,9:8
1. — Żn + 4 Źn	Am	4,5	3,6:3,7
2. — Hg Se + 4 Hg S		2:3	

6. Genus:
$$\frac{x}{y} = 6$$
.

Siebente Ordnung. Schema: HIH. HI.

- 1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$.

Achte Ordnung. Schema: I. III.

- 1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$.

Neunte Ordnung. Schema: II. III.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{6}$$
.

a.

6.

a.

b.

Sauerstoffverbindungen

1. Sp. Fergusonit

Schwefelverbindungen

2. - Arseniksilberblende

3. Sp. Molybdänsilber

1. — Selenkobaltblei

1. - Arsenikkies v. Andreasberg

Schwefelverbindungen

- 1. Sp. Kupferwismutherz
- 2. Buntkupfererz

Schwefel-Tellurverbindungen

3. — Tetradymit v. Brasilien

1. — Kupferkies

2. — Kupferantimonglanz

3. Sp. Bi S + 4 Bi Te 1. — Co Se + 6 Pb Se	Rh Te	1,6:2	8,0:8,4
1. Sp. 2 Zn Se ³ + Hg Se			5,5:5,6
1. — Fe As ³ + Fe S			
1. Sp. Ću³ Ëi? 2. — Ću³ Ëe	Pr Te	3,5	5 4,9:5,1
3. — 3 Bi Te + Bi 1. — Ću Fe 2. — Ću Sb	$rac{ ext{Py}}{ ext{Pr}}$	3,6:4	4,1:4,3 4,7:4,8
2. — Eusp	Pr	ა, მ 	4,7:4,0
1. Sp. (Y, Ca) Ta; Zr Ta	Py	5,6:6	5,8:5,9
2. — Ág ⁶ Äs	p _r	2:2,5	5,5:5,6

2.	Genus:	=======================================	$=\frac{1}{5}$.
----	--------	---	------------------

3.
$$--$$
 = $\frac{1}{3}$.

$$\frac{1}{2}$$
. $\frac{1}{2}$

5.
$$---=\frac{2}{3}$$

6.
$$=\frac{3}{4}$$

Sauerstoffverbindungen

Sauerstoffverbindungen

1	I		
3. Sp. Ág ⁶ Sb	Pr	2:2,5	5,7:5,9
4. — Ýb ⁶ Šb	Am	2:2,5	6,4:6,5
1. — Pb ⁵ (Sb, As)	$p_{\rm r}$	2,6:3	6,4:6,6
		ĺ]
1. — Y³ Ta; ܳ Ta	Xr	5,5	5,8:5,'9
$2 (\dot{Y}, \dot{U}_a)^3 \ddot{T}_a$	Am	5,2	, , .
3. $ (\dot{Y}, \dot{C}a, \dot{F}e)^3 \ddot{T}a; \dot{Y}^3 \ddot{W}$	Xr	5, 2	5,3:5,4
$4 \text{Åg}^3 \text{Ås}$	Rh	2:2,5	5,4:5,6
5. — Ýb³ Šb	Xr	3	5,6:5,97
6. — Ág Šb	Rh	2:2,5	5,7:5,9
1. — Ýb² Ãs	Te		5,5:5,6
2. — Ýb² Šb	Xr	3	5,7:5,9
1. — Ýþ³ Š′þ²	P_{Γ}	2:2,5	5,5:5,8
2. — Ýe³ Šb²	Xr	2:2,5	4:4,3
1. — Ýb ⁴ Šb ³	P_{Γ_2}	2,5	5,4
1. — (Fe, Mg) (Gr, Al)	Te	5,5	4,3:4,5
2. — (Fe, Mn) Ta	$_{ m Pr}$	6	7:7,3
3. — (Mn + Fe) Ta ∫	, 1 1	· ·	7 . 7 , . 9
4. — (Mn,Fe) Ta;(Mn,Fe) Sn	Xr		
5.—(Mn,Fe,Ca)Ta;(Mn,Fe,Ca)W	Xr		6,5
$6 (0s, Fe)(\tilde{I}r, \tilde{\Theta}s, \tilde{C}r)$	Xr		6,4:6,6

7. Sp. Mennig 8. — Weich-Magneteisenerz 9. — Iserin 10. — Franklinit 11. — Hausmannit 12. — Uranpecherz 13. — Galmit 14. — Spinell 15. — Pleonast 16. — Chlorospinell b. Schwefelverbindungen 17. — Miargyrit 18. — Zinkenit 19. — Anglarit 20. — Weissgiltigerz 21. — Nickelwismuthglanz 8. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{4}{3}$ a. Sauerstoffverbindungen 1. Sp. Hart-Magneteisenerz b. Schwefelverbindungen 2. — Martourit 8. Gauerstoffverbindungen 1. — Columbit b. Schwefelverbindungen			
8. Genus: $\frac{\pi}{2} = \frac{4}{3}$ a. Sauerstoffverbindungen 1. Sp. Hart-Magneteisenerz b. Schwefelverbindungen 2. — Martourit Sauerstoffverbindungen 1. — Columbit b. Schwefelverbindungen		b.	8. — Weich-Magneteisenerz 9. — Iserin 10. — Franklinit 11. — Hausmannit 12. — Uranpecherz 13. — Gahnit 14. — Spinell 15. — Pleonast 16. — Chlorospinell Schwefelverbindungen 17. — Miargyrit 18. — Zinkenit 19. — Anglarit
2. — Martourit 9. — = 2. a. Sauerstoffverbindungen 1. — Columbit b. Schwefelverbindungen	8. Genus: $\frac{\pi}{y} = \frac{4}{3}$	a.	Sauerstoffverbindungen
1. — Columbit b. Schwefelverbindungen		<i>b</i> .	Schwefelverbindungen
b. Schwefelverbindungen	9. — = 2.	a.	Sauerstoffverbindungen
2. — Sternbergit		ь.	Schwefelverbindungen

T. C. DI DI			
7. Sp. Pb Pb	Am	3	4,6
8. — Fe Fe	Te	5:5,5	4,9:5,1
9. — Fe (Fe, Ti)	Те	6:6,5	4,7:4,9
10. — $(Fe + Zn) (Fe, Mn)$	Te	6:6,5	5:5,1
11. — Mn Mn	Py	5:5,5	4,7:4,8
12. — ÜÜ	Am	5, 5	6,4:6,6
13. — Żn Äl	Te	8	4,1:4,3
14. — Mg Al	Te	8	3,5:3,7
15. — (Fe, Mg) Al	Te	7,6:8	3,7:3,8
16. — Mg (Al, Fe)	Te	8	3,5:3,6
17. — Ág Šb	Pr	2:2,5	5,2:5,3
18. — Ýb Šb	Rh	3:3,5	5,3:5,4
19. — Fe Sb	Xr	2,6:3	4:4,3
20. — (Ýb, Ág, Ýe, Źn) Šb	Am	2,5	5,4:5,5
21. — Ńi (Ĕi, Ÿi)	Те	4, 5	5,1:5,2
		r	
1. Sp.	Te	5,6:6	5,1:5,2
2. — Ýe³ Šb⁴	Xr	2:2,5	4:4,3
1. — $(Mn + 4 \text{ Fe}) \tilde{N}b^2$	Pr_2	6	6,3:6,4
2. — Ág Ée²	Pr	1:1,5	4,2:4,5

a.

6.

Zehnte Ordnung. Schema: III.III.

1.
$$Genus: \frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$

1. Sp. Tenalymit . Schemnitz

Sauerstoffverbindungen

Sauerstoff-Schwefelverbind.

3. — Rothspiessglanzerz

Eilfle Ordnung. Schema: II.IV.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$
.

- 1. Sp. Mendipit
- 2. Mysorin
- 1. Perowskit
- 2. Pyrochlori
- 3. Kohlensaures Silber
- 4. Wismuthoxyd
- 5. Weissbleierz
- 6. Kohlensaures Blei und Kalk

1:e Form: Plumbocalcit

2:e Form: Bleiarragonit

- 7. Zinkbleispath
- 8. Zinkspath
- 9. Herrerit

1 50	2 Bi Te³ + #i	Rh	1.6.0	- 4 - 0
1. Op.	2 Di 16 + Di	ÝΨ	1,6:2	7,4:7,6
	$\ddot{ m B_e} \ddot{ m A}$ l²	D		2.5
1. —	*** *** ***	Pr	8,5	3,75:3,8
2. —	Be (Al, Cr) ²	P_{Γ}	8,5	3,68:3,69
3. —	Sb + 2 Sb	Pr	1:1,5	4,5:4,6
1. Sp.	2 Pb + Pb Cl ²	`Pr	2,6:3	7:7,1
2. —	Ċu² Ċ; Fe	Am	,	2,6:2,7
1. —	Ċa Ti	Te	5,6:6	4:4,2
2. —	(Ča, Ý, Ú) Ťi	Te	5	4,2:4,5
3. —	Åg Ö	1.6		1,2.4,0
4. —	Bi Ö		5:5,5	7
5. —	Pb Ö	$P_{\mathbf{r}}$	3:3,5	6,4:6,5
J. —	100	1.0	0.0,0	0,4.0,0
6	(Pb, Ca) C			
0	(1 1), Oa) O	Rh	2,6:3	2,8:2,9
		Pr	2,013	2,0:2,9
7	(Dr.6 + Z) C	Fr		
7. —	(Ṗb6+ Żn) C̈	D1	_	4.4.4.5
8. —	Zn Č	Rh	5	4,4:4,5
9. —	(Žn, Ni) Č	Rh	4:4,5	4,3

	10. Sp. Kapnit
	11. — Kohlensaures Eisen
	1:e Form: Spatheisenstein
	2:e Form: Junkerit
	12. — Pistomesit
	13. — Mesetinspath
	14. — Ankerit
	15. — Breunerit
	16. — Kohlensaures Mangan
	1:e Form: Manganspath
	2:e Form: Manganocalcit
	17. — Magnesit
	18. — Dolomit
	19. — Gurlioffian
	20. — Kohlensaurer Kalk
1	1:e Form: Kalkspath
	2:e Form: Arragonit
1.	21. — Hessit
	22. — Barytocalcit
	1:e Form: Alstonit
	2:e Form:
	23. — Strontianit
	24. — Witherit
3. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$.	1. Sp. Kibdelophan
1	

10. Sp.	(Żn, Fe) Ö	Rh	4:4,5	4,1:4,2
111. —	ře Č			
		Rh	3,6:4,5	3,6:3,9
		$P_{\rm r}$	4	3,8:3,9
12. —	$(\dot{F}e + \dot{M}g) \ddot{C}$	Rh	4	3,4:3,5
13. —	$(2 \text{ Fe} + 3 \text{ Mg}) \ddot{\text{C}}$	Rh	4	3,3:3,6
14. —	(Ču, Fe) Ö	Rh	3,6:4	2,9:3
15. —	(Mg, Fe, Mn) C	Rh	4:4,5	3:3,2
16. —	Mn Ö			
		Rh	4	3,5:3,6
	(Mn, Ča, Fe) Ö	Pr		
17. —	Mg Č	Rh	4:4,5	3:3,2
18. —	$(\dot{C}a + \dot{M}g) \ddot{C}$	Rh	3,6:4	2,8:3
19. —	$(\dot{C}a^2 + \dot{M}g) \ddot{C}$	Am	5:5,5	2,8
20. —	Ċa Ö			
		Rh	3	2,5:2,8
		$P_{\rm r}$	3,6:4	2,9:3
21. —	(Ča, Ču) Č			
22. —	(Ba + Ca) C			
		Pr	4:4,5	3,7:3,8
		Pr_2	4	3,6:3,7
23. —	Śr Č	Pr	3,5	3,6:3,7
24. —	Ba Č	Pr	3:3,5	4,2:4,4
1. Sp.	Fe² Ti³	Rh	5:5,5	4,6:4,7

Zwölfte Ordnung. Schema: IV. IV 3).

1. Genus: $\frac{z}{2} = 1$.

- 1. Sp. Kobaltglanz
- 2. Kobaltarsenikkies
- 3. Arsenikalischer Kobalt
- 4. Gersdorfit
- 5. Nickelantimonglanz
- 6. Arsenikkies

1:e Form: Mispickel
2:e Form: Plinian

Dreizehnte Ordnung. Schema: II.V.

- 1. $G_{\text{max}}: \frac{x}{y} = \frac{1}{y}$
- $2. \quad --- \qquad = \frac{1}{3}$
- 3. $\frac{1}{3}$

4. — = 1.

- 1. Triplit
- 1. Sp. Triphyllin
- 2. Tetraphyllin
- 3. Edwarsit
- 4. Kryptolith
- 5. Monazit
- 6. Yttrophosphit
- 7. Berzeliit
- 1. Sp. Quecksilber-Salpeter
- 2. Natron-Salpeter

^{1.} Sp. Monazitoid

^{*,} Nute. 4.

	1	1	
1. Sp. $\operatorname{Co} \operatorname{As}^2 + \operatorname{Co} \operatorname{S}^2$	Te	5:5,5	6:6,3
$2 (Fe,Co) As^2 + (Fe,Co) S$	² Pr	5,6:6	6,2
3. — Co As ² + Fe S ²	Pr	5,5	7:7,3
4. — Ni As ² + Ni S ² .	Te	5,5	6,3:6,7
5. — Ni (Sb, As) ² + Ni S ²	Te	5:5,5	6,2:6,5
6. — Fe As ² + Fe S ²			
	Pr	5,6:6	5,7:6,2
	P_{Γ_2}	6	6,2:6,5
1. Sp. (Če, La) ⁵ ${P}$		5,5	5,26:5,3
1. — $(\dot{M}n + \dot{F}e)^4 \ddot{P}$	Pr?	5:5,5	3,4:3,7
1. Sp. $(\text{Li} + 6 (\text{Fe}, \text{Mn}))^3 \hat{P}$	Pr?	5:5,5	3,6
2. — (Fe, Mn, Li, Na) ³ P	Pr?	5	.3,5:3,6
3. — ('e³ P	Pr		4,2:4,6
4. — Če³ P, Fe P	Xr		4,6
5. — (Če, La) ³ P	P_{Γ_2}	5,5	4,9:5,25
6. — Y³ P	Py	4,6:5	4,4:4,6
7. — $(Ca + Mg, Mn)^3 As$	·Xr	5,5	2,5:2,6
1. Sp. Hg N?			
2. — Na N	Rh	1,5	2:2,1

Vierzehnte Ordnung. Schema: III.V.

- 1. $Genus: \frac{x}{y} = \frac{3}{8}$
- 2. = 1.

Fünfzehnte Ordnung. Schema: II.VI.

1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$.

2.
$$=\frac{2}{3}$$

- 3. Sp. Kali-Salpeter
- 1. Sp. Phosphorsau: Thonerde
- 1. Childrenit
- 1. Sp. Willemit
- 2. Eisen-Chrysolith
 1:e Form:

2:e Form: Fayalith

- 3. Batrachit
- 4. Fowlerit
- 5. Mangan-Chrysolith

1:e Form:

2:e Form: Tephroit

- 6. Gadolinit
- 7. Oliwin
- 8. Sacchit
- 9. Molybdänblei
- 1. Sp. Melanochroit
- 2. Vauquelinit
- 3. Rother Mangankiesel
- 4. Mangansilicat v. Franklin

3. Sp. Ka 🛱	Pr	2	1,9:2
1. Sp. ${Al^{s}}{P^{s}}$ 1. — ${(Al},{Fe}){P}$	Pr	4,6:5	
1. Sp. Zn³ Si 2. — Fe³ Si	Rh	4,6:5,5	3,9:4,1
	Pr?	4	3,8:3,9
	Xr	6,5	4, 1
$3 (\dot{M}g, \dot{F}e + \dot{C}a)^3 \ddot{S}i$	Pr?	5	3
4. — (Mn, Fe) ³ Si	Pr_2		3,3:3,5
5. — Mn³ Si			
	Pr?	6	4:4,1
	Py	5,5	4:4,1
$6 (\mathring{X} + \mathring{C}e + \mathring{F}e)^3 \mathring{S}i$	Pr_2	6,6:7	4:4,3
7. — Mg³ Si; Fe³ Si	Pr	6,6:7	3,3:3,7
8. — (Ča + Mg) ³ Ši	Pr		
9. — Pb ³ M, (PbC, Pb P, Pb Cl)	Am		
1. Sp. Pb ³ Gr ²	\tilde{P}_{r}	3,5	5,7:5,8
$2 (\dot{C}u + 2 \dot{P}b)^3 \dot{C}r^2$	Pr_2	2,6:3	6,6:6,8
3. — Mn ³ Si ²	Pr_2	5:5,5	3,5:3,7
4. — (Mn, Fe) ³ Si ²	Pr_2	6	3,5:3,6

3. Genus: -	$\frac{r}{r} = 1$.
-------------	---------------------

- 5. Sp. Broncit
- 6. Pyrallolith
- 7. Tafelspath
- 1. Sp. Bleivitriol
- 2. Anhydrit
- 3. Dreelith
- 4. Glauberit
- 5. Coelestin
- 6. Baryt-Coelestin
- 7. Schwerspath
- 8. Maseagnin
- 9. Thenardit
- 10. Kalisulphat
- 11. Rothbleierz
- 12. Volborthit
- 13. Gelbbleierz
- 14. Wolframbleierz
- 15. Wolfr:sau: Eisen und Mangan

1:e Form: Wolfram

2:e Form: Wolfram v.

Cornwall

16. - Scheelit

17. - Gillebäckit

5. Sp. (Mg, Ca, Fe, Mn) ³ Si ²	Pr_2	5,2:5,5	3,2:3,4
6. — Mg ³ Si ² ; Ca ³ Si ² ; Al Si ²	Pr_2	3,6:4	2,5:2,7
7. — Ċa³ Śi²	Pr_2	4,6:5	2,8:2,9
1. Sp. Pb S	Pr	3	6,2:6,4
2. — Ċa Š	$P_{\mathbf{r}}$	3:3,5	2,7:3
3. — (Ča + 2 Ba) Š	Rh	3,5	3,2:3,4
4. — (Na + Ca) S	Pr_2	2,6:3	2,7:2,8
5. — Śr Ś	Pr	3:3,5	3,9:4
$6 (2 \dot{S}r + \dot{B}a) \ddot{S}$	Xr	2,5	3,9:4
7. — Ba S	P_{r}	3:3,5	4,3:4,6
8. — (N H ⁴) S	Pr	2:2,5	1,7:1,8
9. — Na S	Pr	2,6	2,6:2,7
10. — Ka S	Pr	2,6:3	2,6:2,7
11. — Þb Ör	P_{r_2}	2,6:3	5,9:6,1
12. — Ġu Ÿ?	Rh	3	3,5:3,6
13. — Pb Mo	Py	3	6,6:6,8
14. — Pb W	Py	3:3,5	8:8,1
,			
15. —			
$(\dot{M}n + \dot{F}e) \dot{W}$	P_{r_2}	5:5,5	7,1:7,4
	<u>.</u>		
(Mn + 3 Fe) W	Py	111111	
16. — Ča ϔ	Py	4:4,5	6:6,1
17. = Ca Si			

4. Genus:
$$\frac{z}{2} = \frac{4}{3}$$
.

Sechszehnte Ordnung. Schema: III.VI.

1. Genus:
$$\frac{\pi}{3} = \frac{1}{3}$$
.
2. — $= \frac{1}{3}$.

$$3. - = \frac{2}{3}$$

4.
$$=\frac{3}{4}$$

$$6. - \frac{3}{2}$$

Siebzehnte Ordnung. Schema: IV. VI.

1. Genus:
$$\frac{z}{y} = \frac{2}{3}$$
.

- 18. Sp. Jeffersonit
- 1. Sp. Borazit
- 2. Rhodizit
- 1. Sp. Schrifterz
- 2. Weisstellur
- 1. Sp. Marcellin
- 1. Staurolith v. St Gotthardt V. 3. Staurolith v. Airolo
 - V. 7. D:o v. Ural
- 1. Sillimanit
- 2. Cyanit
- 1. Andalusit
- 2. Chiastolith
- 1. Zirkon
- 2. Xenolith
- 1. Bamlith
- 1. Chromocker
- 2. Phenakit
- 1. Agalmatolith
- 1. Sp. Kryolith
- 1. Chiolith

18. Sp. (Ča, Mn, Fe) Ši	Pr	4,5	3,5:3,6
1. Sp. Mg ³ B ⁴	Te	7	2,9:3
2. — Ča³ B⁴?	Te	8,5	3,4:3,5
1. Sp. Ag Te + 2 Au Te ³	P_{Γ_2}	1,6:2	8,2:8,3
2. — (Ag,Pb)Te+2Au(Te,Sb) ³	Pr	2:2,5	7,9:8,4
1. Sp. Än³ Si	Py?	5,6:6	3,8
1. — $(\ddot{A}l, \ddot{F}e)^2 \ddot{S}i$	Pr	7:7,5	3,4:3,8
(Al, Fe) ² Si; Al Si			
(Al, Fe) ² Si; ½ Al Si ² *)			
1. — (Fe, Al) ³ Si ²	Pr?	8	3,4:3,45
2. — Al ³ Si ²	Pr_4	5:7	3,5:3,7
1. — Al ⁴ Si ^{3 **})	Pr	7,5	3,1:3,2
2. — (Al, Fe) Si ³	Pr	5:5,5	2,9:2,95
1. — Zr Si	Py	7,5	4,5
2. — Al Si	$P_{\mathbf{r}}$	6,6:7	3,5:3,6
1. — Al ² Si ³	Xr	6,3	2,9:3
1. — "Gr Si ²	Am		
2. — Be Si ²	Rh	7:7,5	2,9:3
1. — Al Si ³	Am	1,6:2	2,7:2,85
1. Sp. 3 Na Fl ² + 2 Al Fl ³	Py	2,6:3	2,8:3
1. — 2 Na Fl ² + 2 Al Fl ³	Am	3,6:4	2,7:2,75

^{*)} Note: 7. **) Note: 8.

VIERTE KLASSE.

Ordnungen und Genera.	Name der Verbindungen.
Erste Ordnung. Schema: III.I+VI.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $n = 3$. $n' = 2$. Zweite Ordnung. Schema: II. III+I.	1. Sp. Fluoreerium v. Bastnas
1. Genus: $\frac{z}{y} = \frac{1}{6}$. $n = 1$. $n' = 4$.	1. Sp. Condurrit?
$\frac{1}{0}$ - $\frac{1}{0}$ - 115.	
$\begin{vmatrix} 3. & & -1 & -1 & -1 \\ -1 & & -1 & -1$	1. — Nickelblüthe 1. — Oxalsaurer Kalk
5. — — 1. — 2. — 3.	
Dritte Ordnung. Schema: FI. I + VI.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$. $n = 1$. $n' = 3$.	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1. — D:o v. Cobija
4. — — 1. — 2. — 5.	
5. — — 1. — 3. — 1.	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
- ·	1. — Psilomel in v. Fichtelgeb.
	2. — D:o v. Horhausen 3. — D:o v. Schneeberg
9. — — 2. — 1. — 2.	1. — Kupfermanganerz

Tridiploiten.

Chemische Formel.	Krystall- firm.	Härte.	Specifisches Gewicht.
1. Sp. 3 Ce H + 2 Ce Fl3		4,5	
1. Sp. Cu ⁵ As + 4 H	-	5.5	5.2
1. — Mgs Äl + 15 H			2.04
1. — Ni As + 4 H	Am	2.0:2.5	3.0:3.1
1. — Ča € + Ĥ	Pr_2	2,4:2,75	1
1. — 2 Fé C + 3 H	Xr	2.0	2, 15: 2, 25
1. Sp. Ċu³ Cu Cl² + 3 Ĥ 1. — Ću³ Cu Cl² + 6 Ĥ	Pr	3,0:3,5	4,0:4.3
1. — Na C + 10 H	P_{r_2}	1,0:1,5	1,4:1,5
1. — $2(\dot{X}a + \dot{C}a)\ddot{C} + 5\dot{H}$	Pr_2	2,5	1,9:1,95
1. — $3(2 \dot{N}a + \dot{M}g) \ddot{C} + \dot{H}$	Am	3,3	2,6:2,7
1. — 5 Na C + 4 H	Pr	1.5	1.5:1.6
1. $- \dot{N}a^2 \ddot{C}^3 + 4 \dot{H}$	Pr_2	2,6:3	2,1:2,2
$1 (Mn, K) Mn^2 + H$			
$2 (Mn, K, Cu) Mn^2 + H$			
3. — (Mn, Ba) Mn ² + H	Am	5,6:6	4,3:4,4
1. — (Mn,Ca,Cu,Ba) Mn ² +2H	Am	3,6:4	3, 1:3.21

10. Genus: $\frac{x}{y} = 2$. n = 1. n' = 4. 1. Sp. Erdkobalt v. Saalfeld

Vierte Ordnung.

Schema: III. IV+I.

1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. n = 1. n' = 3. 1. Sp. Mangansuperoxydy. Siegen

Fünfte Graning.

Schema: II. IV+IV.

Sechste Ordnung. Schema: II. V+I.

1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$ n = 1. n' = 4. 1. Sp. Bleiniere

2. — $-\frac{1}{3}$. — 1. — 8. 1. — Nickelocker

3. $\frac{2}{5}$ - 1. - 12. 1. - Pieropharmacolith

4. $\frac{2}{5}$ - 3. - 5. 1. - Heterosit

5. — $-\frac{2}{5}$. — 4. — 30. 1. — Hureaulith

- - $\frac{1}{2}$ - 1. - 4. 1. - Haidingrit

7. — $-\frac{1}{2}$ — 1. — 6. 1. — Pharmakolith

-- $-\frac{2}{3}$ -1 -6 1. - Thrombolith

9. — — 1. — 1. — 1. 1. — Talk-Salpeter

Siebente Ordnung. Schema: HAH. V+H.

1. Genus: $\frac{x}{s} = \frac{2}{5}$, n = 1, n = 20. 1. Sp. Kakoxen

2. — — 1. — 1. — 12. 1. — Phosphors. Eisen v. Isle

1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. n = 1. n' = 1. 1. Sp. Bleihornerz v. Matlock

2. — Kobaltblüthe

2. — Kalk-Salpeter

de France

1. Sp. (Čo, Ču) $\ddot{\text{M}}$ n ² + 4 $\dot{\text{H}}$	Am	1:1,5	2,0:2,24
1. Sp. Al Mn + 3 H			
1. Sp. Pb C + Pb Cl ²	Py	3	6,0:6,2
1. Sp. Pb ³ Sb + 4 H			4,6:4,8
$1 Ni^3 \ddot{A}s + 8 \dot{H}$	Xr	2:2,5	3:3,1
$2 \dot{C}_{0}^{3} \ddot{A}_{5} + 8 \dot{H}$	P_{r_2}	2,5	2,9:3,1
1. $-(\hat{C}_a, \hat{M}_g)^5 \hat{P}^2 + 12 \hat{H}$	Xr		
1. $-3 (\dot{\text{Mn}} + 2 \dot{\text{Fe}})^5 \ddot{P}^2 + 5 \dot{\text{H}}$	Pr_2	4,6:5,5	3,4:3,6
1. $-4 (\dot{F}e + 3 \dot{M}n)^3 \ddot{P}^2 + 30 \dot{H}$	Pr_2	3,5	2,2:2,3
$1 \dot{C}a^2 \dot{A}s + 4 \dot{H}$	Pr	2:2,5	2,8:2,9
1. — $\dot{C}a^2 \ddot{A}s + 6 \dot{H}$	Pr ₂	2:2,5	2,7:2,8
1. — $\dot{C}u^{3}\ddot{P}^{2} + 6\dot{H}$	Am	3:6,4	3,38:3,4
$1 Mg\ddot{N} + \dot{H}$			
2. — Ča N + H			

1. Sp. $(\mathbf{Fe}, \mathbf{Al})^5 \mathbf{P}^2 + 20 \mathbf{H}$	Xr	1,5	2,3:2.4
$1 \ddot{F}e^2\ddot{P} + 12\dot{H}$			

3. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$
: $n = 1$. $n' = 24$. 1. — Delvauxit

5. — —
$$\frac{3}{4}$$
 — 1. — 18. 1. — Wavellit

Achte Ordnung. Schema: II. V+IV.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot n = 1$$
. 1. Sp. Wagnerit

2. —
$$\frac{1}{3}$$
 — 3. — 1. 1. — Eisenapatit

Neunte Ordnung. Schema: II. VI+ I.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{n}$$
 $\cdot n = 1$. $n = 2$. 1. Sp. Sideroschisolith

2. —
$$\frac{1}{4}$$
 — 1. — 1.

3. — —
$$\frac{1}{3}$$
. — 1. — 3. 1. — Schwarzmangansilicat

* *

1:e Form: Skorodit

2:e Form: Jogynæit

$$\frac{1}{3}$$
 - 5. - 1. 1. - Nussierit

(
$2. \text{ Sp. } \ddot{\mathbf{F}} e^2 \ddot{\mathbf{A}} s + 12 \ddot{\mathbf{H}}$	Am	2	2,2:2,4
$1 \mathbf{F}e^2\mathbf{P} + 24\mathbf{H}$	Am	2,6:3	1,85:1,9
$1 2 \ddot{\mathbf{F}} e^2 \ddot{\mathbf{P}} + 5 \dot{\mathbf{H}}$	Xr	3	3,4
1. — Al' P³ + 18 H; Al Fl³	Pr	4,5:5	2,2:2,3
1. — Fe As + 4 H			
	Pr	3,6:4	3,1:3,2
	Am	5 ·	2,5:3,0
1. — Äl P + 8 H	Am	3,5	2,35
1. Sp. Mg ³ P + Mg Fl ²	Pr_2	5,0:5,5	3,1:3,15
1. — $3 (Fe, Mn)^3 P + Fe Fl^2$	$\mathbf{X}_{\mathbf{r}}$	4,6:5	3,9:4,0
$2 3 \dot{P}b^3 \dot{P} + Pb Cl^2$	Rh	3,6:4	6,96:7,09
3. — 3 Ca ³ P + Ca (Cl, Fl) ²	Rh	5	3,0:3,3
4. — $3 \text{ Pb}^3 (\vec{P}, As) + \text{Pb Cl}^2$	Rh	3, 6:4,0	7,19:7,21
5. $= 3(\dot{P}b,\dot{C}a)^3(\dot{A}s,\dot{P}) + PbCl^2$	Rh	3,6:4,0	5,45:5,5
6. — 3 (Pb, Cu) Pb + Ca Cl ²	Rh	3,6	5,9:61
1. $= 5(Pb,Ca)^3(\overline{PAs}) + Pb Cl^2$	Rh	4:4,5	5:5,1
1. Sp. Fe ⁶ Si + 2 H?	Rh	2	3
1. — Cu ⁴ S + 4 H			
1. — Mn ³ Si + 3 H	Am		
2. — Če ³ Ši + 3 H	Rh	5, 5	4,9:5

4. Genus	$: \frac{z}{z} = \frac{1}{z}.$	n = 2. n' =	3.

$$5. - \frac{1}{3} - 4. - 3.$$
 1. - Villarsit

6. — —
$$\frac{1}{2}$$
 — 1. — 3. 1. — Hydrophit

7. —
$$-\frac{1}{2}$$
 — 1. — 8. 1. — Kobaltvitriol

S. — —
$$\frac{2}{3}$$
. — 1. — 2. 1. — Aphrodit

9. —
$$-\frac{2}{3}$$
. — 1. — 3. 1. — Dioptas

10. — —
$$\frac{2}{3}$$
. — 1. — 6. 1. — Dermatin

11. — —
$$\frac{2}{3}$$
 — 1. — 12. 1. — Kieselmalachit v. Somm.

12. —
$$-\frac{2}{3}$$
 — 4. — 3. 1. — Monardit

3. Sp. Th ³ Si + 3 H	-Am	4.	4,6:4,8
$1 2 \text{ Zn}^3 \text{ Si} + 3 \text{ H}$	Pr	5	3,3:3,4
1. — $4(Mg^3, Fe, Mn) \ddot{S}i + 3 H$	Pr	3?	2,9:3
1. — $(Mg, Fe)^2 Si + 3 H$	Am	3,6:4	2,6:2,7
$2 \text{Mg}^2 \text{Si} + 3 \text{ H} \qquad$	Am		2,2:2,3
$1 \hat{C}o^2\hat{S} + 8\hat{H}$	Pr		
$1 Mg^3 \ddot{S}i^2 + 2 \dot{H}$	- Am -	2,5	1
$2 (Mg^3, Fe^3) Si^2 + 2 H$	Xr ·	2,6:3	2,7:2,8
1. — Cu ³ Si ² + 3 H	· Rh ·	5	3,2:3,4
1. — (Fe, Mg) ³ Si ² + 6 H	Am	2,5	2,1:2,2
2. — Ču³ Si² + 6 H	Am ·	-2,6:3	2:2,2
1. — $\hat{C}u^3 \hat{S}i^2 + 12 \hat{H}$			
1. $-4(M_g, F_0)^3 \ddot{S}i^2 + 3 \dot{H}$	Хr	6:6,5	3,2:3,8
$1 \hat{C}a \hat{S} + 2 \hat{H}$	P_{Γ_2}	1,6:2	2,2:2,4
2. — (Ka+Mg+2Ca) S+2H	Pr	3,2:3,5	2,6:2,7
3. $- (Mg + Na) \tilde{S} + 2 H$	Pr		
1. — Mn Ši + 3 H	Am		
2. — Fe Si + 3 H	Am	2,6:3	2,1:2,2
$3 Mg \ddot{S}i + 3 \dot{H}$	Am	-2:2;5 -	0,8:1
1. — Ču Š+5 H	Pr4.	- 2,5	2,2:2,3
2. — $\hat{\text{Co}}\hat{\text{S}} + 5\hat{\text{H}}$?	Pr		
$3 Mn\ddot{S} + 5H$	Pr		
1. $-$ (Fe, Mg) $\ddot{S}i + 6 \ddot{H}$	Am		2:2,1

17. Genus:
$$\frac{r}{y} = 1$$
. $n = 1$. $n' = 7$. 1. Sp. Zinkvitriol

- 2. Eisenvitriol
- 3. Schwefels. Kobalt
- 4. Bittersalz
- -1. -1. -10. 1. Glaubersalz
- 19. — 1. 2. 1. 1. Pimelith
- 20. - 1. 3. 4. 1. Löweit
- 21. — 1. 5. 2. 1. Steatit v. Nuntsch
- 22. $-\frac{4}{3}$. 1. 6. 1. Okenit
- 23. $\frac{4}{3}$. 1. 9. 1. Hydroboraeit
- 24. — 2. 1. 6. 1. Borocalcit
 - 1. Tinkal

Zehnte Ordnung. Schema: III. VI+I.

- 2. - 1. -10.

- 1. Genus: $\frac{\pi}{n} = \frac{1}{4}$. n = 1. n = 18. 1. Sp. Opalinallophan
- 2. $-\frac{1}{3}$. 1. 5. 1. Kollyrit
- 3. $-\frac{1}{2}$. 1. 6. 1. Vitriolocker 4. $-\frac{2}{3}$. 1. 6. 1. Smelit 5. $-\frac{2}{3}$. 1. 9. 1. Miloschin

- 6. $-\frac{2}{3}$ 1. 15. 1. Allophan
- 2. Kollyrit
 7. — 1. 1. 2. 1. Gelberde

- 2. Kollyrit v. Weisenfels
- 2. Pholerit

1	1	
P_{r}	2:2,5	1,9:2,1
P_{r_2}	2	1,8:1,9
P_{Γ_2}		
P_{r}	2:2,5	1,7:1,8
P_{Γ_2}	1,5	1,4:1,5
Am	2,5	2,2:2,3
Py	2,6:3	2,3:2,4
Am		
$p_{\mathbf{r}}$	5	2,28:2,36
Xr	1,6:2	1,9
Xr		
Pr_2	2:2,5	1,5:1,7
	0.01.0	40.00
		1,8:2,2
Am	1,6:2	1,3:1,4
Am		
Am	1	2,1:2,2
Am	2	2,1:2,2
Am	3	1,8:1,9
Am	1:1,5	
Am		2,2:2,3
X_{r}	0,5:1	2,3:2,6
	Pr ₂ Pr Pr Pr Pr Am Py Am Pr Xr Xr Pr Am Am Am Am Am	Pr2 2 Pr2 2:2,5 Pr2 1,5 Am 2,5 Py 2,6:3 Am 5 Xr 1,6:2 Xr 2:2,5 Am 2,6:3 Am 1,6:2 Am 1,6:2 Am 1 Am 2 Am 3 Am 1:1,5 Am 1:1,5

8. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $n = 1$. $n' = 3$.	1. Sp. Thraulit
	2. — Halloysit
9 1 1 9.	1. — Aluminit
10 1 2 1.	1. — Malakon?
1. $-23.$	1. — Wittingit
$11 \frac{4}{3} - 1 6.$	1. — Chromocker
3	2. — Kaolin
$12.$ $-\frac{3}{9}.$ $-1.$ $-6.$	1. — Eisensteinmark
-	2. — Kaolin v. Passau
13	
~	2. — Bol v. Ettingshausen
$14 \frac{3}{2} - 2 3.$	
$\begin{cases} 15 & - & 2 \\ 2. & - & 1 \\ - & 3 \end{cases}$	
16 2 1 6.	
	2. — Erinit; Bot
17 2 2 21.	
$18 \frac{5}{9} 1 18.$	
$\begin{vmatrix} 19. & & - & 3. & -1. & -1. \end{vmatrix}$	
20 3 1 3.	
	2. — Cimolit
21 3 1 9.	
	2. — Fettbohl
$ _{22}$, $$ 3. $-$ 1. $-$ 18.	1. — Neutr. Schwefs. Thon
100	2. — Honigstein
23 4 1 4.	

110			
1. Sp. Fe Si + 3 H	Am	3,6:4	2,6:3
2 Al Si + 3 H	Am	1,6:2,5	1,9:2,1
1. — $\ddot{A}1\ddot{S} + 9\ddot{H}$	Am	1	1,6:1,7
$1 2\ddot{Z}r\ddot{S}i + H$	$\mathbf{P}\mathbf{y}$	6	3,9:4
1. — 2 ($\ddot{F}e + 9 \ddot{M}n$) $\ddot{S}i + 3 \dot{H}$	Am	4,3:4,5	2,71:2,76
1. — (Ër, Äl, Fe) ³ Si ⁴ + 6 H			
$2 \ddot{A}l^3 \ddot{S}i^4 + 6 H$	Am	1	2,2
1. — $(\ddot{A}l, \ddot{F}e)^2 \ddot{S}i^3 + 6 \dot{H}$	Am	2,6:3	2,49:2,5
$2 \ddot{\mathbf{A}} \mathbf{i}^2 \ddot{\mathbf{S}} \mathbf{i}^3 + 6 \ddot{\mathbf{H}}$	Am		,
1. $-(\ddot{A}l, \ddot{C}h, \ddot{F}e)^2 \ddot{S}i^3 + 9 \dot{H}?$	Am	2:2,5	2,2:2,3
$\dot{2}$. — $(\ddot{A}l, \ddot{F}e)^2 \ddot{S}i^3 + 9 \dot{H}$	Am		
1. $-2 \ddot{F}e^2 \ddot{S}i^3 + 3 \dot{H}$	Am		
$1 \ddot{A}l \ddot{S}i^2 + 3 \dot{H}$	Am		·
1. — Fe Si ² + 6 H	Am	1	
2. — (\ddot{A} l, \ddot{F} e) \ddot{S} i ² + 6 \dot{H}	Am	1,5	2
1. $-2 \text{ Fe } \ddot{S}^2 + 21 \text{ H}$	Xr		
1. — $\ddot{F}e^2\ddot{S}^5 + 18\dot{H}$	Xr		
1. — Fe Si³ + H	Xr	6,5	3
$1 \ddot{A} \ddot{S} \ddot{i}^3 + 3 \dot{H}$	Pr?	1:1,5	2,7:2,8
$2 \ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 3\dot{H}$	Am		2,1:2,3
1. — $\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e}\ddot{\mathbf{S}}^3 + 9\dot{\mathbf{H}}$	Rh	2:2,5	2:2,1
$2 \ddot{F}e \ddot{S}i^3 + 9 \dot{H}$	Am	1,5	2,2:2,3
1. $-\ddot{A}l\ddot{S}^3 + 18\dot{H}$	\mathbf{Am}		
$2 \ddot{A} \cdot \ddot{M}^3 + 18 \dot{H}$	Py	2:2,5	1,4:1,6
1. $- (\ddot{F}e + 4 \ddot{A}l) \ddot{S}i^4 + 4 \dot{H}$	m Am	0,5	1,9:2,01

Eilfle Ordnung.

Schema: II. VI+IV.

Zwölfte Ordnung.

Schema: III. VI+IV.

1. Genus: $\frac{x}{y} = 2$. n = 1. n' = 1. 1. Sp. Lepidolith

2. - Lithionglimmer

Dreizehnte Ordnung. Schema: III. VI+VI.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = 1$$
. $n = 5$. $n' = 4$. 1. Sp. Topas

$$|2. - \frac{5}{4} - 1. - 4.|$$
 1. - Pyknit

1. Sp. Ba S + 3 Ca Fl ² 1. — Mg S + 10 Na Cl ²	Am		3,7:3,8
1.Sp.(Äl,Än)Si²+(Ka,Li,Na)Fl² 1. — (Äl,Fe)Si²+(Ka,Li,Na)Fl²	P_{r_2} P_{r_2}	2:2,5 2:2,5	2,8:3 2,8;3,1
1. Sp. 5 Ål Ši + 4 Al Fl ³ 1. — Äl ⁴ Ši ⁵ + 4 Al Fl ³ *)	Pr Pr	8 8	3, 5:3, 6 3, 5

^{*)} Note: 9.

FÜNFTE HLASSE.

Ordnungen und Genera.	Name der Verbindungen.
Erste Ordnung.	
Schema: II. I+II. IV.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x'}{y'} = 1$. $n = 1$. $n' = 1$.	1. Sp. Malachit
2 1 1 1 2.	1. — Kupferlasur
3. — — 1. — 1. — 3. — 2.	1. — Auricalcit
$4 \frac{3}{2} \cdot - \frac{1}{2} \cdot - 2 1.$	1. — Nemalith
$5 \frac{3}{2} - 1 1 1.$	1. — Zinkblüthe
	2. — Lanthanit
6. — — 4. — 1. — 1. — 3.	1. — Ilydromagnesit
	2. — Hydromagnocalcii
Zweite Ordnung.	
Schema: II. I+II.V.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1 \cdot \frac{x'}{y} = \frac{1}{3} \cdot n = 1 \cdot n' = 1$.	1. Sp. Olivenit
	2. — Libethenit
$2 1 \frac{1}{3} \cdot - 2 1.$	1. — Dihydrit
$3 1 \frac{1}{3} \cdot - 3 1.$	1. — Phosphorocalcit
Ü	2. — Strahlerz
Dritte Ordnung.	
Schema: II. I+II. VI.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x'}{y'} = \frac{2}{3}$. $n = 1$. $n' = 1$.	1 Sn Antigorit
1. Genus: $\frac{1}{y} = 1 \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{3} \cdot n = 1 \cdot n = 1$	1. Sp. Amugorn

Tetradiploiten.

Chemische Formel.	Kry- stall- form.	Hårte.	Specifi- sches Gewicht.
1.Sp.Ċu Ĥ + Ċu Ĉ 1.— Ċu Ĥ + 2 Ċu Ĉ 1.— 3 (Ċu, Żn) Ĥ + 2 (Ċu, Żn) Ĉ 1.— 2 Mg² Ĥ³ + Mg² Ĉ	$\begin{array}{c c} P_{r_2} \\ P_{r_2} \\ X_r \\ X_r \end{array}$	3, 6:4 3, 6:4 2	2,4
1.— Zn² H³ + Zn C 2.— La² H³ + La C 1.— Mg H⁴ + 3 Mg C 2.— (Mg + Ca) H⁴ + 3 (Mg + Ca) C	Am Py Xr Am	2:2,5 2,6:3 1,5	3, 5:3, 6
1.Sp.Cu \dot{H} + $\dot{C}u^{3}$ (3 \ddot{P} + 19 $\ddot{A}s$) 2.— $\dot{C}u \dot{H}$ + $\dot{C}u^{3} \ddot{P}$ 1.—2 $\dot{C}u \dot{H}$ + $\dot{C}u^{3} \ddot{P}$ 1.—3 $\dot{C}u \dot{H}$ + $\dot{C}u^{3} \ddot{P}$ 2.—3 $\dot{C}u \dot{H}$ + $\dot{C}u^{3} (\ddot{P}$ + 11 $\ddot{A}s$)	$egin{array}{c} \mathbf{Pr} \\ \mathbf{Pr} \\ \mathbf{Pr}_2 \\ \mathbf{Pr}_2 \\ \mathbf{Pr}_2 \\ \mathbf{Pr}_2 \end{array}$		4,2:4,6 3,6:3,8 4,4 4,1:4,3 4,15:4,25
1.Sp.Mg H + (Mg, Fe) ³ Si ²	Xr	2, 5	2,6:2,7

2. Genus:
$$\frac{x}{y} = 1$$
. $\frac{x}{y} = 1$. $n = 1$. $n = 1$. 1. Sp. Bleilasur

Vierte Ordnung. Schema: III. I+ II. VI.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = 2$$
. $\frac{x}{y} = 1$. $n = 1$. $n' = 2$. 1. Sp. Kaliphit

2. — 3.
$$-\frac{1}{3}$$
 — 1. — 1. 1. — Cronstedtit

Fünfte Ordnung. Schema: III. I+III. VI.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = 3 \frac{\hat{x}}{\hat{y}} = 1$$
. $n = 1$. $n = 5$. 1. Sp. Wörthit

Sechste Ordnung. Schema: H. HIH+ HH. HHH.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{9} \cdot \frac{x'}{y'} = \frac{1}{9} \cdot n = 1$$
. $n' = 4$. 1. Sp. Polybasit

2.
$$\frac{1}{5}$$
 $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ 1. Kupferblende

3. —
$$-\frac{1}{4}$$
. — $\frac{1}{4}$. — 2. — 1. 1. — Kupferfahlerz

4.
$$-\frac{1}{3}$$
. $-\frac{1}{3}$. -1 . -2 . 1. - Bournonit

Siebente Ordnung.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{y} = 1$$
. $n = 2$. $n = 1$. 1. Sp. Schilfglaserz

2.
$$-\frac{2}{3} \cdot -\frac{1}{3} \cdot -1$$
. - 1. 2. - Kobellit

	1	1	
1.Sp.Cu H + Pb S	P_{r_2}	2,6:3	5, 3:5, 5
$1MgH+5Mg\ddot{S}i$	Am	, í	, , , , ,
1.— 3 Ču H + Ču Š	$P_{\mathbf{r}}$	3, 5	3,78:3,91
		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
$1 \text{Sp.} (3 \text{ Fe} + 5 \text{ Mn}) \dot{H}^2 + 2 (\dot{Z}_{\text{II}}, \dot{C}_{\text{a}}) \ddot{S}_{\text{i}}$		1	2,8
1— Fe H³ + (Fe, Mg, Mn)³ Si	Rh	2, 5	3, 3:3, 4
1— Fe # + (Fe, Mg, Min) Si	lui	2, 0	3, 3: 3, 4
	Do		
1.Sp. Al H ³ + 5 Al Si	Pr?	5, 5	3
1.Sp. \mathcal{L}_{u^9} (Sb, \mathcal{A}_s) + 4 \mathcal{A}_{g^9} (Sb, \mathcal{A}_s)	Rh	2, 5	[6, 2:6, 3]
1.— Ću ⁵ Äs + (Fe, Źn) ³ Äs	Te	3,6:4	4, 2: 4, 4
1. $-2 \dot{\mathbb{C}}u^4 (\ddot{S}b, \ddot{A}s) + (\ddot{Z}n, \dot{F}e)^4 (\ddot{S}b \ddot{A}s)$	Te	3, 5	[4, 4:5, 2]
$2 - 2 (\acute{\mathrm{C}}\mathrm{u}, \acute{\mathrm{Ag}})^4 \breve{\mathrm{S}}\mathrm{b} + (\acute{\mathrm{Z}}\mathrm{n}, \acute{\mathrm{Fe}})^4 \breve{\mathrm{S}}\mathrm{b}$	Te	3:3,5	4, 8:5, 1
3.— 2 Ću* Ãs + Fe, Ću)* Ãs	Te	4	4, 3: 4, 4
$1 \text{\'e}u^3 \text{\"S}b + 2 \text{\'P}b^3 \text{\'S}b$	Pr	2,6:3	5,7:5,8
2.— Ču³ Ĕi + 2 Ýb³ Šb	Pr	2:2,5	6,7:6,8
-			
1.Sp.2 $(\dot{P}b + \dot{A}g)^3 \ddot{S}b + \dot{P}b \ddot{S}b$	\mathbf{Pr}	2:2,5	6, 1:6, 2
$2\dot{F}e^{3}\ddot{S}b^{2}+\dot{P}b^{3}\ddot{B}i$	Xr	1, 6:2, 5	6,29:6,32

Achte Ordnung.

Schema: II. III + II.V.

8. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot n = 2. = n'$ 1. 1. Sp. Xanthokon

Neunte Ordnung.

Schema: II. III+ HI. VI.

1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{9} \cdot \frac{x'}{y} = \frac{2}{9} \cdot n = 1$. 1. Sp. Buttererz v. Nagytg

Zehnte Ordnung.

Schema: II. III + III. VI.

1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = 1$. n = 3 n' = 1. 1. Sp. Sapphirin?

Eilfte Ordnung.

Schema: I. IV+II. IV.

1. Genus: $\frac{\pi}{v} = \frac{1}{2}$, $\frac{\pi}{v} = \frac{1}{2}$, n = 1, n = 1. 1. Sp. Zinnkies

Zwölfte Ordnung.

Schema: II. IV+II. VI.

1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x'}{y} = \frac{2}{3} \cdot n = 1$. 1. Sp. Vanadinbleierz

2. — 1. $-\frac{1}{3}$ — 1. — 2. 1. — Chondrodit

3. — - 1. - 1. - 1. 1. - Lanarkit

4. — - 1. — 1. — 2. — 1. 1. — Barytsulfocarbonat

5. — — 1. — 1. — 3. — 1. 1. — Leadhillit

6. — — 3. — 1. — 1. — 2. 1. — Sphen

2. - Caledonit

3. — Calstron-Baryt

			,
1.Sp.2 Ág³ Äs + Ág³ Äs 1.Sp.Ýb° Šb + Ýb° (Au, Te³)²	Rh		5:5, 2 7:7,2
1.Sp.3 Mg Äl + Äl Si	Pr	7,5	3,4:3,5
1.Sp.Ću² Šn + (Ýe, Źn)² Šn	Те	4	4,9:5,1
1.Sp. \dot{P} b ² Pb Cl ² + \dot{P} b ³ \dot{V} ²	Rh	3:3,5	6,9:7,3
$1\mathrm{Mg}\mathrm{Mg}\mathrm{Fl^2} + 2\mathrm{Mg^3}\mathrm{\ddot{S}i}$	P_{r_2}	6, 5	3, 1:3, 2
1.— Pb C+Pb S	Pr_2	2:2,5	
2.— (Ću + 2 Pb) Č + Pb Š	Pr	2,6:3	6, 4
3. $-$ (\dot{S} r, \dot{C} a) \ddot{C} + \dot{B} a \ddot{S}	Pr?	3,2:3,5	4, 2:4, 3
1. — 2 Ba C + Ba S 1. — 3 Pb C + Pb S	D		
1.— Ca Ti ³ + 2 Ca Si	Pr_2		6, 2:6, 3
1.— Oa 11 7 2 Oa 01	Pr ₂	5:5,5	3, 4: 3, 6

Dreizehnte Ordnung.

Schema: II. VI+II. VI.

1. Genus:
$$\frac{z}{3} = \frac{1}{3}$$
. $\frac{z'}{3} = \frac{1}{3}$. $n = 1$. $n' = 1$. 1. Sp. Knebelit

2. —
$$-\frac{1}{3}$$
. — $\frac{2}{3}$. — 1. — 2. 1. — Bustamit

3. —
$$-\frac{2}{3}$$
 — $\frac{1}{3}$ — 1. — 3. 1. — Troostit

4.
$$\frac{2}{3}$$
 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ - 1. - 1. 1. - Weisser Malakolith

2. - Hedenbergit

3. — Hypersten

4. — Sahlit

5. — Grüner Malakolith

6. - Thonerde-Augit

7. - Diopsid

8. - Vanado-Augit

 $-\frac{2}{3}$ - 1. - 1. 1. - Tremolith

2. - Arfvedsonit

3. - Anthophyllit

4. - Aegirin

5. - Strahlstein

6. - Pargasit

7. — Grammatit

S. - Thonerdehaltige Horn-

blende

6. — — 1. — $\frac{2}{3}$ — 3. — 1. 1. — Babingtonit

2. — Talk

		1	1
1.00			
1.Sp.Fe³ Ši + Mn³ Ši	Am		3,7:3,8
$1 \overset{\cdot}{\text{Ca}}{}^{3}\overset{\cdot}{\text{Si}} + 2\overset{\cdot}{\text{Mn}}{}^{3}\overset{\cdot}{\text{Si}}{}^{2}$	Xr	6, 5	3, 2:3,3
$1\dot{F}e^{3}\ddot{S}i^{2}+3\dot{M}n^{3}\ddot{S}i$	Rh	5, 5	4,0:4,1
$1 \tilde{C}a^3 \tilde{S}i^2 + \tilde{M}g^3 \tilde{S}i^2$	P_{Γ_2}	5:5,5	3,2:3,3
$2\dot{C}a^3\dot{S}i^2+\dot{F}e^3\dot{S}i^2$	Pr_2	5:5,5	3,4:3,5
$3\dot{\mathrm{Mg}}^{3}\ddot{\mathrm{Si}}^{2}+(\dot{\mathrm{Mg}}^{3},\dot{\mathrm{Fe}}^{3})\ddot{\mathrm{Si}}^{2}$	P_{Γ_2}	6:6,5	3,3:3,5
4.— $(\dot{C}_a, \dot{F}_e)^3 \bar{S}_i^2 + \dot{M}_g^3 \bar{S}_i^2$	Pr_2	5, 6:6	3,22:3, 26
5.— Ča ³ Ši ² + (Mg, Fe) ³ Ši ²	P_{Γ_2}	6	3,35:3,4
6. — $(\dot{C}a^3 \ddot{S}i^2 + \dot{M}g^3 \ddot{S}i^2)$, $(\dot{M}g, \dot{F}e)^3 \ddot{A}l^2$	P_{r_2}	5,6:6	3,4:3,5
7.— $(Ca, Fe)^3 Si^2 + Mg^3 Si^2$	Pr_2	5,6:6	3,2:3,3
8.—	P_{Γ_2}	6, 5	
$1 Ca \tilde{S}i + Mg^{s} \tilde{S}i^{s}$	P_{Γ_2}	5, 6:6	2,9:3
2.— Na Ši + Fe³ Ši²	P_{Γ_2}	6	3,32:3,5
$3 Fe Si + Mg^3 Si^2$	Pr	5, 6	3
4 (Na, K, Ca, Mg) Si + Fe3 Si2	Pr_2	6	3,3:3,5
5.— $\dot{C}a \dot{S}i + (\dot{M}g, \dot{F}e)^3 \dot{S}i^2$	P_{Γ_2}	5,6:6	3:3,1
6 Ca Si (Mg, Mn) Si; (Fe, Mg) Al	P_{Γ_2}	5, 2:5, 5	3:3, 1
7.— $\dot{\text{Ca}}\dot{\text{Si}}+\dot{\text{Mg}}^{3}\dot{\text{Si}}^{2}$	P_{Γ_2}		
•			
S. — (Ca.Mg) Si+(Mg, Fe) Si'. Mg, Fe, Al'	P_{Γ_2}	5, 6:6, 5	2,8:3,2
1.—3 Ca Si + Fe³ Si²	P_{Γ_4}	5,6:6	3,4:3,5
$23 \mathrm{Mg} \mathrm{\ddot{S}i} + \mathrm{\dot{M}g^3} \mathrm{\ddot{S}i^3}$	P_{Γ_2}	1	2,68:2,75

7. Genus:
$$\frac{\pi}{y} = 1$$
. $\frac{\pi}{y} = \frac{2}{3}$. $n = 6$. $n' = 1$. 1. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^$

Vierzehnte Ordnung.

Schema: II. VI+III. VI.

1. Genus
$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}, \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}, \alpha = 1, \alpha = 1.$$
 (a.2).

$$4. - - \frac{1}{2} - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 - 1$$

2. - X = (b) (1)

2. — Grand

. - Romanzowit

4. - Granet v. Hellendsis

5. - D:0

6. - Dio v. Fahlun

7. - Die v. Langbanshytten

S. - 11: 11

0. - Die

100 - Persp

(i. - Lamori

12. - 4 = 0

13. - Discourt Chinese

14. - Salesille

16. - Idelens

10. - Lesson Propositi

17. - Cyyola

^{*)} Note: 10.

$1.\mathrm{Sp.6}\mathrm{Mg}\mathrm{\ddot{S}i} + \mathrm{Mg^3}\mathrm{\ddot{S}i^2}$	Am	1, 5	2,6:2.7
1.Sp.Fe ³ Si + Al ³ Si			
$12 \overset{\circ}{\text{Ca}}^3 \overset{\circ}{\text{Si}} + (\overset{\circ}{\text{Al}}, \overset{\circ}{\text{F}})^2 \overset{\circ}{\text{Si}}$	Py	5,6:6	2,9;3,1
2.—2 (Ča, Mg, Fe)* Ši + Āl² Ši	Pr	5,6:6	3, 2:3, 3
1. $-3 (Ca + 2 Fe)^3 \overline{S}i + \overline{F}e^2 \overline{S}i$	Pr	5:6,6	3, 9:4, 2
$1 \dot{F}e^2 \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i$	Te	7:7,5	4, 1:4, 3
2.— $(C_a, F_e)^3 \overline{S}i + \overline{A}l \overline{S}i$	Te	7	3,6:3,65
$3(Fe+4 Ca)^3 Si+Al Si$	Te	7	3,5:3,65
$4 (Fe, Mg)^3 \widetilde{S}i + \widetilde{A}l \widetilde{S}i$			
5.—(Ča, $\dot{M}g$, $\ddot{\ddot{S}}$ i + (\ddot{A} l, $\ddot{\ddot{F}}$ e, $\ddot{\ddot{S}}$ i			
6.—(Ca, Mn)° Si + (Al, Fe) Si	Te	6, 6:7, 5	3, 5: 4, 3
7.— (Ca, Mn) ³ Si + Fe Si			
8.— (Ca, Mg, Fe)3 Si + (Al, Mn Fe) Si			
9.— (Ča, Mn, Mg, Fe) Si + (Al, Fe) Si			
10. — (CaMgFe)3 Si + (Al, Ch) Si	Te	7,6:8	3,69:3,8
11.— Ca ³ Si + (Al, Ch) Si	Te	6:6,5	3, 4:3, 5
$12.$ — $\hat{C}a^3 \hat{S}i + \hat{F}e \hat{S}i$	Te	7,6:7	3,6:3,9
13. — $(K, Fe, Mg)^3 Si + (Al, Fe) Si$	Rh	2,6:3	2,7:2,9
14. — $(\hat{C}a, \hat{N}a)^3 \hat{S}i + \hat{A}l \hat{S}i$	Py.	6	3, 4:3, 5
$15 \hat{C}a^3 \hat{S}i + (\hat{F}e + 5 \hat{A}l) \hat{S}i$	Py	6, 5	3, 3:3, 4
$16 \dot{C}a^3 \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i; (\dot{M}g, \dot{F}e)^3 \ddot{S}i$	PN	6	
17. — (Ču, Ča) Ši + Āl Ši	Py		

5. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$, $\frac{x}{y} = 1$, $n = 1$, $n' = 2$.	1. Sp. Epidot
	2. — Pistazit
	3. — Mangan-Epidot
	4. — Puschkinit
	5. — Thulit
	6. — Mejonit
$6 \frac{1}{3} \cdot - 1 \cdot - 1 \cdot - 3.$	1. — Wehrlit
	2. — Amphodelith
	3. — Anorthit
	4. — Lepolith
	3. — Anorthit 4. — Lepolith 5. — Ittnerit? 6. — Davyn 7. — Lepidomelan 8. — Wernerit 9. — Indianit
	6. — Dayyn
	7 — Lenidomelau
	8 Wamarit
	o. — Wernern
	9. — Indianit
$7 \frac{1}{3} 1 1 4.$	1. — Latrobit
$\begin{vmatrix} 8. & & -\frac{1}{3} & -1 & -2 & -1 \\ 9. & & \frac{1}{3} & -1 & -3 & -2 \end{vmatrix}$	1. — Melilith
9	1 Orthit
3.	Var. β. Pyrorthit
	2. — Allanit
	3. — Cerin
$10 \frac{1}{2} - 1 1 2.$	1. — Nephelin 2. — Ekwolith
	2. — Elæolith
$11 \frac{2}{3} 1 1 1.$	1. — Tachylith

	1	1	T
$1.\mathrm{Sp.\dot{C}a^3\ddot{S}i} + 2\ddot{\overline{A}}1\ddot{\overline{S}}i$	P_{r_2}	7	3, 1:3, 5
$2(\dot{C}a^3,\dot{F}e)^3\ddot{S}i + 2(\ddot{A}l,\ddot{F}e)\ddot{S}i$	P_{Γ_2}	6:6,5	-1, 2: -1, -1
$3(\mathring{C}a,\mathring{M}n)^3 \ddot{S}i + 2 (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i$	Pr_2	5, 6:6, 5	3,4:3,5
$4.$ —(Ca, Mg, Fe, Na) ³ $\ddot{\text{S}}$ i + 2 $\ddot{\text{A}}$ l $\ddot{\text{S}}$ i	Pr_2	6, 6:7	3:3,1
5.— (Ća, Fe, Mn) ³ Ši + 2 Äl Ši	Pr_2	6	[3, 1: 3, 2]
$6 (\dot{C}a, \dot{N}a, \dot{K})^3 \ddot{S}i + 2 \ddot{A}1 \ddot{S}i$	Py		
1.—(Fe, Ca)³Si + 3 Fe Si			
$2 (\dot{C}a, \dot{F}e \dot{M}g)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$	P_{Γ_2}	5:5,5	2,7:2,8
3.— $(\dot{C}a, \dot{M}g, \dot{K}a, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$	Pr_*	6	2, 7
$4 (\dot{C}_a, \dot{N}_a)^3 \ddot{S}_i + 3 \ddot{A}_1 \ddot{S}_i *)$	P_{Γ_2}	6	2, 6
5.— $(\hat{C}a + 2\hat{N}a)^3\hat{S}i + 3\hat{A}l\hat{S}i^{**}$	Te	5, 6:5, 8	2, 3:2,8
6. — (Na Ka) ³ Ši + 3 Äl Ši; Ca Cl ²	Rh	5:5,5	2, 4
7.— $(Ka, Fe)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$	Rh?	2,6:3	3
$8 \hat{C}a^3 \hat{S}i + 3 \hat{A}l \hat{S}i^{***})$	Py		2,7:2,85
$9 (\dot{C}a, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$			l i
1.— $(\dot{K}a, \dot{F}e)^3 \ddot{S}i + 4 (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i$	Pr_4	5:6,5	[2, 7: 2, 8]
1.—2 ($\dot{C}a$, $\dot{M}g$, $\dot{N}a$) ³ $\ddot{S}i$ + ($\ddot{A}l$, $\ddot{F}e$) $\ddot{S}i$	Py?	5:5,5	2,9:3
1. -3 (Če, Ý, Mn, Ča Fe) 3 Ši $+ 2$ Äl Ši	$P_{\rm r}$		[3, 2: 3, 6]
23 (Če, Fe, Mn, Ča) $^{\circ}$ Si $+ 2$ Āl Si	$ m p_{r}$	5, 6: 6, 3	4:4,2
3.—3 (Će, Mn, Ća, Fe) ³ Ši + 2 (Āl, Fe)-Ši	X_{r}	6	
1. $-(4K + Na)^2 \ddot{S}i + 2\ddot{A}l \ddot{S}i$	Rh	5,6:6	
$2(Na \dot{K})^2 \ddot{S}i + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i$	Rh	0,0.0	~,00.~,01
1. $-(K, Na, Ca, Mg, Mn, Fe)^2 \ddot{S}i^2 + \ddot{A}l \ddot{S}i$	Am	6, 5	2,51:2,54
*) Note: 11. **) Note: 12. ***) Note: 13.	1		

12. $Genus. = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{3} = 1$. $n = 1$. $n' = 2$.	1. Sp. Skapolith
	2. — Ekebergit
	3. — Axinit
$ 13 \frac{2}{3} - 1 1 3.$	1. — Barsowit
3	2. — Dichroit
	3. — Bytownit
$14\frac{2}{3} 1 1 9.$	
$\begin{vmatrix} 15. & & & & 2. & & 3. \end{vmatrix}$	
$10 \frac{4}{3} - 1 1.$	
$17\frac{2}{7} - 211.$	
$18\frac{2}{5} - 21 2.$	1. — Weissit
	2. — Glaukophan
$10 \frac{2}{3} \cdot - 2 \cdot - 1 \cdot - 3$	1 Andesin
	2. — Ampligen
	3. — Leucit
	4. — Sordawalit
20 1 1 1 1	
	2. — Pinit
	3. — Ryakolith
	4. — Labrador
	5. — Wasserfreier Skolezit
21. — — 1. — 1. — 2	
221129	
23 1 1 3 2	. 1. — Couzerand

	T		
1.Sp.(Ča, Na) ³ Ši ² + 2 Āl Ši	Py	5:5,5	[2, 6:2,8]
$2 (3 \text{ Na} + \text{Ca})^3 \text{ Si}^2 + 2 \text{ Al Si}$	Xr		
3.— $(\dot{\text{Ca}},\dot{\text{Mg}})^3(\ddot{\text{Si}},\ddot{\text{B}})^2 + 2(\ddot{\text{Al}},\ddot{\text{Fe}},\ddot{\text{Mn}})(\ddot{\text{Si}},\ddot{\text{B}})$	Pr^4	6, 5	3:3,3
$1(\dot{C}a, \dot{M}g)^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$	Xr	5,6:6	2,74:2,76
2.—(Mg,Fe) ³ Si ² + 3 Al Si	P_{r}	7:7,5	[2, 5: 2, 6]
$3(Ca, Na, Mg)^3 \ddot{S}i^2 + 3 (\ddot{A}l \ddot{F}e) \ddot{S}i$	Py?	6	2,8
1.— $(N_a, L_i, M_g, M_n)^{\circ} B^2 + 9 \text{ Al Si?}$	Rh	7:7,5	2:3,2
1. — $2 (\dot{C}_a + \dot{N}_a, \dot{K})^3 \ddot{S}_{12}^2 + 3 \ddot{A}_1 \ddot{S}_{13}$	Py	5	2, 6: 2, 7
1.— $(Fe, Mg, Li, Na)^3 \ddot{B}^2 + \ddot{A}l^3 \ddot{S}i^4$?	Rh.	7:7,5	2:3, 2
1.— $(Na, Ca, Mg, Fe)^3 \ddot{S}i^2 + (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i^2$	Am	6, 7	3:3,1
1. — $(\dot{\mathrm{Mg}}, \dot{\mathrm{Fe}}, \dot{\mathrm{Ka}}, \dot{\mathrm{Na}})^3 \ddot{\mathrm{Si}}^2 + 2 \ddot{\mathrm{Al}} \ddot{\mathrm{Si}}^2$	$ P_{\Gamma_2} $	6, 6	2,8:2,9
$2(Mg, Ca, Na, Mn)^3 \ddot{S}i^2 + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i^2$	Pr?	5, 5	4:4,1
1.— $(\dot{M}_g,\dot{C}_a,\dot{N}_a,\dot{K}_a)^3\ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l\ddot{S}i^2$	P_{Γ_4}	6	3,7:3,8
$2 \dot{K}a^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i^2$	Te	5:5,5	2, 4:2, 5
$3(Ka, Ca)^{\circ}Si^{2}+3 \text{ Ål }Si^{2}$	Te	5,6:6	[2, 4: 2, 5]
$4 (Mg + 2Fe)^3 \ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l \ddot{S}i^2; \dot{M}g^2 \ddot{P} + \ddot{H}$	Am	5, 6	[2,5:2,6]
1.— (Na + 3 Ca) Si + Al Si	Pr	5,6:6	2,7:2,9
2. — (Mg,Fe, Na,K) Ši + Äl Ši	Pr	2,6:3	2,75:2,85
3.— (Na, Ka) Si + Al Si	Pr_2	6	2,55:2,58
4.— (Ca, Mg, Ka, Na) Si + Al Si	Pr_4	6	2,69:2,76
5.— Ca Si + Al Si	Pr2?	6	
1.— (Ka, Fe, Mg) Si + 2 Āl Si	Rh?	2,6:3	2,8:2,9
1.—2 (Na, Li, Mn, Mg) B+9 Al Si	Rh	7, 5	2:3,2
1 1. — 3 (Na, Ka, Ng, Ca) Si + 2 Al Si	$ P_{r_2} $	6	[2, 6: 2, 7]

24. — — 1. —	1. — 6. — 1.	1. — Raphilit
25. — — 1. —	2 1 1.	1. — Achmit
		2. — Hafnefjordit
		3. — Oligoklas
[26. ————————————————————————————————————	- 2 2 1.	1. — Ізоруг?
27. — — — 1. —	3. — 1. — 1.	1. — Orthoklas
		2 Glasiger Feldspath
1		3. — Albit
		4. – Periklin
$ 25 \frac{4}{3}$	2 1 4.	1. — Spodumen
$ 29 \frac{4}{3} -$	4 1 4.	1 Petalit
30. — — 2. —	4. — 3. — 1.	1. — Krablit
31. — - 2. —	6 1 1.	1. — Baulit
32. — — 3. —	3 1 2.	1. — Kastor
Fünfzehnte	Ordnung.	
Schema: III.	T'A+ BAD. T'A.	
1. Genus: $\frac{x}{3} = 1.\frac{x}{3}$	$=\frac{1}{2}$, $n=2$, $n'=1$	1. Sp. Euklas
22	2. — 1. — 1.	1 Beryll

1.Sp.6 (\dot{G}_a , \dot{M}_g , \dot{K}) $\ddot{S}i$ + ($\ddot{A}l$, $\ddot{F}e$) $\ddot{S}i$	Xr	3, 5	2,8:2,9
1.— Na Ši+Fe Ši²	Pr ₂	6:6,5	[3, 2: 3, 3]
$2 (\dot{C}a, \dot{N}a) \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i^2$			[2,7:2,8]
3.— (Na,Ka,Ca,Mg) Ši + Äl Ši	Pr_4	6	[2,6:2,7]
12 ($\dot{C}a$, $\dot{F}e$) $\ddot{S}i + \ddot{A}l$ $\ddot{S}i^2$	Am	5,6:6	2,9:3
1.— Ka Ši + Äl Ši³	P_{Γ_2}	6	[2, 5: 2, 6]
$2(\dot{N}_a,\dot{K}_a,\dot{C}_a)\ddot{S}_i+(\ddot{A}_l,\ddot{F}_e)\ddot{S}_i^3$	P_{Γ_2}	6	
$3 Na\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i$	P_{r_4}	6	2, 6:2, 7
$4 (Na,K)\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}i^3$	$ P_{r_4} $	6	[2, 5: 2, 6]
1. $- (\dot{L}i, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i^4 + 4 \ddot{A}l \ddot{S}i^2$	Pr	6, 6:7	3:3,2
$1 \cdot - (\dot{L}i, \dot{N}a)^3 \ddot{S}i^4 + 4 \ddot{A}l \ddot{S}i^4$	Pr	6,6:5	2,4:2,5
$1 3 \text{ Na } \ddot{\text{Si}}^2 + \ddot{\text{Al }} \ddot{\text{Si}}^4$	Xr	6	[2, 3: 2, 4]
1. — Ka Ši² + Äl Ši6			2, 6: 2, 7
1. — Li Si ³ + 2 Al Si ³	Pr_2	6	2,38:2,4
$1.\mathrm{Sp.2}$ Be $\mathrm{Si} + \mathrm{Al^2}$ Si	Pr_2	7, 5	[2, 9:3, 2]
$1 \text{Be } \text{Si}^2 + \text{Al } \text{Si}^2$	Rh	7,6:8	2,6:2,8

SECHSTE BLASSE.

Ordnungen und Genera.	Name der Verbindungen.	
Erste Ordnung.		
Schema: II. I+II. IV+II.		
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = 1$. $n = 1$. $n' = 8$. $n' = 2$.	1. Sp. Bunsit; Parisit	
Zweite Ordnung.		
Schema: II. I+II. V+I.		
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$. $n = 1$. $n' = 1$. $n'' = 2$.	1. Sp. Tagilit	
$2 1 \frac{1}{3} - 1 1 6.$	1. — Euchroit	
$31\frac{1}{3} - 211.$	1. — Ehlit	
$4 1 \frac{1}{3} - 2 1 8.$		
$5 1 \frac{1}{3} - 3 1 9.$	1. — Erinit	
$61, -\frac{1}{3} - 5, -1, -18,$	1. — Kupferglimmer	
9		
Dritte Ordnung.		
Schema: III. I+II. V+I.		
1. Genus: $\frac{x}{y} = 3$. $\frac{x}{y'} = \frac{1}{4}$. $n = 2$. $n' = 3$. $n'' = 8$.		
	Cornwall	
$2 3 \frac{1}{4} 2 3 24.$	2. — Blau. ars:s.Kup-	
	fer v. Cornw.	
Vierte Ordnung.		
Schema: III. I+III. V+I.		
1. Genus: $\frac{x}{y} = 3$. $\frac{x'}{y} = \frac{3}{4}$. $n = 2$. $n' = 1$. $n'' = 9$?	1. Sp. Kalait	
, , ,	1	

Pentadiploiten.

Chemische Formel.	Kry- stall- form.	Härte,	Specifi- sches Gewicht.
1.Sp.Če Ĥ + 8 Ĉe Ĉ + 2 Ca F	Rh?	4, 5	4,3:4,4
$1.\mathrm{Sp.Cu}\dot{\mathrm{H}} + \mathrm{Cu}^{3}\ddot{\mathrm{P}} + 2\dot{\mathrm{H}}$	Am	3	3, 5
$1 \dot{C}u\dot{H} + \dot{C}u^3\ddot{A}s + 6\dot{H}$	$\mathbf{p_r}$	3,6:4,0	3,3:3,5
$12 \text{ Cu H} + \text{Cu}^3 P + \text{H}$	Xr	1,6:2,0	
$12 \text{ Cu H} + \text{Cu}^3 (P, As) + 8 \text{ H}$	P_{r}	1,0:1,5	3,0:3,2
$13 \text{ Cu H} + \text{Cu}^3 (\text{As}, \hat{P}) + 9 \text{ H}$	Pr?	4,6:5,0	4,0:4,1
$15 \overset{\cdot}{\text{Cu}}\overset{\cdot}{\text{H}} + \overset{\cdot}{\text{Cu}}^{3}\overset{\cdot}{\text{As}} + 18\overset{\cdot}{\text{H}}$	Rh	2, 0	2,4:2,6
1.Sp.2 Äl H³ + 3 Cu⁴ Äs + 8 H	$ m P_{r}$	2:2,5	2,9:3
2. $-2 \text{ Ål } \text{ H}^3 + 3 \text{ (Cu, Fe)}^4 \text{ (Ås, P)} + 24 \text{ H}$ 1. Sp. 2 Ål $\text{H}^3 + \text{ Äl}^4 \overset{\text{P}}{\text{P}}^3 + 9 \text{ H}$?	Am	6	2,62:2,8

2. Genus: $\frac{x}{y} = 3 \cdot \frac{x'}{y} = \frac{3}{4} \cdot n = 2$. $n' = 1$. $n' = 12$.	1. Sp. Peganit
$3 3 \frac{3}{4} 2 1 18.$	
Fünfte Ordnung.	
Schema: AAD. A+ AD. V+ AV.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = 3$. $\frac{x}{y'} = \frac{1}{3}$. $n = 18$. $n' = 3$. $n' = 1$.	1. Sp. Bleigummi
Sechste Ordnung.	
Schema: II. I+II. VI+I. 1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. $n = 1$. $n' = 1$. $n'' = 2$.	1. Sp. Chrysotil
y y	2. — Baltimorit
$2 1 \frac{2}{3} 3 2 3.$	1. — Serpentin
	2. — Steatoid
$3 1 \frac{2}{3} 3 2 6.$	1. — Zermattit
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1. — Bastit 1. — Spadait
$\begin{bmatrix} 3. & & -1. & -1. & -1. & -3. \\ 6. & & -1. & -1. & -2. & -3. & -2. \end{bmatrix}$	
7. — — 1. — 1. — 2. — 4. — 1.	
Siebente Ordnung.	
Schema: III. I+ III.VI+VI.	1. Sp. Pyrosmalith
1. Genus: $\frac{x}{y} = 6 \cdot \frac{x}{y'} = \frac{2}{3} \cdot n = 1$. $n' = 4$. $n' = 2$.	1. Sp. 1 , 10 smanu
Achte Ordnung. Schema: II. III+II. VI+I.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{9}$. $\frac{x}{y'} = \frac{1}{3}$. $n = 1$. $n' = 2$. $n' = 3$.	1. Sp. Berthierit
$2 \frac{1}{6} \frac{1}{3} 1 2 12.$	
$3 \frac{2}{3} - 1 1 1 1.$	
3	,

1.Sp.2 $\ddot{\mathbf{H}}$	Pr Xr	3, 6:4	2,49:2,54 2,4:2,5
1.Sp.18 Äl H + 3 Pb3 P + Pb Cl	Am	4,6:5	6, 4:6, 5
1.Sp.Mg $\dot{\mathbf{H}} + \dot{\mathbf{M}} \mathbf{g}^3 \dot{\mathbf{H}}^2 + 2 \dot{\mathbf{H}}$ 2. — (Mg,Fe) $\dot{\mathbf{H}} + \dot{\mathbf{M}} \mathbf{g}^3 \dot{\mathbf{H}}^2 + 2 \dot{\mathbf{H}}$	Xr Xr	2, 6:3	
1. — $3 \text{ Mg H} + 2 (\text{Mg,Fe})^3 \text{ Si}^2 + 3 \text{ H}$ 2. — $3 \text{ Mg H} + 2 \text{ Mg}^3 \text{ Si}^2 + 3 \text{ H}$ 1. — $3 \text{ Mg H} + 2 \text{ Mg}^3 \text{ Si}^2 + 6 \text{ H}$	Xr	3:3,5	2,5:2,6
1. — $3 \text{ Mg H} + 4 \text{ Mg}^3 \text{ Si}^2 + 3 \text{ H}$ 1. — $\text{Mg H} + 4 \text{ Mg Si} + 3 \text{ H}$	Pr? Am	3, 5 2, 5	2,6:2,8
1. — 2 Mg H + 3 Mg Si + 2 H 1. — 2 Mg H + 4 Mg Si + H	$egin{array}{c} \mathbf{Pr}_2 \\ \mathbf{Pr} \end{array}$	3, 6:4 2, 6:3	2,6:2,8 2,5:2,7
1.Sp.Fe $\dot{\mathbf{H}}^{6}$ + 4 (Fe + $\ddot{\mathbf{H}}$ n) 3 $\ddot{\mathbf{S}}$ i 2 + 2 Fe Cl 3	Rh	4:4,5	3:3,1
1.Sp.Fe ⁹ Äl + 2 Fe ³ Si + 3 H	Am		
1. — $\dot{\text{Fe}}^6 \ddot{\text{Al}} + 2 \dot{\text{Fe}}^3 \ddot{\text{Si}} + 12 \dot{\text{H}}$ 1. — $(\dot{\text{Fe}}, \dot{\text{Mg}})^3 \ddot{\text{Al}}^2 + (\dot{\text{Fe}}, \dot{\text{Ca}}) \ddot{\text{Si}} + \dot{\text{H}}$	Am Rh	4:4,5	3:3,4 3:3,1

Yeunte Ordnung.

Schema: II. V+III. V+I.

1. Genus:
$$\frac{\pi}{n} = \frac{1}{n}$$
. $\frac{\pi}{n} = \frac{1}{n}$. $n = 1$. $n' = 2$. $n' = 28$. 1. Sp. Blaueisenerde

2. —
$$\frac{1}{3}$$
. — $\frac{3}{7}$. — 2. — 1. — 13. 1. — Arseniosiderit

3. —
$$-\frac{1}{3}$$
 — $\frac{1}{3}$ — 1. — 2. — 24. 1. — Uranit

4. —
$$-\frac{1}{3}$$
. $-\frac{2}{3}$ — 2. — 1. — 18. 1. — Würfelerz

$$\frac{1}{3} - \frac{3}{3} - \frac{3}{2} - 2 - 1 - 6$$
. 1. — Lazulith

Zehnte Ordnung.

Schema: III. V + III. VI + I.

1. Genus:
$$\frac{x}{3} = \frac{1}{2}$$
, $\frac{x}{3} = \frac{1}{2}$, $n = 5$, $n = 3$, $n' = 40$. 1. Sp. Eisensinter v.

2. —
$$-\frac{3}{2}$$
 — 2. — 1. — 3. — 54. 1. — Diadochit

3.
$$\frac{2}{3}$$
 $-$ 2. $-$ 1. $-$ 1. $-$ 30. 1. $-$ Eisensinter v.

Eilfte Ordnung.

Schema: III. V+III.VI+II.

1. Genus: $\frac{\pi}{n} = 1$. $\frac{\pi}{n} = 2$. n = 1. n' = 6. n' = 1. 1. Sp. Kieselwismuth

Zwölfte Ordnung.

Schema: II. VI+II.VI+I.

1. Genus:
$$\frac{z}{2} = 1$$
. $\frac{z}{5} = \frac{1}{5}$ $n = 2$. $n = 1$. $n = 8$. 1. Sp. Retinalith

2. — 3.
$$-\frac{2}{5}$$
. — 3. — 4. — 3. 1. — Pektolith

2. - Chalkolith

Gastein

Freiberg

	1	1	1
1.Sp.Fe ⁴ \ddot{P} + 2 \ddot{F} e ² \ddot{P} + 28 \dot{H}			
$12 \text{ Ca}^3 \text{ Ås} + \text{Fe}^7 \text{ Ås}^3 + 13 \text{ H}$	Xr	1:1,5	3,5:3,9
$1 \dot{C}a^{3} \ddot{P} + 2 \ddot{U}^{3} \ddot{P} + 24 \dot{H}$	Py	2	3,3
$2 \text{Cu}^3 \mathbf{P} + 2 \mathbf{H}^3 \mathbf{P} + 24 \mathbf{H}$	Py	2:2,5	3, 5:3,6
1. $-2 \text{ Fe}^3 \text{ As} + \text{Fe}^3 \text{ As}^2 + 18 \text{ H}$	Те	2, 5	2,9:3
$22 \text{ Fe}^{3} \vec{P} + \vec{F}e^{3} \vec{P}^{2} + 18 \vec{H}$			
1. $-2 \text{ (Mg,Fe, Ca)}^3 \ddot{P} + \ddot{A}l^4 \ddot{P}^3 + 6 \dot{H}$	P_{r}	5, 5	3:3,1
$1.\mathrm{Sp.5}\ddot{\mathrm{Fe}}^{2}\ddot{\overset{\dots}{\mathrm{As}}} + 3\ddot{\mathrm{Fe}}^{2}\ddot{\mathrm{Si}} + 40\dot{\mathrm{H}}$	Am		
1. $-\ddot{F}e^{5}\ddot{P}^{3} + 3\ddot{F}e\ddot{S}i^{2} + 54\dot{H}$	Am		
1. — $\ddot{\mathbf{F}}e^3 \ddot{\mathbf{A}}s^2 + \ddot{\mathbf{F}}e \ddot{\mathbf{S}}i^2 + 30 \dot{\mathbf{H}}$	Am	2:2,5	2,3:2,5
20 125 2001. 0011	2111	~· ~, U	2,0:2,0
1.Sp.($\ddot{B}i$, $\ddot{F}e$) \ddot{P} + 6 $\ddot{B}i$ $\ddot{S}i^2$ + $\dot{B}i$ Fl	Te	5	5,9:6
1			
1.Sp.2 Na Si + Mg ³ Si + 8 H	Am	3,5	2,4:2,5
1. -3 (Na, Ka) $\ddot{\text{S}}i + 4 \ddot{\text{C}}a^3 \ddot{\text{S}}i^2 + 3 \ddot{\text{H}}$	Xr	5	2, 6: 2, 7

2 Canus x = 1 x'	4 2 -/ - 1 -// - 2	1 Sn Datalith
	$=\frac{4}{3}$. $n=3$. $n'=1$. $n''=3$.	
4. — — 1. —	$\frac{4}{3}$ - 3 1 6.	1. — Botryolith
$\frac{1}{3}$. $\frac{4}{3}$.	$\frac{2}{3}$ - 1 3 6.	1. — Krokydolith
6 2	-11816.	1. — Apophyllit
Ibreizeh	nte Ordnung.	
Schema: II	·VI+III.VI+I.	
1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{y'}$	$=\frac{1}{2} \cdot n = 3$. $n' = 1$. $n' = 12$.	1. Sp. Thuringit
$2 \frac{1}{3}$	-1122.	1. — Zeuxit
$3 \frac{1}{3}$	- 1. — 1. — 2. — 3.	1 Prascolith
4. — — 1/3. —	- 1 1 3 3.	1. — Iberit
$5 \frac{1}{3}$	-1136.	1. — Karpholith
	-1146.	
7. — — 1/3. —	-1137.	1. — Comptonit
	$-1214\frac{1}{2}.$	
$9 \frac{1}{3}$	-1216.	1. — Kæmmererit
$\frac{1}{10}$. $-\frac{1}{3}$. $-$	-1326.	1. — Chonikrit
11. — — 1/2. —	$-\frac{1}{2}$ - 2 3 4.	1. — Diphanit
12. — — 1 —	1 1 1 1.	1. — Prehnit
$13 \frac{1}{2} \cdot -$	1 3 1 2.	1. — Kirwanit
$14 \frac{2}{3} -$	1. — 1. — 1. — 9.	1. — Glottalith
$15 \frac{2}{3} \cdot -$	1 1 2 3.	1 Ottrelit
$16 \frac{2}{5}$	1 1 3 2.	1. — Bonsdorffit

	1		
$1.\mathrm{Sp.3}\ \dot{\mathrm{Ca}}\ \ddot{\mathrm{B}} + \dot{\mathrm{Ca}}^{3}\ \ddot{\mathrm{Si}}^{4} + 3\ \dot{\mathrm{H}}$	Pr_2	5:5,5	2,9:3
$1 3 \text{ Ca B} + \text{Ca}^3 \text{ Si}^4 + 6 \text{ H}$	Am	5	2,8:2,9
1.— Na³ Ši⁴ + 3 Fe³ Ši² + 6 Ĥ	Xr	4	3, 2: 3, 4
1. $- \text{Ka Si}^2 + 8 (\text{Ca}, \text{Fe}) \text{Si} + 16 \text{ H};$	Py	4,6:5	2, 3:2, 4
1.Sp.3 $(\dot{M}g + 21 \dot{F}e)^3 \ddot{S}i + \ddot{F}e^2 \ddot{S}i + 12 \dot{H}$	Am	2:2,5	3,15:3,16
1. $- (\dot{F}e, \dot{C}a)^3 \ddot{S}i + 2 (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i + 2 \dot{H}?$	Xr	4,6:5	3:3,1
$1 (\text{Mg}, \text{Fe})^3 \text{Si} + 2 \text{Al} \text{Si} + 3 \text{H}$	Pr	3,6:4	2,7:2,8
1. — $(Fe, Ka)^3 \ddot{S}i + 3\ddot{A}l \ddot{S}i + 3\dot{H}$	Rh?	2, 5	2,8:2,9
1. $-(Mn, Fe)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i + 6 \dot{H}$	Xr	5	2,9:3
1.— (Fe, Mg, Ka) ³ Si + 4 Āl Si + 3 Ḥ	Pr_2	4:4,5	2,8:2,82
1. — $(Na, Ca, Ka)^3 \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i + 7 \dot{H}$	$\mathbf{p_r}$.	5	2, 3:2, 4
1. — 2 ($\dot{\text{Mg}}$, $\dot{\text{Fe}}$) ³ $\ddot{\text{Si}}$ + $\ddot{\text{Al}}$ $\ddot{\text{Si}}$ + $4\frac{1}{2}$ $\dot{\text{H}}$?	Pr	3	2,7:2,8
1. -2 (Mg, Ca, Fe) ³ Si + (Al, Ch) Si + 6 H	Rh	2	2,7:2,8
1. -3 ($\dot{\text{Mg}}$, $\dot{\text{Ca}}$) ³ $\ddot{\text{Si}}$ + 2 $\ddot{\text{Al}}$ $\ddot{\text{Si}}$ + 6 $\dot{\text{H}}$	Am	3	2,9:2,95
1. $-2 (\hat{C}_a, \hat{F}_e, \hat{M}_n)^2 \hat{S}_i + 3 \hat{A}_i^2 \hat{S}_i + 4 \hat{H}$	Rh	5:5,5	3:3,1
1. $-\dot{C}a^2\ddot{S}i + (\ddot{A}l, \ddot{F}e)\ddot{S}i + \dot{H}$	Pr	6:6,5	2,8:3
1. — $3 (\dot{C}a, \ddot{F}e)^2 \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i + 2 \dot{H}$	Xr	.2	2, 9
$1 \dot{C}a^3 \ddot{S}i^2 + \ddot{A}l \ddot{S}i + 9 \dot{H}$	Te	3, 5	2,.1:2,2
1.— $(\dot{F}e, \dot{M}n)^3 \ddot{S}i^2 + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i + 3 \dot{H}$	Rh	6, 5	4, 3:4, 5
1. $-(Mg, Fe)^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i + 2 H$	Rh?	3:3,5	

				2. Sp. Pinit von Penig
17. Genus: =	$=\frac{2}{3}$. $\frac{x}{5}=1$. t	i = 1. $n' = 3$.	n'= 3.	1. — Esmarkit
				1. — Fahlunit
				2. — Brevicit
19. —— —	$-\frac{2}{3}$. — 1.	- 1. - 3.	_ 8	1. — Mesole?
				1. — Huronit
21	$-\frac{2}{3}$. — 1.	- 1 5	. — 4.	1. — Polyargit
22. — -	$-\frac{2}{3}$. — 1.	- 1. - 6.	- 0.	1. — Rosellan
23. — -	$-\frac{2}{3}$. — 1.	- 2. - 1	11.	1. — Seifenstein
				1. — Analeim
				2. — Ledererit
25. —— —	$-\frac{2}{3}$. -2 .	- 1. — 3	. — 0.	1. — Cluthalit
20. — -	$-\frac{3}{3}$. — 2.	— 1. — 3.	— 15 J	1. — Phillipsit
				2. — Herschelit
27. — -	$-\frac{2}{5}$. — 2.	— 1. — 3.	- 18	1. — Gmelinit
				2. — Chahasit
25	$-\frac{2}{3} \cdot -2$.	— 1. — 3.	— 36.	1. — Botryogen
	$-\frac{2}{3}$. $-\frac{2}{3}$.	— 1. — 4.	_ 18	1. — Laumontit
				2. — Harmotom
30. — –	$-\frac{2}{3}$. — 2.	- 2. - 1.	- 0.	1. — Stilpnomelan
				1. — Saecharit
1				1. — Gigantolith
				2. — Xylith

2.Sp.			
1.— (Mg, Fe, Mn) ³ Si ² + 3 Al Si + 3 H	Am	3.6:4	2,7:2,75
1.—(MgMn,Fe,Ka,Na)°Si°+3(Al,Fe)Si+6H	Rh?	3	2.6:2.7
$2 (Na, Ca)^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i + 6 \ddot{H}$	Pr?		
1. — $(Na + 2 Ca)^3 Si^2 + 3 Al Si + 8 H$	Xr	3. 5	3.3:3.4
1. $-$ (Ca, Fe) 3 Si 3 + 4 Al Si + 3 H	Xr	3:3.5	2.8
1. $- (\hat{C}_a, \hat{K}_a, \hat{M}_g, \hat{F}_e)^3 \hat{S}_i^2 + 5 \hat{A}_i \hat{S}_i + 4 \hat{H}_i$	Am	4	2.7:2.8
1. — (Ka Co, Mg)3 Si2 + 6 Al Si + 6 H	Xr	2.6:3	2.7:2,8
$1 2 M_8^{\circ} Si^{\circ} + \overline{Ai} Si + 6 H?$	Am	1	
1. — Na Si + 3 Al Si + 6 H	Te	5.5	2:2.2
2. — $(C_a, N_a)^3 \bar{S}i^2 + 3 \bar{A}l \bar{S}i^2 + 6 \bar{H}$	Rh		
1.— (Ča, Na)* Ši² + 3 Āl Ši² + 9 Ĥ	Xr	3, 6:4	2.1:2.2
1. — $(C_a, N_a, K_a)^{\circ} S_i^{\circ} + 3 A_i S_i^{\circ} + 15 H$	Pr	4, 5	2:2.2
2. — (Ca+10Ka+34Na)*Si*+3AlSi*+15H	Rh	4, 5	2:2.1
1. — $(C_0, N_0)' Si' + 3 Al Si' + 18 H$	Rh	4, 5	2:2,1
2 (KaNa)° Si² + 3 Al Si² + 18 H	Rh	4:4,5	2:2.2
1.— Fe ² S ² + 3 Fe S ² + 36 H	P_{Γ_2}	2,2:2,5	2:2.1
1.— Ca ³ Si ² + 4 Al Si ² + 18 H	P_{r_2}	3, 5	2.2:2.4
$2 \dot{B}a^2 \dot{S}i^2 + 4 \dot{A}l \dot{S}i^2 + 18 \dot{H}$	Pr	4, 6	2, 3:2, 4
i.— 2 Fe ² Si ² + Al Si ² + 6 H	Xr	3,6:4	2.7:3
1. -2 (Ca, Na) ² $\ddot{\text{S}}$ i ² $+ 6$ $\ddot{\text{A}}$ l $\ddot{\text{S}}$ i ² $+ 3$ $\ddot{\text{H}}$	Xr	5,6:6	2.66:2,69
1 (Mg, Fe, K, Na, Mn) Si + Al Si + H	Rh	3	2,8:2,9
$2 (\hat{C}a + \hat{M}g) \hat{S}i + \hat{F}e \hat{S}i + \hat{H}$	Xr	3	2.9:3

33 Canus	$\frac{x}{y} = 1$, $\frac{x}{y} = 1$, $n = 1$, $n' = 1$, $n' = 2$.	1. Sp. Mesotyp
JJ. Ochus.	$\frac{1}{y} = 1$. $\frac{1}{y} = 1$. $n = 1$. $n = 1$	2. — Natrolith
		3. — Harringtonit
34. ——	-1113.	
	_ 1 1 1 1.	Scolezit
		2. — Scolezit
		3. — Caporcianit
		4. — Lehuntit
35. ——	- 1 1 1 4.	
		1. — Hisingrit
	-1119.	
3,.		Kalieisen
38. —	-11125.	
		1. — Damourit
	-11136.	
	-11130.	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
12.	— 1. — 1. — 1. — 4. — 3.	erz
		2. — Natron-Gelbei-
43. —	1 1 2 4 5	senerz
14. —	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
45. ——	- 1 1 3 4 15	1. — Kali-Harmotom 1:e Form.
		2:e Form.Zeagonit

1.Sp.($\mathring{C}a$, $\mathring{N}a$) $\mathring{S}i + \mathring{A}l \mathring{S}i + 2 \mathring{H}$ 2. $-\mathring{N}a \mathring{S}i + \mathring{A}l \mathring{S}i + 2 \mathring{H}$	Pr_2	5:5,5	3, 2: 2, 3
$3 (\mathring{C}a, \mathring{N}a) \mathring{S}i + \mathring{A}l \mathring{S}i + 2 \mathring{H}$	Am		
A CONDENTATE LOS			
1.— (Ca, Na) Si + Al Si + 3 H 2.— Ca, Si + Al Si + 3 H	Pr_2	5:5,5	[2, 2:2, 3]
$3 (\mathring{C}a, \mathring{K}a) \mathring{S}i + \mathring{A}l \mathring{S}i + 3 \mathring{H}?$	Am		
4 Na Si + Al Si + 3 H	Am	3, 7:4	1,9:2
1. — $(\dot{F}e, \dot{M}g, \dot{K}a, \dot{N}a) \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i + 4 \dot{H}$	Py	3:3,5	[2, 5: 2, 8]
$1 \dot{F}e \ddot{S}i + \ddot{F}e \ddot{S}i + 6 \dot{H}$	Am	3	3:3,2
1. — Ka Ši + Fe Ši + 9 H			
1. $-$ (Ca,Ka) $\ddot{\text{S}}$ i + 2 $\ddot{\text{A}}$ l $\ddot{\text{S}}$ i + 5 $\dot{\text{H}}$	Xr	3, 6:4	2:2,1
1. — Ka Ši + 3 Āl Ši + 2 Ħ	Xr	1, 5	[2, 7: 2, 9]
$1 \ddot{K}_a \ddot{S} + 3 \ddot{A} \ddot{S} + 6 \dot{H}$	Rh	5	[2,6:2,8]
1 Mg Si + 4 (Fe + Mn) Si + 8 H	Am	3,6:3,8	2,7:2,8
$1 Ka\ddot{S} + 4\ddot{A}l\ddot{S} + 9\dot{H}$	Am	2,6:3	2,7:2,9
$2\dot{N}_a\ddot{S}+4\ddot{A}\ddot{I}\ddot{S}+9\dot{H}$	Am	2,6:3	2,7:2,9
1 3 (7 Mg + 2 Fe) Si + 4 Al Si + 5 H	Am	3:3,5	2,7:2,8
$1 3$ (Ca, Na) $\ddot{\text{Si}} + 4$ ($\ddot{\text{Al}}$, $\ddot{\text{Fe}}$) $\ddot{\text{Si}} + 12$ $\dot{\text{H}}$	Am	4:4,5	2,55:2,62
1. -3 (Ka, Ca) $\ddot{\text{Si}} + 4 \ddot{\text{Al}}$, $\ddot{\text{Si}} + 15 \ddot{\text{H}}$			
	Pr	4:4,5	[2, 1: 2, 2]
	Py	6:6,5	2, 1:2, 2

46. Genus: $\frac{x}{y}$	$\frac{x}{3} = 1. \frac{x}{3} = 1. n =$	= 3. n' = 5. n' = 12.	1. Sp. Poonalith
47. ——	$-1\frac{3}{2}\cdot$	1. — 1. — 15.	1. — Pinguit
48. ——	$-1\frac{3}{2}$	2 1 10.	1. — Phakolith
49. ——	— 1. — 2. —	3 4 15.	1. — Leonhardit
50. ——	— 1. — 3. —	1. — 1. — 4.	1. — Ædelforsit
51. ——	— 1. — 3. —	1. — 1. — 5.	1. — Epistilbit
			2. — Brewsterit
52. ——	— 1. — 3. —	1. — 1. — 6.	1. — Stilbit
		1. — 1. — 24.	
			2. — Manganalaun
			3. — Magnesiaalaun
			4. — Natronalaun
			5. — Kalialaun
			6. — Ammoniaka-
			laun
54. ——	- 1. - 3. -	3. — 2. — 12.	1. — Voltait
55. —— -	- 1. - 3. -	3. — 4. — 18.	1. — Henlandit
56. —— -	$-\frac{4}{3} \cdot -1.$	1. — 4. — 12.	1. — Ellagit
57. — -	$-\frac{4}{3}$ - 2	1. — 3. — 24.	1. — Faujasit
58. —— -	$-\frac{4}{3}$. — 4. —	1. — 5. — 6.	1. — Neurolith
59. — -	$-\frac{4}{3}$ 2	1. $-2.$ $-18.$	1. — Acadiolith
60. ——	- 2. - 3. -	1. — 1. — 5.	1. — Beaumontit

	1		1
1.Sp.3 $\dot{C}a\ddot{S}i + 5\ddot{A}l\ddot{S}i + 12\dot{H}$	Pr	5	2, 1:2, 3
$1 \dot{F}e \ddot{S}i + \ddot{F}e^2 \ddot{S}i^3 + 15 \dot{H}$	Am	1	2,3:2,35
$\int 12 \operatorname{Ca} \ddot{\mathrm{Si}} + \ddot{\mathrm{A}} \dot{\mathrm{I}}^2 \ddot{\mathrm{Si}}^3 + 10 \dot{\mathrm{H}}$	Rh	4,6:5	2, 13:2,15
$1 3 \text{ Ca Si} + 4 \text{ Al Si}^2 + 15 \text{ H}$	P_{Γ_2}	3:3,5	2,2:2,3
$1 \dot{C}a \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i^3 + 4 \dot{H}$	Pr?	6	2, 6
$1 (\dot{C}a, \dot{N}a) \ddot{S}i + \ddot{A}l \ddot{S}i^3 + 5 \dot{H}$	Pr	3, 6:4	2,2:2,3
$2 (\dot{S}_{r}, \dot{B}_{a}) \ddot{S}_{i} + \ddot{A}_{l} \ddot{S}_{i}^{3} + 5 \dot{H}$	Pr_2	3, 6:4	2,1:2,2
$1 \text{Ca Si} + \text{Al Si}^3 + 6 \text{ H}$	Pr .	3,6:4	2:2,2
$1 Fe\ddot{S} + Al\ddot{S}^3 + 24H$	Te	2	
$2 \text{Mn S} + \text{Al S}^3 + 24 \text{ H}$	Те		
$3 (Mg, Mn) \ddot{S} + Al \ddot{S}^3 + 24 H$	Te		i
$4 \text{Na } \ddot{S} + \ddot{A} \text{I } \ddot{S}^3 + 24 \dot{H}$	Te		1,5:1,6
$5 \text{Ka \ddot{S}} + \text{Al \ddot{S}}^3 + 24 \text{ H}$	Te	2:2,5	1,7:1,8
$6 (N \dot{H}^3) \ddot{S} + \ddot{A} \dot{1} \ddot{S}^3 + 24 \dot{H}$	Te	2, 5	1,7:1,8
1. — 3 ($\dot{F}e, \dot{K}a$) $\ddot{S} + 2 (\ddot{F}e, \ddot{A}l) \ddot{S}^3 + 12 \dot{H}$	Te		
1.— 3 Ča Ši + 4 Äl Ši³ + 18 Ħ	P_{Γ_2}	3, 6:4	2, 2:2, 3
$1 \dot{C}a^3 \ddot{S}i^4 + 4 \ddot{A}l \ddot{S}i + 12 \dot{H}$	Pr		2, 4:2, 5
1. $-(\dot{C}a,\dot{N}a)^3\ddot{S}i^4 + 3\ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 24\dot{H}$	Те	7	1,9:2
1.— $(\dot{C}a, \dot{M}g)^3 \ddot{S}i^4 + 5 \ddot{A}l \ddot{S}i^4 + 6 \dot{H}$	X_{Γ}	4, 3	2, 4:2, 5
1. $-\dot{C}a^3\ddot{S}i^4 + 2\ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 18\dot{H}$	Rh		
$1 \dot{C}a \ddot{S}i^2 + \ddot{A}l \ddot{S}i^3 + 5 \dot{H}$	Py]	4,6:5	2, 2: 2, 3

Vierzehnte Ordnung.

Schema: II. VI+III. VI+IV.

1. Genus:
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x'}{y} = 1$$
. $n = 1$. $n' = 3$. $n' = 1$. 1. Sp. Sodalith

2. —
$$-\frac{1}{3}$$
. — 1. — 3. — 2. — 1. 1. — Zweiaxiger

Glimmer

von New York

3.
$$--\frac{2}{3}\cdot -\frac{3}{2}\cdot -2\cdot -1\cdot -2\cdot$$

3.
$$- -\frac{2}{3}$$
: $-\frac{3}{2}$: $-$ 2. $-$ 1. $-$ 2. 1. $-$ Leukophan 4. $- -\frac{2}{3}$: $-$ 2. $-$ 8. $-$ 4. $-$ 1. 1. $-$ Eudialith

1.Sp.Na³ Si + 3 Āl Si + Na Cl²	Te	5,6:6	2,2:,2,3
1. — 3 Mg ³ Si + 2 Āl Si + Ka Fl ²	Pr_2	2:2,5	2,2:3
1. — 2 Ĉa³ Ŝi² + B̄e² Ŝi³ + 2 Na FI² 1. — 8 (Ĉa, Na, Fe)³ Ŝi² + 4Zr Ŝi² + Na Cl²	Rh	5:5,5	2,8:2,9

SIEBENTE KLASSE.

Ordnungen und Genera.	Name der Verbindungen.
Erste Ordnung. Schema: II.I-II.III-III.VI.	
1. Genus: $\frac{x}{j} = 1$. $\frac{x}{j} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{j'} = 1$. $n = 3$. $n' = 3$. $n' = 2$. Zweite Ordnung.	1. Sp. Xanthophyllit
Schema: II. $I + II$. $VI + III$. VI . 1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y'} = 1$. $n = 9$. $n = 3$. $n' = 2$.	1. Sp. Pennin
2. — 1. $-\frac{1}{3}$. — 1. — 9. — 1. — 3.	1. — Chlorit 2. — Ripidolith
3. — 1. — $\frac{1}{3}$. — $\frac{3}{2}$ — 6. — 2. — 1. 4. — 2. — $\frac{1}{3}$. — $\frac{1}{2}$. — 3. — 1. — 1.	1. — Steatit v. Ural
5. — — 3. — 1. — 1. — 6. — 3. 6. — — 5. — 1. — 3. — 1. — 2. — 1.	1. — Bergholz von
Dritte Ordnung. Schema: II.II-II.VI-III.VI.	Sterzing
1. Genus: $\frac{x}{y} = 1$. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. $\frac{x}{y} = 2$. $n = 3$. $n = 1$. $n' = 2$.	1. Sp. Helvin
Vierte Ordnung. Schema: III. III+II. VI-II.VI. 1. Genus: $\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{y} = 1.n = 1. n = 5.n' = 5.$	

Mexadiploiten.

Chemische Formel.	Kry- stall- form.	Härte.	Specifi- sches Gewicht.
1.Sp.3 $\dot{M}g \dot{H} + 3 (\dot{C}a, \dot{M}g)^2 \ddot{A}l + 2 \ddot{A}l \ddot{S}i$	Rh	4, 0:4, 5	3,0:3,1
1.Sp.9 $\dot{M}g \dot{H} + 3 \dot{M}g \ddot{S}i + 2 (\ddot{A}l, \ddot{F}e) \ddot{S}i$	Rh	2,0:2,5	2, 62:2,66
1. $-9 \text{ Mg H} + \text{Mg}^3 \text{ Si} + 3 \text{ (Al, Fe) Si}$	Rh	1,0:1,5	2,78:2,88
2. $= 9 \text{ Mg } \dot{\mathbf{H}} + (\dot{\mathbf{Mg}}, \dot{\mathbf{Fe}})^3 \ddot{\mathbf{Si}} + 3 (\ddot{\mathbf{A}}l, \ddot{\mathbf{Fe}}) \ddot{\mathbf{Si}}$	Rh	2, 0:2, 5	2,61:2,68
1.— $6 \text{ Mg H} + 2 (\text{Mg, Fe})^3 \text{Si} + \text{Al}^2 \text{Si}^3$	Rh	1,6:2,0	2, 7:2,75
$1 3 \text{ Mg } \text{H}^2 + \text{Mg}^3 \text{ Si} + \text{Al}^2 \text{ Si}$	Am		
$1\dot{M}g + 6 \dot{M}g + 3 \dot{M}g \ddot{S}i$	Rh	4, 6:5, 5	3:3,1
1. — Mg H³ + 2 Mg Si + Fe Si³	Am	2, 5	2, 5: 2, 6
1.Sp.3 $\dot{\text{M}}$ n $\dot{\text{M}}$ n + $\dot{\text{M}}$ n³ $\ddot{\text{S}}$ i² + 2 ($\ddot{\text{B}}$ e, $\ddot{\text{F}}$ e) $\ddot{\text{S}}$ i²	Te	6, 0:6, 5	3, 1:3, 3
1-10			
1.Sp.Zr³ Ñi + 5 Ća³ Ši + 5 Na Ši	X_{r}	5,6:6	3, 4:3, 5

Fünfte Ordnung.

Schema: II.VI+II.VI+III.VI.

1. Genus: $\frac{\pi}{3} = 1$. $\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. $\frac{\pi}{5} = 1$. n = 1. n = 1. n = 2. 1. Sp. Concrinit

2. — 3. — $\frac{2}{3}$. — 1. — 1. — 3. — 1. 1. — Yttrotitanit

2. - Stroganowit

Sechste Ordnung.

Schema: II. V+III. V+IV. VI.

1. $G_{0} = \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n} = 2$. n = 3. n' = 1. 1. Sp. Amblygonit

Siebente Ordnung.

Schema: II.VI-II.VI-III.VI.

1. Genus. $\frac{z}{2} = 1$. $\frac{z}{2} = \frac{1}{2}$. $\frac{z}{2} = 1$. n = 1. n = 3. 1. Sp. Nosean

[2. — — 1. — 1. — 1. — 2. — 1. — 3. 1. — Haüyn

1.Sp.Ca C + Na ² Si + 2 Āl Si 2.— Ca C + (Na ² ,Ca ²) Si + 2 Āl Si 1.— Y Ti ³ + 3 Ca ³ Si ² + (Fe,Āl,Ān) Si 1.Sp.(Li,Na) ⁵ P̄ ³ +3Āl ⁵ P̄ ³ +(Li,Na)Fl+2AlFl ³	Rh Py? Xr	5, 5 5 6:6, 5	2.4:2.5 2.7:2.8 3,6:3,7
1.Sp. Na S + Na ³ Si + 3 Āl Si	Te	5.0:6	2.25:2.6
$12 Ca \overline{S} + \overline{X}a^3 \overline{S}i + 3 \overline{A}l \overline{S}i$	Te	5:5,5	2.45:2, 6



DAS EXAMINATIONS-SYSTEM DER MINERALIEN.

Die Tabellen 1 bis 8, das Examinations-system enthaltend, werden hier eingeschaltet.

Noten und Ergänzungen.

- Note: 1. Einige Analysen sehr zusammengesetzter Mineralien sind von neueren Chemikern so berechnet, als ob Hepta-, Octo- und Ennea-Diploiten, ja sogar noch höhere Diploiten vorkämen, doch theils können diese Formeln, ohne der Idée von der Constitution der Mineralien Gewalt an zu thun, leicht auf eine der schon angegebenen Klassen reduzirt werden, theils nimmt die Berechnung der Analysen keine Rücksicht darauf, dass fremde Verbindungen mit der Constitution des Minerals in bestimmten Verhältnissen zusammenkrystallisirt sein können, ohne dass ein solcher Zusatz in irgend einer Weise auf die Krystallform des Minerals einen Einfluss ausübt. Durch ein solches Zusammen-Krystallisiren möchte wohl die Ungleichheit herrühren, die oft bei der Härte und dem specifischen Gewichte eines und desselben Minerals von verschiedenem Fundorte beobachtet wird. Schon 1820*) wies ich bei dem Augit von Pargas die Einmischung der Verbindung fe S + 2 Al S (Eisen-Epidot) bis zu $\frac{1}{6}$ und $\frac{1}{3}$ nach. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet können wohl mehrere Anomalien erklärt werden, ohne gerade die Zuflucht zu der Berechnungsweise nehmen zu müssen, die D:r Scheerer geltend zu machen gesucht und Polymer Isomorphie genannt hat.
- Zu pag. 62 Zeile 5. Ausserdem habe ich mit Xr solche Mineralien bezeichnet, welche Spuren einer Krystallisation zeigen, deren Krystallsystem aber nicht ermittelt werden kann, so wie den ganz derben und amorphen Mineralien die Bezeichnung Am verliehen.
- Note: 2. Es giebt hiervon noch andere Verbindungen, die speciell anzutühren ich nicht für nothwendig erachtet, als: AgAu³, AgAu⁵, AgAu⁴,

^{*)} Bidrag till närmare kännedom af Finlands Mineralier och Geognosie pag. 79.

Ag Au⁸, und zwar alle von derselben Krystallisation. Diess liefer den deutlichsten Beweis, dass solche Verbindungen (Legierungen) obgleich sie auch in bestimmten Proportionen vorkommen, doch nur als, Variationen der auf der Electrischen Skala nahe an einander liegenden Grundstoffe, aus denen die Legierung besteht, betrachtet werden müssen.

- Note: 3. Man führt eine Verbindung Ag³ Sb an, welche wahrscheinlich nur ein Gemenge von Ag Sb und Ag ist. Sollte diese Verbindung sich als eine wahrhaft chemische bestätigen, so könnte sie mit der Formel Ag Sb + Ag ausgedrückt werden und würde sodann einer neuen Klasse zwischen den Diploiten und Bidiploiten angehören, welche man am zweckmässigsten Haplo-Diploiten benennen könnte. Doch bedarf es genauerer Analysen und mehrerer Beispiele, bevor jene jeder Analogie widerstreitente Annahme sich geltend machen kann.
- Note: 4. Möglich ist es, dass diese Verbindung von der Zusammensetzung SbSb+2 H wäre und folglich zur 7:ten Ordnung der 4:n Klasse gehört.
- Note: 5. Diese ganze Ordnung würde verschwinden, wenn die Verbindungen mit (4 Pb + Cu) S; Zn (0 + 4 S) u. s. w. bezeichnet würden. In dem Falle gehören sie zur 2:n Ordnung der Diploiten.
- Note: 6. (Durch einen Druckfehler mit 4 bezeichnet). Eben diese ganze Ordnung kann verschwinden, wenn die hierher gehörigen Mineralien mit Co (As + S)²; (Fe, Co) (As + S)² u. s. w. bezeichnet würden und gehören sodann der 4:n Ordnung der Diploiten an.
- Note: 7. Die Analysen des Stauroliths von verschiedenen Orten haben zu ganz verschiedenen Formeln Anlass gegeben. Wenn man, so wie ich es vorgeschlagen, die bestimmende Zusammensetzung so betrachtet, dass sie durch III². VI, ausgedrückt werden kann und dass die Verbindung ausserdem im Stande ist andere Thonsilicate in bestimmten Proportionen zur Zusammen-Krystallisirung aufzunchmen, so stimmen auch die Resultate der Analysen überein. Nähere Untersuchungen, die ich nicht habe machen können, werden entscheiden, welcher Unterschied zwischen der Härte und dem spe-

cifischen Gewichte bei den von mir angegebenen Variationen statt findet.

- Note: 8. Man hat auch Andalusit gefunden, dessen Zusammensetzung gleich der des Cyanits gewesen. Entweder muss diese Anomalie dadurch erklärt werden, dass! in einem solchen Andalusit die gewönhliche Verbindung Al⁴ Si³ ein Atom Al² Si (eisenfreier Staurolith) aufgenommen hat, oder auch ist die wahre Zusammensetzung des Andalusits Al³ Si² und folglich eine andere Form (die Hemiprismatische) des Cyanits. Im letzten Falle ist die angegebene Zusammensetzung Al⁴ Si eigentlich nur eine Zusammen-Krystallisirung von 1 Atom Al³ Si² mit 1 Atom Al Si (Xenolith).
- Pag. 108. Zeile 3. Muss sein: "Schwefelsaurer Kobalt mit Talkerde."

 Diese Species ist möglicher Weise gleich der 1 Species, Genus
 7 dieser Ordnung, welche in dem Falle verschwinden könnte.

 Die Analysen bringen aber auf das hier angegebene ungleiche Resultat.
- Pag. 110. Zeile 5. Muss sein: "Chromocker von Halle." Da dieses Mineral, wenn sich die Analyse bestätigt, eine ganz andere Verbindung ist als die Pag. 93 unter Chromocker angegebene, so müsste es einen andern Namen erhalten.
- Note: 9. Die von D:r Rammelsberg in seinem "Berzelius's Mineralsystem"
 Pag. 245 bestimmten Formeln für Topas und Pyknit sind nicht
 gleich den von mir hier vorgeschlagenen, man wird aber leicht finden, dass auch die meinigen nicht viel von den Analysen abweichen.
 Enthalten diese Mineralien wirklich Fluor-Silicium, so ist man genöthigt eine neue Form von Diploiten anzunehmen, die der Analogie zufolge mit XII bezeichnet würde. Dass solche Diploiten unter den in unseren Laboratorien gebildeten Stoffen vorkommen, ist
 eine bekannte Sache, es kann aber die Mineralogie kein anderes Beispiel anführen. Dass ich stets 2 Al Fl³ anstatt Al Fl³
 schreibe, rührt daher, weil ich keinen Unterschied zwischen diesen beiden Arten, solche Verbindungen zu betrachten, einsehen kann-

- Note: 10. Nanthit habe ich als verschiedene Species angeführt, obgleich es nur als ungleiche Form des Gehlenits betrachtet werden müsste. Es geschah aber, weil (nach der Analyse) ein ungleicher Bestandtheil im Minerale enthalten ist. Dasselbe gilt für eine Menge hierauf folgender Mineralien, welche ich nicht streng in ungleiche Formen eingetheilt habe.
- Note: 11. Lepolith hat wenn auch nicht eine ganz gleiche, so doch eine analoge Krystallisation mit Amphodelith. Beide scheinen mir dem Hemiprismatischen Krystallsysteme anzugehören und müssten folglich verschiedene Formen des Anorthits bilden, mit dem eben die Zusammensetzung analog ist. Latrobit, obgleich die Analyse 4 Atomen Thonerde-Silicat angiebt, scheint mir, wenigstens nach einem Stücke zu urtheilen, das ich Herrn Brook in London verdanke, einer erstaunenden Ähnlichkeit wegen ganz dasselbe als Amphodelith zu sein.
- Note: 12. Hier ist der Ittnerit angeführt, als ob er nur die Tessularische Form von Amphodelith oder Anorthit wäre, ist aber ein sehr zusammengesetztes Mineral, das über dem noch Wasser und Chlor enthält. Es ist noch unbestimmt, ob die angegebene Formel, die nach einer älteren Analyse berechnet worden, der bestimmenden Verbindung des Minerals entspricht. Mehrere Mineralogen betrachten es als Varietät von Haüyn.
- Note: 13. Ich habe mit Rammelsberg Mejonit. Wernerit und Skapolith als verschiedene Species angegeben, obleich die Angabe wahrscheinlich nicht richtig ist. Die Ungleichheit der Analysen beruht vielleicht von der Zusammen-Krystallisirung ungleicher Bestandtheile mit der eigentlich bestimmenden Verbindung, weshalb es auch sehwer ist die wahre Zusammensetzung zu finden. Ilr Bergmeister Hartwall hat schon längst durch eine Reihe von Analysen dargethan, dass kohlensaurer Kalk größeren oder kleineren Theils in der Zusammensetzung des Skapoliths enthalten ist, ob aber dieser Bestandtheil wie beim Stroganowit zur Constitution des Minerals beiträgt, lässt sich noch sehwerlich abmachen.

Schliesslich muss ich folgende Fehler, die sich in meine Arbeit eingeschlichen, berichtigen:

- Pag. 64 Zeil 2. Der Olivenit wird jetzt im Systeme unter den Tetradiploiten aufgenommen und erhält die Formel CuH+Cu³ (3P+10As).
- Pag. 83, muss beim 1:sten Genus der 11:ten Ordnung vor der 1:sten Species Mendippit stehn:
 - a. Chlor-Sauerstoffverbindungen,
 - und vor der 2:ten Species Mysorin:
 - b. Sauerstoffverbindungen.
- Pag. 94. Im 1:sten Genus der 15:ten Ordnung müsste eigentlich Molybdänblei die 1:ste statt der 9:ten Species ausmachen.
- Pag. 110. Zeile 5. Vor dem Wittingit ist die Genusnummer ausgelassen; es muss jetzt mit 10. b. und das vorhergehende Genus Malakon mit 10. a bezeichnet werden.
- Pag. 136. Zeile 12, steht vor Lindsayit n'=6 anstatt = 3. Ausserdem sind die Genera 6 und 7 verwechselt; das letztere muss dem ersteren vorangehen.
- Pag. 143. Zeile 17, muss bemerkt werden, dass der Ellagit vermuthlich Pr₂, seine Härte aber nach meinen Versuchen = 3:3.2 ist.
- In der 8:ten Tabelle des Examinations-Systems sind in der 5:ten Gruppe der 3:ten Unterabtheilung Wittingit und Neotokit ausgelassen.

- C 6-C 6-----



DIE HÖHEN DER DREIECKS-PUNKTE DER FINNLÄNDISCHEN GRADMESSUNG ÜBER DER MEERESFLÄCHE,

BERECHNET VON

FR. WOLDSTEDT.

(Vorgetr. in der Societ. d. 26 März 1849.)

1.

Nach der Vollendung der Breitengradmessung in den Ostsec-Provinzen Russlands wurde im Jahre 1830 für die Fortsetzung derselben gegen Norden auf 10 Jahre eine jährliche Summe von 10000 Rubel Bank-Assignationen aus dem Russischen Reichsschatze bevilligt, und die Direction dieser Arbeit S:r Excellenz dem Herrn Wirklichen Staatsrathe von Struve, der die erstere ausgeführt hatte, anvertraut. Die geodätischen Operationen in Finnland wurden bis 1835 inclusive von Officieren des Kaiserlichen Generalstabes und zwar hauptsächlich von den Herren Oberg und Melan, von welchen jener damals Capitain, dieser Stabscapitain war, bewerkstelligt. Nachdem ich im letzt genann-

ten Jahre als Gehülfe mit diesen Arbeiten vertraut worden war, wurde die Fortsetzung derselben von Struve mir aufgetragen, wobei ich mich der thätigen Beihülfe der Herren Feldmesser II. und J. Hällström und im Jahre 1842 des Herrn J. Kehl, damals Studenten der Helsingforser Universität, zu erfreuen hatte. Im October 1835 ward die Messung der Winkel der Dreiecke von Süden bis zum Punkte Lehtowaara in der Nähe der Stadt Kajana vollendet, nur die Verbindung des Dreieckspunkts Tuskamit Mäkipäällys auf der Insel Hochland fehlte noch. Die grossen Schwierigkeiten, welche sich den geodätischen Operationen von Kajana his Torneå entgegenstellten, und welche, theils durch weitläuftige Durchhaue der zwischen den angenommenen Dreieckspunkten gelegenen Wälder, theils durch Errichtung hoher Signale, (welche dem Instrumente einem um einige Toisen über dem Erdboden erhöhten Standort gaben), beseitigt werden mussten, machten es unmöglich die Winkelmessungen vor 1844 zu beendigen. Mittlerweile wurde im Jahre 1843 eine Basis im Dorfe Rattula - Kirchspiel Elimä - vom Adjunkten der Pulkowaer Sternwarte Herrn Doctor Sabler und mir gemessen, und 1845 massen wir eine zweite Basis in der Nähe von Die beiden Grundlinien wurden durch Hülfsdrei-Lleaborg. eckspunkte mit den Hauptdreiecken verbunden, und der ganze geodätische Theil der Finnländischen Gradmessung 1845 beendigt, ausser einer noch dazu geherigen Bestimmung der Hohe des Dreieckspunktes Lowisa über dem Finnischen Meerbusen, — welche vom Herrn Candidaten Eklöf, damals Gehülfen der Helsingforser Sternwarte, im Sommer 1846 ausgeführt wurde.

2.

Laut der vom Director der Operationen in Finnland gegebenen Vorschrift sollten ausser Horizontal-Winkelmessungen an jedem Dreieckspunkte noch die Zenithdistanzen der damit verbundenen Punkte beobachtet werden, um die Höhen der zu messenden Grundlinien, für welche die Oerter erst später bestimmt vurden, ermitteln, und die gemessenen Grundlinien auf die Oberfläche des Meeres reduciren zu konnen. Für diesen Zweck ist keine grosse Genauigkeit der Höhenbestimmungen nöthig, und deswegen wurden auch bei der Finnländischen Gradmessung in der Regel die Zenithdistanzen nur dann beobachtet, wenn der Zustand der Lust für Horizontalwinkelmessungen zu ungünstig war. Es war auch den Beobachtern vorgeschrieben worden, die Zemithdistanzen nicht weit von der Mittagszeit zu messen, damit sie nicht mit den in den Morgen- und Abendstunden gewöhnlichen unregelmässigen Refractionen behaftet werden möchten; da aber eben am Abend und zuweilen am Morgen die günstigste Luft; für geodätische Winkelmessung eintritt, musste man die Zenithdistanzen bei ungünstigeren Umständen beobachten. Ausserdem wurden sie auf dieselbe Weise wie bei

der Gradmessung in den Ostseeprovinzen gemessen, und also bei jeder Einstellung des Gegenstandes nur 2 Nonien abgelesen. — Ungeachtet dieser ungünstigen Umstände zeigen die an einem Punkte gleichzeitig in beiden Lagen des Kreises gemessenen Zenithdistanzen von anderen damit verbundenen Punkten eine so schöne Uebereinstimmung des Orts des Zeniths am Instrumente, dass man daraus auf eine grosse Genauigkeit derselben schliessen muss. Aus den Abweichungen der verschiedenen Bestimmungen des Zenithpunktes vom jedesmaligen Mittel hat Herr Wirkl. Staatsrath von Struve den wahrscheinlichen Fehler einer einmal in beiden Lagen gemessenen Zenithdistanz berechnet und mir privatim mitgetheilt; ich will aber ihn hier nicht angeben, weil ich vermuthe, dass Herr v. Struve selbst künftig darüber etwas veröffentlichen wird. Hier genüge es zu bemerken, dass die Genauigkeit der Beobachtungen dem Berechner die Pflicht auferlegt, eine besondere Aufmerksamkeit der Ermittelung der Gesetze der irdischen Strahlenbrechung zu widmen.

3.

Aus einer Gradmessung erhält man nicht nur einen Beitrag zur Bestimmung der Dimensionen des Erdkörpers sondern auch sehr leicht die geographischen Breiten und die auf den Anlangspunkt bezogenen Längen der Dreieckspunkte. Wenn an jedem Punkte zugleich die Zenithdistanzen beobachtet worden sind, kann man auch die Höhen über der Meeresfläche berechnen. — So-

bald auch der Astronomische Theil der Finnländischen Gradmessung vollendet sein wird, so dass der Bericht über die ganze Operation nebst ihren Resultaten in einem Zusammenhange veröffentlicht werden kann, wird es leicht sein aus den angegebenen Coordinaten der Dreieckspunkte, (da' auch die Länge des Anfangspunkts Mäkipäällys durch die Länge von Dorpat bekannt ist), die geographischen Längen und Breiten derselben zu berechnen. Ungleich mühsamer ist die Bestimmung der Höhen über der Meeresfläche. Da es für den eigentlichen Zweck dieser Gradmessung nur nöthig war die Höhen der nicht weit von der Küste entfernten Grundlinien zu kennen, und der grösste Theil der in Finnland gemessenen Zenithdistanzen nur ein topographisches Interesse haben konnte, entstand bei mir der Wunsch das reiche Material der Gradmessung zur Bestimmung der Höhen der Dreieckspunkte über der Meeresfläche benutzen, und dadurch zur Kenntniss der Topographie meines Vaterlandes beitragen zu können. In dieser Absicht ersuchte ich Herrn v. Struve mir die Tagebücher der Finnländischen Gradmessung zur Benutzung zu geben, und derselbe hatte die Güte nicht nur meinem Wunsche zu willfahren, sondern auch mir zu erlauben, meine Rechnungsresultate, wo ich es wollte, zu publiciren. Indem ich nun also dieselben der Societät der Wissenschaften übergebe, erlaube ich mir zugleich das ganze Rechnungs-Material so vollständig wie möglich mitzutheilen, um andern Rechnern Gelegenheit zu geben die Rechnung moglicherweise nach anderen Prinreport dus houtilless. - Meine Red is its granter son auf die von Bessel) gegebenen Formeln, welche ich nur in so fern verändert habe, dass ich die Besselsche durch gegenseitige Zenithdistanzen zu bestimmende Constante $k = \alpha + b \beta$ gesetz habe, vo b den Abstand der Beobachtungszeit vom wahren Mittage dividirt mit dem halben Tagbogen der Sonne bezeichnet. Die von Struve bei seiner Gradinessung in den Ostsee-provinzen und von Bäyer in seinem Nivellement zwischen Swinemunde und Berlin gemachten Erfahrungen, dass die Strahlenbrechung um so grösser wird, je weiter die Zeit der Beobachtung vom wahren Mittage entfernt ist, veranlassten mich, statt einer, zwei Constanten der Refraction aus den gegenseitigen Zeuithdistanzen zu suchen. Bäyer setzt die Refractionsconstante geradezu der Grösse b proportional. Durch diese Annahme aber wird die mittigliche Refraction Null, was aller Erfahrung widerspricht. Struve will diese Constante auch von der Jahreszeit abhängig gefunden haben, und behauptet, dass sie im Allgemeinen eine Function der Höhe der Sonne über dem Horizonte im Augenblicke der Beobachtung ist; da aber eine solche Annalune die Rechnung bedeutend vermehrt hitte, und die diesem Auffatze angehingte Tafel II zeigt, dass die Strahlenbrechung keinen durch jetzige Beobichtungsmethoden bestimmbaren Gesetzen streng folgt, so habe

^{*)} Gradmessung in Ostpreussen, ausgeführt von Bessel und Büyer. Berlin 1838. Seite 193-195.

ich es vorgezogen die Bäyersche Annahme in so fern nur zu verändern, dass ich auch eine mittägliche Constante α gesucht habe.

4.

Da die Zenithdistanzen nicht am Dreieckspunkte selbst gemessen wurden, und der Visirpunkt selten der Dreieckspunkt selbst war, so habe ich, um die späteren Rechnungen bequemer zu machen, alle beobachtete Zenithdistanzen auf die gehörigen Dreieckspunkte reducirt. Aus den Tagebüchern der Gradmessung habe ich den Höhenunterschied des Dreieckspunkts und des Oculars des in der Nähe desselben aufgestellten Instruments und den Höhenunterschied des jedesmaligen Visirpunkts und des dazu gehörigen Dreieckspunkts entlehnt, und in Tafel I, mit i und v bezeichnet und in Englischen Zollen *) ausgedrückt, angegeben. Jede der Grössen i und v ist positiv angenommen worden, wenn sie die reducirte Zenithdistanz grösser macht. Als Dreieckspunkt oder Normalpunkt ist meistens das oberste Ende des vertikalen Balkens des Signals angenommen worden, ausser af Mäkipäällys, Swartwira und Ristisaari, wo es bequemer war alle Beobachtungen auf die unter den Signalen im Felsen markirten Dreieckspunkte zu reduciren. Wo Kirchthürme beobachtet worden sind, habe ich die Visirpunkte in Tafel I besonders angegeben. In

^{*)} Während einiger Jahre ist ein fehlerhafter Maassstab angewandt worden; die in Tafel I aber angegebenen Grössen i und v sind in richtigen Englischen Zollen ausgedrückt.

der dritten Columne dieser Tafel kommt nach je-dem beobachteten Punkte eins von den Zeichen I, II, III, IV, V, M, II vor, welche den Visirpunkt angeben. Die Mitte des runden Visirbalkens des Signals wird mit I bezeichnet, das obere Ende der Streben mit II, der untere Rand der Signalpyramide (an hohen Signalen) mit III, das obere Ende der Signalpyramide (an hohen Signalen) mit IV, das obere Ende des runden Visirbalkens mit V, eine am Signale befestigte Visirmarke mit M und ein Heliotrop mit II. Das Zeichen* in derselben Columne zeigt an, dass die Zenithdistanz nur in einer Lage des Kreises beobachtet worden ist. - Die sechste Columne der Tafel I enthält die Logarithmen der in Toisen ausgedrückten Dreiecksseiten. Da das Instrument gewöhnlich nicht in der Lothlinie des Dreieckspunktes sondern in einer kleinen Entfernung, von derselben aufgestellt war, sollten eigentlich sowohl für die Reductionen der beobachteten Zenithdistanzen als für die Berechnung der Höhenunterschiede der Dreieckspunkte die Distanzen vom Instrumente zu den beobachteten Punkten zu Grunde gelegt werden; weil aber dieser Unterschied in den gewöhnlichen Dreiecken auf die Rechnungsresultate keinen Einfluss hatte, wurde meistens die Dreiecksseite selbst benutzt, so wie sie mit Berücksichtigung des Legendreschen Satzes berechnet worden war. Doch wurde bei den kleineren Dreiecksseiten wie I Porlom — II Porlom und allen von Intionkangas ausgehenden Dreiecksseiten auf diesen Umstand

Rücksicht genommen. Noch ist zu bemerken, dass die angegebenen Dreiecksseiten aus den auf die Meeressläche reducirten beiden Grundlinien berechnet worden, und dass sie also für meinen Zweck in Verhältniss ihrer mittleren Höhe über der Meeresfläche zum Krümmungshalbmesser der Erd-Oberfläche hätten vergrössert werden sollen; bei den geringen Höhen in Finnland aber wird die Vernachlässigung dieser Correction der Distanzen keinen Einfluss haben. Dieser Fehler wird übrigens zum Theil dadurch compensirt, dass die von mir gebrauchten Distanzen eigentlich geodätische Linien sind. — Die beobachteten Zenithdistanzen hatte Herr v. Struve die Güte aus den Original-Tagbüchern der Gradmessung zu berechnen und mir zuzusenden. Ich habe sie noch mit den abgeschriebenen Tagbüchern, die schon früher zu meiner Benutzung gegeben worden waren, controllirt, und nach der Berichtigung der gefundenen sehr unbedeutenden Irrthümer, in der siebenten Columne der Tafel I zusammengestellt. Die achte Columne derselben Tafel enthält die aus i und v berechneten Reductionen der beobachteten Zenithdistanzen auf die Dreieckspunkte. Weil die Distanzen s in Toisen ausgedrückt sind, ist der Logarithmus dieser Reduction = $\log (i + v) - \log s$ + 3.42943. Die neunte Columne derselben Tafel enthält log b, welcher aus der in der zweiten Columne angegebenen wahren Zeit der Beobachtung mit dem für den in der ersten Columne angeführten Tag geltenden halben Tagebogen der Sonne für den

D. hungs it bereikent worden ist. Die zehne Calamine enthalt im Legarithmus der für die Bereikenung der Hohmanterschiede nöthigen Quantität $\frac{d}{2\pi \sin 4\pi}$, oder nach Bessels Bezeichmung $\frac{d}{d\tau}$, wur den mit den neuesten von Bessel in Nio 438 der Astronomischen Nachrichten gegebenen Erd-Dimensionen berechnet worden ist. Die eilfte Columne endlich enthält die auf die Dreieckspunkte reducirten Zemithdistanzen.

5.

 zugehörigen Quantitäten b, und ebenso das Mittel aller in B beobachteten Zenithdistanzen des Punktes A und das Mittel der ihnen zugehörigen Quantitäten b; nenne ich diese 4 Mittel respective z, b, z', b', so bekomme ich zur Bestimmung der beiden Constanten die Gleichung

$$\frac{0.01s}{2r\sin 1^n} \left\{ a' + \frac{b+b'}{2} \beta \right\} = 90^{\circ} + \frac{0.86s}{2r\sin 1^n} - \frac{z+z'}{2}$$

Diese Gleichung folgt aus der Besselschen

$$1 - k = \frac{r}{s \omega} (z + z' - 180^\circ)$$

Gradmessung in Ostpreussen. S. 195.

Die Tafel II enthält Gleichungen dieser Art mit nehenbei angegebenen Gewichten, welche nach der Formel the berechnet worden sind, wo m, n die Zahl der Beobachtungen auf den beiden Punkten bezeichnen. Ist der wahrscheinliche Fehler einer Zenithdistanz ε , so ist der wahrscheinliche Fehler der obigen Gleichung, wenn sowohl z als z sich nur anf einer Beobachtung gründet, auch ε ; in diesem Falle ist aber das Gewicht $\frac{1}{2}$. Man muss also den durch die Gleichungen der Tafel II gefundenen wahrscheinlichen Fehler für das Gewicht 1 mit \mathcal{L} multiplieiren, um den aus denselben Gleichungen folgenden wahrscheinlichen Fehler einer beobachteten Zenithdistanz zu ermitteln. — Die Behandlung der 119 in Tafel II angeführten Gleichungen nach der Methole der kleinsten Quadrate giebt folgende Werthe und wahrscheinliche Fehler:

 $\alpha = +0.257 \pm 0.241, \beta = +1.433 \pm 0.619$

Wahrscheinlicher Fehler einer Gleichung mit dem Gewichte 1=3 452 Daraus folgender w. F. einer beobachteten Zenithdistanz = 4.88

Da die Gleichungen der Tafel II die oben angegebene Form haben, ist es klar, das ich nur $\frac{z+z}{2}$ als mit zutalligen Fehlern behaftet angesehen habe, während doch die Werthe der Unbekannten selbst zufälligen Schwankungen unterworfen sind. Ob ich gleich nach Bessels Beispiel hierauf hätte Rücksicht nehmen können, habe ich es doch nicht gethan, weil ich gerade untersuchen wollte, wie gross der wahrscheinliche Fehler einer gemessenen Zenithdistanz ist, den die vereinigte Wirkung des Fehlers der Beobachtung und der Veränderlichkeit der Refractions-Constante hervorbringt. Lebrigens hat eine kleine Veranderung der Werthe der Constanten sehr unbedeutenden Einfluss auf die Hohenbestimmungen, weil die meisten Hohenunterschiede sich auf gleich viele auf beiden Seiten beobachtete Zenithdistanzen gründen. Hierauf muss ich um so viel mehr mich berufen. da die in Tafel III zusammengestellten Hohenunterschiede nicht mit den obigen — sondern mit den — Werthen $\alpha = 0.283$, $\beta = 1.397$ berechnet worden sind. Diese Werthe hatte ich früher gefunden, ehe ich einen Fehler der Reduction der auf Rontti beobachteten Zenithdistanzen entdeckte. Es war leicht diesen Fehler in allen übrigen schon vollendeten Rechnungen zu berichtigen, eine Wiederholung aber der Berechnung der letzten Columne von Tafel III schien mir eine unnütze Zeitverschwendung.

Wenn die von mir angewandten Constanten & und ß einer mittleren Strahlenbrechung zugehören, muss man voraussetzen, dass, je öfter man die Zenithdistanz eines Punktes misst, desto genauer die im Mittel gefundene Zenithdistanz mit einer auf diesen Constanten begründeten Refraction behaftet sein wird, und dass das Gewicht eines Höhenunterschiedes der Zahl der Beobachtungen proportional sein muss ohne Rücksicht darauf, auf welchem der beiden Punkte sie gemacht worden sind. Nach diesen Grundsätzen ist die Tafel III entworfen. Der Ausdruck des Höhenunterschiedes ist nach der Formel

h' — h = s cotgt.
$$\left\{ \frac{z+z_1 + \dots + 90^\circ - z' + 90^\circ - z'_1 \dots - \frac{0.86 \text{ s}}{2 r \sin 1}}{m+n} \right\}$$

$$= \frac{0.01 \text{ s}^2}{2 r} \left\{ \frac{(m-n) \alpha' + (b+b_1 + \dots - b' - b'_1 - \dots) \beta'}{m+n} \right\}$$

berechnet worden, wo h die Höhe des in der ersten Columne erstgenannten Punktes ist, h' die Höhe des zweiten, m die Zahl der am zweiten Punkte gemachten Beobachtungen. Die Grössen z, z, ... b, b, ... beziehen sich auf den ersten, z', z', ... b', b', ... auf den zweiten Punkt. Die Gesammtzahl der Beobachtungen m + n ist in der zweiten Columne angegeben, und die letzte enthält die mit den Constanten $\alpha' = 0.283$, $\beta' = 1.397$ berechneten Höhen des zweiten in der ersten Columne angeführten Punktes über dem ersten.

Die Höhen der folgenden Punkte über der Meeresfläche sind unmittelbar bestimmt worden.

1:0 Die Höhe der Kreutzschwelle des Signals bei Lowisa über dem Finnischen Meerbusen wurde durch ein zweimaliges Nivellement von Eklöf im Sommer 1846 bestimmt. Er fand diese Höhe das erste Mal = 141.350 und das zweite Mal = 141.072, also im Mittel = 141.211 Schwedische Fuss, von welcher Zahl er die geschieze Dieferenz des dam ligen Wasserstandes vom mittleren. 1.4 Fuss. I zug. so dass die definitive Höhe = 139.811 Schwed. Fuss. = 21.297 Toisen ist. Setzt man die Höhe des oberen Endes des verticalen Balkens über der Kreutzschwelle hinzu, so findet man die Höhe des Dreie Ispandaes Lowisa über dem Finnischen Meerbusen = 22.861 Toisen.

2:0 Die Höhe über dem Bottnischen Meerbusen des Dreieckspunktes Klemola, welcher ein Endpunkt der in der Nähe von Uleäborg gemessenen Basis war, wurde im Herbste 1845 vom Herrn Geometer Barck durch ein Nivellement bestimmt und = 2.422 Toisen gefunden.

3:0 Die Höhe des Dreieckspunktes Ulkogrunni über dem Bottnischen Meerbusen wurde durch eine kleine Triangulirung, deren Details hier anzuführen ich für überflüssig halte, von mir bestimmt und = 9.292 Toisen gefunden.

4:0 Die Höhe des Oculars des auf der Insel Rontti im Jahre 1842 aufgestellten Universal-instruments über dem Bottnischen Meerbusen bestimmte ich durch eine am Strande vertical aufgerichtete Stange, auf welche ich mit dem horizontal gestellten

Fermohre visirte. So fand ich nach gehörigen Reductionen die Höhe des Dreieckspunktes Rontti über dem Bottnischen Meerbusen = 6.911 Toisen.

6.

Auf die eben angeführten unmittelbaren Höhenbestimmungen und die in der Tafel III enthaltenen Höhenunterschiede soll nun die Berechnung der Höhe eines jeden der in den Tafeln angeführten Punkte gegründet werden. Bei dieser Arbeit bin ich auch Bessels Beispiele gefolgt, indem ich jedem der in Tafel III angegebenen Höhenunterschiede ein der Anzahl der Beobachtungen direct — und der Entfernung umgekehrt — proportionales Gewicht beigelegt habe. Ich habe nämlich den Logarithmus des Gewichts = log (m + n) — log s + 3.9000 gesetzt.

Zuerst habe ich die Höhenunterschiede zwischen Lowisa und den von da aus beobachteten Punkten Tuskas, Strömfors und Korsmalm aus den Angaben der Tafel III nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Rücksicht auf die auf eben angeführte Weise bestimmten Gewichte berechnet. Die Höhenunterschiede, Ausgleichungscorrectionen und Gewichte lasse ich hier folgen, indem ich dem Namen eines Dreieckspunkts die Bedeutung der Höhe desselben über dem Finnischen Meerbusen beilege. Tuskas — Lowisa = — 2.910—0.016 = — 2.926Gewicht 2.430 Strömfors — Lowisa = + 15.702 + 0.024 = + 15.726 — 4.472 Korsmalm — Lowisa = + 14.571—0.024 = + 14.547 — 2.930

Strömfors - Tuskas = +18.666 - 0.914 = +18.052Gewicht 2.745 Korsmalm—Strömfors = -1.202 + 0.023 = -1.179 - 3.075

Der durch die Ausgleichungsrechnung gefundene wahrscheinliche Fehler einer Bestimmung, die das Gewicht 1 hat, = 0.040.

Aus der oben angegebenen Höhe von Lowisa finde ich also folgende wahrscheinlichste Höhen:

Lowisa 22.861

Tuskas 19.935

Strömfors 38.587

Korsmalm 37.408

Die Höhen der übrigen Punkte, von Mäkipäällys bis Sarwikangas, über dem Finnischen Meerbusen habe ich auf folgende Art bestimmt. Wie man bei der Coordinatenrechnung die Coordinaten eines neuen Dreieckspunktes durch die schon bekannten Coordinaten von wenigstens zwei Punkten bestimmen kann, so kann man auch, da die Höhenunterschiede aller mit einander verbundenen Punkte durch Zenithdistanzen bestimmt worden sind, die Höhe eines jeden Punktes auf die bekannten Höhen von wenigstens zwei Punkten gründen. Diese schon bekannten Höhen habe ich für absolut richtig angenommen, und jede derselben im Verhältniss des Gewichts des Hohenunterschie les zur Ermittelung der Hohe des neuen Punktes stimmen lassen. Dieses Gewicht ist wie oben bestimmt wortens stimmen lassen. Dieses Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die des Gewicht wortens stimmen lassen. Dieses Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht ist wie oben bestimmt wortens die der Bohenunterschie des Gewicht wortens der Bohenunterschie des Gewicht wortens der Bohenunterschie des Gewichts des Bohenunterschie des Gewichts des Bohenunterschie des Gewicht wortens der Bohenunterschie des Gewicht des Gewicht wortens der Bohenunterschie des Gewicht des Gewicht des Gewicht des Gewicht des

den, und hängt also von der Zahl der Beobachtungen und von der Entfernung der beiden Punkte ab. Die folgende Zusammenstellung der Höhenbestimmungen wird nun leicht verstanden werden.

Kokkowwori.

Tuskas 24.254 Gewicht 3.877

Strömfors 24.226 — 1.464 Mittel = 24.246

Ristisaari. (1843 markirter Punkt).

Tuskas 5.189 Gewicht 5.707

Kokkowuori 5.180 — 3.767 Mittel = 5.185

Swartwira. (Markirter Punkt)

Tuskas 7.358 Gewicht 3.832

Ristisaari 7.590 - 3.752 Mittel = 7.473

Mākipāāllys. (Bolzen).

Ristisaari 65.229 Gewicht 1.653

Swartwira 64.069 — 1.530 Mittel = 64.671

Mustila.

Strömfors 50.265 Gewicht 2.021

Korsmalm 50.268 :— 5.976 Mittel = 50.267

Lähdetkallio. (Hülfspunkt).

Korsmalm 34.032 Gewicht 4.678

Mustila 34.182 - 10.08 Mittel = 34.134

Briefberg. (Hülfspunkt).

Korsmalm 36.515 Gewicht 4.627

Mustila 36.630 — 5.150

Lähdetkallio 36.692 — 9.690 Mittel = 36.634

Linnankallio. (Hülfspunkt).

Korsmalm 37.205 Gewicht 3.681

Mustila 37.454 — 7.463

Lähdetkallio 37.397 — 12.402

Briefberg 37.318 — 12.148 Mittel = 37.362

Nord-Ende der Basis.

Briefberg 13.248 Gewicht 10.57

Linnankallio 13.260 — 35.88 Mittel = 13.257

Süd-Ende der Basis.

Briefberg 11.828 Gewicht 17.16

Linnankallio 11.843 — 26.93

Nord-Ende d. B. 11.884 — 29.45 Mittel = 11.856

II Porlom.

Korsmalm 48.141 Gewicht 3.814

Mustila 48.310 — 3.131 Mittel = 48.217

I Porlom.

Mustila 52.172 Gewicht 2.35

II Porlom 52.401 — 129.5 Mittel = 52.397

Perheniemi.

Mustila 60.195 Gewicht 3.685

60.330 — 2.426 Mittel = 60.249I Porlom

Willikkala.

61.088 Gewicht 3.857 I Porlom

61.195 — 4.383 Mittel = 61.145 Perheniemi

Huhtmar.

78.118 Gewicht 4.560 Perheniemi

78.117 - 5.041 Mittel = 78.117Willikkala

Emmeneures.

58.976 Gewicht 5.732 Willikkala

58.928 — 3.228 Mittel = 58.959Huhtmar

Messilä.

116.240 Gewicht 1.160 Huhtmar

Emmeneures 116.647 — 1.699 Mittel = 116.482

Wahteristo.

92.868 Gewicht 3.212 Huhtmar

93.414 — 3.139 Mittel = 93.138 Messilä

Hesivehmais.

Messilä 88.560 Gewicht 4.106

88.202 — 5.005 Mittel = 88.363 Wahteristo

Kurhila.

Messilä 90.865 Gewicht 2.686

Wesiwehmais 90.731 — 3.765 Mittel = 90.787

Soitinkallio.

Wesiwehmais 98.468 Gewicht 2.724

Kurhila 98.551 — 2.605 Mittel = 98.509

Wirmala.

Kurhila 97.608 Gewicht 2.242

Soitinkallio 97.391 — 2.705 Mittel = 97.489

H'iljaminicuori.

Soitinkallio 101.075 Gewicht 1.765

Wirmala 101.462 - 1.502 Mittel = 101.253

Kylmākangas.

Wirmala 105.016 Gewicht 3.077

Wiljaminwuori 104.879 — 4.158 Mittel = 104.937

Kammio.

Wiljaminwuori 115.524 Gewicht 4.520

Kylmäkangas 115.655 — 3.549 Mittel = 115.582

Rappurcuori.

Kylmäkangas 109.058 Gewicht 3.004

Kammio 109.072 - 3.224 Mittel = 109.065

Tammimäki.

Wiljaminwuori 126.228 Gewicht 2.146

Kammio 126.062 — 2.846

Rappuwuori 126.087 — . 2.060 Mittel = 126.120

Puolakka.

Rappuwuori 100.495 Gewicht 4.385

Tammimäki 100.560 – 4.695 Mittel = 100.529

Waterwuori.

Tammimäki 118,401 Gewicht 1.734

Puolakka 118.475 — 1.669 Mittel = 118.437

Jywäskylä.

Puolakka 118.345 Gewicht 2.804

Waterwuori 118.500 — 2.258 Mittel = 118.414

Ruuhimäki.

Waterwuori 108.442 Gewicht 2.399

Jywäskylä 108.420 — 2.460 Mittel = 108.431

Laajawuori.

Waterwuori 118.693 Gewicht 1.858

Jywäskylä 118.809 – 12.28

Ruuhimäki 118.902 — 2.338 Mittel = 118.809

Multamäki.

Ruuhimäki 110.349 Gewicht 1.912

Laajawuori 110.735 — 1.259 Mittel = 110.502

Ohimāki.

Ruuhimäki 111.900 Gewicht 1.970

Multamāki 111.502 — 2.880 Mittel = 111.667

Silmutmāki.

Multamäki 99.271 Gewicht 1.971

Ohimāki 98.837 — 3.484 Mittel = 98.994

Ilamāki.

Multamäki 111.369 Gewicht 2.226

Silmutmāki 111.509 — 2.262 Mittel = 111.440

Listonmāki.

Silmutmäki 111.138 Gewicht 2.408.

Ilamiki 111.496 — 2.757 Mittel = 111.329

Wesamāki.

Silmutmäki 113.134 Gewicht 0.963

Listonmäki 113.074 — 2.209 Mittel = 113.092

Kilpimāki.

Silmutmiki 104.882 Gewicht 2.671

Wesamiki 105.256 — 1.289 Mittel = 105.004

Honkamäki,

Wesamäki 124.149 Gewicht 1.454

Kilpimäki 124.284 — 1.549 Mittel = 124.219

Lehtomäki.

Wesamäki 94.528 Gewicht 1.380

Honkamäki 94.668 — 1.377 Mittel = 94.598

Pörsänmäki.

Honkamäki 130.639 Gewicht 1.316

Lehtomäki 130.351 — 2.044 Mittel = 130.464

· Pihlajanmäki.

Lehtomäki 107.303 Gewicht 2.028

Pörsänmäki 107.559 — 1.594 Mittel = 107.416

Iimäki.

Pörsänmäki 106.844 Gewicht 2.214

Pihlajanmäki 106.986 — 0.853 Mittel = 106.884

Kiwimäki.

Pörsänmäki 116.250 Gewicht 1.379

Iimäki 116.447 :- 4.359 Mittel = 116.400

Sallisenmäki.

Iimäki 116.837 Gewicht 1.952

Kiwimäki 116.963 — 1.738 Mittel = 116.896

Kulwenmäki.

Kiwimiki 119.223 Gewicht 3.368

Sallisenmiski 119.183 — 2.484 Mittel = 119.206

Naarasmāki.

Sallisenmäki 126.329 Gewicht 1.057

Kulwenmiki 126.260 — 3.063 Mittel = 126.278

Murtomāki.

Sallisenmiki 116.985 Gewicht 2.271

Naarasmiki 117.135 — 2.077 Mittel = 117.057

Lehtowaara.

Naarasmäki 143.001 Gewicht 3.391

Murtomáki 142.887 – 3.434 Mittel = 142.944

Otanmāki.

Murtomäki 100.724 Gewicht 3.158

Lehtowaara 101.389 - 2.079 Mittel = 100.988

Kiweswaara.

Lehtowaara 153.732 Gewicht 1.455

Otanimiki 153.332 — 0.709 Mittel = 153.601

Rupukkawaara.

Lehtowaara 144.636 Gewicht 2.898

Kiweswaara 144.909 - 1.959 Mittel = 144.746

Saukkowaara.

Kiweswaara 169.479 Gewicht 1.929

Rupukkawaara 169.383 — 2.396 Mittel = 169.426

Teiriharju.

Kiweswaara 173.487 Gewicht 1.955

Saukkowaara 173.446 — 2.203 Mittel = 173.465

Puokiowaara.

Kiweswaara 114.058 Gewicht 1.852

Teiriharju 113.875 — 2.016 Mittel = 113.963

Rohuawaara.

Kiweswaara 103,895 Gewicht 0.900

Puokiowaara 103.066 - 1.366 Mittel = 103.395

Palowaara.

Puokiowaara 78.696 Gewicht 2.803

Rokuawaara 79.635 — 1.307 Mittel = 78.995

Rewonpesāmaa.

Rokuawaara 63.535 Gewicht 2.565

Polowaara 64.211 '- 5.290 Mittel = 63.990

Repokangas.

Rokuawaara 50.945 Gewicht 1.470

Rewonpesamaa 51.838 - 2.550 Mittel = 51.511

Halosenwaara.

Rokuawaara 38.703 Gewicht 1.370 Repokangas 39.825 — 3.932 Mittel = 39.535

Pithäselhä.

Repokangas 51.552 Gewicht 3.629Halosenwaara 51.494 — 2.749 Mittel = 51.527

Linnunsilmā.

Halosenwaara 28.543 Gewicht 3.623

Pitkäselkä 28.808 — 5.582 Mittel = 28.704

Sarwikangas.

Pitkäselkä 27.110 Gewicht 3.607

Linnunsilmä 27.149 — 5.303 Mittel = 27.133

7

Aus der oben angeführten unmittelbaren Höhenbestimmung des Punktes Klemola war es mit Benutzung der Angaben der Tafel III möglich die Höhe des Dreieckspunktes Sarwikangas auch über dem Bottnischen Meerbusen zu bestimmen. Weil aber hier für die Ermittelung der Höhen von fünf Punkten neun Bestimmungen vorhanden waren, aus welchen also vier strenge zu erfüllende Bedingungsgleichungen entstanden, wandte ich hier wieder wie oben die Methode der kleinsten Quadrate an. Die aus der Tafel III entlehnten Höhenunterschiede mit den gefun-

denen Ausgleichungscorrectionen und den wie oben bestimmten Gewichten lasse ich hier folgen.

	т т т	Gewicht
Oritkari — Klemola*) =+	1.125 + 0.007 = + 1.13	2 21.11
Länkisenkangas — Klemola = +	9.490 - 0.002 = + 9.48	88 79.80
Länkisenkangas — Oritkari = +	8.357 - 0.001 = + 8.35	6 20.88
Intionkangas — Oritkari =+	9.128 + 0.009 = + 9.13	7 18.79
Intionkangas — Länkisenk. =+	0.769 + 0.011 = + 0.78	0 15.88
Sarwikangas — Länkisenk. = +	12.597 - 0.036 = +12.56	1 9.50
Sarwikangas — Intionkang. = +	11.700 + 0.081 = + 11.78	1 10.55
Glockenthurm—Intionkang. = +	21.235 - 0.018 = +21.213	7 28.62
Glockenthurm—Sarwikang.=+	9.321 + 0.115 = + 9.43	6 4.47

Die Ausgleichungsrechnung giebt den wahrscheinlichen Fehler einer Höhenbestimmung mit dem Gewichte 1 = 0.133. — Die wahrscheinlichsten Höhen uber dem Bottnischen Meerbusen sind also

Klemola	2.422
Oritkari	3.554
Länkisenkangas	11.910
Intionkangas	12.691
Uleåborgs Glockenthurm	33.908
Sarwikangas	24.472

^{*)} Hier bezeichnet wieder der Name eines Punktes die Höhe desselben über der Meerestläche.

Da nun die Höhe des Dreieckspunktes Sarwikangas über dem Bottnischen Meerbusen gegeben ist, und die Höhen von Utkogrunni und Rontti unmittelbar bestimmt worden sind, so waren für die Ermittelung der Höhen aller von Sarwikangas aus beobachteten Punkte mehr Bestimmungen als unumgänglich nöthig vorhanden, so dass 7 strenge zu erfüllende Bedingungsgleichungen entstanden. Ich werde hier die verschiedenen Bestimmungen der Höhenunterschiede mit den Ausgleichungscorrectionen und Gewichten wie oben folgen lassen.

Gewicht Sarwikangas — Pitkäselkä =— 25.417 + 0.024 =— 24.393 - 3.607 Sarwikangas—Linnunsilmä=— 1.555—0.103 =— 1.658 - 5.303 Sarwikangas — Latonmäki = + 9.533—0.228 = + 9.305 - 2.086 Sarwikangas — Hypenmäki = + 2.470 + 0.010 = + 2.480 - 1.581 Sarwikangas — Isoniemi = + 5.233—0.316 = + 4.917 - 1.857 Pitkäselkä — Linnunsilmä = + 22.719 + 0.016 = + 22.735 - 5.582 Linnunsilmä — Latonmäki = + 11.151 - 0.188 = + 10.963 - 2.420 Latonmäki — Hypenmäki =— -5.882—-0.943 =— -6.825 - 0.987 Hypenmäki — Isoniemi = + 3.585—-1.148 = + 2.437 - 1.331 Hypenmäki — Isoniemi = + 3.585—-1.148 = + 2.437 - 1.331 Hypenmäki — Ulkogrunni = + 12.341 + 0.359 = + 12.700 - 1.706 Isoniemi — Ulkogrunni = + 9.012 + 1.251 = + 10.263 - 0.987 Isoniemi — Ronti = + 14.113—-1.469 = + 12.644 - 2.279

Der wahrscheinliche Fehler einer Bestimmung mit dem Gewichte 1 = 0.786. — Die wahrscheinlichsten Höhen über dem Bottnischen Meerbusen werden also

 Sarwikangas
 24.472

 Pitkäselkä
 48.865

 Linnunsilmä
 26.130

 Latonmäki
 15.167

 Hypenmäki
 21.992

 Isoniemi
 19.555

 Ulkoğrunni
 9.292

 Rontti
 6.911

Für die Ermittelung der Höhen der übrigen Punkte sollen nun die unmittelbar bestimmten Höhen von Ulkogrunni und Rontti zu Grunde gelegt werden. Da aber der in Tafel III gegebener Höhenunterschied von Ulkogrunni und Ajos sich nur auf einer Zenithdistanz gründet, welche auf Ajos bei ungewöhnlich grosser Strahlenbrechung gemessen worden ist,*) so wurde zuerst nur die Höhe von Kiwalo bestimmt, und die Höhen aller übrigen Punkte aus dieser hergeleitet. — Die Höhe von Kiwalo wurde, wie folgt, gefunden.

Kiwalo.

Ulkogrunni 83.233 Gewicht 1.264
Rontti 83.694 — 0.854 Mittel = 83.419

Aus dieser Höhe sollten mit Hülfe der Tafel III die Höhen aller übrigen Punkte über dem Bottnischen Meerbusen berechnet

^{*)} Siche die Bemerkung bei Ajos in Tafel I.

werden. Weil hier auch viel mehr Bestimmungen der Höhenunterschiede als unumgänglich nöthig vorhanden waren, wurde
die Methode der kleinsten Quadrate angewandt, um durch gehörige Ausgleichungen den gebildeten 6 Bedingungsgleichungen
strenge Genüge zu leisten. — In der folgenden Zusammenstellung der Höhenunterschiede und Ausgleichungscorrectionen bedeuten I Kemi Kirche und I Torneå Kirche die Höhen der von
Kiwalo und Ajos aus beobachteten — dagegen II Kemi Kirche
und II Torneå Kirche die Höhen der von Kallinkangas und Kokkomäki aus beobachteten — Visirpunkte der beiden Kirchen.

Gewicht =+69.049-0.187=+68.862Kiwalo - Ajos 2.859 Kiwalo — Kallinkangas = +52.820 + 0.043 = +52.8632.801 Kiwalo — I Kemi Kirche = +53.747 + 0.162 = +53.9091.467 Kiwalo — I Torneâ Kirche = +55.166 + 0.224 = +55.3900.797 Kallinkangas — Ajos = +16.224 - 0.225 = +15.9993.675 Kokkomáki — Ajos =+ 0.365 + 0.375 =+ 0.7402.530 I Kemi Kirche - Ajos = +14.829 + 0.124 = +14.9531.921 I Tornea Kirche — Ajos = +13.324 + 0.148 = +13.4721.208 Kallinkangas — Kokkomäki = +15.048 + 0.211 = +15.259Kallink. — II Kemi Kirche = + 1.453 - 0.021 = + 1.432 12.520 Kallink. — II Torneâ Kirche = + 1.844 + 0.430 = + 2.274 0.922 HKemiKirche - Kokkomäki = +13.973 - 0.146 = +13.827II Tornea Kirche — Kokkom. = +12.955 + 0.030 = +12.985

Der durch diese Ausgleichungsrechnung gefundene wahrscheinliche Fehler eines mit dem Gewichte 1 bestimmten Höhenunterschiedes beträgt 0.299. — Die wahrscheinlichsten Höhen über dem Bottnischen Meerbusen werden also

Ajos	14.557
Kallinkangas	30.556
I Kemi Kirche	29.510
I Torneå Kirche	28.029
Kokkomäki	15.297
II Kemi Kirche	29:124
II Torneå Kirche	28.282

Der Höhenunterschied der mit I und II bezeichneten Visirpunkte ist nicht gemessen worden, doch war an beiden Kirchen der Visirpunkt I höher. Oben haben wir aber I Torneå Kirche niedriger als II Torneå Kirche gefunden, — welches einen bei Beobachtungen so oft in Erfahrung gebrahten Satz bestätigt, dass die wahrscheinlichsten Werthe nicht immer die wahren sind.

8.

Wenn man die oben bei den Ausgleichungen gefundenen wahrscheinlichen Fehler und die verschiedene Genauigkeit der übrigen oben angeführten Höhenbestimmungen vergleicht, findet man im Allgemeinen eine grössere Genauigkeit bei den Höhenbestimmungen südlich von Kiweswaara als nördlich von diesem

Punkte, sowohl wenn die Gesichtslinie über's Land als wenn sie "über's Meer geht. Ich werde versuchen die Ursache hievon zu erklären. — Nördlich von Kiweswaara wurden Signale errichtet, die weit grösser waren als die südlich von demselben Punkte vorkommenden, und die Streben derselben machten einen kleineren Winkel mit dem Verticalen Balken. Offenbar musste diess, bei undurchsichtiger Luft und wenn die Entfernung gross war, die Sicherheit der Visirungen bedeutend beeinträchtigen. Ebenso war die genaue Visirung sehr schwierig auf die oberen Theile der im Bottnischen Meerbusen errichteten hohen Signale, welche aus Pyramiden von dünnen Balken ohne Verbindungsbretter bestanden. Die kurzen verticalen Balken, die über diesen Pyramiden hervorragten, waren auch sehr dünn. Der Umstand dass die verschiedenen in einer Beobachtungsreihe gefundenen Oerter des Zeniths am Instrumente doch unter sich gut stimmen widerlegt diesen Erkfärungsgrund nicht, wenn man annimmt, dass der Beobachter jedesmal das Fernrohr auf einen gewissen von der Deutlichkeit des Signals abhängigen Visirpunkt eingestellt hat. Dass ausser dieser Ursache noch eine grössere Unregelmässigket der Refraction, die durch die Nähe der Gesichtslinie zum Erdboden bewirkt worden ist, die Genauigket der Höhenbestimmungen beeinträchtigt hat, ersieht man aus den gegenseitigen Zenithdistanzen der Punkte Palowaara — Puokiowaara, Palowaara — Rokuawaara und Repokangas — Pitkäselkä. — Besonders unsicher sind die Höhenbestimmungen zwischen Sarwikangas und der Dreiecksseite

Ulkogrunni — Rontti. Ich habe untersucht, ob diese Unsicherheit aus Irrthümern in den Beobahtungen hervorgegangen wäre, aber mit Ausschluss der auf Latonmäki beobachteten fehlerhaften Zenithdistanzen des Dreieckspunktes Hypenmäki, (welche bei der Berechnung der Tafel III nicht berücksichtigt worden sind), habe ich keine andere Fehler entdecken können, als dass der Tag der Beobachtung auf Latonmäki unrichtig angegeben ist; er muss nämlich statt Juni 27 wahrscheinlich Juli 27 sein. Die Correction dieses Fehlers aber würde die Höhenunterschiede zwischen Latonmäki und den von da aus beobachteten Punkten sehr wenig verändern.

Oben habe ich die Höhe des Dreieckspunktes Sarwikangas über dem Finnischen Meerbusen = 27.133, über dem Bottnischen Meerbusen aber = 24.472 gefunden. Um annähernd beurtheilen zu können, ob dieser Unterschied von 2.661 aus den Fehlern der durch die Beobachtungen bestimmten Höhenunterschiede hervorgegangen sei, habe ich die wahrscheinlichen Fehler der Höhen aller zwischen der Dreiecksseite Kiweswaara — Puokiowaara und Sarwikangas befindlichen Dreieckspunkte berechnet, in dem ich die Höhen der beiden Endpunkte dieser Dreieckseite für absolut richtig angenommen, und den wahrscheinlichen Fehler eines mit dem Gewichte 1 bestimmten Höhenunterschiedes = 0.299 gesetzt habe, so wie die Ausgleichung der in der Nähe von Torneå bestimmten Höhenunterschiede ihn ergab. Die

Höhe Heines jeden der fraglichen Punkte ist so bestimmt worden, dass sie sich auf den schon bekannten Höhen h und h' zweier Punkte gründet. Bezeichne ich den mit einem Gewichte p bestimmten Leberschuss der Hohe des neuen Punkts über h mit \triangle h und den mit einem Gewichte p' bestimmten Leberschuss der Höhe des neuen Punkts über h' mit \triangle h' so ist H berechnet worden nach der Formel

$$II = \frac{p(h+\triangle h) + p'(h'+\triangle h')}{p+p'}$$

Wenn h und h' absolut richtig wären, so würde der wahrscheinliche Fehler der aus obiger Gleichung bestimmten Höhe H, welchen ich W nennen will, nur von dem wahrscheinlichen Fehler w eines mit dem Gewichte 1 bestimmten Höhenunterschiedes abhängen, und ich müsste $W^2 = \frac{w}{p+p}$, setzen. Wenn aber h und h' mit den wahrscheinlichen Fehlern v und v' behaftet sind, muss zu diesem Quadrate noch $\frac{1}{p+p}$ hinzugelegt werden, so dass der vollständige Ausdruck des Quadrats des wahrscheinlichen Fehlers der Höhe H

$$W^{2} = \frac{sv^{2}}{p+p} + \frac{p^{2}v^{2} + p^{2}v^{2}}{(p+p')^{2}}$$

wird. — Nehme ich nun v und v' für Kiweswaara und Puokiowaara für Null an, und w = 0.299, so finde ich nach dieser Formel folgen le wahrscheinliche Fehler der oben angegebenen Höhen der Punkte von Kiweswaara und Puokiowaara bis Sarwikangas: Rokuawaara 0.199
Palowaara 0.161
Rewonpesämaa 0.165
Repokangas 0.196
Halosenwaara 0.202
Pitkäselkä 0.185
Linnunsilmä 0.169
Sarwikangas 0.160

Hätte man nur eine einfache Verbindungslinie zwischen Kiweswaara und Sarwikangas gehabt, so ist es klar, dass man zum Quadrate des wahrscheinlichen Fehlers des Höhenunterschiedes von Sarwikangas und dem nächst vorhergehenden Punkte die Quadrate der wahrscheinlichen Fehler der Höhen aller mittleren Stationen hätte hinzulegen müssen, um den wahrscheinlichen Fehler der Höhe des Punktes Sarwikangas zu bekommen. In einer einfachen Verbindungslinie vergrössern sich also die Fehler der Höhen je weiter die Operationslinie sich erstreckt. Aus obiger Zusammenstellung der w. Fehler aber sieht man, dass diess nicht in einem Dreiecksnetze der Fall ist. Die verschiedene Höhe des Punktes Sarwikangas über dem Finnischen und dem Bottnischen Meerbusen kann also kaum den Beobachtungsfehlern zugeschrieben werden. Eine Unregelmässigkeit der Erdoberfläche würde veranlassen, dass ich mit unrichtigen Krüm-

mungshalbmessern gerechnet hätte, da aber meistens auf jeder von zwei verbundenen Stationen gleich viele Zenithdistanzen gemessen worden sind, muss der daraus entstandene Fehler nur auf die Refractionskonstante Enfluss haben, aber keinen auf die bestimmten Höhenunterschiede. Ein anderer Fehler in den unmittelbaren Bestimmungen der Höhen über der Meeresfläche als der, welcher aus einer unrichtigen Schätzung des mittleren Wasserstandes hervorgeht, ist nicht zu vermuthen. Die Höhe von Klemola habe ich so geprüft, dass ich aus den von mir unmittelbar bestimmten Höhen von Ulkogrunni und Ronta die Höhe von Sarwikangas über dem Bottnischen Meerbusen nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet habe. Ich fand sie freilich etwas grösser als die durch die Höhe von Klemola bestimmte, nämlich 25.126; da aber die Höhenunterschiede, welche zwischen Sarwikangas und Rontti bestimmt worden sind, mit einem sehr grossen wahrscheinlichen Fehler behaftet sind, kann man diesem Resultate kein Vertrauen schenken, und übrigens bleibt doch immer in den Höhen der beiden Meerbusen ein Unterschied von mehr als 2 Toisen, dessen Erklärung ich Anderen überlassen muss.

9.

Es ist noch übrig, dass ich kurz beschreibe, wo jeder Dreieckspunkt gelegen ist, und die Höhe des Standorts jedes Signals über der Meerestliche ungebe. Die Hampulreichkspunkte sind in der Tasel I in der Ordnung wie sie von Mäkipäällys an auf einander folgen, numerirt. Die nicht mit Zahlen versehenen Punkte sind Hülfsdreieckspunkte für die Verbindung der beiden Grundlinien (im Kirchspiele Elimä und in der Nähe von Uleaborg) mit dem Hauptdreiecksnetze. Ich lasse sie nun in derselben Ordnung wie in Fasel I auf einander folgen.

1. Mäkipäällys.

Ein Berg auf dem nördlichen Theile der Insel Hochland, auf dessen höchster Spitze der nördliche Endpunkt der Gradmessung in den Ostsee-Provinzen Russlands, mit einem im Felsen befestigten eisernen Bolzen bezeichnet, sich befindet. Die Höhe dieses Bolzens über der Meeresfläche haben wir oben = 64.671 gefunden.

2. Swartwira.

Eine kleine Insel im Finnischen Meerbusen, auf deren höchster Felsenspitze der Dreieckspunkt markirt worden ist. Die Höhe desselben haben wir oben = 7.473 gefunden.

3. Ristisaari.

Eine kleine niedrige Insel nicht weit von einer grösseren, Fagerö benannt. Die Höhe des Erdbodens, worauf der Dreieckspunkt im Jahre 1843 markirt wurde, beträgt 5.185.

4. Tuskas.

Dieser Name gehört dem zum Dreieckspunkte nächsten Bauerhof. Der Berg, worauf das Signal steht, wird Storsunds-

verg genannt, und ist auf der Insel Mogenpörtö gelegen, welche zum Kirchspiele Pyttis gehort. Die Hohe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 1.900, und dieser liegt also 18.035 über der Meeresfläche.

.5. Kokkowuori.

Ein waldbewachsener Berg eine halbe Werste vom Meere und drei Werste vom Dorfe Heinlax im Kirchspiele Pyttis. Die Hohe des Dreieckspunktes über dem Erdboden beträgt 2.961, und dieser liegt also 21.285 über dem Finnischen Meerbusen.

6. Strömfors.

Der Dreieckspunkt trägt den Namen des zum Kirchspiele Elimä gehörenden Gutes Strömfors, in dessen Bezirk er auf dem Berge Harkranksberg gelegen ist. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Erdboden beträgt 1.925, und dieser liegt also 36.662 über dem Finnischen Meerbusen. — Hier wurde im Jahre 1843 ein Gerüste aufgelührt, so dass das Instrument auf dem oberen Ende des runden Visirbalkens aufgestellt werden konnte, und über dem früheren Signale wurde noch eine Signalpyramide errichtet, auf welche die in Tafel I mit IV bezeichnete Visirung sich bezieht.

7. Lowisa.

Der mit diesem Namen bezeichnete Dreieckspunkt liegt kaum eine Werste südlich von der Stadt Lowisa. Das Signal steht auf dem höchsten Punkte eines Erdrückens ganz nahe ei-

nem grossen Steine, der Kuckusten genannt wird. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Erdboden beträgt 2.086, und dieser liegt also 20.775 über dem Finnischen Meerbusen.

S. Korsmalm.

Dieser Name gehört einer zwei bis drei Werste nördlich vom Dreieckspunkte gelegenen Poststation auf dem Wege von Lowisa nach Heinola. Das Signal steht auf einem kahlen Felsen, Storhästberg genannt, nicht weit von der Landstrasse. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 2.083, und dieser liegt also 35.325 über dem Finnischen Meerbusen.

9. Mustila.

Der Felsen Rappukallio, auf welchem das Signal steht, gehört zum Gute Mustila im Kirchspiele Elimä, und liegt auf dem halben Wege zwischen der Kirche Elimä und dem Dorfe Kimoböle, dicht neben der Landstrasse. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 1.797, und dieser liegt also 48.470 über dem Finnischen Meerbusen.

Lähdetkallio. Hülfspunkt.

Ein Berg auf der Grenze zwischen den Kirchspielen Elimä und Lappträsk 7 Werste vom Dorfe Rattula in jenem Kirchspiele entfernt. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Erdboden beträgt 1.812, und dieser liegt also 32.322 über dem Finnischen Meerbusen.

Briefberg. Hülfspunkt.

Ein waldbewachsener Berg im Kirchspiele Pyttis 3 Werste vom Dorte Swenshby entland. Die Höhe des Dreie kspunktes über dem Lalloden Lattigt 1.735, und dieser liegt also 34.522 über dem Finnischen Meerbusen.

Linnankallio. Hülfspunkt.

Ein waldbewachsener Berg anderthalb Werste vom Dorfe Rauch im Kirchspiele Elimit. Die Halte des Dreierkspieles über dem Felsen beträgt 1.763, und dieser liegt also 35.599 über dem Finnischen Meerbusen.

Nordende der Basis.

Das Signal stand auf einem Acker neben der Landstrasse nicht weit vom Gute Junttila im Dorfe Rattula und im Kirchspiele Elimä. Die Höhe des Dreieespunkts über dem Erdboden betrug 1.875, und dieser liegt also 11.382 über dem Finnischen Meerbusen.

Südende der Basis.

Das Signal stand auf einem Acker südöstlich vom Dorfe Rattula, etwa ½ Werste von der Landstrasse entfernt. Die Höhe des Dreicekspunktes über dem Erdboden betrug 1.809, und dieser liegt also 10.047 über dem Finnischen Meerbusen.

10. II Porlom.

Das Signal steht auf der südlichen Abdachung des Felsens Kosensuunkallio, welcher zum Gute Porlom im Kirchspiele Lappträsk gehört. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 1.888, und dieser liegt also 46.329 über dem Finnischen Meerbusen.

11. I Porlom.

Das Signal steht auf dem nördlichen Abhange des oben erwähnten Felsens Kosensuunkallio. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 1.925, und dieser liegt also 50.472 über dem Finnischen Meerbusen.

12. Perheniemi.

Das Signal steht auf dem Berge Kakarajärwenkallio, welcher zum Gute Perheniemi im Kirchspiele Ithis gehört. Der Dreieckspunkt liegt 1.878 über dem Felsen, und dieser also 58.371 über dem Finnischen Meerbusen.

13. Willikkala.

Das Signal steht auf dem Felsen Paskaketummäki, welcher 3 Werste südlich vom Dorfe Katajala und 6 bis 7 Werste nördlich vom Dorfe Willikkala im Kirchspiele Orimattila liegt. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen beträgt 1.859, und dieser liegt also 59.286 über dem Finnischen Meerbusen.

14. Huhtmar.

Der so genannte Dreieckspunkt liegt auf dem Berge Huhtmarmäki einige Werste südlich von dem bei der Poststation Nyby im Kirchspiele Hollola sich erstreckenden Erdrücken und 6 bis 7 Werste nördlich vom Dorfe Kuiwanto. Das Signal steht auf einem Granitfelsen, welcher um 1.913 niedriger ist als der Dreieckspunkt, und also 76.204 über dem Finnischen Meerbusen liegt.

15. Emmeneures.

Diese Benennung, welche wohl richtiger Aemmänäyräs heissen soll gehört dem Berge, worauf das Signal steht, und welcher im Kirchspiele Orimattila 2 bis 3 Werste südlich von der Kirche in der Nähe der Landstrasse gelegen ist. Der Dreieckspunkt befindet sich 1.796 über dem Erdboden, und dieser also 57.103 über dem Finnischen Meerbusen.

16. Messilä.

Der Dreieckspunkt ist nach einem drei Werste von demselben östlich entfernten Dorfe Messilä oder Mässilä benannt. Das Signal steht auf dem Berge Tirismae, dem höchsten Punkte eines Landrückens. Der Dreieckspunkt liegt 1.901 über dem Erdboden, und dieser also 114.581 über dem Finnischen Meerbusen.

17. Wahteristo.

Das Signal steht auf dem Berge Wahteristenmäki, welcher zum Derfe Pyhöntaka in der Capelle Nastola gehört. Der Dreieckspunkt liegt 1.739 über dem Felsen und dieser also 91.399 über dem Finnischen Meerbusen.

18. Wesiwehmais.

Das Signal steht auf dem Berge Isosupanmäki, auf dem höchsten Punkte zwischen den Seen Wesijärwi und Päjäne, 4 bis 5 Werste vom Dorfe Wesiwehmais entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 1.902 über dem Erdboden und dieser also 86.461 über dem Finnischen Meerbusen.

19. Kurhila.

Das Signal steht auf dem Berge Kurkistenkorwenmantere, welcher zum Dorfe Wehimä in der Capelle Asikkala und in dem Kirchspiele Hollola gehört, und drei Werste östlich von der Poststation Kurhila gelegen ist. Der Dreieckspunkt liegt 1.885 über dem Erdboden und dieser also 88.902 über dem Finnischen Meerbusen.

20. Soitinkallio.

Der Berg Soitinkallio, worauf das Signal steht, gehört zum Dorfe Karilanmaa im Kirchspiele Syssmä. Der Dreieckspunkt liegt 1.894 über dem Erdboden und dieser also 96.615 über dem Finnischen Meerbusen.

21. Wirmala.

Dieser Name bezeichnet eine Insel im Landsee Päjäne, wo das Signal steht auf dem Berge Rasinmäki, zum Gute Kellosalmi im Kirchspiele Padasjoki gehörend. Der Dreieckspunkt liegt 1.915 über dem Felsen und dieser also 95.574 über dem Finnischen Meerbusen.

22. Hiljaminwuori.

Das Signal steht auf dem Berge Wiljaminwuori im Kirchspiele Syssmä anderthalb Werste nördlich vom Dorfe Taipale. Der Dreieckspunkt liegt 1.926 über dem Felsen und dieser also 99.327 über dem Finnischen Meerbusen.

23. Kylmäkangas.

Das Signal steht auf dem Berge Kylmäkangas oder Hartikanmäki, welcher zum Dorfe Ruolaks im Kirchspiele Kuhmois gehört. Der Dreieckspunkt liegt 1.845 über dem Erdboden und dieser also 103.092 über dem Finnischen Meerbusen.

24. Kammio.

Das Signal steht auf der höchsen Spitze des Berges Kammiowuori 3 bis 4 Werste nördlich vom Dorfe Winturi in der Capelle Luhango des Kirchspiels Syssmä. Der Dreieckspunkt liegt 1.915 über dem Felsen und dieser also 113.667 über dem Finnischen Meerbusen.

25. Rappuwuori.

Der Berg Rappuwuori, worauf das Signal steht, ist im Kirchspiele Jänas'i 2 Werste westlich vom Dorfe Waherkylä gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 1.885 über dem Felsen und dieser also 107.180 über dem Finnischen Meerbusen.

26. Tammimäki.

Der Erdberg Tammimäki liegt in der Capelle Jouza in Gustav Adolphs Kirchspiele. Die höchste Stelle des Berges, wo das Signal steht, hat den besonderen Namen Kempinmäki. Der Dreieckspunkt liegt 1.875 über dem Erdboden und dieser also 124.245 über dem Finnischen Meerbusen.

27. Puolakka.

Dieser Name gehört einem Dorfe in der Gapelle Korpilaks des Kirchspiels Jämsä, von welchem Dorfe der sich am Ufer des Sees Päjäne steil erhebende Felsen Orawawuori, (worauf das Signal steht), 2 Werste südlich liegt. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Felsen ist 1.898, und dieser liegt also 98.637 über dem Finnischen Meerbusen.

28. Waterwuori.

Der Berg Waterwuori oder nach Finnischer Orthographie Waaterwuori, auf welchem das Signal steht, ist 6 bis 7 Werste nördlich vom Dorfe Nisula in der Capelle Korpilaks des Kirchspiels Jämsä gelegen. Die Grenzlinie zwischen den Gouvernemens St. Michel und Wasa geht über diesen Berg nicht weit vom Signale. Der Dreieckspunkt liegt 1.797 über dem Erdboden und dieser also 116.640 über dem Finnischen Meerbusen.

29. Jywäskylä.

Der mit diesem Namen bezeichnete Ort ist später zur Stadt ert of en. Das Signal steht auf dem Berge Romninmiki, 3 bis 4 Werste süllich von der Kinche Jywäskylü. Der Dreieckspunkt liegt 1.841 über dem Erdbollen und dieser also 116.573 über dem Finnischen Meerbusen.

30. Ruuhimäki.

Das Signal steht innerhalb der Einzäunung eines zum Dorte Ruuhimiki im Kirchspiele Laukkas gehörigen Ackers, anderthalb Werste vom Dorfe entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 1.800 über dem Erdboden und dieser also 106.622 über dem Finnischen Meerbusen.

31. Laajawuori.

Das Signal steht auf dem Berge Laajawuori 4 bis 5 Werste westlich von der Kirche Jywaskylä. Der Dreieckspunkt liegt 1.950 über dem Felsen und dieser also 116.859 über dem Finnischen Meerbusen.

32. Multamäki.

Der Erdberg Multamäki, auf welchem das Signal steht, ist 3 Werste westlich vom Dorfe Finni im Kirchspiele Laukkus gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 1.933 über dem Erdbolen und dieser also 108.569 über dem Finnischen Meerbusen.

33. Ohimäki.

Das Signal steht nicht weit vom Dorfe Ohimäki am Ufer des Sees Kynsiwesi etwa 2 Werste östlich von einem grösseren Dorfe Hawusalmi in der Capelle Hankasalmi, welche zum Kirchspiele Rautalampi gehört. Der Dreieckspunkt liegt 1.871 über dem Felsen und dieser also 109.796 über dem Finnischen Meerbusen.

34. Silmutmäki.

Ein mit dichten Birken und mit Tannen bewachsener Erdberg, worauf das Signal steht, etwa 3 Werste von der Poststation Hintikka im Kirchspiele Rautalampi. Der Dreieckspunkt liegt 1.797 über dem Erdboden und dieser also 97.197 über dem Finnischen Meerbusen.

35. Ilamäki.

Das Signal steht auf einem Berge Hamäki oder vielleicht richtiger Iilamäki genannt, welcher 2 bis 3 Werste vom Dorfe Pyrinlaks im Kirchspiele Saarijärwi entfernt ist. Der Dreieckspunkt liegt 1.902 über dem Felsen und dieser also 109.538 über dem Finnischen Meerbusen.

36. Listonmäki.

Der Berg Listonmäki, auf welchem das Signal steht, ist 3 Werste südlich vom Dorfe Listo im Kirchspiele Saarijärwi gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 1.811 über dem Felsen und dieser also 109.518 über dem Finnischen Meerbusen.

37. Wesamāki.

Das Signal steht auf dem Berge Wesamiki nicht weit von einem Dorfe desselben Namens am nördlichen Ende des Kirchspiels Rautalampi. Der Dreieckspunkt liegt 1.003 über dem Erdboden und dieser also 111.489 über dem Finnischen Meerbusen.

38. Kilpimāki.

Der Felsen Kilpimiki, auf welchem die Signal steht, liegt nicht weit von der Landstrasse, 5 Werste nordwestlich von der Poststation Toholaks im Kirchspiele Rautalampi, und nich weniger von der Kirche entfernt. Der Dreierkspunkt liegt 1.830 über dem Felsen und dieser also 103.174 über dem Finnischen Meerbusen.

39. Honkamāki.

Der Berg Honkamäki, auf welchem dis Signal steht, liegt in der Capelle Karttula des Kirchspiels Kuopio etwa 6 Werste modlich vom Dorfe Saita. Die Höhe des Dreieckspunkts über dem Erilhaden beträgt 1.627, und dieser liegt also 122.502 über dem Finnischen Meerbusen.

40. Lehtomäki.

Das Signal steht auß einem Erdberge ganz nahe zum Dorfe Lehtomiki im Kirchspiele Pielawesi. Der Dreieckspenkt liegt 1.570 über dem Endboden und dieser den 93.028 über dem Finnischen Meerbusen.

41. Pörsänmäki,

Dieser Name gehört einer Poststation im Kirchspiele Idensalmi, von welcher der Berg Pöllömäki oder Pitulamminmäki, worauf das Signal steht, 2 bis 3 Werste entfernt ist. Der Dreieckspunkt liegt 1.473 über dem Erdboden und dieser also 128,991 über dem Finnischen Meerbusen.

42. Pihlajanmäki.

Das Signal steht auf einem Berge nicht weit vom Dorfe Pihlajanmäki im Kirchspiele Pielawesi. Der Dreieckspunkt liegt 1.540 über dem Erdboden und dieser also 105.876 über dem Finnischen Meerbusen.

43. Iimäki.

Das Signal steht auf dem Berge Iimäki ganz nahe zu einem Dorfe desselben Namens im Kirchspiele Idensalmi etwa 10 Werste nördlich von der Kirche. Der Dreieckspunkt liegt 1.476 über dem Erdboden und dieser also 105.408 über dem Finnischen Meerbusen.

44. Kiwimāki.

Das Signal steht auf dem Berge Kiwimäki nicht weit vom Dorfe Swenninmäki im Kirchspiele Idensalmi, einige Werste von der nach der Stadt Kajana leitenden Landstrasse entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 1.555 über dem Erdboden und dieser also 114.845 über dem Finnischen Meerbusen.

45. Sallisenmäki.

Das Signal steht auf einem Acker ganz nahe zum Bauerholchen Sallisenmäki im Kirchspiele Idensalmi, 17½ Werste von
der Poststation Niinimäki entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 1.584
über dem Erdboden und dieser also 115.312 über dem Finnischen Meerbusen.

46. Kulwenmäki.

Der Erdberg Kulwenmäki, auf welchem das Signal steht, ist 3 bis 4 Werste vom Dorfe Palomäki im Kirchspiele Idensalmi entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 1.542 über dem Erdboden und dieser also 117.664 über dem Finnischen Meerbusen.

47. Naarasmäki.

Der waldbewachsene Felsen Naarasmäki, auf welchem das Sienal steht, gehört zum Dorfe Lahmasmiki im Kirchspiele Sotkamo. Das Signal steht nahe zu den Feldern eines auf dem Berge wohnenden Bauers. Der Dreieckspunkt liegt 1.575 über dem Felsen und dieser also 124.703 über dem Finnischen Meerbusen.

48. Murtomāki,

Das Signal steht auf einem Erdberge, über welchen die Grenze zwischen den Gouvernemens Kuopio und Uleaborg streicht, ganz nahe zum Dorfe Murtomäki und zur Landstrasse. Der Dreicekspunkt liegt 1.526 über dem Erdboden und dieser also 115.531 über dem Finnischen Meerbusen.

49. Lehtowaara.

Der Berg Lehtowaara, auf welchem das Signal steht, ist im Kirchspiele Paltamo 3 Werste von der Poststation Alakylä gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 1.510 über dem Felsen und dieser also 141.434 über dem Finnischen Meerbusen.

50. Otanmāki.

Das Signal steht auf dem Erdberge Otanmäki etwa 7 Werste vom Dorfe Suutarila entfernt, welches an der südlichen Küste des Uleä-Sees im Kirchspiele Paltamo gelegen ist. Der Dreieckspunkt liegt 1.458 über dem Erdboden und dieser also 99.530 über dem Finnischen Meerbusen.

51. Kiweswaara.

Der Erdberg Kiweswaara, auf welchem das Signal steht, ist im Kirchspiele Paltamo etwa 4 Werste vom Dorfe Wiitaniemi und vom See Kiwesjärwi nördlich von Ulea-See gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 1.496 über dem Erdboden und dieser also 152.105 über dem Finnischen Meerbusen.

52. Rupukkawaara.

Das Signal steht auf dem Erdberge Rupukkawaara, welcher auf der Grenze zwischen den Kirchspielen Paltamo und Sotkamo etwa 2 Werste von der dieselben verbindenden Land-

strasse gelegen ist. Der Dreieckspunkt liegt 1.715 über dem Erdboden und dieser also 143.031 über dem Finnischen Meerbusen.

53. Saukkowaara.

Der Erdberg Saukkowaara, auf welchem das Signal steht, ist im Kirchspiele Hyrynsalmi gelegen, etwa 7 Werste vom Dorfe Karinniemi, welches am Ufer des Sees Ristijärwi liegt. Die Höhe des Dreieckspunktes über dem Erdboden beträgt 1.750, und dieser liegt also 167.676 über dem Finnischen Meerbusen.

54. Teiriharju.

Das Signal steht auf dem Erdberge Teiriharju im Kirchspiele Hyrynsalmi, etwa 3 Werste vom Dorfe Latwamäki entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 2.266 über dem Erdboden und dieser also 171.199 über dem Finnischen Meerbusen. Hier mussbemerkt werden, dass, weil die Reduction der hier beobachteten Zenithdistanzen zum Dreieckspunkte unsicher ist,*) die absolute Höhe von Teiriharju ein wenig fehlerhaft sein kann, — was aber keinen Einfluss auf die Höhenbestimmungen anderer Punkte hat.

55. Puokiowaara.

Das Signal steht auf dem Berge Puokiowaara im Dorfe Puokio und Kirchspiele Hyrynsalmi. Nicht weit von Puokio ist

^{*)} Siehe Tafel I.

die Grenze zwischen den Kirchspielen Paltamo, Hyrynsalmi und Muhos. Der Dreieckspunkt liegt 2.241 über dem Erdboden und dieser also 111.722 über dem Finnischen Meerbusen.

56. Rokuawaara.

Der Sandberg Rokuawaara, worauf das Signal steht, ist auf der Grenze zwischen den Kirchspielen Paltamo und Muhos 4 Werste von der Poststation Rokua gelegen. Der Dreieckspunkt liegt 2.351 über dem Erdboden und dieser also 101.044 über dem Finnischen Meerbusen.

57. Palowaara.

Das Signal steht auf dem Erdberge Palowaara nahe zu einem Bauerhofe desselben Namens etwa 12 Werste östlich vom Dorfe Sankijärwi im Kirchspiele Muhos. Der Standort des Signals ist 3 bis 4 Fuss niedriger als die höchste Stelle des Berges. Der Dreieckspunkt liegt 2.412 über dem Erdboden und dieser also 76.583 über dem Finnischen Meerbusen.

58. Rewonpesämaa.

Mit diesem Namen wird eine 2 Werste vom Dorse Sankijärwi im Kirchspiele Muhos entsernte Anhöhe bezeichnet, wo ein hohes Signal ausgeführt werden musste, um Palowaara mit Repokangas verbinden zu können. Das Instrument stand auf einem etwa 3 Toisen hohen Gerüste von Holz. Die Höhe des Dreieckspunkts über dem Erdboden ist nicht gemessen.

59. Repokangas.

Der Ertherg Rep Langus, auf welchem das Signal steht, ist im Kirchspiele Muhos etwa 3 Werste von der von Kajana nach Utellung leitenden Lankursse gelegen. Der Dreie Aspunkt liegt 5.247 über dem Erdboden und dieser also 48.204 über dem Finnischen Meerbusen.

60. Halosenwaara.

Der Erdberg Halosenwaara, auf welchem das Signal steht, ist im Kirchspiele Limingo 3 Werste vom Dorfe Engeslewägelegen. Der Dieleckspunkt hegt 2.787 über dem Erdbelen und dieser also 36.748 über dem Finnischen Meerbusen.

61. Pitkāselkā.

Der Erdberg Pitkäselkä, auf welchem das Signal steht, ist unt der Grenze zwieden den Kindespielen Mahrs und Die nindlich von der von Kajana nach Uleäborg leitenden Landstrasse gelegen. Die II die des Diese despunkts über dem Erdbeden beträgt 2.235. Nach dem Obigen liegt dieser also 49.292 über dem Finnischen und 40.000 über dem Datnischen Mechanisch.

62. Linnunsilmä.

Das Signal steht auf dem Erdberge Linnunsilmä im Kirchspiele Limingo, 12 Werste von der von Uleäborg nach Åbo leitenden Loudstesse entternt. Die Höhe des Dielekspunkts dem Lollo für tuttigt 2.405. Dieser liegt also 20.200 inc. dem Finnischen und 23.725 über dem Bottnischen Meerbusen.

63. Sarwikangas.

Der Erdberg Sarwikangas, auf welchem das Signal steht, liegt nördlich von Uleå-Flusse im Kirchspiele Uleå, etwa 8 Werste von der Stadt Uleåborg entfernt. Die Höhel des Dreieckspunkts über dem Erdboden beträgt 2.260. Dieser liegt demnach 24.873 über dem Finnischen und 22.212 über dem Bottnischen Meerbusen.

Intionkangas. Hülfspunkt.

So wird eine steinichte Anhöhe neben dem Begräbnissplatze der Stadt Uleäborg genannt. Auf dem höchsten Punkte derselben steht das Signal \(\frac{1}{3} \) Werste von der Stadt entfernt. Der Dreieckspunkt war 1.667 über dem Erdboden, und dieser liegt also 11.024 über dem Bottnischen Meerbusen.

, Länkisenkangas. Hülfspunkt.

Das Signal steht auf der steinichten Anhöhe Länkisenkangas 4 Werste von Uleäborg nicht weit von der nach Åbo leitenden Landstrasse. Der Dreieckspunkt war 1.779 über dem Erdboden, und dieser liegt also 10.131 über dem Bottnischen Meerbusen.

Orithari. Nordwestl. Ende der Basis.

Das Signal stand auf dem Sandhügel Oritkari, welcher anderthalb Werste vom Uleåborg und $\frac{2}{3}$ Werste vom Bottnischen Meerbusen entfernt ist. Der Dreieckspunkt war 1.845 über dem Erdboden, und dieser liegt also 1.709 über dem Bottnischen Meerbusen.

Klemola. Südöstl. Ende der Basis.

Das Signal stand auf einem waldbewachsenen Hügel sehr nahe zum Ufer des Meeres und nicht weit vom Bauerhofe Klemola 4 Werste von Uleaborg. Der Dreieckspunkt war 1.827 über dem Erdboden, und dieser liegt also 0.595 über dem Bottnischen Meerbusen.

64. Latonmäki.

Der Erdberg Latonmäki, auf welchem das Signal steht, liegt im Kirchspiele Limingo, 2 Werste von der Kirche der Capelle Lumijoki entfernt. Der Dreieckspunkt liegt 2.116 über dem Erdboden und dieser also 13.051 über dem Bottnischen Meerbusen.

65. Hypenmäki.

Das hohe Signal steht auf dem Sandberge Hypenmäki oder richtiger Hyppänmäki (Hypppä) im nördlichen Theile der Insel Carlö. Der Dreieckspunkt war 6.680 über dem Erdboden und dieser also 15.318 über dem Bottnischen Meerbusen.

66. Isoniemi.

Mit diesem Namen wird ein 20 Werste nordwestlich von Uleaborg sich in den Bottnischen Meerbusen erstreckendes Vorgebirge bezeichnet, wozu eine Anhöhe, Runteli genannt, gehört, worauf das Signal steht. Der Dreieckspunkt liegt 2.264 über dem Erdboden und dieser also 17.291 über dem Bottnischen Meerbusen.

67. Ulkogrunni.

Das hohe Signal steht auf einer kleinen Anhöhe im nördlichen Theile der Insel Ulkogrunni, welche zum Kirchspiele Ijo gehört, und etwa 35 Werste vom nächsten Festlande, (dem Ausflusse des Ijo-Flusses), entfernt ist. Der Dreieckspunkt war 6.052 über dem Erdboden, und dieser liegt also 3.240 über dem Bottnischen Meerbusen.

68. Rontti.

Das hohe Signal steht auf dem westlichen Theile der kleinen Insel Rontti, welche dem Ausflusse des Ijo-Flusses in den Bottnischen Meerbusen gegenüber liegt, und zum Kirchspiele Ijo gehört. Der Dreieckspunkt liegt 5.760 über dem Erdboden und dieser also 1.151 über dem Bottnischen Meerbusen.

69. Kiwalo.

Mit diesem Namen wird ein nördlich vom Bottnischen Meerbusen sich in nördlicher Richtung erstreckender Bergsrücken bezeichnet, auf dessen höchster südlichen Spitze das Signal steht. Diejenigen Spitzen dieses Bergrückens, welche auf dem Meere sichtbar sind, werden von den Seefahrern "Simo kullar" genannt. Der Dreieckspunkt liegt 1.720 über dem Felsen und dieser also 81.699 über dem Bottnischen Meerbusen.

70. Ajos.

Das Signal steht auf dem südwestlichen Theile der waldbewachsenen Insel Ajos im Bottnischen Meerbusen, welche Insel 2 Werste von der nördlichen Küste desselben entfernt ist. Der Dreierkspunkt liegt 2.450 über dem Endboden und dieser also 12.077 über dem Bottnischen Meerbusen.

71. Kallinkangas.

Der Erdberg Kallinkangas, auf welchem das Signal steht, liegt im Kirchspiele Kemi eine halbe Werste südwestlich von derjenigen Kinche, die in der Swanbergschen Gradmessung ein Dreieckspunkt war. Der Swanbergsche Dreieckspunkt Kallinkangas war auf dem Berge desselben Namens nicht mehr zu finden. — Der Dreieckspunkt liegt 2.372 über dem Erdboden und dieser also 28.184 über dem Bottnischen Meerbusen.

72. Kokkomāki.

Die Anhöhe Kokkomäki, auf welchem das Signal steht, liegt eine Werste südöstlich von der Kirche des Kirchspiels Tornea, deren Thurmspitze ein Punkt der Swanbergschen Gradmessung war. Der Dreieckspunkt liegt 2.515 über dem Littleden und dieser also 12.782 über dem Bottnischen Meerbusen.

Die diesem Außsatze beigefügte Zeichnung des Hauptdreiserksnetzes wird die Außindung der Hauptpunkte erheichtern. Was die Hüllspunkte betrifft, wird jeder mit Hülfe der ebigen Angaben und der in Tafel I angegebenen Distanzen leicht eine Zeichnung derselben entwerfen können. — Schliesslich muss ich bemerken, dass die Kirchen von Kemi und Torne is deren Höhen über dem Bottnischen Meerbusen oben bestimmt worden, dieselben sind, deren Thurmspitzen Swanhergsehe Dreicelspunkte waren.

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	v	l 2. g s.
		1. Mäkipäälly	18.		
1843 Aug. 5		Oestl. Meereshmiz.			1
8	2 8 3 38		4		
5	4 0	Westl.Meereshoriz.	1		
7	2 8 3 38				
8 5			1 9.00	+ 15.40	4.19247
7	2 8				
8 5		Ristisaari II		+ 94.90	1 15803
7	2 8	H		7 34.50	4.10033
8	3 38	II			
		er Meereshorizont se	hr under	tlich. 3)	Der Mee-
unerkenntlich					
		Swartwira. (Markii			
1833 Aug. 20	22 0		-02.29	- 24.01	3.79373
		Ristisaari III		+494.15	3.80288
4	40		1	9	4.400.45
	40	Mākipāāllys M		5	4.19247
1				lkter Himn	iel, etwasi
	3 Rice	lisaari. (1843 mar			
1833 Aug. 301	1 45	Tuskas	-54.51	- 24.01	3.02176
1843 Aug. 13	23 17		-42.00:		
1843 Aug. 13	23 45	Kokkowuori I		- 20.00	3.92610
13	23 45	I	-42.00:		
1833 Aug. 30	1 45	Mikiphillys M	-54.51		4.15503 [

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz.	Reduction.	log b	log s 2 r sin. 1"	Reducirte Zenithdistanz.		
-	1. 1	Iäkipäälly	ys.			
90° 17′ 25″.2	1	1 9.6909	I	Ĭ		
16 46.9		9.4215				
18 34.5	1	9.6557				
90 18 44.1		9.6909				
18 35.4		9.4215				
19 1.2		9.6557				
90 19 38.0	— 0′ 5″.S	9.6909	2.69031	90° 19′ 32″.2		
34.1		9.4215		28.3		
25.7		9.6557		19.9		
90 20 44.1	+ 0' 8".6	9.6909	2.65677	90 20 52.7		
28.6		9.4215		37.2		
37.4		9.6557		46.0		
reshorizont unde	utlich, besonder	s der wes	stliche, welc	her nachher ganz		
				C		
	2. Swartwira.	(Markir	ter Punkt.)			
89 56 36.8	1 - 0 37.3	9.4259	1 2,29157 1	89 55 59.5		
35.3		9.2494		58.0		
90 1 10.4	+ 3 2.8	9.4259	2.30072	90 4 13.2		
6.9		9.2494		9.7		
80 52 11.7	3	9.4259	2.69031			
7.5	5	9.2494				
windig und klär	e Luft.					
3	. Ristisaari.	IS13 mar	kirter Punk	+		
89 58 5.5	-0 25.3					
4.8	- 0 21.2	8.9635	1	43.6		
6.7	- 0 21.2	8.5041		45.5		
89 56. 24.9	- 0 21.7	8.9635	2.42394	89 56 3.2		
25.2	_ 0 21.7	8.5041		3.5		
89 49 46.6	5	9.3942	2.65677			

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	٧.	log s.						
1833 Aug. 30	1 45	Swartwira 1	-54.51	+124.39	3.50255						
2) u.	3). D	ie Luft sehr unru	hig. Die	relative	Höhe des						
4. Tuskas.											
1833 Sept. 7	3 40	Lowisa 1	+ 93.11	- 24.11	3.99155						
1833 Sept. 7	3 40	Strombus	+93.11	24.03	3.93878						
1843 Aug. 20	22 1	Kolkownori I	+ 93.97		3.91374						
	3 40	Ristis mri III	+ 93.11	+ 4/14.15	3.92176						
1843 Aug. 20	22 1	111	+ 93.97	± 176.28							
1833 Sept. 7	3 40	Swartwira I	+ 93.11	+124.30	3.79373						
	wölkter	Himmel. Die Sig-			s hei Lo-l						
zu sehen.		5. Kokkowuo	ri.								
1843 Aug. 27		Rististari I		+ 176.28	3.92610						
28 27	3 2	Tuskas I	- 1	24.01	3.91374						
28 27 28	3 2	Strömfors IV		+ 77.90	4.03542						
20,	19 19	1 V	1	Strömfor	s beinahe						
	6. Strömfors.										
1833 Aug. 5	3 15 4 50	Lowisa II	+ 91.12	$\begin{vmatrix} -48.21 \\ -24.11 \end{vmatrix}$	3.85156						
5		Korsmalm I		- 23.93	3.58919						

Taf. I.

			1		i	1			
		chtete istanz.		uction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin u'}$	Ze	Reduci nithdis	
90	1'	8'.3	+0'	29".6	9.3942	3.30072	90°	, 1	37".9
Instr	umei	nts und	des ma	rkirten	Punktes u	ım etwa 2	Zoll 1	ınsie	her.
1						2000			
			,	4.					
90	3	3.2	+0	18.9	9.7386	2.48939	90	3	22.1
00	r 0	24.6	-0	5.7	0.5000	0 /100/10	00	~ 0	18.9
89	56	8.1 5.6	+0+0	21.4 21.4	9.7386	3.43642	89	56	29.5 27.0
90	1	22.7	+0	22.3	9.4205	2.41158	90 -	1	
30	1	32.3	+0.	22.3	9.3085	2.41100	90	1	54.6
90	6	32.2	+3	9.0	9.7386	2.41960	90	9	41.2
		13.1	+3	9.0	5				22.1
90	8	27.1	+1	27.0	9.4205		,		54.1
		29.4	+1	27.0	9.3085				56.4
90	8	2.6	+1	58.3	9.7386	2.29157	90	10	0.9
		3.7	+1	58.3	1 5	1			2.0
wisa	. 2) Sonne	nschein	ı. 3) i	u. 4) Son	nenschein.	Ströi	nfors	s nicht
				5. I	Kokkowuor	i.			
90	. 9	39.8	+1	53.0	9.6235	2.42394	90	11	32.8
		43.1	+1	53.0	9.6524				36.1
90	4	38.1	+0	50.6	9.6235	2.41158	90	5	28.7
00	50	33.7	+0	50.6	9.6524	0 50005	90	0	24.3
89	59	20.7 7.4	+1+1	$\frac{3.5}{3.5}$	9.6235 9.6524	2.53325	90	0	24.2 10.9
			1 1 1	3.0	1 0.0024	'			10.5
ganz	uns	ichtbar.							
				6. 4	Strömfors				
90	10	31.2	1+0	162	9.6007	2.34939	90	10	47.4
		21.0	+0	254	.9.7776				46.4
90	3	36.1	+0	23.3	9.6007	2.38701	90	3	59.4
1									

Taf. I.

Tue	W 2 de Z di	B commercial		\$1.	l g s								
1533 Aug. 7	4" 507	Kusmin I	+ 91.12	- 23,93	3.58019								
		Mustila 1		- 23.99	4.07147								
7	4 50]		23.99									
5	3 15	Tuskas I		- 24.01	3.93858								
7	4 50			- 24.01									
					TV								
1) Dunlis	-hugs	Luft. Die Signale	z sinli L	pulling. 2)	Hen at								
	7. Lowisa.												
1833 500. 101	4 0	Konsender I	14114.15	03.03	7.01020								
19	4 10	I		1	10000								
16	4 0	Strömfors I	1	1- 24.03	3.85156								
19													
16		Tuskas I	1	- 24.01	3.99155								
19	4 10	I	i										
		S. Korsmaln	7.										
1822 Sant 251	1 05	II Porlom I	14 94 00	1_ 03 03 1	3 92065								
1833 Sept. 25	1 25	Mustila I	11 91 00	- 23.99	3.96565								
1843 Sept. 28	1 14				0.40.50								
27 Sept. 25		i											
		Strömfors I			3.55919								
1833 Sept. 25	1 25	Lowisa 1	14 92 00	- 24.11	3.91020								
		Lahandalla			1.831000								
28	1 47	I											
	1 1.4	Linnankallio I	+110.51	17.95	3.93513								
1 08	1 47		+110 51	17 05									
28	1 1.3	Brighton	÷110.51	1815	3.83677								
28	1 1	Briefterg I	+110.51	1815	0.33077								
20.	1 7/			10.10									
		9. Mustila.			233 -								
	0 0	Perkenismi I	+107.01	- 23.00 j	3.93000								
24		ÎÎ											
27]	3 0	I	1	- 23.9									

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz.			Red	uction	log b.	log s 2 r sin. 1"		Reduc	irte istanz.			
90°	3'	34'.1	+0	23″.3	9.7776	2.38701	90°	3	57.4			
90	1	39.4	+0	15.3	9.6007	2.56929	90	1	54.7			
		35.9	+0	15.3	9.7776				51.2			
90	10	57.0	+0	20.8	9.6007	2.43642	90	11	17.8			
		53.8	+0	20.8	9.7776				14.6			
und Windstille, durchsichtige Luft und ruhige Signale.												
7. Lowisa.												
89	56	59.3	+0	29.9	9.8028	2.40802	89	57	29.2			
		57.6	+0	29.9	9.8305				27.5			
89	55	1.1	+0	34.2	9.8028	2.34939	89	55	35.3			
		0.0	+0	34.2	9.8305				34.2			
90	4	59.5	+0	24.8	9.8028	2.48939	90	5	24.3			
		57.8	+0	24.8	9.8305				22.6			
				8. 1	Korsmalm.							
89	58	57.3	+0	22.6	9.3814	2.41847	89	59	19.9			
89	59	3.2	+0	20.2	9.3814	2.46650	89	59	23.4			
		8.2	+0	25.0	9.3280				33.2			
		9.5	+0	25.0	9.4885				34.5			
90	2	30.1	+0	24.3	9.3814	2.38701	90	2	54.4			
90	9	26.9	+0	23.1	9.3814	2.40802	90	9	50.0			
90	4	22.4	+0	36.4	9.3280	2.32984	90	4	58.8			
		11.6	+0	36.4	9.4885				48.0			
90	3	31.0	+0	28.8	9.3280	2.43395	90	3	59.8			
		27.9	+0	28.8	9.4885				56.7			
90	2	54.4	+0	36.2	9.3280	2.33459	90	3	30.6			
		53.0	+0	36.2	9.4885				29.2			
					Mustila.							
89	59	37.1	+0	25.9	— co	2.43341	90	0	3.0			
		8.0	+0	25.9	9.9826		89	59	33.9			
		35.0	+0	25.9	9.5446		90	0	0.9			

Taf. I.

	Tag.		ahre eit.	Beobachter Punkt.	i.	v.	log s.
1					+107.01		4.00011
ì			20	_		— 23.93	
ı				II Porlom II		-23.93 -95.97	4.00642
1			0	Korsmalm I		- 23.93	3.96868
			20	I		— 23.93	0.0000
١	2	27 3	0			23.93	
	1843 Sept. 1		14		+ 91.03		
1		- 1			1 -		
-	1832 Juli 2	1 -			+107.01		
	1843 Sept. 1		14 52	Linnankallo 1	+ 91.03	- 17.95	3.62921
				Briefberg I		17.95 18.15	3.79033
1			52	Drietberg 1		-18.15	3.73033
Ì	_	18 2		Lähdetkallio I		— 18.55	3.49863
1	1	18 2	52	l		- 18.55	
				fast wolkenleer, die ruhig, die Signale I	kaum sich		
1	1812 Sant 9	00 01	20	<i>Lähdetkallio</i> Mustila 1		1 02.00	3.49863
1	1043 Sept. 4	22 22	1.5	Musua 1	7 00.22	-23.99 -23.99	3.49003
		22 21		Linnankallio I		-17.95	3.40863
١	2	22 22	15	I		— 17.95	
1		22 21	28	Briefberg 1		- 18.15	3.51583
		22 22		1		- 18.15	
ı				Korsmalm 1		- 23.93	3.83202
1	2	22 22	10	1		23.93	
1					Sonne	nschein.	Korsmalm
-				Briefberg.			
	1843 Oct. 2	26 22	13	Korsmalm 1	+ 81.40	- 23.93	3.83677
	-	26 23	5	<u> </u>		- 23.93	

Taf. I.

	Beobac nithdi		Redu	ction.	log b.	log zrsin. 1"		Reduci enithdi	
90°	3	35'.2	1 + 0'.	22".0	<u> </u>	2.50392	90°	3'	57".2
		6.6	+0	22.0	9.9826				28.6
		35.5	+ 0	22.0	9.5446	B B			57.5
90	5	17.3	+ 0	2.9	_ co	2.50423	90	5	20.2
90	8	35.2	+ 0	24.0	co ·	2.46650	90	8	59.2
		10.9	+0	24.0	9.9826			8	34.9
		40.7	+0	24.0	9.5446			9	4.7
		43.8	+ 0	12.5	9.5531			8	56.3
		43.4	+ 0	12.5	9.6627			8	55.9
90	S	43.6	+0	2.5	<u> </u>	2.56929	90	8	46.1
90	11	36.3	+ 0	46.1	9.5531	2.12702	90	12	22.4
1		31.3	+ 0	46.1	9.6627		0		17.4
90	9	50.9	+ 0	31.7	9.5531	2:28815	90	10	22.6
		50.5	+ 0	31.7	9.6627		0.5		22.2
90	17	58.8	+ 1	1:8	9.5531	1.99644	90	19	0.6
		59.5	+ 1	1.8	9.6627				1.3
		isichtig. Korsma				chtbar aber	keine	IIel	iotrope.
		•			hdetkallio.				
89	42	59.0	+0	54.8	9.6206	1.99644	89	43	53.8
	43	3.5	+0	54.8	9.4605				58.3
89	55	37.3	+ 1	13.7	9.6206	1.90644	89	56	51.0
1 00		30.6	+ 1	13.7	9.4605				44.3
89	57	51.7	+ 0	57.4	9.6206	2.01365	89	58	49.1
1 00		48.6	+ 0	57.4	9.4605		0.0		46.0
90	1	3.0	+0	25.4	9.6206	2.32984	90	1	28.4
		2.4	+ 0	25.4	9.4605				27.8
am 1	Ende	etwas	undeutli	ch.					
				R	riefberg.				!
90	2	12.4	+ 0	22,5	9.5982	2.33459 [90	2	34.9
		14.6	+0	22.5	9.3116	2,30 200		~	37.1
		2 300						29	

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	V	log s.
1843 Oct. 26		Lähdetkallio I	+81.40		3.51583
26		Mustila I		-18.55 -23.99	3.79033
26	23 5	1		- 23.99	
26 26		Linnankallio I		- 17.95	3.41763
201		N. Ende der Basis I		-17.95 -18.55	3.47794
26	23 5	I		— 18.55	
20		S. Ende der Basis 1		- 18.20	3.26754
26				— 18.20	
		Nordende der Basis Ablesetehler von 1.			. dass das
semen Signals	ist ent	Ameseremet von 1.	o corrigi	re worden.	
		Linnankallio	•		
		N. Ende der Basis I	+82.24	- 18.55	2.94718
10	1 45			- 18.55 48.00 l	2 40000
10	0 40 1 45	S. Ende der Basis 1		-18.20 -18.20	3.16885
		Briefberg Î	İ	- 18.15	3.41763
10	1 45	1		— 18.15	
	0 40	Korsmalm II		- 23,93 - 23,93	3.93613
10		Lahdetkallio I		-25.55 -18.55	3.40563
	1 45			- 18.55	1
10		Mustila I		-23.99	3.62921
10	1 45	1	- 1	— 23.99	
				Sonnensel	tein und
		Südende der Ba			
1844 Sept. 7/2	2 2	Briefberg 1	+84.40	- 18.15	3.26754
5	2 5	Linnankallio 1		-18.15 -17.95	3.16885

Taf. I.

	Beobac nithdi:		Redu	ction.	log b	$\log \frac{s}{2 r \sin n}$		Reduc	
90°	3′	17".3	+0'	517.5	9.5982	2.01365	90°	4'	8″.8
		18.4	+0	51.5	9.3116				9.9
89	54	47.7	+0	25.0	9.5982	2.28815	89	55	12.7
		44.3	+0	25.0	9.3116				9.3
89	59	9.7	+1	5.2	9.5982	1.91545	90	0	14.9
0.0		9.7	+1	5.2	9.3116				14.9
90	27	14.1	+0	56.2	9.5982	1.97576	90	28	10.3
00	A =	18.9	+0	56.2	9.3116		0.0		15.1
90	45	17.4	+1.	31.7	9.5982	1.76536	90	46	49.1
		19.9	+1	31.7	9.3116				51.6
Ende	der	Streber	ı kaum	zu seh	en war.	An den Zei	nithdi	stanz	en des-
				Lin	nankallio.				
91	30	43.1	1 + 3	13.3	9.0986	1 1.44499	91	33	56.4
		44.5	+3	13.3	9.5155	111100	01	00	57.8
90	58	16.0	+1	56.7	9.0986	1.66666	90	.0	12.7
1		15.6	+1	56.7	9.5155				12.3
90	0	58.5	+1	5.9	9.0986	1.91545	90	2	4.4
		55.3	+1	5.9	9.5155			~	1.2
90	3	29.6	+0	18.2	9.0986	2.43395	90	3	47.8
		31.4	+0	18.2	9.5155				49.6
90	4	24.0	+1	6.8	9.0986	1.90644	90	5	30.8
		28.8	+1	6.8	9.5155				35.6
89	51	4.0	+0	36.8	9.0986	2.12702	89 -	51	40.8
		0.2	+0	36.8	9.5155				37.0
starke	or TA	7 ind							
Stark	51 V	illu.							
				Südena	le der Ba	sis.			
89	13	9.4	+1	36.2	9.4671	1.76536	89	14	45.6
	1 1	5.8	+1	36.2	9.4940				42.0
88	59	19.2	+2	1.1	9.4671	1.66666	89	1	20.3

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	š.	٧.	log s.
1544 Sept.	8 2 5	Linnankallo I	+ 54.40	— 17.95	3.10885
	8 3 13	N. E. J. D. M.		— 17.95	0.40000
	7 22 2 8 2 5	N. Ende der Basis M	2	-21.20 -21.20	3.12993
	8 3 13			$\frac{-21.20}{-21.20}$	
				•	dende der
		Nordende der 1	Basis.		
1544 Sept.		S. En le der BasisM	+ 89.30	- 29.00	3.12993
	5 3 48	<u> </u>		- 29.00	
	5 3 26	Briefberg 1		- 18.15	3.47794
Ī	5 3 48 5 3 26	Linnankallio II	1	- 18.15	2.94718
	5 3 48			-35.90 -35.90	2.94/10
	01 0 10	10 II D- 1	1	1 00.00	
		10. II Porlo			
1832 Aug.		I Porlom II	+ 95.56		2.39547
	5 20 30 7 0 35	II 		- 47.86	
	5 19 30	Mustila I		- 47.86 - 23.99	4.00642
	5 20 30			- 23.99 - 23.99	4.00042
	7 0 35	j		- 23.99	
		Korsmalm 1		- 23.93	3.92066
1	5 20 30			- 23.93	
	7 0 35			- 23.93	
	1) 1	1. 2). Die Signale	gut auss	er Mustila.	3) Be-
		11. I Porlon	7.		
	14 23 30 16 7 30	Willikkala 1	+120.20	1	3.79088
		Perheniemi I		-23.92 -23.99	3.99217
	7 30			-23.99	0.30217

Taf. I.

		chtete istanz.	, Red	uction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin t}$	Z	Reduc enithd	rirte istanz.			
889	, 59'	17".3	+2'	1.1	9.4940	1.66666	899	1	18".4			
		5.5	+2	1.1	. 9.6838		٠,		6.6			
89	55	35.5	+2	6.0	9.4671	1.62775	89	57	41.5			
		27.4	+2	6.0	9.4940		1		33.4			
		3.2	1+2	6,0	9,6838				9.2			
Basis undeutlich.												
Nordende der Basis.												
0.5		20 = 1				•			- 015			
90	2	39.5	+2	0.2	9.7028	1.62775	90	4	39.7			
00	0.0	37.9	+2	0.2	9.7473	4.0===			38.1			
89	33	38.2	+1	3.6	9.7028	1.97576	89	34	41.8			
00	0 //	40.0	+1	3.6	9.7473	4 . 4 . 60	00	0.0	43.6			
88	.24	8.3	+2	42.1	9.7028	1.44499	88	26	50.4			
		9.5	+2	42.1	9.7473		I		51.6			
				10.	II Porlo	n_*						
88	53	42.0	+8	35.8	9.7399	0.89329	89	2	17.8			
		50.2	+.8	35.8	9.6308			~	26.0			
		52.8	+8	35.8	8.8549			6	28.6			
90	3	25.5	+0	19.0	9.7399	2.50423	90	3	44.5			
		42.7	+0	19.0	9.6308			4	1.7			
		38.6	+0	19.0	8.8549			3	57.6			
90	7	39.2	+0	23.1	9.7399	2.41847	90	8	2.3			
		53.9	+0	23.1	9.6308				17.0			
		46.9	+0	23.1	8.8549		٠.		10.0			
wőlk	t; di	ie Signa	le unru	ılıig un	d nicht gu	t sichtbar.						
				11.	I Porlom							
89	5.7	22.2	+0	41.9	8.8069	2.28869	89	58	4.1			
		18.6	+0	41.9	9.9880				0.5			
90.	1	13.8	+0	26.3	8.8069	2.48998	90-	1	40.1			
		8.4	+0	26.3	9.9880				34.7			
		•		•					f.			

Taf. I.

Wahre	1	i . I		
Tag. Wante Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	٧.	log s
1832 Aug. 14 23h 30 16 7 30	Mustila I	+120.20	— 23.99	4.00611
16 7 30	II Porlom II		-23.99 -47.86	
16 7 30	II Fortom II		-47.86	2.00424
	isch , doch klare Li	of Musti		becondere
Perheniemi und Mu				
schriebene Tagbuch	, auf welchem sich			
cirt, hier eingetragen	werden.			
	12. Perhenie	mi.		
1832 Juli 31 23 30	lMustila I	[+114.35]	- 23.99	3.93560
1832 Juli 31 23 30 Aug. 2 0 30			- 23.99	
Juli 31 23 30	II Porlom II		-95.92	3.99217
Aug. 2 0 30	Willikkala I		- 95.92	2 0000=
Aug. 2 0 30			-23.92 -23.92	3.86027
Juli 31 23 30	Huhtmar I			3.84306
Aug. 2 0 30]]	1	- 23.92	
1) Die Luft i	icht immer gut di	irchsichtig	, die Sig	nale aber
genug.		C		
	13. Willikka	la.		
1832 Aug. 22 1 10	Emmeneures 1	1+104.01	_ 23.91	3.74383
22 2 10	I		- 23.91	
22 1 10 22 2 10	Huhtmar I		-23.92	3.79959
	Perheniemi I		-23.92 -23.99	3.86027
22 2 10	I		-23.99	0.00021
	I Porlom II	1 1	- 96.12	3.79088
22 2 10			- 96.12	
	Der Himmel fa	st wolkenle	eer, sehr s	stürmisch,

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz.	Reduction	log b.	log s 2 r sin. 1"	Red Zenit	ucirte hdistanz.					
90° 4 53″.2	1 + 0 25 .5	8.8069	2.50392	190° .	5 18.7					
42.1	+ 0 25.5	9.9880			7.6					
90 46 33.3	+13 22.7	8.8069	0.89141	90 5						
25.7	+13 22.7	9.9880	l	I	48.4					
bei der letzten Einstellung undeutlich. 2) Die Luft ziemlich ruhig.										
ist das Instrumen	nt zweimal au	fgestellt w	orden, we	eil aber	das abge-					
sten Beobachtung	en nicht enthä	lt, konnter	i sie nicht,	vollstän	dig redu-					
	12.	Perheniem	i.							
90 7 28.5	+ 0 28.2 [8.7737	2.43341	90 7	56.7					
29.9	+ 0 28.2	8.7784			58.1					
90 7 7.5	+ 0 5.0	8.7737	2.48998	90 7						
7.1	+ 0 5.0	8.7784			12.1					
90 2 29.4	+ 0 33.5	8.7737	2.35808	90 3						
26.2 89 53 47.1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8.7784 8.7737	2.34087	89 54						
89 53 47.1 46.6	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8.7784	2.34087	09 04	21.5					
		,		TT- 1						
ziemlich ruhig.	2) Die Objecte	e waren b	ei starkem	VV inde	deutlich					
	13. 7	Villikkala.								
90 3 22.4	+ 0 38.8 ;	9.1960	2.24164	90 4						
23.0	+ 0 38.8	9.4643	\		. 1.8					
89 53 14.3	+ 0 34.2	9.1960	2.29740	89 53						
11.6	+ 0 34.2	9.4643	0.05000	00 2	45.8					
90 3 26.1	+ 0 29.7 + 0 29.7	9.1960	2.35808	90 3	55.8 53.4					
90 7 37.4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9.4643	2.28869	90 7	40.8					
35.9	+ 0 3.4	9.4643	2,20009	30 7	39.3					
00.0	. 0 0.1	0.40.10			30.0					

die Lust rein, die Signale aber unruhig.

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	٧.	log s.					
14. Huhtmar.										
1832 Sept. 25	122 45	Perheniemi I	1+ 98.92	23.99	3.84306					
30	1 12	I		- 23.99						
25	22 45	Willikkala 1		- 23.92	3.79959					
20]		- 23.92						
30			•	- 23.92						
		Emmeneures		-23.91	3.99310					
20				- 23.91						
30		N.F. 110		- 23.91	1.40000					
		Messilä II		-95.84						
		Wahteristo 1	1	23.73	3.99543					
	5 8			- 23.73						
	0 1 12		1	23.73						
		schwer zu sehen	wegen ein	er dunkeli	ı Wolke,					
ruhig und de	utlich. 3	5) Bewölkt.			`					
		15. Emmeneu	res.							
1832 Sept. 7	5 50	Messilä 1	1+108.42	[-95.79]	4.14676					
1	3 20]]		- 95.79						
16	5 23 20	113		-95.79						
	5 50	Huhtmar		- 23.92	3.99310					
	3 20		1	-23.92						
	8 6 20			- 23.92						
_	5 23 20			- 23.92						
	0 5 40			23.92						
	0 5 12	147:001 1		- 23.92	- = 1000					
	7 5 50	Willikkala		- 23.92	3.74383					
	8 3 20 8 6 20			- 23.92						
1	$ \begin{array}{c c} 8 & 6,20 \\ 6 & 23 & 20 \end{array} $	1	1 1	23.92						
1	9 5 40			-23.92 -23.92						
	0 5 12			- 23.92 - 23.42						
1	01 0 12		A.	20, 12						

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz. Red			Redu	iction.	$\log b. \log \frac{s}{2 r \sin 4''}$		Reducirte Zenithdistanz.		
				14.	Huhtman				
90°	11'	29'.2	1 + 0'	28'.9	9.3268	2.34087	90°	11'	58".1
		31-6	+0	28.9	9.3264			12	0.5
90	11	43.1	+ 0	32.0	9.3268	2.29740	90	12	15.1
		29.8	+ 0	32.0	9.9437				1.8
		48.6	+0	32.0	9.3264				20.6
90	10	54.3	+ 0	20.5	9.3268	2.49091	90	11	14.8
	10	35.2	+ 0	20.5	9.9437			10	55.7
	11	4.5	+ 0	20.5	9.3264	· [. 11	25.0
89	56	41.3	+ 0	0.6	9.3268	2.63410	89	56	41.9
89	59	5.5	+ 0	20.4	9.3268	2.49323	89	5 9	25.9
	58	45.4	+ 0	20.4	9.9437		'		5.8
	5 9	9.2.	+ 0	20.4	9.3264				29.6
die	hinter	r diesen	n Punkt	le war.	2) Bew	ölkter Him	mel,	die	Signale
									8
				15. I		es.			
89	51	: 9.4	+0	2.4	9.9377	2.64457	89	52	1.8
	52	19.3	+ 0	2.4	9.6976				21.7
	52	19.2	+ 0	2.4	9.0248				21.6
89	57	5.5	+ 0	23.1	9.9377	2.49091	89	57	28.6
	57	25.6	+ 0	23.1	9.6976			57	48.7
	56	30.9	+0	23.1	9.9766			56	54.0
	57	38.7	+ 0	23.1	9.0248			58	1.8
	57	3.2	+ 0	23.1	9.9633		1	57	26.3
	57	5.0	+ 0	23.1	9.9292			57	28.1
90	0	22.1	+ 0	41.0	9.9377	2.24164	90	1	3.1
		38.9	+ 0	41.0	9.6976			1	19.9
		8.6	+ 0	41.0	9.9766			0	49.6
		38.9	+ 0	41.0	9.0248			- 1	19.9
		21.3	+ 0	41.0	9.9633			1	2.3
		22.5	+ 0	41.0	9.9292			1	3.5
								30) '

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt-	i	v	log s.				
1) Die Luft klar, stürmisch. Die Signale umruhig. 2) Klarer									
Signale undeutlich, besonders dis von Huhtmar. 4) u. 5) Die Sig-									
hig und deutlich.									
16. Messilā.									
1833 Juni 91	0' 0	Kurhila I	+87.67	23.86	4.07302				
9			1.	- 23.86					
		Wesiwelimais II		- 96.82:	3 98549				
				- 96.82:	0.00010				
9		II		— 96.82:					
		Waliteristo I		-23.73					
		I I	3	-23.73					
		Huhtmar I		-23.73 -23.92					
		Linmeneures II	1	- 25.52					
9	3 40	Limmenetties							
9	5 0	——— Н	1	— 96.76:					
		17. Wahteris	to.						
1832 (00. 15)	23 20	[Huhtmar I	+122.11	1- 23.02	3.99543				
16	0 0	1		- 23.92	9.00				
				- 24.06	4.00545				
16	0 0	Messilä l		- 24.06	2.000-10				
		Wesiwehmais 1		- 23.98	3 80971				
	0 0			- 23.98	3.00273				
10	0 0	1		nschein, wi	udia mul				
			Some	itschein, wi	marg una				
		18. Wesiwehm							
[1833 Juni 25]	4 ()	Waliteristo I	+ 95.23	- 23.73	3.80271				
25				- 23.73					
25	4 0	Messilä I		- 24.06	3.98549				
25	-	I		- 24.06					
25	-	Kurhila I	1	1	3.92627				
25				- 23.86					
25	0	Soitinkallio I			4.06687				
25	5 0	1		- 23.92	1.00007				
. 20	3 0		Die In	ft gut und d	urcheich				
1			Die Pa	- gut and c	an Chaiche I				

Taf. I.

	Beobachtete Reduction log b log s Reducirte								
		istanz.	Redi	ection.	log b	$\log \frac{s}{2 r \sin 1}$	Z	enithd	istanz.
Him	mel,	beinah	e Win	dstille.	Die Sign	ale sehr ui	ideutl	ich.	3) Die
nale sehr unruhig, besonders das von Huhtmar. 6) Die									nale ru-
					Ū				
0.00	4 = 1		. 01		. Messilä.				
90°	12'	35".2	+0'	14.5	_ co	2.57082	90°	12'	
100	4.2	32.6	+0	14.5	9.7296				47.1
90	14	23.5	-0	2.5	8.7305	2.48329	90	14	21.0
		21.1	-0	2.5	8.7305				18.6
1 00	4.0	19.7	-0	2.5	9.7296	0.50005	0.0	4.0	17.2
90	12	2.5	+0	17.0	<u> </u>	2.50325	90	12	19.5
00	4 -	9.3	+0	17.0	9.7296	0.00040	00	4 ~	26.3
90	15	36.5	+0	12.5	9.7296	2.63410	90	15	49.0
90	20	34.1	0.	1.7	9.6046	2.64457	90	20	32.4
		32.5	-0	1.7	9.7296		1		30.8
				17.	Wahterist	0.			
90	9	14.4	+0	26.7	9.1324	2.49323	1 90	9	41.1
		18.7	+0	26.7	co				45.4
89	56	18.4	+0	26.0	9.1324	2.50325	89	56	44.4
		17.7	+0	26.0	— co				43.7
90	5	1.2	+0	41.5	9.1324	2.30051	90	5	42.7
	4	58.4	+0	41.5	_ = ===================================				39.9
sehr	kalt.	Die S	ignale	deutlich					
					Vesiwehma	2.			
89	59	50.8	+ 0	30.3	9.6267	2.30051	90	0	21.1
00	00	47.5	+ 0	30.3	9.7236	2.0001		0	17.8
89	54	9.2	+ 0	19.8	9.6267	2.48329	89	54	29.0
		8.4	+ 0	19.8	9.7236	2.13323		3-1	28.2
90	2	33.4	+ 0	22.7	9.6267	2.42406	90	2	56.1
		30.7	+ 0	22.7	9.7236			~	53.4
90	2	0.4	+ 0	16.4	9.6267	2.56466	90	2	16.8
	ĩ	55.6	+ 0	16.4	9.7236				12.0
tig. d	ie S	ignale d				,			
1.8,		0							1

Taf. I.

Tag	Walte Zest	Be Varietier Punkt.	i.	١.	l·g·s.					
19. Kurhila.										
1533 Juni 301	4 501	Wirmila I		- 23.961	4.15145					
30]		— 23.96 .						
30	4 30	Soitinkallio I		- 23.92	4.08635					
30	5 45			- 23.92	- 0-0-5					
30	1 .,()	Wesiwehmais		- 23.98	3.92627					
30	5 45			- 23.98 - 24.06	4.07302					
30		Messilä	1 j	-24.06 -24.06	4.07302					
50	0 701		1							
			Die Luft	nicht rec	ht durch-					
		20. Soitinkal	lio.							
1533 Juli 12	0 0	Wesiwelimis !	1 + 91.13	- 23.04	4.000157					
15				- 23.98						
. 12		Kurhila I		- 47.71	4.08635					
15	4 15	I		- 96.57:						
12	0 0	Wirmala .		- 23.96	4.06988					
15		Wiljaminwuori		-23.96 -23.92	4.13041					
15				-23.92 -23.92						
			11 4							
1) Die	Similar	e ziemlich deutlich.	2) Klar	er Himmel	. Wind-					
		21. Wirma								
15 1 3 1 11 23	21 0	Kylmi kingis	1 + 96.39		4.01357					
	21 50	· ·	I.	- 24.04						
1	21 0	Wiljaminwuori	I i	23.92	4.20039					
	21 50	Soitinkallio	I T !	- 23,92	100000					
	21 50	John Kallio	11	-23.92 -23.92	4.06988					
	21 0	Kurhila	1	-23.92 -23.86	4.15148					
	21 50	TEO MIO	Î	- 23.86 - 23.86	4.10140					
			Strich	regen. D	e Signale					
å .				8	5					

Taf. I.

	oithái	hteta stanz.	Redu	etica	l g 5.	leg 5 2 r sua. 1		Reduc	rirte istanz.
				19.	Kurhila.				
90°	4	32".0	1 + 0'	12'.6		2.64927	1 90°	4	44.6
		25.6	+ 0	12.6	9.7861			1	38.2
90	3	0.0	+ 0	14.6	9.6796	2.58414	90	3	14.6
1	2	56.6	1 + 0	14.6	9.7861				11.2
90	4	30.5	1 + 0	21.1	9.6796	2.42406	90	4	51.6
1		27.8	+ 0	21.1	9.7861				48.9
89	57	40.6	+ 0	15.1	9.6796	2.57082	89	57	55.7
		36.7	1+0	15.1	9.7861	'			51.8
sichti	o di	e Simi	ale unru	hio.		6			
J.C.L.	5, 4.	0.5.10	iic umu	0	~				
				20. 3	Soitinkallie	0.			
90	7	56.9	+0	15.5	_ co	2.56466	90	8	12.4
		58.1	+0	15.5	9.6698			-	13.6
90	7	23.3	+0	9.6	<u>—</u> ജ	2.58414	90	7	32.9
		42.5	-0	1.2	9.6698				41.3
90	5	17.3	+0	15.4	- 00	2.56767	90	5	32.7
		23.6	+0	15.4	9.6698				39.0
90	5	6.5	+0	13.4	— co	2.62819	90	5	19.9
1		14.4	+0	13.4	9.6698				27.8
stille.	Ru	ich in e	der Luft	. Die	ignale rul	hig aber nie	ht rea	hr d	entlich.
			1						
90.	1	44.5	+ 0	18.8	9.5321	2.51165	90	2	3.3
00	00	48.9	+ 0	18.8	9.3915	0.0004=	0.0		7.7
90	5	57.2	+ 0	12.3	9.5321	2.69817	90	6	9.5
90	6	2.0	+ 0	12.3 18.6	9.3915	0 =0=0=	20		14.3
90	-±	39.6	+ 0		9.5321	2.56767	90	4	56.2
90	7	39.7	+ 0	16.6	9.3915	0.6100=	00	_	56.3
30	-	45.8 49.6	+ 0	13.8 13.8	9.5321	2.64927	90	7	59.6
wich:	hasa	nders r		19.9 -	9.3915			S	3.4
ment	nes0	nuers T	mng.						

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	î.	۲.	log s						
	22. Hiljaminwuori.										
1834 Juni 181	4 151	Solitinhal lo	± 107.59	_ 23.02	4.13041						
15	4 55	1		23.92							
15	4 15	Wirmall. 1		- 24.5%	4.20039						
18	4 55	l		23.96							
18	4 15	Kylmäkangas I		- 24.04	4.05927						
18	4 55	I		- 24.04							
18	4 15	Kammio 1		- 24.12	3.84698						
18		I		- 24.12							
18	4 15	Temminolii I		- 23.92	4.17042						
18	4 55	l		- 23.92							
1		Bewölkt. Starker	Wind.	Die Signa	le beson-						
		22 70 7 1 11									
		23. Kylmäkang	gas.								
1833 Oct. 21	23 5	Wiljaminwami 1	+ 90.07 [23.02	4.05027						
	0 22			23.92							
1834 Juni 24	5 30	I	+91.35	- 23.92							
251	5 15 1]		23.92							
11833 Oct. 21	23 5	Wirmala 1	+ 92.67	- 23.96	4.01387						
1 3			+ 92,67	$-23.90 \pm$							
1834 Juni 24				- 24.12	3.95202						
25				- 24.12							
24			+ 91.35		4.02442						
25	5 15 1	I	+91.35	-22.61							
1		24. Kammio.									
LAND IN THE	() A = 1	17	1	55 (17)	3.03.00						
1834 Juli 2		Williaminwami I	÷ 50.00		3.44167						
2	2 30	L' 1 T		- 23.92 - 24.04	3.95202						
2	$\frac{2}{2} \frac{10}{30}$	Kylmidenges I	1	- 24.04 - 24.04	3.00202						
2		Rappuwuni I		- 23.04 - 22.61	3.903, 9						
-1	2 10	responsibility 1	1		9.303.3						

Taf. I.

	Beobac enithd	chtete istanz.	Red	luction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin n'}$	Ze	Reduci enithdi	irte istanz.	
	22. Wiljaminwuori.									
90°	6'	26".6 1	+0'	16".7	9.6484	2.62819	90°	6	43".3	
		24.2	+0	16.7	9.7120	2.02010			40.9	
90	7	37.5	+0	14.2	9.6484	2.69817	90	7	51.7	
	Ť	37.3	+0	14.2	9.7120			·	51.5	
90	3	42.1	+0	19.6	9.6484	2.55705	90	4	1.7	
		41.7	+0	19.6	9.7120				1.3	
89	55	45.7	+0	31.9	9.6484	2.34476	89	56	17.6	
		41.8	+0	31.9	9.7120				.13.7	
90	0	41.7	+0	15.2	9.6484	2.66819	90	0	56.9	
		40.2	+0	15.2	9.7120				55.4	
dore	dae	auf Wi	مامس	cohn un	doutlish					
ueis	uas	att yyı	mala	senr une	dentifen.					
				23. K	ylmä k ang	as.				
90	5	56.6	+0	- 16.1	9.2187	2.55705	90	6	12.7	
	6	0.1	+0	16.1	8.8278				16.2	
	5	53.6	+0	15.8	9.7599				9.4	
1	5	56.6	+0	15.8	9.7402				12.4	
90	6	49.3	+0	17.9	9.2187	2.51165	90	7	7.2	
		49.2	+0	17.9	8.8278				7.1	
89	59	19.0	+0	20.2	9.7599	2.44979	89	59	39.2	
		37.9	+0	20.2	9.7402				58.1	
90	3	3.0	+0	17.5	9.7599	2.52219	90	3	20.5	
i		5.5	+0	17.5	9.7402				23.0	
İ				24.	Kammio.					
90	9	50.4	+0	24.0	9.3749	2.34476	90	10	14.4	
		49.1	+0	24.0	9.4206	2,04470	00	10	13.1	
90	7	45.8	+0	18.8	9.3749	2.44979	90	8	4.6	
	•	44.0	+0	18.8	9.4206	2.14075	00	0	2.8	
90	6	24.1	+0	17.5	9.3749	2.49146	90	6	41.6	

Taf. I.

Tue.		Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	î.	۲.	log s.
1834 Juli	2	2 15 2 30	R ppuw 7 I Tammimäki I	- 86.67	$ \begin{array}{r} -23.01 \\ -23.92 \\ -23.92 \end{array} $	4.04781
1			Bewölkt. Starke	r Wind.	Die Sign	ale rulig
1			25. Rappureue	ort.		
1834 Juli	6:	4 15	Puolakka I	[]+ S7.76		3.86006
	11				-24.06 -23.92	4.15529
	6	1 0 4 15 1 0	Kammio I		$ \begin{array}{r rrrr} - 23.92 \\ - 24.12 \\ - 24.12 \end{array} $	3.99369
	6		Kylmäkangas		- 24.04 - 24.04	
1			Bewölkt. Die	e Signale		
			26. Tammim	āki.		
1531 Indi	-00	4 .[1)	Williaminava vi	1(+ (11	(93.09	4.17(142
ı	21	-	Kammio	1 + 92.11	- 23.92	
1	20	4 40	Kammio	11+ 92.11	- 24.12	4.04781
	1()	5 20 40	It ppurve i	- 1.11	- 34.13	4.185.0
1	21	5 20		11+ 92.11	i- 22.61	
1	20	4 40				
	21	5 20	I	1 + 92.11	- 96.58	
- 1.	12	0 5]	1 + 91.71	-48.11 -48.11	
1			Waterwuori			4.13819
	12	0 90		1+ 111.71	- 23. 5	
VV ind, lei	Die	Noll	k demich and mi ken am Himmel.	Mg. 2) I	Офрими	i unique

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz. Reduction. log b. log s Reductive Zenith iistanz									
90,	6	26 .5	1+0	17".5	9.4206	2.40146	1 50	b'	44.1)
90	1	37.2	+0	15.1	9.3749	2.54558	90	1	52.3
		33.7	1+0	15.1	9.4206				48.8
und o	leutl	ich, Ta	mmimä	ki ausg	enommen.				
				25.	Карришио	ri.			
90	6	57.1	1+0	23.6	9.6539	2.35783	90	7	20.7
		55.1	+0	23.6	9.0255				18.7
.90	2	54.9	+0	11.1	9.6539	2.68606	90	3	6.0
		53.1	+0	11.1	9.0255	İ	1		4.2
90	1.	53.0	+0	17.4	9.6539	2.49146	90	2	10.4
		52.6	+0	17.4	9.0255				10.0
90	5	49.8	+0	16.2	9.6539	2.52219	90	6	6.0
		45.4	+0	16.2	9.0255				1.6
ausgei	nom	men Ta	ummimä	ki Sign	ıal.	•			
				26.	Tammimā	ki.			
90	12	16.0	+ 0	12.4	9.7146	2.60819	90	12	25.4
30	1.	22.3	+ 0	12.4	9.7739	~.00010	30	1~	34.7
90	8	3.2	+0	16.4	9.7146	2.54558	90	8	19.6
00	7	56.8	+0	16.4	9.7739	2.04000	00	0	13.2
90	10	21.8	+ 0	12.1	9.7146	2.68606	90	10	33.9
		30.8	+0	12.1	9.7739				42.9
90	12	32.5	_0	8.9	9.7146	2.62930	90	12	23.6
		36.2	-0	8.9	9.7739				27.3
		20.1	+ 0	8.7	8.0869				28.8
		24.3	+0	8.7	8.7023				33.0
90	7	53.7	+ 0	13.3	8.0869	2.63595	90	8	7.0
		51.4	+0	13.3	8.7023	į.			4.7
lich.	3)	u 1) I	Die Tuff	solir r	oin die S	ignale deut	lich	S. h.	ver bon
41,110	")	u. 7) 1	DIC LILL	i sciii i	em, me o	Simile delle	IICII.	-(11	or cellett!

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beebachteter Punkt.	i	v	log s.
e		27. Puolakka	7.		
1834 Aug. 6	4"45"	Jywäskylä I	+108.52	- 23.93	4.23029
27	4 10	1			
Sept. 23	2 55		+108.02		
23	3 25		+108.02		0.45446
23	2 55		+108.02		4.15446
23	3 25		+108.02	1	4.13154
Aug. 6	4 45		+108.52 +108.52		4.1.)104
Sept. 23			+108.02		
23	3 25		+108.02		
Aug. 6		Rappuwuori Î	1		3.86006
27	4 10	I	+108.52	_ 22.61	
			1 .) u. 2) Di	. Signala
		28. Waterway) u. 2) Di	te Signate
14024 5 . 04	1 2 50			1 1-01	. 410010
1834 Sept. 21 21		Tammimäki II Puolakka *II		- 47.84 - 48.11	
21		Jywäskylä II		-45.11 -47.85	
21	1	Laajawuori II		48.11	4.10811
21		Ruuhimäki II		- 48.01	3.99706
	1 0 00		'		
				Signale nie	chi peson-
		29. Jywäsky			
1834 Sept. 20		[Laajawuori I]	[]+ 87.23	48.11	3.41273
26]	1	- 48.11	
26		Ruuhimäki I		- 48.01	4.11107
20		147		- 24.00	1.00000
20		Waterwuori I		- 47.85	4.02320
20				- 23.93 - 48.11	4.23029
20		T. CONTRACTOR		-24.06	4.20029
1	1		- (4.00	1

Taf. I.

-		Beobac nithdi:		Redu	ction.	log b	$\log \frac{s}{2 r \sin t'}$		Reduc nithdi			
1					27.	Puolakka						
I	90°	3′	47".4	1 + 0'	13".4	9.7576	2.72805	900	4'	0".8		
I			45.5	+0	13.4	9.7568			3	58.9		
l			46.9	+0	9.5	9.6872			3	56.4		
١			40.8	+0	13.3	9.7558			3	54.1		
ľ	90	- 1	53.3	+0	11.3	9.6872	2.65222	90	. 2	4.6		
ł			42.6	+0	15.8	9.7558			1	58.4		
ł	89	59	14.6	+0	16.8	9.7576	2.62930	89	59	31.4		
ł			12.3	+0	16.8	9.7568				29.1		
l			17.1	+0	1 1.9	9.6872				29.0		
ı			4.9	+0	16.7	9.7558		1		21.6		
l	89	58	37.5	+0	31.9	9.7576	2.35783	89	59	9.4		
١			40.3	+0	31.9	9.7568				12.2		
1	rnhio	r une	l deutlic	eh.								
l	3	,			28.	Waterwuor	ri.					
1	90	- 4	2.1	1+0	8.0	9.7986	2.63595	90	4	10.1		
i	90	10	31.4	+0	7.6		2.65222	90	10	39.0		
	90	4	29.1	+0	10.4		2.52095	90	4	39.5		
l	90	5	27.1	1+0	8.5		2.60586	90	5	35.6		
ı	90	7	41.4	+0	11.0		2.49481	90	7	52.4		
I.	ders	deut	lich abe	r ruhig.								
				0	20	Jywäskylä						
1												
1	90	0	0.8	$ + 0 \rangle$	40.7	9.7092	1.91048	90	0	41.5		
	0-		0.9	+ 0	40.7	9.7968	0.00000	0.0	0	41.6		
	90	8	12.3	+ 0	8.2	9.7092	2.60882	90	8	20.5		
-	00	/4	7.6	+ 0	13.2	9.7968	0.50005	00	/4	20.8		
-	90	4	31.8	+ 0	10.0	9.7092	2.52095	90	4	41.8		
I	00	1.1	27.4	+ 0	16.1	9.7968	0.70905	00	4.1	43.5		
I	90	11	4.9 57.9	+ 0 + 0 = 0	6.2	9.7092	2.72805	90	11	11.1		
1		10	07.9	1 + 0	10.0	1 9./900	,			7.9		

Taf. I.

Tag.		Wahre Zeit.	Beobachteter Punk	t.	i.	v.	log s.					
	30. Ruuhimäki.											
1835 Jun			Waterwuori	111+	-84.94		3.99706					
	20	19 30 6 45	Jywäskylä	11		- 47.85 - 47.85	4.11107					
	20	19 30 6 45	Laajawuori	-111		- 47.85 - 48.11	4.13330					
	20	19 30		11		- 48.11						
	201	6 45	Multamäki	11 j - 11 j		-48.01 $ -48.01 $	4.22063					
	20	6 45	Ohimäki	11		- 47.46	4.20764					
4				III)	31 2.	47.46	()1: "1:					
1)	Die	Signa	le ziemlich deut		Mulla	make und	Ohimaki					
1			31. Laajaw									
1834 Oct.	2	2 10 3 0	Multamäki	-11 +	94.64	-48.01 -48.01	4.10111					
	2	2 10	Ruuhimäki	11		- 48.01	4.13330					
	2	3 0 2 10	Waterwuori			-48.01 -47.85	4.10811					
	2 2 2 2	3 0	<u> </u>	П		- 47.85						
	2	2 10	Jywaskyla	11		- 47.85 - 47.85	3.41273					
						Sonnensch	ein, kalt,					
			32. Multan	nāki.								
1834 Oct			Hamāki		89.02	— 47.96]	4.15446					
	22	2 30 23 45	Silmutmäki	11		-47.96 -47.85	4.20737					
	22	2 30		П		- 47.85						
	21	23 45 2 30	Ohimäki			-47.46 -47.46	4.04261					
	~~!	- 201			- 1	17.10						

Taf. I.

_												
			htete stanz.	Red	uction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin . 1'}$	Ze	Reduc nithd	cirte istanz.		
	30. Ruuhimäki.											
1 9	0°	0'	44".1	1+0'	10".0	9.8425	2.49481	I 90°	O'	54".1		
			51.1	+0	10.0	9.6664			1	1.1		
1 9	90	2	48.8	+0	7.7	9.8425	2.60882	90	$\overline{2}$	56.5		
			58.5	+0	7.7	9.6664			3	6.2		
1 9	90	3	10.3	+0	7.3	9.8425	2.63105	90	3	17.6		
			18.4	+0	7.3	9.6664				25.7		
1 9	90	6	39.7	+0	6.0	9.8425	2.71838	90	6	45.7		
			49.3	+0	6.0	9.6664				55.3		
9	0	6	12.6	1+0	6.2	9.8425	2.70538	90	6	18.8		
			20.3	+0	6.2	9.6664				26.5		
au.	sgei	iom	men.	2) Die	Signale	ziemlich	deutlich a	usser	Mul	ltamäki.		
					31. <i>L</i>	aajawuor	i.					
9	00	7	40.0	1+0	9.9 [9.5914 1	2,59885	90	.7	49.9		
			39.7	+ 0	9.9	9.7320	2.00000		•	49.6		
1	90	8	32.9	+ 0	9.2	9.5914	2.63105	.90	8	42.1		
			29.2	+ 0	9.2	9.7320	2.00100			38.4		
9	0	5	39.3	+ 0	9.8	9.5914	2.60586	90	5	49.1		
			33.2	+ 0	9.8	9.7320	. 2.0000			43.0		
9	0	1	1.1	+ 0	48.6	9.5914	1.91048	90	1	49.7		
		0	51.2	+ 0	48.6	9.7320				39.8		
etr	vas	wii	idig.	1								
1	, 40	** 11	raig.									
	32. Multamäki.											
9	90	6	2.4	1+0	7.7	8.7399	2.65220	1 90	6	10.1		
		5	59.5	+0	7.7	9.7399				7.2		
(90	9	19.0	+0	6.9	8.7399	2.79511	90	9	25.9		
			25.4	1+0	6.9	9.7399				32.3		
1	90	4	18.1	+0	10.1	8.7399	2.54035	90	4	28.2		
2			21.5	+0	10.1	9.7399				31.6		

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	r.	log s
1834 Oct. 21	23° 45	Rauhim'iki II	+ 80.02	- 45.01	4.22063
23	2 30	Laajawuori *11		- 48.01	110111
S	chwach	er Wind. Sonnen	schein. F	Calt. Die	Erde mit
		33. Ohimäk	i.		
1835 Juni 10	1 5 15	Ruuhimäki II	1+ 97.48	_ 98.79:	4.20764
10	5 30]]		- 96.79:	
	5 15	Multamäki 🐪 I		- 24.01	
	5 30			- 24.01	
10		Silmutmaki 1		- 23.93	
10	5 30]	1	— 23. 3	
			Die Luf	t ruhig, ab	er Multa-
		34. Silmutmä	iki.		
		Ohimiki	日十 89.95	- 23.73	3.95999
1	0 22 40			- 23.73	
	0 22 15	Multamäki		- 24.01	4.20737
	22 40	llamäki		- 24.01	0 4 4
	22 15	Hamaki		-23.98 -23.98	4.14757
	0 22 40	Listonmäki		$\frac{23.98}{-23.98}$	4.12046
	0 22 40			-23.98	7.12040
	0 22 15	Wesamäki		- 18.54	4.21723
	0 22 15	Kilpimäki		- 23.89	
3	0 22 40			- 23.89	
		Trüh	er Himm	el aber du	rchsichtige
		35. Ilamäk	i.		
1835 Juni 30	0'21 40	Listonn'ili 1	11+ 82.24	1- 47.07	4.00161
	2 5 15]	1	- 47.97	
	0 21 40		1	- 47.85	4.14757
Juli :	2 5 15]		1- 47.85	1

Taf. I.

		eobach iithdis		Redu	ction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin \cdot 1''}$	I Ze	Reduci nithdi	rte stanz.
-	90°	7	30".4	+ 0'	6".6	8.7399	2.71838	90°	7'	37″.0
۱			36.7	+ 0	6.6	9.7399				43.3
1	90	3	11.3.	+ 0	8.7	8.7399	2.59885	90	3	20.0
1	Schne	e be	deckt.	Laajaw	uori g	ar nicht si	chtbar.			
İ					33.	Ohimäki.				
l	90	7	48.1	1+0	0.1	9.7357	2.70538	90	7	48.2
ı			55.2	+ 0	0.1	9.7559				55.3
l	90	4	49.3	+ 0	17. 9	9.7357	2.54035	90	5	7.2
			47.0	+ 0	17.9	9.7559				4.9
1	90	8	36.2	+ 0	21.7	9.7357	2.45773	90	8	57.9
Ĭ			32.2	+ 0	21.7	9.7559	l j			53.9
ľ	näki	nieh	t recht	deutlich	1.					
ı					34.	Silmutmäh	z.			
l	89	58	55.6	1 + 0	19.5	1 9.2099	1 2.45773	1 89	59	15.1
L			59.7	+0	19.5	9.1961	2110770		00	19.2
ı	90	4	30.1	+0	11.0	9.2099	2.70511	90	4	41.1
ı		•	33.3	+0	11.0	9.1961	1			44.3
ı	90	3	0.6	+0	12.6	9.2099	2.64530	90	3	13.2
		2	59.6	+0	12.6	9.1961				12.2
	90	2	32.3	+0	13.4	9.2099	2.61819	90	2	45.7
			32.8	+0	13.4	9.1961	1			46.2
	90	4	13.3	+0	11.6	9.2099	2.7149,6	90	4	24.9
I	90	' 3	24.2	+0	14.9	9.2099	2.57318	90	3	39.1
			21.5	+0	14.9	9.1961	1			36.4
1	Luft.	V	Vindstil.	le. Sig	nale ri	thig.				
						. Ilamäki.				
1	90	4	59.3	1 + 0	8.0	9.2291	2.55934	90	5	7.3
1	00	5	8.1	+ 0	8.0	9.3953	2.00004	00	U	16.1
1	90	9	7.0	+0	6.6	9.2291	2.64530	90	9	13.6
1			19.7	+0	6.6	9.3953				26.3

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Pu	nkt. i.	ν.	log s.
1835 Juni 30 Juli 2	21 ^h ,40 5 15	Multamäki		24 — 48.01 — 48.01	4.15446
		ein. Listonmä und undeutlich		ziemlich der	itlich, die
		36. Listo	nmäki.		
1835 Juli 7 8 7 8 7 8	3 45 5 35 3 45		1 + 86.9 1 11 11	18.54 - 18.54 - 96.58 - 96.58	4.12046
7 8	5 35 3 45	llamäki	_1	-23.98 -23.98	4.06161
		1) Die S	ignale deutl	lich aber um	ruhig. 2)
		37. IVes	amäki.		
1835 Aug. 20 20 20 20 20 20	4 30 1 15 1 15	Lehtomäki Honkamäki Kilpimäki Silmutmäki Listonmäki	H	$7 \begin{vmatrix} -18.51 \\ -76.73 \\ -23.89 \\ -23.93 \\ -23.98 \end{vmatrix}$	4.21431 4.26670 4.21723
	1)	Bewölkt. Die	Signale ri	thig und det	itlich. 2
		38. Kilpi	mäki.		
1835 Juli 16 16 16 16 16 16 16 1	4 52 4 15 4 52	Silmutmäki Wesamäki Honkamäki	+ 92.7 	76 — 23.93 — 23.93 — 18.54 — 18.54 — 37.09 — 37.09	4.26670

Taf. I.

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$													
31.2 + 0 6.4 9.3953 37.6 37.6 übrigen sehr unruhig und undeutlich. 2) Starker Sonnenschein. 36. Listonmäki. 90 3 56.6 + 0 17.0 9.4388 2.53063 90 4 13.6 20.6 4 3.6 + 0 17.0 9.3188 2.61819 90 9 3.1 9.1 90 9.3188 2.61819 90 9 3.1 7.1 90 4 54.0 + 0 14.7 9.4388 2.55934 90 5 8.7 5 3.7 + 0 14.7 9.3188 2.55934 90 5 8.7 18.4 Die Signale unruhig und nicht ganz deutlich. 37. Wesamäki. 90 11 23.2 + 0 8.3 9.6889 2.73466 90 11 31.5 90 5 1.8 90 9.5405 2.76443 90 9 43.5 90 9 36.6 + 0 6.9 9.5405 2.76443 90 9 43.5 90 10 9.5 + 0 7.8 9.5405 2.71496 90 10 17.3 90 5 12.2 + 0 11.9 9.5405 2.53063 90 5 24.1 Sonnenschein. Der Heliotrop ruhig und deutlich. 38. Külpimäki. 90 6 45.9 + 0 15.6 9.4189 2.57318 90 7 1.5 45.5 + 0 15.6 9.4597 9.4597 9.4597 9.4597 9.470 90 5 52.1 + 0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4		nithdi	stanz.	Redu			$\log \frac{s}{2 r \sin A''}$	Ze	Reduci nithdi	rte stanz.			
36. Listonmäki. 90	90°	6'					2.65220	90°	6'				
90 3 56.6	übrig	en s	sehr un	ruhig u	ınd un	deutlich.	2) Stark	er So	nner	ıschein.			
90 3 56.6					0.0	r t							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					36. 1	Listonmak	ℓ.						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90	3	56.6	+0	17.0	9.4388	2.53063	1 90	4	13.6			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				+0						_			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90	9					2.61819	90	9	_			
Die Signale unruhig und nicht ganz deutlich. 37. Wesamäkı. 90 11 23.2 +0 8.3 9.6889 2.73466 90 11 31.5 90 5 1.8 -0 0.8 9.6889 2.71203 90 5 1.0 90 9 36.6 +0 6.9 9.5405 2.76443 90 9 43.5 90 10 9.5 +0 7.8 9.5405 2.71496 90 10 17.3 90 5 12.2 +0 11.9 9.5405 2.53063 90 5 24.1 Sonnenschein. Der Heliotrop ruhig und deutlich. 38. Kilpimäki. 90 6 45.9 + 0 15.6 9.4189 2.57318 90 7 1.5 45.5 +0 15.6 9.4597 9.4189 2.76443 90 6 50.8 36.2 +0 10.8 9.4189 2.76443 90 6 50.8 47.0 90 5 52.1 +0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4	00	4			ž.		0.55004						
Die Signale unruhig und nicht ganz deutlich. 37. Wesamäkr. 90 11 23.2 $ +0 8.3 9.6889 2.73466 90 11 31.5 90 5 1.8 -0 0.8 9.6889 2.71203 90 5 1.0 90 9 36.6 +0 6.9 9.5405 2.76443 90 9 43.5 90 10 9.5 +0 7.8 9.5405 2.71496 90 10 17.3 90 5 12.2 +0 11.9 9.5405 2.53063 90 5 24.1 Sonnenschein. Der Heliotrop ruhig und deutlich. 38. Kilpimäki. 90 6 45.9 +0 15.6 9.4189 2.57318 90 7 1.5 45.5 +0 15.6 9.4597 1.1 90 6 40.0 +0 10.8 9.4189 2.76443 90 6 50.8 36.2 +0 10.8 9.4597 47.0 90 5 52.1 +0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4 90 6 50.8 47.0 90 5 52.1 +0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 5 59.4 90 $	90		_		,		2.55934	90	5				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	D. (,					i		18.4			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Die S	Signa	de unru	hig und	l nicht	ganz deut	tlich.						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					37.	Wesamäk).						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90	11	23,2	+0	8.3	9.6889	2.73466	90	11	31.5			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1		7			1					
90 5 12.2 $ + 0 $ 11.9 $ 9.5405 $ 2.53063 $ 90 $ 5 24.1 Sonnenschein. Der Heliotrop ruhig und deutlich. 38. <i>Kilpimäki</i> . 90 6 45.9 $ + 0 $ 15.6 $ 9.4189 $ 2.57318 $ 90 $ 7 1.5 45.5 $ + 0 $ 15.6 $ 9.4597 $ 1.1 90 6 40.0 $ + 0 $ 10.8 $ 9.4189 $ 2.76443 $ 90 $ 6 50.8 36.2 $ + 0 $ 10.8 $ 9.4597 $ 9.4189 2.80998 $ 90 $ 5 59.4			5										
Sonnenschein. Der Heliotrop ruhig und deutlich. 38. <i>Kilpimäki</i> . 90 6 45.9 $\begin{vmatrix} + & 0 & 15.6 & 9.4189 & 2.57318 & 90 & 7 & 1.5 \\ 45.5 & + & 0 & 15.6 & 9.4597 & & 1.1 \\ 90 6 40.0 & + & 0 & 10.8 & 9.4189 & 2.76443 & 90 & 6 & 50.8 \\ 36.2 & + & 0 & 10.8 & 9.4597 & & 47.0 \\ 90 5 52.1 & + & 0 & 7.3 & 9.4189 & 2.80998 & 90 & 5 & 59.4 \\ \hline$					2	_							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			•		- 1	_		90	5	24.1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Sonn	enscl	hein. I	er Heli	otrop r	uhig und	deutlich.						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					38.	Kilpimäki	•						
90 6 40.0 + 0 10.8 9.4189 2.76443 90 6 50.8 36.2 + 0 10.8 9.4597 47.0 90 5 52.1 + 0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4	90	6			15.6	9.4189	2.57318	90	7	1.5			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$													
90 5 52.1 + 0 7.3 9.4189 2.80998 90 5 59.4	90	6					2.76443	90	6				
	00	-					0.0000	00:	مع				
5/14 11 /3 11/150/ 1 5 11/1	90	3	54.9	+ 0	7.3	9.4189	2.00998	90	. 6	2.2			
34.9 7 0 7.3 9.4597 1 1 0 2.2 1			04.9	7 0	7.0	9.4097							

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	v	log s.
		39. Honkami	ilii.		
1835 Aug. 12	1 3 7	Kilpinoki I		- 23.50	4.31225
13			1	1- 23.89	
12		Wesamāki I			4.21431
13	1			- 15.54	
12	1	Lehtomäki II		- 78.46:	4.36311
1.	4 10		1	- 7h.411:	
11	3 7	Porshimiki H	. }	- 78.00:	4.38477
1.3	1 4 40	ļII		I 78.00:	
	1	40. Lehtomä	7.*		
10 1- 1 1-	100 101	Pilaljaaniki II		3-1-	1.10501
	4 0		7 09.39	-37.17	4.10001
17		Pörsänmäki II	1	-37.10	4.28854
1 18	1			-37.10	3.2000
17	1 1	Honkamäki II		- 37.09	4.36311
18	T	II		- 37.09	
		Wesamäki II		- 37.09	4.23695
18	4 0	ll		- 37.09	
		Pörsämmäki und He		undeutlich	. 2) Die
	-/				,
	20	41. Pörsänmä			1 10 000000
1535 Aug. 11	4 30	Honkamaki II	+ 35.00		4.3~277
111		Lehtomäki II		- 77.53	4.28854
1	1	Lentomaki II		-37.03 -37.03	4-50004
11				-37.03	
	121 30	Pihlajanmaki II	. 1	- 37.03 - 37.17	4.29051
1	4 30	- II		- 37.17	7.20001
1 2	21 30	Himāli II	:	- 37.19	4.15697
11	4 30	llimāki II		- 37.19	31,10001
	21 30	Kiwimäki II		- 37.19	4.23748
	4 30			- 37.19	200740
1		miki und limiki z	1	1	lajanm'il.i

Taf. I.

	leobacl nìthdis		Reduc	tion.	log b	$\log \frac{s}{2 r \sin n}$	Ze	Reduc	rte stanz.			
				39. <i>E</i>	Ionkamäk	i.						
(0:	12	23 .9	+ 0'	41.2	9.5535	2.50008	900	12	28".1			
		22.1	+ 0	4.2	9.6489				26.3			
1 40	9	34.7	+ 0	6.2	9.5535	2.71203	90	9	40.9			
1		31.0	+ 0	6.2	9.6489				37:2			
90	1-1	57.0	- 0	2.6	9.5535	2.86082	90	14	54.4			
		44.2	0	2.6	9.6489				41.6			
90	10	1.9	- 0	2.4	9.5535	1.88048	90	9	59.5			
	9	55.9	- 0	2.4	9.6489				53.5			
				40. 7	Lehtomäki							
90												
		6.7	+0	4.5	9.6403				11.2			
90	2	20.1	+0	3.6	9.5304	2.78625	90	2	23.7			
		17.3	+0	3.6	9.6403			~	20.9			
90	6	0.6	+0	3.1	9.5304	2.86082	90	6	3.7			
	5	52.5	+()	3.1	9.6403			5	55.9			
90	1	5.1	+0	4.1	9.5304	2.73466	90	4	9.5			
	3	55.3	+0	4.1	9.6403			3	59.4			
Signa	le d	eutlich,	Honkan	iáki au	sgenomme	n.						
				41. F	Põrsänmäk	ii.						
90	11	45.8	-0	2.2	9.6165	1 2.88048	1 90	11	43.6			
2		50.4	-0	2.2	9.6509				48.2			
90	15	2.9	+0	2.9	9.5048	2.78625	90	15	5.8			
1	14	57.3	+0	2.9	9.6165			15	0.2			
	14	53.6	+0	2.9	9.6509			1-1	56.5			
90	12	52.5	+0	2.8	9.5048	2.79721	90	12	55.3			
		54.6	+0	2.8	9.6165			~	57.4			
90	12	6.1	+0	3.9	9.5048	2.65467	90	12	10.0			
		2.7	+0	3.9	9.6165				6.6			
90	10	30.1	+0	3.2	9.5048	2.73518	90	10	33.3			
		28.5	+0	3.2	9.6165				31.7			
und l	Lehto	maki a	ber kaur	n sichtl	par. 2) D	ie Signale	zieml	ich c	leutlich.			

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	ν.	log s.
		42. Pihlajanm	aäki.		
1835 Aug. 30!	4h 10'	limäki l	1+66.59	— 18.59	4.26992
27	4 15	Pőrsänmäki I		18.55	4.29951
	4 10			- 18.55	
		Lehtomäki l		— 18.51	4.19501
30	4 10		lj	- 18.51	
		1) Starker S	onnensche	ein. 2 Sta	rker Son-
		43. Iimāki	•		
1535 Aug. 29	21 40	Sallisenmäki	1 + 68.77	- 18.66	4.08665
	3 30			- 18.66	
		Kiwimäki		- 18.59	3.86274
	3 30			<u> 18.59</u>	14500
		Pörsänmäki .		- 18.55	4.15097
	3 30		í	- 18.55 - 18.58	1.06000
		,	•		
1) Tri Pankte ruhig	iber III ausser	immel, etwas wind Porsanniki, weld	dig. Die her bei de	Signale n r letzten E	icht recht instellung
		44. Kiicimäi	hi.		
1835 Sept. 8	4 9	Pörsämnäki	1 + 72.01	- 18.55	4.23748
8	4 9		1	- 18.59	3.86274
13	2 30		I	- 18.59	
8			1	- 18.66	
S		Kulwenmaki		- 18.60	
13)	2 30	I		15.00	
1		45. Sallisenm	äki.		
1835 Sept. 13	3 20	Mintomäki I	1 + 66.58	36.69	4.02090
13	3 20	Naarasmäki I.	1	- 34.61	4.17680
13	3 20	Kulwenmäki I	1	— 37.20	3.98189

Taf. I.

-			chtete	D.J.	nction	log b.	log 8	i	Redu				
	Ze	nithd	istanz.	Redi	iction	10g 0.	log 2 r sin. 1	Z	enithd	listanz.			
	42. Pihlajanmäki.												
	90°	S	20".7	+ 0′	6".9	9.7291	2.76761	90°	8'	27".6			
	90	4	52.2	+ 0	6.5	9.7140	2.79721	90	4	58.7			
			56.7	+ 0	6.5	9.7291			5	3.2			
	90	9	39.6	+ 0	8.2	9.7140	2.69271	90	9	47.8			
			45.6	+ 0.	8.2	9.7291				53.8			
ne	ensc	hein	. Die	Signale	ziemlio	ch deutlich	1.						
					43	3. Iimäki.							
1	90	2	31.7	+ 0	11.0	9.6377	2.58434	90	2	42.7			
			28.7	+ 0	11.0	9.6906				39.7			
1 8	89	58	30.8	+ 0	18.5	9.6377	2.36043	89	58	49.3			
			29.6	+ 0	18.5	9.6906				48.1			
1 3	90	0	36.5	+ 0	9.4	9.6377	2.65467	90	. 0	45.9			
		_	42.4	+ 0	9.4	9.6906		0.0	_	51.8			
1	90	8	11.7	+ 0	7.2	9.6377	2.76761	90	8	18.9			
			und ruh		Pihlaj	anmäki n	icht zu seh	en.	Die	übrigen			
et	was	un	ruhig w	ar.									
					44.	Kiwimäki							
1	90	4	42.7	+0	8.3	9.7849	2.73518	90	4	51.0			
1 5	90	7	30.1	+ 0	19.7	9.7849	2.36043	90	7	49.8			
			29.9	+ 0	19.7	9.5823				49.6			
	00	3	41.3	+ 0	15.7	9.7849	2.45873	90	3	57.0			
1 5	90	2	53.8	+ 0	15.2	9.7849	2.47238	90	3	9.0			
		3	1.9	+ 0	15.2	9.5823				17.1			
					45. S	allisenmäl	ki.						
	(10	4	28.1	+0	7.7.	9.7068	2.51858	90	4	35.8			
	90	4	26.8	+0	5.7		2.67448	90	4	32.5			
1 9	90	3	16.6	+0	8.2		2.47958	90	3	24.8			

Taf. I.

Tag. Wah		v. v.	log s.
		6.58 - 37.19 - 37.19	3.96104
10 0			1
	Starker	Sonnenschein.	Die Si-
	46. Kulwenmäki.		
	5 Kiwimāki II+ 6		3.974119
21 0 3		18.59 18.66	3 08180
	01	- 18.66	0.00100
	5 Naarasmäki II	— 77.26 :	4.01594
21 0 3	0 1	17.31	
	1) Die Signale ruhi	g und ziemlich	deutlich.
	47. Naarasmäki.		
	8 Kulwenmäki 1 + 6	55.40 - 18.60	4.01594
	2	- 18.60	
17 3 3	8 Sallisenmäki 1 8 Murtomäki 1	18.66	
18 2 1		-18.34 -18.34	
	8 Lehtowaara I	- 18.31	
18 2 1	2	- 18.31	
	48. Murtomäki.		
1825 Oct 16:23 1	0 [Otanmäki I, + 68	8.90 (18.53)	4.00265
	0 1	- 18.53	
	0 Lehtowaara 1	- 18.31	3.96644
	0	18.31	4 0 1 1 7
	0 Naarasmäki 1	- 17.31	
16 23 1 16 23 8		- 18.66 - 18.66	4.02090
10 ~3	1	10.00	1

Taf. I.

	Beobac enithd	ehtete istanz.	Redu	ction	log b.	log s 2 r sin. 1"		Reduc	irte istanz.			
90°			+0′	8'.6		2.45873	900	4'	221.8			
90	8	13.5	+0	6.5	İ	2.58434	90	8	20.0			
gnale	e um	ruhig un	ıd unde	utlich.								
	46. Kulwenmäki.											
100	-	10	1 1 0	12.6		2.47238	90	5	46.0			
90	5	4.2 5.2	+0 + 0	12.6	9.7139	2.4/200	90	J	16.8 17.8			
90	4	52.5	+ 0	12,4	9.7139	2.47958	90	5	4.9			
30	-1	53.3	+ 0	12.4	8.9122	~.4/000	30	J	5.7			
90	2	20.2	- 0	3.7	9.7139	2,51362	90	2	16.5			
		9.8	+ 0	11.8	8.9122				21.6			
2) D	io S	ignale ru		dentl		'						
1-) 1	10 0.	ignate 1t	mg un	u ucuii.	10114							
				47. A	laarasmäk	ri.						
90	6	40.7	+ 0	12.1	9.7585	2.51362	00	6	52.8			
		52.8	+ 0	12.1	9.5417			7	4.9			
90	8	42.7	+ 0	8.4	9.7585	2.67445	90	8				
90	7	36.5	+ 0	11.0	9.7585	2.55740	90	7	47.5			
00		45.6	+ 0	11.0	9.5417	2 22020	60	-0	56.6			
89	57	46.8	+ 0	13.5	9.7585	2.46935	89	58	0.3			
		58.9	+ 0	13.5	9.5417	1			12.4			
				48.	Murtomäk	i.						
1 90	9	52.1	+0	13.5	9.2452	2.50032	90	10	5.6			
		57.7	+0	13.5	8.5565				11.2			
89	54	14.6	+0	14.7	9.2452	2.46412	80	54	29.3			
		16.1	+0	14.7	8.5565	1			30.8			
90	2	13.3	+0	12.1	9.2452	2.55740	90	5	25.4			
90	4	26.3	+0	12.9	9.2452	2.51858	90	7	39.2			
1		33.2	+0	12.9	8.5565				46.1			

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	v.	log s							
	49. Lehtowaara.											
		N rasmāki I	+ 66.26		3.97170							
16 15		Murtomäki		- 17.31 - 18.34	3.96644							
16		Otanmāki		- 18.34	4.18419							
16	1 0			- 18.53 - 18.53	4.10419							
15	1	Kiweswaara		- 18.44	4.33901							
	- 0	Rupukkawaara J		-18.44 -23.91	4.03998							
16				- 23.91								
		e deutlich und ruh ne Spur. 3) Das			veswaara,							
	ttiget grot	50. Otanmā		***************************************								
1537 Sept. 18	3 15	Kiweswaada II	+ 51.54	1 - 36.89	4.35038							
	1 40	Lehtowaara I	1	-36.89 -18.31	4.18419							
19	1 40			— 18.31								
18		Murtomäki		- 18.34 - 18.34	4.00265							
10	1 40	1) Kiwesw	taara anta		nachhar							
		51. Kiweswaa		ngs dilike	, macimer							
		Rokuawaara			4.42273							
	23 52 22 43	Puokiowaara		-26.31 -23.50	4.23442							
28	23 52	T HOKIOW dard	i	_ 23.50	4120442							
Sept. 8 Aug. 28	1 45	Teiriharju		-23.50 -34.93	4.21092							
28	23 52			- 34.93								
28	22 43	Saukkowaara		- 24.96	4.21687 [

Taf. I.

	eobac	htete stanz.	Redu	ction.	log b.	log s 2 r sin. 1"		Reduci enithdi	
			1		1				
				49. 1	Lehtowaar	a.			
90°	10'	9",6	1+0	14'.0	9.1456	2.46938	1 90°	10'	23''.6
		10.1	+0	14.0	9.3215			-	24.1
90	13	28.6	+0	13.9	9.1456	2.46412	. 90	13	42.5
		25.4	+0	13.9	9.3215				39.3
90	16	3.3	+0	8.4	9.1456	2.68186	90	16	11.7
1		4.5	+0	8.4	9.3215				12.9
90	7	55.2	+0	5.9	9.1456	2.83668	90	8	1.1
1		47.9	+0	5.9	.9.3420	, .		7	53.8
90	4	8.6	+0	10.4	9.1456	2.53765	90	4	19.0
		9.0	+0	10.4	9.3215				19.4
welch	ies	kaum	sichtbar	war.	2) Die 3	Signale der	utlich	und	ruhio.
									5
				-0	01				
				50.					
90	2	7.7	1+0	1.8	9.7160	2.84805	90	2	9.5
	1	51.3	+0	1.8	9.4303			1	53.1
89	57	30.4	+0	5.8	9.7160	2.68186	89	57	36.2
00	*0	16.2	1+0	5.8	9.4303				22.0
89	58	49.4	+0	8.9	9.7160	2.50032	89	58	58.3
]		47.7	+0	8.9	9.4303	i			56.6
ganz	unsi	chtbar.	2) Lel	ıto w aar	a undeutli	ch.			
				51 E	iweswaara				
90	18	5.2	1+0	4.1	9.2403	2.92039	90	18	9.3
00	30	8.6	+ 0	4.1	8.2570	2.02030	30	10	12.7
90	15	25.7	+ 0	6.7	9.2403	2.73207	90	15	32.4
	10	32.9	+ 0	6.7	8,2570	21,020,		10	39.6
		32.2	1+0	6.7	9.4099				38.9
90	2	56.0	1+0	5.2	9.2403	2.70857	90	3	1.2
	3	1.7	1+0	5.2	8.2570				6.9
90	3	53.6	+ 0	6.8	9.2403	2.71453	90	4	0.4
			1					33	

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	v	log s.
1838 Aug. 28		Saukkowaara *I	+ 66.50	- 24.96	4.21687
Sept. 8	1 45	I		- 24.96	
Aug. 28		Rupukkawaara 1		- 23.91	4.21022
	23 52	- ° I		-23.91	
Sept. 8	2 18	I		- 23.91	
8		Lehtowaara I		- 18.31	4.33901
8 8	2 18			- 18.31 - 18.53	4 25020
S		Otanmakt 1		-18.53	
9	~ 10		1	10.00	
		52. Rupukkowa	ara.		
1838 Aug. 10	4 11	Lehtowaara I	+ 93.33	- 18.31	4.03998
10		<u> </u>		- 18.31	
10		Kiweswaara 1		- 18.44	4.21022
10	1	C 11		- 18.44	1 40050
10	ī	Saukkowaara I		- 24.96 - 24.96	4.12258
10	4 43	1		•	
		Die Luft sehr	schlecht	mit abwe	chselndem
		53. Saukkowa	ara.		
1837 Sept. 30	0 45	Rupukkawaara I	+ 99.25	- 23.91	4.12258
30	1 15	I		- 23.91	
30	1	Kiweswaara l		- 18.44	4.21687
30				- 18.44	1 45040
30		Teiriharju l		- 34.93 - 34.93	4.15919
30	1 15	1	1	,	
				Stark	er Wind.
		54. Teiriharj	iu.		
1837 Oct. 5	23 15	Saukkowaara I	+ 131.2:	- 24.96	4.15919
5	23 49	J		-24.96	
5	23 15	Kiweswaara l	1	- 18.44	4.21092

Taf. I.

	eobacl nithdis		Reduc		log b	$\log \frac{s}{2 r \sin A'}$		Reduci nithdis			
900	3′	58".5	+ 0	6".8	8.2570	2.71453	90°	4'	5".3		
		53.2	+ 0	6.8	9.4099				0.0		
90	8	53.1	+ 0	7.1	9.2403	2.70788	90	9	0.2		
	9	2.9	+ 0	7.1	8.2570	1			10.0		
	8	56.7	+ 0	7.1	9.5286		1		3.8		
90	11	14.1	+ 0	5.9	9.4099	2.83668	90	11	20.0		
		14.5	+ 0	5.9	9.5286	7.00000	100	11	20.4		
90	17	51.1	+ 0	5.8	9.4099	2.84805	90	17	56.9		
	18	1.5	+ 0	5.8	9.5286	2.04000	30	18			
	10	1.0	1		r	1	1	10	7.3		
				52. R	upukkawae	ara.		1			
90	-5	0.1	1+0	18.4	9.6985	2.53765	90	5	18.5		
		5.4	+0	18.4	9.7512				23.8		
90	-5.	8.3	+0	12.4	9.6985	2.70788	90	5	20.7		
		4.5	+0	12.4	9.8016		,		16.9		
89	59	10.9	1 + 0	13.9	9.6985	2,62024	89	59	24.8		
		15.2	+0	13.9	9.7512			00	29.1		
Rege					sehr und	all'all			~~.		
litege		IXI W CS V	vaara pe								
				53. S	aukkowaa	ra.					
90	12	1.4	1+0	15.3	9.1261	1 2.62024	1 90	12	16.7		
	11	58.8	+ 0	15.3					14.1		
1 90	10	25.7	+ 0	13.2	9.1261	2:71453	90	10	38.9		
		23.9	+0	13.2	9.3479	1	1.00	10	37.1		
.90	5	17.4	+0	12.0	9.1261	2.65684	90	5	29.4		
		16.2	1+0	12.0	9.3479	2.00004	30	U	28.2		
D			•	1 42.0	1 0.0-1,0		•		20.2		
Bew	ölkte	r Himn	nel.								
	,			54.	Teiriharj	u.					
90	7	5.7	1+0	19.8:	1 -9.1533	1 2.65684	1 90	7	25.5:		
		3.3	+0	19.8:		2.00001	1	•	23.1:		
90	11	10.8	+0	18.6:		2.70857	90	11	29.4:		
1		20,0	1	20.0.			1 90	11	29.4:		

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	v.	log s.
1837 Oct. 5	23, 49	Kiweswaara I			
		Puokiowaara 1		- 23.50	4.19757
5	23 49			- 23.50	
		Die Höhe des S	ignalpunl	ets über de	m Instru-
		55. Puokiowaa	ra.		
1838 Sept. 241	3 50	Teiriharju I	1+115.53	5! - 34.931	4.19757
	23 13			- 34.93	
		Kiweswaara l		- 18.44	4.23442
	23 13			- 18.44	
24	3 50	Rokuawaara	li .	- 26.31	4.36687
	23 13			- 26.31	,
		Palowaara I		- 25.73	4.05440
25	23 13	J		1- 25.73	
		56. Rokuawaa	ra.		
1838 Oct. 10!	0 10	Halosenwaara 🧦 I]	+127.71	- 28.82	4.24032
14.		1		- 28.82	
10	0 10	Repokangas * Î		- 27.76	4.20959
14:		I		- 27.76	
10	0 10	Rewonpesämaa H		- 5.36	4.18994
14	22 15	H		_ 5.36	
10		Palowaara 1		25.73	4.26078
1		Puokiowaara 🔻 📗		- 23.50	4.36687
14				- 23.50	
14	22 15	Kiweswaara - 1		- 18.44	4.42273
		57. Palowaar	a.		
1020 1 411	1 3 ()	Dual ion range	1.100 (10)	02.50 !	105110
	19 39	Puokiowaara II	十125.90	-23.50 -23.50	4.00440
	0 31			- 23.50 - 23.50	
11		Rokuawaara ? I			4.26078

Taf. I.

	Beobac enithdi		Redu	ıction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin 1''}$		Reduc enithd	irte istanz.
90°	11	9".7	1+0'	18".6:	8.5335	2.70857	90°	11	28".3:
90	19	44.4	+0	18.4:	9.1533	2.69522	90	20	2.8:
		44.5	+0	18.4:	8.5335				2.9:
ment	ist 1	nur gese	- chätzt, 1	nicht ge	messen.	•			
					uokiowaa	ra.			
89	53	53.6	1+0	13.7	9,8087	2.69522	89	54	7.3
03	0.0	41.0	+ 0	13.7	9.1274	2.00022		53	54.7
89	59	31.2	+ 0	15.2	9.8087	2.73207	89	59	46.4
00	00	25.4	+ 0	15.2	9.1274	21.020,			40.6
90	11	51.9	+ 0	10.3	9.8087	2.86452	90	12	2.2
	• •	43.7	+ 0	10.3	9.1274			11	54.0
90	15	36.9	+ 0	21.3	9.8087	2.55205	90	15	58.2
	•	26.5	+ 0	21.3	9.1274				47.8
				56 B	Rokuawaar	· a			
									20.0
90	20	4.9	1+0	15.3	8.5177	2.73797	90	20	20.2
		14.2	+0	15.3	9.5618		0.0	4.0	29.5
90	18	3.3	+0	16.6	8.5177	2.70724	90	18	19.9
		4.3	+0	16.6	9.5618	0.00==0	0.0	4 -	20.9
90	15	29.0	+0	21.2	8.5177	2.68759	90	15	50.2
		21.5	+0	21.2	9.5618	0.77040	0.0	4.0	42.7
90	12	34.4	+0	15.0	8.5177	2.75843	90	12	49.4
90	8	39.7	+0	12.0	8.5177	2.86452	.90	8	51.7
00		30.1	+0	12.0	9.5618	0.00000	00	_	42.1
90	4	53.2	+0	11.1	9.5618	2.92039	90	5	4.3
				57. 1	Palowaara	<i>t</i> .			
89	53	58.6	+0	25.0	9.7506	2.55205	89	54	23.6
	53	59.3	+0	25.0	9.7199				24.3
	54	10.5	+0	25.0	8.7949				35.5
90	2	54.1	+0	15.1	9.7506	2.75843	90	3	9.2
				1					1

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	۲.	lig s
		Rokuawaara .	1 +128.90		4.20078
11	0 31 4 44 21 20	Rewonpesamaa I	H	$\begin{bmatrix} -26.31 \\ -3.50 \\ -3.50 \end{bmatrix}$	3.77859
13	-1 -0			nruhig. D	as Signal
		58. Rewonpesi		5	
1839 100 11	1 4 95	'Palowana		1 25.73	3.77859
. 21	5 0		-1	- 25.73	
1		Rokuawaara			4.15094
21	1 0		-1	-26.31 -26.31	
	4 25	Repokangas	ú	- 55.53	
21	5 27			- 55.53	
22	0 .0	1		1- 27.76	771
		as sehr undeutlich			
		struments angenon			· - 1115
		0			
		59. Repokan	igas.		
1839 Oct. 29	0 10	Rewonpesamaa	H +194.1	7]— 5.09	4.09563
20	0 40		H	- 5.09 - 52.62	1 4.20959
20	1	Rokuawaara		-52.02 -52.62	4.20000
26	0 40		II	- 52.62	
19	1	Halosenwaara	I	- 28.82	3.90751
20		Phthiseller	-1) 	- 28.82 - 26.91	3.04232
20			-1	- 26.91	
20	01 0 10)	11	- 26.91	1

Taf. I.

_									
	Beobac enithdi	htete stanz.	Red	nction	log b.	log 3 r sin. 1"		Reduc	rirte istauz.
90°	3	20″.8	1+0'	15".1	9.7199	1 2.75843	900	3	35".9
-	3	38.9	+0	15.1	8.7949				54.0
90	10	18.0	+ 0	56.1	9.7506	2.27623	90	11	14.1
		25.4	+ 0	56.1	9.5111				21.5
				D					
steht	nich	t auf de	m höch	isten Pl	latze des I	Serges.			
				58. Re	ewonpesän	ıaa.			
89	54	32.4	1 - 0	14.5	9.7511	2.27623	89	54	17.9
		40.5	- 0	14.5	9.8047				26.0
89	58	2.7	- 0	5.7	9.7511	2.68759	89	57	57.0
		9.9	- 0	5.7	9.8047	1		58	4.2
		12.1	- 0	5.7	9.6101		7	58	6.4
90	9	9.3	- 0	13.4	9.7511	2.59328	90	8	55.9
	8	51.2	- 0	13.4	9.8421				37.8
	9	7.0	_ 0	7.4	9.6101	!			59.6
stellu	ng	— In d	er zwe	iten Be	obachtung	von Repol	kangas	stir	nmt der
Dreie	ecksp	unkt is	t das	Centrun	n des Lin	nbuskreises	des a	nuf d	em Si-
				-0					!
				59.	Repokange	78.	5		-
90	1	38.1	1+0	40.8	8.6217	2.59328	90	2	18.9
		35.5	+0	40.8	9.2231				16.3
89	55	32.7	+ 0	23.5	9.8479	2.70724	89	55	56.2
		41.2	+0	23.5	8.6217			56	4.7
		47.6	+ 0	23.5	9.2231	i		56	11.1
90	7	34.7	+ 0	55.0	9.8851	2.40516	90	8	29.7
		31.7	+0	55.0	9.8479				26.7
90	2	42.3	+ 0	51.3	9.8851	2.43996	90	3	33.6
	2	30.0	+ 0	51.3	9.8479	1.6		3	21.3
1	3	20.3	+ 0	51.3	8.6217	- 1		4	11.6

Taf. I.

Tug	Wahre Zeit.	Beobachteter Pankt.	1.	٧.	leg s.						
00. Halosenwaara.											
1839 Sept. 29 21 27 [Linnunsilmä 1.+153.95]— 25.61 13.94303 29 23 20											
		Pitkäselkä l		-25.61 -26.91	4.06304						
	23 20	Repokangas I		- 26.91	2 (4)==4						
29 29	_	Repokangas I		$\begin{array}{c} -27.76 \\ -27.76 \end{array}$	3.90751						
29	21 27	Rokuawaara II		_ 53.02	4.24032						
Oct. 1	23 20 2 18			— 52.62 · — 52.62							
			1) Die Lu	ıft durchsi	chtig und						
		61. Pitkäselk	ã.								
1839 Sept. 31	1 18	Repokangas I	+116.74	- 27.76	3.94232						
	21 55 21 35	Halosenwaara I		-27.76 -28.82	4.06304						
6	21 55	I	1	- 28.82							
	21 35 21 55	Limunsilma 1		-25.61 -25.61	3.85223						
	1 15	Sarwillanges 1		- 27.00	3.94500						
	21 35 21 55			- 27.00 - 27.60							
		62. Linnunsili	nā.								
		Latonmäki * 1			4.11530						
19	2 54 3 59		0 1	- 25.72 - 26.72							
16	22 32	Sarwikangas I	1	27.60	3.95371						
19	2 54	I Pitkäselkä I		- 27.00 - 20.01	3.85223						
19	2 54			- 20.91	0.00,220						
19	3 59	I	!	- 26.91	1						

Taf. I.

	Beobac enithd	htete istanz.	Redu	ection.	log b.	log s 2 r sin. 1"		Reduc		
60. Haloseuwaara.										
900	7	35".9	+0'	39".3	9.6560	1 2.44068	90°	S'	15'.2	
		43.3	+0	39.3	9.0736				22.6	
90	1	5.2	+0	29.5	9.6560	2.56068	90	1	34.7	
		6.9	+0	29.5	9.0736				36.4	
89	57	47.5	+0	42.0	9.6560	2.40516	89	58	29.5	
		55.1	+0	42.0	9.0736				37.1	
80	54	37.4	+0	15.7	9.6560	2.73797	89	54	53.1	
		40.3	+0	15.7	9.0736				56.0	
		43.9	+0	15.7	9.6151				59.6	
ruhig	ruhig. 2) Die Lust unruhig.									
				61.	Pitkäselkä	•				
90	3	21.2	+ 0	27.3	9.2614	2.43996	90	3	48.5	
		22.0	+ 0	27.3	9.4793				49.3	
90	8	25.8	+ 0	20.4	9.5344	2.56068	90	8	46.2	
		17.5	+ 0	.20.4	9.4793	,			37.9	
90	13	41.2	+ 0	34.4	9.5344	2.34987	90	14	15.6	
		35.9	+ 0	34.4	9.4793				10.3	
90	13	1.0	+ 0	27.2	9.2614	2.44264	90	13	28.2	
	13	6.1	+ 0	27.2	9.5344				33.3	
	12	53.4	+ 0	27.2	9.4793				20.6	
				62. Li	nnunsilme	ä.	,			
90	8	29.3	+ 0	19.2	9.3652	2.61594	90	8	48.5	
		24.5	+ 0	. 19.2	9.6679				43.7	
		20.6	+ 0	19.2	9.8054				39.8	
90	4	19.4	+ 0	27.5	9.3652	2.45135	90	4	46.9	
]		15.8	+ 0	27.5	9.6679				43.3	
89	51	41.3	+ 0	35.0	9.3652	2.34987	89	52	16.3	
		42.8	+ 0	35.0	9.6679				17.8	
1		33.8	+ 0	35.0	. 9.8054			0	8.8	
								3-	ŧ	

Taf. I.

	Vahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	v	log s.
1839 Sept. 16 25		Halosenwaara * 11 -	+119.50		3.94303
	2 54	1		-28.82	
191	3 59	1	1	- 28.82	
				1) Hale	senwaara
		63. Sarwikange	as.		
1841 Oct. 271	0 35	[Pitkäselkä I]-	+120.75	26.91	3.94500
29 2				- 26.91	
	0 35	Linnunsilmä 1		- 25.61	3.95371
29 2			1.400.00	- 25.61	
	0 25		+126.00	0.00	
1	1 5	VI VI	1.100 = 5	0.00	4 (000)=
1841 Oct. 27 29 2	0 35	Latonmäki II	+120.75	-51.45 -51.45	4.18285
	3 33 0 35	Hypenmäki I		-9.40	4.30302
29 2		Trypenmaki I		9.40	4.00002
	0 35	Isoniemi I		25.15	4.10833
	3 33			- 25.15	1110000
	0 25	Länkisenkangas V	+126.00		3.52431
	1 5	V		0.00	
26	0 25	Uleab. Glockenthurm		0.00	3.55026
	1 5			0.00	
	0 25	Intionkangas V		0.00	3.47905
26]	1 5	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		0.00	
		Auf Uleaborgs	Glocken	thurm ist	der Visir-
		Intionkangas			
1845 Juli 30 2		Sarwikangas V	+ 81.66		3.47894
	2 26	V		0.00	
30 2		Länkisenkangas V		0.00	3.30135
31 2	2 26	V j		0.00	

Taf. I.

2		istanz.	Red	uction	log b.	$\log \frac{s}{2 r \sin t}$	Z	Reducenithd	cirte istanz.	
89°	59	8".5	+0	12°.8	9.3652	2.44068	89°	59'	21".3	
		16.5	+0	27.8	9.6679				44.3	
1		9.6	+0	27.8	9.8054	I			37.4	
sehr undeutlich.										
63. Sarwikangas.										
89	53	59.4	+ 0	28.6	9.1549	2.44264	89	54	28.0	
		52.2	+0	28.6	9.0644				20.8	
90	3	4.5	+0	28.4	9.1549	2.45135	90	3	32.9	
	2	56.8	+ 0	28.4	9.0644	1			25.2	
	2	54.1.	+ 0	37.7	8.8575				31.8	
	` 2	53.8	+ 0	37.7	9.2677				31.5	
90	8	36.0	+ 0	12.2	9.1549	2.68049	90	8	48.2	
		22.2	+0	12.2	9.0644		1		34.4	
90	8	59.0	+0	14.9	9.1549	2.80066	90	9	13.9	
	9	0.0	+ 0	14.9	9.0644				14.9	
90	6	49.9	+0	20.0	9.1549	2.60596	90	7	9.9	
		46.2	+0	20.0	9.0644				6.2	
90	12	49.8	+ 1	41.3	8.8575	2.02195	90	14	31.1	
		47.1	+ 1	41.3	9.2677				28.4	
89	50	59.5	+ 1	35.4	8.8575	2.04790	89	52	34.9	
		57.6	+ 1	35.4	9.2677				33.0	
90	13	1.8	+ 1	52.4	8.8575	1.97669	90	14	54.2	
		1.1	+ 1	52.4	9.2677				53.5	
punk	t im	mer die	Mitte o	des Krei	utzes gew	esen.				
				Inti	onkangas.					
-							00	40	1.5	
89	47	2.4	+1	12.9	9.2156	1.97658	89	48	15.3	
	46	55.5	+1	12.9	9.2436	4.70000	00		8.4	
90	0	29.2	+1	49.7	9.2156	1.79899	90	2	18.9	
		28.1	+1	49.7	9.2436				17.8	
									1	

Taf. I.

Tag. Wahre Beobachteter Ponkt i.	۲.	he s
1845 Juli 30 22 31 Uleab. Glockenth. [+ 81.66]	0.00	2.74435
31 22 26	0.00	1
	- 31.0	3.11502
31,22 26	- ,5.20	~-
7 - 7 - 7	1) Di	ie Sign .
Länkisenkangas.		
1845 Sept. 29 23 0 Klemola M + 80.55	+ 2.40	2.00008
	1 2.10	
29 23 0 Oritkari V	0.00	3.18231
29 23 35	0.00	0.0000
29 23 0 Intionkangas V	0.00	3.30107
29 23 35	0.00	2 -0101
29 23 0 Sarwikangas V 29 23 35	0.00	3.52431
Orithari. (Nordwestl. Ende der Ba	sis).	
[1845 Aug. 17] 4 26 h im a - V + Social	0.00	1.00500
17 4 50	0.00	
17 4 26 Länkisenkangas V	0.00	3.15131
17 4 56 V 17 4 26 Klemola II	0.00	
		3.17.763
17 4 56	- 35.70	
	• 1	Die Laft
Klemola. (Südöstl. Ende der Bas		
[1845 Aug. 20] 2 50 Orithari VI+ 86,501	0.00	1.177
20 3 S	0.00	
20 2 50 Linkismling v		2.00000
26 3 8 ——VI	0.00	
64. Lalonmāki.		
1844 Juni 27/21 7 Hypenmäki 1/+128.99;	- 9.40	1.20691
	- 18.80	
	-	

Taf. I.

	Beobac enithdi	stanz.	Redu	Reduction log h					cirte distanz.	
87°	42	13″.1	+ 6'.	35".5	9.2156	1.24199	87°	45'	48″.6	
		11.5	+ 6	35.5	9.2436				47.0	
90	18	24.4	+ 1	13.8	9.2156	1.72616	90	19	38.2	
		23.3	+ 1	13.8	9.2436				37.1	
selir	unde	eutlich.								
Länkisenkangas.										
91	12	41.8	+ 9	20.0	9,2510	1.09772	91	22	1.8	
		41.9	+ 9	20.0	8.8742				1.9	
90	17.	20.1	+ 2	22.3	9.2510	1.67995	90	19	42.4	
İ		16.6	+ 2	22.3	8.8742				38.9	
89	57	52.0	+ 1	48.3	9.2510	1.79871	89	59	40.3	
		51.1	+ 1	48.3	8.8742				39.4	
89	47	30.5	+ 1	4.7	9.2510	2.02195	89	48	35.2	
		32.0	+ 1	4.7	8.8742				36.7	
	Orithari. (Nordwestl. Ende der Basis).									
89	40	16.1	+ 2	17.7	9.7411	1.72573	89	42	33.8	
		11.1	+-2	17.7	9.7875				28.8	
89	39	24.0	+ 2	33.0	9.7411	1.67995	89	41	57.0	
		19.1	+ 2	33.0	9.7875				52.1	
90	2	17.5	+ 1	30.9	9.7411	1.67527	90	3	48.4	
		7.1	+ 1	30.9	9.7875	Į-			38.0	
unru	hig.									
		1	(lemola.	. (Südö	stl. Ende	der Basis)				
89	55	58.9	1+2	34.5	9.5744	1.67527	89	58	33.4	
	56	2.2	+2	34.5	9.6181			30	36.7	
88	28	25.5	+9	44.0	9.5744	1.09772	SS	38:		
		29.6	+9	44.0	9.6181				13.6	
				64.	Eatonmäk	ii.				
90	3	50.4:	+0	20.0	9.4411	2:70445	90	4	10.4:	
	4	4.6:	+0	18.4	9.3848	1,	30	7	23.0:	
				2012	1		I		20.00	

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i	۲.	log s					
	21° 7 21° 28	Sarwikanges		-27.60	4.18285					
27	21 7	Linnunsilmå I		-25.61 -25.61						
Die Leiden B	Die beiden Besbachtungen von Hypenmäki geben eine um 15" grös-									
		65. Hypenmä	iki.							
14 14 15	3 11 3 11 3 10 3 11	Ulkogruumi I Isoniemi I Sarwikangas II Latonmäki II		- 9.40: - 25.15 - 114.60: - 114.60: - 102.75 - 102.75	4.07667 4.30302					
Die L	Die Länge des runden Visirbalkens auf Ulkogrunni ist im Länge des runden Visirbalkens auf Hypenmiki. Der Fehler dieser 66. Isoniemi.									
		Sarwikangas * II			4.10833					
Juni 25 Juli 5	0 27 20 1	Hypenmäki I		- 55.20 - 9.40 - 9.40 - 9.40	4.07667					
	0 27 4 28	Ulkogrunni I		9.40:9.40:						
	0 27 20 1 4 28		1	8.578.578.57						
1 / Ber grossen Strahl		Ulkogrunni etwas o ung behaftet.	lunkel. 2)	u. 3) Di	e Zenith-					

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz.		Reduction.		log b	$\log \frac{s}{2 r \sin t'}$	Reducirte Zenithdistanz.			
90°	4	3".2 5.6	+0'+0	17".9 17.9	9.4411	2.68049	90°	4	21".1 23.5
90	2	29.9 33.9	+0+0	21.2	9.4411 9.3848	2.61594	90	2	51.1 55.1

sere Ablesung für den Ort des Zeniths als die übrigen Beobachtungen.

65. Hypenmäki.

90	9	15.8	1+1	4.1	9.6908	2.76775	90	10	19.9
90	4	40.1	+ 1	36.5	9.6908	2.76775 2.57430 2.80066 2.70445	90	6	16.6
90	7	43.1	+ 0	45.3	9.6908	2.80066	90	8	28.4
		27.5	+0	45.3	9.6929				12.8
90	7	32.0	+ 0	58.5	9.6908	2.70445	90	8	30.5
		22.9	+0	58.5	9.6929				21.4

Tagbuche nicht angegeben worden. Sie ist angenommen gleich der Anahme kann etwa 2 Zoll sein.

66. Isoniemi.

9
8
0
9
4
0
5
1
()

distanzen von Ulkogrunni und Rontti sind mit einer ausserordentlich

Taf. I.

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	٧.	log s.					
67. Ulkogrunni.										
1841 Aug. 5		Kiwalo	[] + 72.33	- 16.05 - 16.05	4.40052					
5		Rontti		71.55 71.55	4.00131					
5 5	2 50	Ismiemi II Hypenryki I	1	113.70: 9.40						
5	0 0			- 9.40 - 9.40						
	1 5.0	Wegen zu	geringer l		war Ajos					
		68. Rontti.			ĺ					
1842 Juli 28 28		Isoniemi I	1+385.03	- 25.15 - 25.15	4.01928					
	0 6	Ulkogrumi l			4.00131					
28	2 6	Kiwalo II	6	- 66.53						
	Isoniem	i Signal war kaum	sichtbar,	und Kiwa	lo konnte					
		69. Kiicalo.								
1842 Aug. 10 17	3 1 3 45	Rontti II	+ 89.68	71.19 71.19	4.44591					
17	4 0 3 45	Ulkogrunni ; II		- 85.40: - 85.40:	4.40052					
9	4 0	Ajos	,	- 25.28	4.14286					
10 17	3 1 3 45			-25.28 -25.28	102					
10	3 1	Kemi Kirche			4.03405					
10	3 1	Kallinkangas I		- 25.00 - 25.00	4.05405					

Taf. I.

	Beoba Zenithd	chtete istanz.	Red	uction.	log b.	log s 2 r sin. 1	7	Reduc Zenitho	cirte listanz.
				67. 7	Ulkogrunn	i.			
909	1	3".6	1+0		9.5073	2.89813	900	1'	
90	5	$\frac{3.0}{27.9}$	+ 0 + 0	6.0	9.5908	0.20000	90	-	9.0
90	9	29.0	+ 0	0.2	9.5908	2.49893	90	5	28.1 29.2
90	5	16.8	-0	6.9	9.5073	2,70409	90	5	9.9
90	5	49.0	+ 0	9.1	- &	2.76775	90	5	58.1
		48.3	+ 0	9.1	_ co			5	57.4
		54.3	+ 0	9.1	9.5073	l	1	6	3.4
den 5 August gar nicht sichtbar.									
				68	. Rontti.				
89	58	6.7	+1	32.5	8.0339	2.51691	89	59	39.2
		12.0	+1	32.5	9.3561				44.5
90	1	38.4	+ 1	40.7	8.0339	2.49893	90	3	19.1
90	2	37.0 51.3	+1+0	40.7	9.3561 9.3561	2.94353	90	3	17.7 22.0
				30.7-			90	9	22.0
auch	nich	t ein z	weites 1	Mal beo	bachtet we	erden.			
				69.	Kiwalo.				
90	22	4.8	+ 0	1.8	9.5465	2.94353	90	22	6.6
		1.0	+ 0	1.8	9.6623				2.8
90	21	27.0	+ 0	0.5	9.6656	2.89813	90	21	27.5
90	0.2	14.0	+ 0 + 0	0.5 12.5	9.6623 9.6656	2.64047	00	0.3	14.5
90	23	10.7	+ 0 + 0	12.5	9.0050	2.04047	90	. 23	21.2 23.2
		2.8	+ 0	12.5	9.6623				15.3
90	21	32.3	+ 0	22.3	9.6656	2.53226	90	21	54.6
		30.3	+ 0	22.3	9.5465				52.6
90	20	42.8	+ 0	15.3	9.6656	2.55229	90	20	58.1
		42.8	+ 0	15.3	9.5465	1		2.5	58.1
								35	,

Tag. Wald . Zett.	Bedla liteter Pankt.	i	L.	leg s.						
1542 Aug. 9 4 0	l'orne (Kirche	+ 50.03		4.29959						
	Der Visig unkt auf Kemi Kirche ist das obere Ende des Kreut-									
der Thurmspitze, wor										
	70. Ajos.									
1842 Sept. 2 22 48	Kokkomäki I	+126 86 -		4.09586						
2 23 25	Tornea Kirche	-	- 25.50	4.11900						
2 23 25 1										
2 22 48 2 23 25	Kallinkangas I	-	-25.00 -25.00	3.93690						
14 21 25			- 25.00 p							
2 22 48	Kemi Kirche			3.91744						
2[23 25] 2 22 45	Kingle I		— 16.05	7.4.1960						
14 21 25		l -	-16.05	4.14256						
15 2 51		il i-	- 16.05							
	Ulkogrunni II			4.23847						
15 2 51	1		— 18.50:							
1) Kiwalo unde einer ungewöhnlich	utlich. 3 u. 4)									
niths. — Die Visirur										
	71. Kallinkan									
1842 Oct. 13 2 37		I +127.10	- 16.05	14.05465						
13 2 52			- 16.05	10723						
	Kemi Kirche		05.50	2.50236						
13 0 50 13 2 37	Ajos		-25.28 -25.28	3.93690						
	Kokkomäki		-25.50	3.91471						
13 2 37		1	- 25.50							

Taf. I.

Beobachtete Zenithdistanz.			Reduction.		log b	log g 2 r sin.1	Reducirte Zenithdistanz.							
90°	18	12″.0 13.0	+0'+0	12".1 12:1	9.6656 9.5465	2.79720	90,	18	24°.1 25.1					
zes,														
steht.														
70. Ajos.														
90	5	23.1	1+0	21.7	9.2249	2.59647	90	5	44.8					
		23.6	+0	21.7	8.9091				45.3					
90	1	57.3	+0	25.9	9.2249	2.61661	90	2	23.2					
00	2	0.6	1+0	25.9	8.9091	1 0 40 454	00		26.5					
89	56	58.0 49.5	+0	31.7 31.7	9.2249 8.9091	2.43451	89	57	29.7					
		39.3	+0	31.7	9.6014				21.2					
89	56	52.2	+0	41.2	9.2249	2.41505	89	57	33.4					
1 30	•	50.4	+0	41.2	8.9091	2.41000	00	0.	31.6					
89	49	10.5	+0	21.4	9.2249	2.64047	89	49	31.9					
	48	47.6	+0	21.4	9.6014				9.0					
	48	52.5	+0	21.4	9.6446	}			13.9					
90	7	57.6	+0	16.8	9.6014	2.73609	90	8	14.4					
		27.5:	1+0	16.8	9.6446			7	44.3:					
	Punkt, welcher mehr als 14 Tage unter dem Horizonte blieb, ist bei													
te Beobachtung von Ulkogrunni giebt einen sehlerhaften Ort des Ze-														
71. Kallinkangas.														
89	48	30.7	1+0	26.3	9.7344	2.55229	89	48	57.0					
03	30	29.0	+0	26.3	9.7740	2.00229	09	40	55.3					
89	59	11.2	+8	58.5	9.2352	1.29997	90	8	9.7					
90	9	42.2	+0	31.6	9.2352	2.43451	90	10	13.8					
		42.7	+0	31.6	9.7344				14.3					
90	9	21.7	+0	33.2	9.2352	2.41232	90	9	54.9					
1		17.6	1+0	33.2	9.7344	1			50.8					

Tag.	Wahre Zeit.	Beobachteter Punkt.	i.	۲.	lig s.							
		Torneå Kirche	+127.10		3.93553							
Die este Beschung von Tornel Kirche gieht einen um S die Mitte des Kreutzes, an Tornel Kirche das übere Ende des unte-												
72. Kokkomāki.												
		Tornel Kirche	+136.93		2.77754							
		Kiwalo II		-32.10 -32.10	4.29118							
	_	Kallinkangas I	1	-32.10 -25.01	3.91471							
		Kemi Kirche		- 25.00	3.04253							
Oct. 1	3 0											
Sept. 26 Oct. 1	3 53 3 0		1	- 25.28 - 25.28	4.00556							

Taf. I.

	Beobachtete Zenithdistanz.		Reduction		log b.	log s 2 r sin. 1'	Z	Reduc	irte istanz.
90,	3′	57".9 54.9	+0'+0'	39°.6	9.2352 9.7344	2.43314	90°	4	37".5 34.5
		nden Oi ren The				rpunkt an l	Kemi	Kirc	he war
				72.	Kokkomäk	i.			
88	35	42.4	+10	14.3		1.27515	88	45	56.7
89	56	26.8 23.4	+ 0	14.4	9.8239 9.7336	2.78879	89	56	41.2 37.8
1 89	56	42.2	+ 0	36.6	9.8239	2.41232	89	57	18.8
		37.5	+0	36.6	9.7336				14.1
89	57	43.0	+ 0	42.0	9.8239	2.44014	89	58	25.0
90	5	42.6 35.7	$+0 \\ +0$	42.0 23.9	9.7336 9.8239	2.59647	90	5	24.6 59.6
		25.3	+ 0	23.9	9.7336	2.00017		0	49.2

Nummer.	Gegenseitig beobachtete Punkte.	Gewicht
1 2 3	Tuskas — Kokkowuori	1 1/13/1
4 5 6	Korsmalm — Linnankallio	
7 8 9	Huhtmar — Emmeneures	1 1
10 11 12	Huhtmar — Messilä) -
13	Emmeneures — Messilä	21
15 16	Messilä — Wahteristo	7
17 18	Messilä — Kurhila	
19 20 21	Wesiwehmais — Kurhila	1 1 2
22 23	Kurhila — Soitinkallio	21
24 25	Kurhila — Wirmala	1
26		21 22
27 28	Soitinkallio — Wiljaminwuori Wirmala — Kylmäkangas	1
29 30	Wiljaminwuori — Kylmäkangas	5 12 51
31	Wiljaminwuori — Tammimäki	1 1
32	Kylmäkangas — Kammio	1

G. leichungen.	0.86 s 2 r sin. 1"
$+$ 3.7 = 2.58 α' + 0.86 β'	3′ 41″.9 4 11.8
+ $0.6 = 2.93 \ \alpha' + 0.92 \ \beta'$	1 1110
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 53.6 3 53.3
$+$ 7.3 = 2.71 α' + 1.38 β'	4 26.3
$+ 18.8 = 3.10 \ a' + 2.75 \ \beta' \dots \dots$	6 10.3
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	4 27.7
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 19.4
$+ 2.4 = 3.19 \ \alpha' \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	4 34.0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 20.1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 48.3 5 15.6
$+$ 2.8 = 3.67 a' + 1.83 β'	5 30.1
$+$ 3.8 = 3.84 α' + 2.07 β'	6 23.5
$+ 0.2 = 3.70 \alpha' + 1.49 \beta' \dots$	5 17.8
+ $2.9 = 4.25 \ \alpha' + 1.59 \ \beta'$	6 5.3 4 39.3
$+$ 2.0 = 3.61 α' + 1.01 β'	5 10.1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 40.6 4 2.3

Nummer.	Gegenseitig beobachtete Punkte.	Gewicht.
33	Kylmäkangas — Rappuwuori ; ;	1
34	Kammio — Rappuwuori	1
35	Kammio — Tammimäki	
36	Tammimäki — Puolakka	2 3
37		6
35	Tammimäki — Waterwuori	51
39	Puolakka — Waterwuori	200
40	Puolakka – Jywäskylä	43
41	Waterwuori - Jywäskylä	2173
42	Puolakka — Jywäskylä	espo Glassians sparage sipassians son 🕶
43	Waterwuori — Ruuhimäki	23
44	Jywäskylä - Ruuhimäki	
4.5	Ruuhimäki — Laajawuori	1
46	Ruuhimäki — Multamäki	1
47		1
47	Multamäki — Ohimäki	
49	Multamäki — Silmutmäki	1
50	Multamäki — Ilamäki	1
51	Ohimäki — Silmutmäki	1
52	Silmutmäki — Ilamäki	1
5.3	Silmutmäki — Listonmäki	1
5-1	Silmutmäki — Wesamäki	1 2
55	Silmutmäki — Kilpimäki	1
5 i	Ilamäki — Listonmäki	1 600213603
57	Listonmäki Wesamäki	3
58	Wesamāki — Kilpimāki	33
59	Wesamaki — Kilpimaki	2
60	VV esamäki — Lehtomäki	3
61	Kilpiniåki — Honkamåki	1
62	Honkamäki — Lehtomäki	I
63	Honkamaki — Porsammaki	1
64	Lehtomäki — Pörsänmäki	5

i	Gleichungen.	0.86 s
	3	2 r sin. 1"
1+	$3''.4 = 3.33 \alpha' + 1.40 \beta'$	4' 46".2
1+	$0.2 = 3.10 \ \alpha' + 0.82 \ \beta'$	4 26.7
-	$1.4 = 3.51 \ \alpha' + 1.42 \ \beta'$	5 2.0
1+	$6.3 = 4.26 \ \alpha' + 1.10 \ \beta'$	6 6.3
+	$9.9 = 4.26 \alpha' + 2.40 \beta'$	
1+	$3.9 = 4.32 \ \alpha + 1.43 \ \beta $	6 11.9
+	$5.8 = 4.49 \ \alpha' + 2.60 \ \beta' \dots \dots$	6 26.1
1+	$6.3 = 5.35 \ \alpha' + 2.99 \ \beta' \ \dots \ \dots$	7 39.8
1+	$4.3 = 3.32 \ \alpha' + 1.99 \ \beta' \ \dots \ \dots$	4 45.4
1+	$6.2 = 4.04 \ \alpha' + 2.21 \ \beta'$	5 47.0
+	$3.7 = 3.12 \ \alpha' + 1.89 \ \beta' \dots \dots$	4 28.7
+	$8.4 = 4.06 \ \alpha + 2.33 \ \beta$	5 49.4
+	$6.8 = 4.28 \ \alpha + 2.23 \ \beta$	6 7.7
+	$13.5 = 5.23 \ \alpha' + 1.36 \ \beta' \dots \dots$	7 29.7
+	$15.2 = 5.23 \ \alpha' + 3.25 \ \beta' \ \dots$	2 70 2
+	$10.4 = 3.47 \ \alpha' + 1.49 \ \beta' \dots \dots$	4 58.4
1+	$10.2 = 5.07 \ \alpha' + 1.17 \ \beta' \ \dots \ \dots$	7 16.1
1+	$4.6 = 4.49 \ \alpha' + 1.15 \ \beta' \ \dots \ \dots$	6 26.1
+	$0.2 = 2.87 \ \alpha' + 1.03 \ \beta' $	4 6.7 6 20.0
+		5 57.0
++++	$1.5 = 4.15 \ \alpha' + 0.83 \ \beta' \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ \dots \ $	7 26.1
+	$2.4 = 3.74 \ \alpha' + 0.81 \ \beta'$	5 21.9
T	$0.8 = 3.62 \ a' + 0.82 \ \beta'$	5 11.8
+	$1.2 = 3.39 \ \alpha' + 1.00 \ \beta$	4 51.8
+	$3.8 = 5.81 \ \alpha' + 1.81 \ \beta'$	8 20.0
+	$3.1 = 5.15 \ \alpha + 2.29 \ \beta$	7 23.1
1	$1.2 = 5.43 \ \alpha' + 2.38 \ \beta'$	7 46.8
+	$1.2 = 6.46 \ \alpha' + 2.18 \ \beta' $	9 15.2
1+	$0.3 = 7.26 \ \alpha' + 2.87 \ \beta' \dots \dots$	10 24.2
+	$1.9 = 7.59 \ \alpha' + 3.16 \ \beta' \ \dots \ \dots$	10 53.1
+	$4.1 = 6.11 \ \alpha' + 2.39 \ \beta' \dots \dots$	8 45.7
1		1

Nummer.	Gegenseitig beobachtete Punkte.	Gewicht.
6.5	Lehtomäki — Pihlajanmäki	1
66	Pörsänmäki — Pihlajanmäki	1
67	Pörsänmäki — limäki	1
68	Pörsänmäki — Kiwimäki	9 17
69	Pihlajanmāki — limāki	į
70	limāki — Sallisenmāki	46.05
71	Kiwimāki — Sallisenmāki	i
72	Kiwimaki - Kulwenmaki	1
7.3		
74	Sallisenmäki — Kulwenmäki	3
75	Sallisenmäki — Naarasmäki	1 1
76	Sallisenmäki – Murtomäki	3
77	Kulwenmäki — Naarasmäki	1 1
7~		1
79	Naarasmäki — Murtomäki	23
80	Naarasmäki – Lehtowaara	1
81	Murtomaki — Lehtowaara	1
82	Murtomäki — Otanmäki	1
83	Lehtowaara — Otanmäki	2 2
84	Lehtowaara — Kiweswaara	emens 1
85	Lehtowaara — Rupukkawaara	1
86	Kiweswaara — Saukkowaara	1
87	Kiweswaara — Puokiowaara	1 2
85	77.	171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
89	Kiweswaara — Rokuawaara	3
90	Rupukkawaara — Saukkowaara	1
91	Puokiowaara — Rokuawaara	1
92		1 3
93	Puokiowaara — Palowaara	2
94	7) . 1) .	-
95	Rokuawara — Palowaara	70.00
96	Rokuawaara — Rewonpesamaa	3

Taf. II.

Gleichungen 0.86 s 2 r sin. 1 - 0".1 = 4.93 α' + 2.25 β' 7 3".8 + 0.5 = 6.27 α' + 2.80 β' 8 59.1 - 0.3 = 4.52 α' + 1.87 β 6 28.3 + 5.6 = 5.44 α + 2.65 β' 8 23.6 - 0.4 = 3.84 α' + 1.86 β' 8 23.6 - 0.4 = 3.84 α' + 1.61 β' 4 7.3 - 2.0 = 2.98 α' + 1.61 β' 4 7.3 - 2.2 = 2.97 α' + 0.69 β' 4 15.2 + 2.3 = 2.97 α' + 1.67 β' 4 19.5 + 4.6 = 4.73 α' + 2.56 β' 4 19.5 + 4.6 = 3.30 α' + 1.01 β' 4 40.6 + 5.9 = 3.26 α' + 1.78 β' 4 40.6 + 5.9 = 3.26 α' + 1.78 β' 4 13.4 + 0.7 = 3.16 α' + 1.78 β' 4 13.4 + 1.7 = 3.61 α' + 1.67 β' 4 10.4 - 0.7 = 3.16 α' + 0.79 β' 4 10.4 - 0.7 = 3.16 α' + 0.79 β' 4 56.6		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Gleichungen.	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 r sin. 1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$0^{\circ} 1 - 4.03 \text{ a}' + 2.25 \text{ b}'$	7' 3" 8
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 2014
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 4.4 = 3.02 \ \alpha + 1.22 \ \beta + \dots$	- 4 19.5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 4.6 = 4.73 \ \alpha' + 2.56 \ \beta' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 4.6 = 3.30 \alpha + 1.01 \beta \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$-2.6 = 3.26 \ \alpha' + 0.70 \ \beta' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+$ 5.9 = 3.26 α' + 1.78 β'	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 1.7 = 3.61 \alpha + 1.15 \beta \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	5 10.4
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4 13.4
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4 10.4
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4 32.2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 13.4 = 6.87 \alpha' + 1.78 \beta' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 6.4 = 3.45 \alpha' + 1.22 \beta' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$+ 6.6 = 5.18 \alpha' + 1.02 \beta$	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		7 44.1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•	10 29.5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$-4.1 = 5.73 \ \alpha_i + 0.93 \ \beta_$	$-5.0 = 3.50 \alpha + 0.35 \beta$	5 6.6
$-4.1 = 5.73 \alpha, +0.93 \beta, \dots $ 8 13.1	$-4.6 = 3.50 \alpha + 2.08 \beta$	0 40
	$-4.1 = 5.73 \ \alpha_1 + 0.93 \ \beta_2 + 0.93 \ \beta_3 + 0.93 \ \beta_4 + 0.90 \ \beta_4 + 0.90 \ \beta_5 + 0.90 \ \beta_6 + 0.90 \ \beta_$	
$+$ 0.3 = 4.57 α $+$ 2.20 β 6 58.9	$+$ 6.3 = 4.87 α + 2.20 β	6 58.9

Domesta - Domesta	
Remarks - House	
Rejokusa — Pakisaki	de maria
He warm — Lorenchat	1 1
Lucino - 1 - L 1	1 1
Brenda — Isasai	
Ramon — Kawala	- 1
April - Kakkewiki	appendix
	Hejekings — Pakiseki Historia — Pakiseki Historia — Lomeni Lomeni — Samangs Lomeni — Lomeni Lomeni — Lomeni Samangs — Hyporiai Samangs — Istoria Historiah — Istoria Historiah — Kiwala Homeni — Kiwala Kiwala — Kallinkangs

Gleichungen.	0.86 s 2 r sin. 1"
+ $3''.9 = 5.10 \alpha' + 1.20 \beta' + 1.20 \beta' + 7.5 = 5.47 \alpha' + 2.18 \beta' + 1.16 \beta' $	7 18".3 7 50.4 5 37.1
$ \begin{array}{l} + 7.8 = 2.54 \ \alpha' + 1.30 \ \beta' \\ - 3.2 = 2.75 \ \alpha' + 0.31 \ \beta' \\ + 21.5 = 2.75 \ \alpha' + 1.39 \ \beta' \\ \end{array} $	3 38.6 3 56.8
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	5 12.7 3 57.2 3 58.3 4 3.1
$+ 7.8 = 4.13 \alpha + 1.68 \beta$ $+ 20.3 = 4.79 \alpha + 0.93 \beta$ $+ 15.9 = 6.32 \alpha + 1.97 \beta$	5 55.2 6 52.1 9 3.4
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	5 47.1 5 22.7 11 20.2 12 35.1
$+ 0.1 = 4.37 \ \alpha' + 1.85 \ \beta' + 0.1 = 3.57 \ \alpha' + 1.74 \ \beta' + 0.2 = 2.72 \ \alpha' + 0.46 \ \beta' + 0.1 = 0.$	6 15.8 5 6.8 3 53.9
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 39.6 3 42.2

Punkte.	Zahl der Beobb.
Mākipāāllys — Swartwira	3
Mäkipäällys — Ristisaari	3
Mäkipäällys — Ristisaari	3
Swartwira — Tuskas	3
Ristisaari — Tuskas	6
Ristisaari — Kokkowuori	4
Tuskas — Kokkowuori	4
Tuskas — Strömfors	3
Tuskas — Strömfors	3
Kokkowuori — Strömfors	
Strömfors — Lowisa	$\frac{2}{4}$
Strömfors — Korsmalm	3
Strömfors — Mustila	3
Lowisa — Korsmalm	3
Korsmalm - Låhdetkallio	4
Korsmalm — Briefberg	4
Korsmalm — Linnankallio	4
Korsmalm — Mustila	7
Korsmalm — II Porlom	4
Lähdetkallio — Briefberg	4
Lähdetkallio — Linnankallio	4
Lähdetkallio — Mustila	4
Briefberg — Linnankallio	4
Brigharg - Rasis-Sidanda	4
Briefberg - Basis-Nordende	4
Briefberg — Basis-Nordende	4
Linnankallio — Basis-Südende	5
Linnankallio — Basis-Nordende	4
Linnankallio — Mustila	4
Basis-Südende — Basis-Nordende	5
Mustila — Il Porlom	4
Mustila — I Porlom	3

Ausdruck des Höhenunterschiedes in Toisen.	Höhenunter-
	schied Toisen.
$-56.2830 - 9.5683 (\alpha' + 0.403 \beta)$	- 56.596
$= 59.7753 = 9.5013 (\alpha' + 0.403 \beta) \dots$	- 60.044
$-2.3930 - 8.7898 (\frac{1}{4} \alpha' + 0.066 \beta)$.	- 2,405
$+ 12.5803 - 8.7709 (\frac{1}{3} \alpha - 0.034 \beta)$	+ 12.577
$+ 14.7287 + 9.0269 (0.117. \beta)$	+ 14.746
$+$ 19.0375 $+$ 9.0356 (0.186 β .)	+ 19.066
$+ 4.3045 + 9.0109 (0.101 \beta)$	+ 4.319
$+ 18.6310 + 9.0606 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.150 \beta'\right)$.	+ 18.666
+ $18.6310 + 9.0606 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.150 \beta'\right) + 2.8437 + 9.1665 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.255 \beta'\right)$	+ 2.910
$+ 14.5210 - 9.2542 (\alpha' + 0.434 \beta)$	+ 14.361
$-15.7100 + 8.8865 (0.078 \beta) \dots$	-15.702
$-1.1610 - 8.9618 \left(\frac{1}{3} \dot{a} + 0.252 \dot{\beta}\right)$	-1.202
$+ 11.7967 - 9.3263 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.333 \beta'\right)$	+ 11.678
+ $14.6307 - 9.0038 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.357 \beta'\right) - 3.3802 + 8.8474 \left(0.046 \beta'\right)$	+ 14.571
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-3.376 -0.893
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	— 0.393
$+ 12.8441 + 9.1207 (\frac{1}{2} \alpha' + 0.058 \beta')$	+ 12.860
$+ 10.6880 + 9.0247 (\frac{1}{2} \alpha + 0.202 \beta)$	+ 10.733
$+$ 2.5585 $-$ 8.2150 (0.026 β)	+ 2.558
$+$ 3.2642 $-$ 8.0006 (0.063 β)	+ 3.263
$+ 16.0845 + 8.1806 (0.028 \beta) \dots$	+ 16.085
$+ 0.6842 - 8.0186 (0.037 \beta) \dots$	+ 0.684
$-24.8065 + 7.7185 (0.001 \beta) \dots$	- 24.806
$-23.3882 + 8.1393 (0.115 \beta)$	- 23.386
+ $13.6330 + 8.7640 (0.054 \beta)$	+ 13.637
$-25.5202 + 7.5211 \left(\frac{1}{5} \alpha' + 0.127 \beta'\right)$.	-25.519
$-24.1020 + 7.0777 (0.152 \beta) \dots$	- 24.102
$+ 12.8097 + 8.4418 (0.091 \beta)$	+ 12.813
$+ 1.3734 - 7.4432 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.005 \beta'\right)$	+ 1.373
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.957
+ 1.9403 - 9.1956 ($\frac{1}{3} \alpha + 0.095 \beta$)	+ 1.905

Punkte.	Zahl /r Beskis
Mustila — Perheniemi	4
II Porlom — I Porlom	-j
I Porlom - Perheniemi	3
I Porlom - Willikkala	3
Perheniemi - Willikkala	4
Perheniemi — Huhtmar	4
· Willikkala — Huhtmar	4
Willikkala — Emmeneures	4
Huhtmar — Emmeneures	4
Huhtmar — Messilä	2
Huhtmar - Wahteristo	~
Emmeneures — Messilä	3
Messila — Wahteristo	4
Messili — Wesiwehmais	.5
Messila — Kurhila	4
Wahteristo — Wesiwehmais	4
Wesiwehmais — Kurhila	4
Wesiwehmais - Soitinkallio	4
Kurhila — Soitinkallio	4
Kurhila — Wirmala	4
Soitinkallio - Wirmala	4
Soitinkallio — Wiljaminwuori	3
Wirmala — Wiljaminwuori	3
Wirmala — Kylınākangas	4
Wiljaminwuori - Kylmäkangas	-6
Wiljaminwuori — Kammio	4
Wiljaminwuori — Tammimäki	4
Kylmäkangas — Kammio	4
Kylmäkangas — Rappuwuori	4
Kammio — Rappuwuori	4
Kammio — Tammimāki	4
Rappuwuori — Tammimäki	4

Ausdruck des Höhenunterschiedes in Toisen.	Höhenunter- schied, Toisen.
$\begin{array}{c} + & 9.9370 - 9.0546 \; (0.058 \; \beta) \\ + & 4.1840 - 5.972 \left(\frac{1}{3}.\alpha' + 0.246 \; \beta' \right) \\ + & 7.9150 + 9.1677 \; \left(\frac{1}{3}.\alpha' + 0.018 \; \beta' \right) \\ + & 8.6750 + 8.7651 \; \left(\frac{1}{3}.\alpha' + 0.128 \; \beta' \right) \\ + & 0.9365 + 8.9039 \; (0.082 \; \beta') \\ + & 17.8610 + 8.8695 \; (0.076 \; \beta) \\ + & 16.9722 - 8.7826 \; (0.006 \; \beta') \\ - & 2.1715 + 8.6710 \; (0.039 \; \beta) \\ - & 19.1982 + 9.1696 \; (0.045 \; \beta') \\ + & 38.0580 + 9.4560 \; (0.162 \; \beta') \\ + & 14.7665 - 9.1742 \; (0.072 \; \beta') \\ + & 57.5980 + 9.4769 \; \left(\frac{1}{3}.\alpha' + 0.147 \; \beta' \right) \\ - & 23.0460 - 9.1943 \; (0.100 \; \beta') \\ - & 27.9260 - 9.1543 \; \left(\frac{1}{3}.\alpha' - 0.061 \; \beta' \right) \\ - & 25.6580 + 9.3294 \; (0.138 \; \beta) \\ - & 4.9532 + 8.7888 \; (0.204 \; \beta) \\ + & 10.1397 - 9.3171 \; (0.121 \; \beta') \\ + & 7.8130 - 9.3561 \; (0.155 \; \beta') \\ + & 6.8750 - 9.4863 \; (0.126 \; \beta') \\ - & 1.1272 + 9.3231 \; (0.030 \; \beta') \\ + & 2.5857 - 9.4442 \; \left(\frac{1}{3}.\alpha' - 0.016 \; \beta' \right) \\ \end{array}$	+ 9.928 + 4.184 + 7.933 + 8.691 + 0.946 + 17.869 + 16.972 - 2.169 - 19.189 + 38.123 + 14.751 + 57.688 - 23.068 - 27.922 - 25.617 - 4.936 + 2.368 + 10.105 + 7.764 + 6.821 - 1.118 + 2.566
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	+ 3.973 + 7.527 + 3.626 + 14.271 + 24.975 + 10.718
$-6.5127 + 1.1707 (0.014 \beta) \dots$	$ \begin{array}{c c} + & 4.121 \\ - & 6.510 \\ + & 10.480 \\ + & 17.022 \\ 37 \end{array} $

Punkte.	Zahl der Beobb.
Rappuwuori — Puolakka	4
Tammimäki — Puolakka	8
Tammimāki — Waterwuori	3
Puolakka Waterwuori	3
Polakka — Jywäskylä	6
Waterwuori — Jywäskylä	3
Waterwuori — Ruuhimäki	3
Waterwuori — Laajawuori	3
Jywäskylä — Ruuhimäki	4
Jywäskylä — Laajawuori	4
Ruuhimäki — Laajawuori	4
Ruuhimäki — Multamäki	4
Ruuhimāki — Ohimāki	4
Laajawuori — Multamäki	2
Multamäki — Ohimäki	4
Multamäki – Silmutmäki	4
Multamäki — Ilamäki	4
Ohimāki — Silmutmāki	4
Silmutmäki — Ilamäki	4
Silmutmäki — Listonmäki	4
Silmutmäki — Wesamäki	
Silmutmāki — Kilpimāki	2 4
Ilamāki — Listonmāki	4
Listonmäki — Wesamäki	3
Wesamāki — Kilpimāki	3
Wesamāki — Kilpimāki	3
Wesamāki — Lehtomāki	3
Kilpimäki — Honkamäki	4
Honkamäki — Lehtomäki	4
Honkamäki — Pörsänmäki	4
Lehtomäki — Pörsänmäki	5
Lehtomäki — Pihlajanmäki	4

Ausdruck des Höhenunterschiedes in Toisen.	Höhenunter- schied, Toisen.
$-8.5865 + 8.9035 (0.146 \beta) \dots$	- 8.570
	1
	 25.560
	- 7.719
$\begin{array}{c} + \ 18.0377 - \ 9.4922 \left(\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.143 \ \beta' \right) \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \end{array}$	+ 17.946
	+ 17.816
$+ 0.0070 + 9.2297 (\frac{1}{3} \alpha + 0.170 \beta)$	+ 0.063
$ -10.0467 + 9.1774 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.177 \beta' \right) $	- 9.995
$+ 0.1970 + 9.3995 (\frac{1}{3} \alpha' + 0.100 \beta')$	+ 0.256
$-9.9955 + 9.4055 (0.005 \beta) \dots$	- 9.994
$+ 0.3962 - 8.0088 (0.052 \beta) \dots$	+ 0.395
$+ 10.4942 - 9.4499 (0.058 \beta) \dots$	+ 10.471
$+ 2.0002 - 9.6246 (0.139 \beta) \dots$	+ 1.918
$+ 3.4837 - 9.5986 (0.011 \beta) \dots$	+ 3.478
$-7.8475 - 9.3855 (\alpha' + 0.465 \beta') \dots$	- 8.074
$+ 0.9667 + 9.2685 (0.127 \beta) \dots$	+ 1.000
$-11.1915 - 9.5980 (0.071 \beta) \dots$	— 11.231
$+ 0.8875 - 9.4922 (0.047 \beta) \dots$	+ 0.867
$-12.7947 - 9.1033 (0.199 \beta) \dots$	- 12.830
$+ 12.5047 + 9.4784 (0.024 \beta) \dots$	+ 12.515
$+ 12.1287 + 9.4242 (0.041 \beta) \dots$	+ 12.144
$+ 14.0870 + 9.6178 (0.092 \beta) \dots$	+ 14.140
$+ 5.8702 + 9.3342 (0.058 \beta) \dots$	+ 5.888
$+ 0.0517 + 9.3065 (0.016 \beta) \dots$	+ 0.056
$+ 1.7730 - 9.2491 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.045 \beta\right) \dots$	+ 1.745
$-7.9347 + 9.7167 \left(\frac{1}{3} \alpha + 0.068 \beta\right) \dots$	— 7.836
$+ 10.9587 + 9.6119 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.105 \beta'\right) \dots$	+ 11.057
$-18.6680 + 9.6572 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.096 \beta\right) \dots$	- 18.564
$+ 19.2237 + 9.8078 (0.063 \beta) \dots$	+ 19.280
$-29.5435 - 9.9095 (0.007 \beta) \dots$	- 29.551
$+ 6.4022 + 9.9488 (0.014 \beta) \dots$	+ 6.420
$+ 35.6548 + 9.7604 \left(\frac{1}{5} \alpha' + 0.081 \beta'\right) \dots$	+ 35.753
$+ 12.6685 + 9.5733 (0.069 \beta) \dots$	+ 12.705

Punkte.	Z.:1 : r B : 1.
Pörsänmäki — Pihlajanmäki	4
Pörsänmäki — limäki	4
Pőrsánmáki — Kiwimáki	3
Pihlajanmāki — limāki	2
limāki — Kiwimāki	2
limāki — Sallisenmāki	3
Kiwimāki — Sallisenmāki	2
Kiwimäki – Kulwenmäki	4
Sallisenmäki — Kulwenmäki	3
Sallisenmäki — Naarasmäki	2
Sallisenmäki — Murtomäki	3
Kulwenmäki — Naarasmäki	. 4
Naarasmäki — Murtomäki	3
Naarasmäki — Lehtowaara	4
Murtomāki — Lehtowaara	4
Murtomäki — Otanmäki	4
Lehtowaara — Otanmäki	4
Lehtowaara — Kiweswaara	4
Lehtowaara — Rupukkawaara	4
Otanmäki — Kiweswaara	2
Kiweswaara - Rupukkawaara	4
Kiweswaara - Saukkowaara	4
Kiweswaara — Teiriharju	4
Kiweswaara - Puokiowaara	4
Kiweswaara — Rokuawaara	3
Rupukkawaara — Saukkowaara	4
Saukkowaara — Teiriharju	4
Teiriharju — Puokiowaara	4
Puokiowaara — Rokuawaara	4
Puokiowaara — Palowaara	4
Rokuawaara — Palowaara	. 3
Rokuawaara — Rewonpesamaa	5

Ausdruck des Höhenunterschiedes in Toisen.	Höhenunter- schied, Toisen.
$\begin{array}{c} -22.9725 + 9.7823 & (0.080 \ \beta) & . & . & . \\ -23.6415 + 9.4972 & (0.048 \ \beta) & . & . & . \\ -14.1453 - 9.6582 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.041 \ \beta) & . & . \\ -0.3925 - 9.7231 & (0.051 \ \beta) & . & . \\ +9.5607 + 8.9087 & (0.017 \ \beta) & . & . \\ +10.0183 - 9.3566 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.138 \ \beta) & . & . \\ +0.5720 - 9.1053 & (0.050 \ \beta) & . & . \\ +2.8412 - 9.1326 & (0.098 \ \beta) & . & . \\ +2.2677 + 9.1470 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.030 \ \beta) & . & . \\ +9.4180 + 9.5368 & (0.032 \ \beta) & . & . \\ +0.0967 + 9.2250 & (\frac{1}{3} \ \alpha' - 0.099 \ \beta) & . & . \\ +7.0360 + 9.2151 & (0.080 \ \beta) & . & . \\ +9.0543 - 9.3027 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.248 \ \beta) & . & . \\ +16.7500 - 9.1266 & (0.143 \ \beta) & . & . \\ +25.8235 + 9.1161 & (0.034 \ \beta) & . & . \\ +25.8235 + 9.1161 & (0.034 \ \beta) & . & . \\ +10.7277 + 9.8613 & (0.059 \ \beta') & . & . \\ +10.7277 + 9.8613 & (0.059 \ \beta') & . & . \\ +10.7277 + 9.8613 & (0.059 \ \beta') & . & . \\ +10.8880 - 9.6051 & (0.006 \ \beta) & . & . \\ +39.8880 - 9.6051 & (0.004 \ \beta) & . & . \\ +39.8880 - 9.6051 & (0.004 \ \beta) & . & . \\ +49.6913 - 0.0287 & (\frac{1}{3} \ \alpha' - 0.058 \ \beta') & . \\ +24.7025 - 9.4284 & (0.176 \ \beta') & . & . \\ +24.7025 - 9.4284 & (0.176 \ \beta') & . & . \\ +24.7025 - 9.4284 & (0.176 \ \beta') & . & . \\ +24.7025 - 9.4284 & (0.176 \ \beta') & . & . \\ -39.5977 + 9.6521 & (0.087 \ \beta') & . & . \\ -39.5937 - 9.2920 & (0.048 \ \beta') & . & . \\ -39.5937 - 9.2920 & (0.048 \ \beta') & . & . \\ -39.5937 - 9.2920 & (0.048 \ \beta') & . & . \\ -39.5937 - 9.2920 & (0.048 \ \beta') & . & . \\ -23.9387 + 9.7048 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.185 \ \beta') & . \\ -23.9387 + 9.7048 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.185 \ \beta') & . \\ -23.9387 + 9.7048 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.185 \ \beta') & . \\ -23.9387 + 9.7048 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.185 \ \beta') & . \\ -40.0048 + 9.5631 & (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.242 \ \beta') & . \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} -22.905 \\ -23.620 \\ -14.214 \\ -0.430 \\ +9.563 \\ +9.953 \\ +0.563 \\ +2.823 \\ +2.287 \\ +9.433 \\ +0.089 \\ +7.054 \\ -9.143 \\ +16.723 \\ +25.830 \\ -16.333 \\ -41.555 \\ +10.788 \\ +1.692 \\ +52.344 \\ -8.692 \\ +15.878 \\ +19.886 \\ -39.543 \\ -49.706 \\ +24.637 \\ +4.020 \\ -59.590 \\ -10.897 \\ -35.267 \\ -23.760 \\ -39.860 \\ \end{array}$

Punkte.	Zahl der Beobb.
Rokuawaara — Repokankas Rokuawaara — Halosenwaara Palowaara — Rewonpesämaa Rewonpesämaa — Repokangas Repokangas — Halosenwaara Repokangas — Pitkäselkä Halosenwaara — Pitkäselkä Halosenwaara — Linnunsilmä Pitkäselkä — Linnunsilmä Pitkäselkä — Linnunsilmä Pitkäselkä — Sarwikangas Linnunsilmä — Sarwikangas Sarwikangas — Intionkangas Sarwikangas — Länkisenkangas Sarwikangas — Uleäborgs Glockenthurn Intionkangas — Uleáborgs Glockenthurn Länkisenkangas — Oritkari Intionkangas — Uleáborgs Glockenthurn Länkisenkangas — Oritkari Länkisenkangas — Klemola Oritkari — Klemola Oritkari — Klemola Linnunsilmä — Latonmäki Sarwikangas — Latonmäki Sarwikangas — Ilypenmäki Sarwikangas — Isoniemi Latonmäki — Ilypenmäki Ilypenmäki — Isoniemi Ilypenmäki — Isoniemi Ilypenmäki — Isoniemi Ilypenmäki — Isoniemi Ilypenmäki — Isoniemi Ilypenmäki — Ilypenmäki	3 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4
Isoniemi — Ulkogrunni	3
Ulkogrunni — Kiwalo	1


Ausdruck des Höhenunterschiedes in Toisen.	schied, Toisen.
70 A502 0 C024 (1 / 0 050 c)	- Constant
$-52.4583 + 9.6024 \left(\frac{1}{3} \alpha' - 0.052 \beta'\right)$	52.450
$-64.8430 + 9.6639 (\frac{1}{3} \alpha' + 0.167 \beta')$	- 64.692
$-14.7897 + 8.7404 (0.079 \beta)$	- 14.784
$-12.0892 - 9.3745 (0.190 \beta) \dots$	-12.152
$-11.6545 - 8.9982 (0.226 \beta) \dots$	11.686
$+ 0.0522 - 9.0679 (0.066 \%) \dots$	+ 0.041
$+ 11.9537 + 9.3093 (0.018 \beta) \dots$	+ 11.959
$= 11.0137 + 9.0693 (0.133 \beta) \dots$	-10.992
$= 22.7382 + 8.8877 \left(\frac{1}{5} \alpha' + 0.138\beta'\right) \dots$	-22.719
$-24.4015 - 9.0732 (0.096 \beta) \dots$	-24.417
$-1.5617 + 9.0906 \left(\frac{1}{3} \alpha' - 0.030 \beta'\right)$	— 1.555
$-11.7007 + 8.1412 (0.020 \beta) \dots$	— 11.700
$-12.5967 - 8.2318 (0.001 \beta) \dots$	-12.597
$+ 9.3300 - 8.2837 (a' + 0.128 \beta)$	+ 9.321
$-0.7687 - 7.786 (0.021 \beta)$	- 0.769
$-9.1295 + 7.640 (0.206 \ \beta) \dots$	9.128
$+ 21.2350 \rightarrow 6.672 (a' + 0.170 \beta)$	+ 21.235
$-8.3585 + 7.5478 (0.228 \ \beta) \dots$	- 8.357
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-9.490 -1.125
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-1.125 -11.151
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u>- 9.533</u>
$-2.6252 + 9.7893 (0.003 \beta)$	$\frac{1}{1}$ = $\frac{9.535}{2.470}$
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 5.233
$\frac{1}{1} + \frac{5.4990}{1} + \frac{9.5968}{1} + \frac{6.6968}{1} + 5.882	
$-3.5170 - 9.3365 (0.224 \beta)$	- 3.585
$-12.3847 + 9.7234 (\frac{1}{2} \alpha' - 0.042 \beta')$	- 12.341
$-9.0895 + 9.5961 (0.140 \beta)$	9.012
$-14.1437 + 9.2218 \left(\frac{1}{3} \alpha' + 0.065 \beta\right)$.	- 14.113
$-3.1670 - 9.1858 (0.119 \beta) \dots$	-3.192
$+ 73.8692 + 9.9842 (0.053 \beta) \dots$	+ 73.941
$+ 2.1830 + 9.6601 (a + 0.399 \beta)$	+ 2.567

Punkte.	Zahl der Beobb.
Rontti — Kiwalo Kiwalo — Ajos Kiwalo — Kallinkangas Kiwalo — Kemi Kirche	3 5 4 2
Kiwało — Torneâ Kirche	2 4 4 2
Ajos — Torneâ Kirche	2 4 1
Kokkomäki — Kemi Kirche	2

Anmerkung. Die Zahl, welche der Parenthese im Ausdrucke des Tafelvorkommenden Nummerquantitäten sind natürliche

	Höhenunter- schied, Toisen.
$\begin{array}{c} + \ 76.3473 + 0.0750 \ (\frac{1}{3} \ \alpha' + 0.195 \ \beta') \dots \\ - \ 68.9962 - 9.4689 \ (\frac{1}{5} \ \alpha' + 0.087 \ \beta') \dots \\ - \ 52.8415 + 9.2925 \ (0.080 \ \beta) \dots \\ - \ 53.5950 - 9.2525 \ (\alpha' + 0.407 \ \beta') \dots \\ - \ 54.6505 - 9.7824 \ (\alpha' + 0.407 \ \beta') \dots \\ + \ 16.2185 + 9.0570 \ (0.037 \ \beta') \dots \\ + \ 0.2842 + 9.3809 \ (0.240 \ \beta') \dots \\ + \ 14.8765 - 9.0181 \ (\alpha' + 0.124 \ \beta') \dots \\ + \ 13.4445 - 9.4212 \ (\alpha' + 0.124 \ \beta') \dots \\ - \ 15.0660 + 9.0126 \ (0.123 \ \beta') \dots \\ - \ 1.4530 - 6.788. \ (\alpha' + 0.172 \ \beta') \dots \\ - \ 1.7260 - 9.0542 \ (\alpha' + 0.543 \ \beta') \dots \\ + \ 14.1045 - 9.0682 \ (\alpha' + 0.604 \ \beta') \dots \end{array}$	+ 76.783 - 69.049 - 52.820 - 53.747 - 55.166 + 16.224 + 0.365 + 14.829 + 13.324 - 15.048 - 1.453 - 1.844 + 13.973

Höhenunterschiedes vorangeht, ist = $\text{Log} \frac{0.01 \text{ s}^2}{2 \text{ r}}$. Die übrigen in dieser Zahlen.



om österländska mynt funna i finsk jord.

Character and the contraction of

Föredr. på Finska Vetenskaps-Societetens ärsdag den 29 April 1848,

AF

GABRIEL GEITLIN.

060

Den Arabiska numismatiken, en af de vigtigaste hjelpvetenskaper för Orientens historie, har först i sednare tider vunnit det anseende henne med rätta tillkommer. Ett nyvaknadt, liftigare intresse för Orientens språk och literatur i allmänhet är orsaken dertill. — Ty ehuru de österländska språken redan i 600:de år utgjort ett vigtigt föremål för de Lärdes uppmärksamhet, har likvål icke förr än i slutet af det sistförflutne och i det närvarande seklet detta studium erhållit den sjelfständiga rigtning som utgör vilkoret för hvarje företags framgång, den, att hos sig sjelf söka och finna en tillräcklig och fast grund för sitt bestånd och sin ytterligare tillväxt. — I äldre tider voro bevekelsegrunderna till detta studium hemtade utifrån. — Omvändelse-ifvern, det religiösa nitet, som bjöd att till Christendomens allena saliggörande Lära föra Pseudoprophetens förvillade anhängare (hvilket åter

iche hunde lyches utan hinnedom at deras spack) var den första anledningen till det Arabiska språkets studium i Europa. - 1 Palveyihle's intresse var det som orientaliska Larostolar imattades, redan i sednare hälften af det 13:de och början af det 14:de arhun hole, vid Universiteterne i Paris, Rom, Bologna, Oxford och Salamanca. Reformationen - och den derigenom väckta ifvern att un sjeltva killen heinte det Gudomliga or lets lifgifvan le bratt, att emalelbart bli delaktig af uppenbarelsens heliga ord, - var den andra måktiga håfstången för de orientaliska sprokens, simbles Hehraiskans, hojande till ett af de mest betydande läroämnen vid skolorna och universiteten. Men småningom afsvalnade det Christna omvåndelsenitet - ty det fann ett ovantalt och kraftigt motstånd i Mahommedanernas icke mindre lillige objectygelse om sin religions gudomliga ursprung, om dess fullkoenlighet, ja foretriede framför den Christna. - Då nu afvon Bibeln öfversattes från grundspråken misterligt af Reformail vens store upphofsman, bitradd af Melanchton och Creuziger, så tillvann sig snart denna öfversättning ett anseende nästan lika stort som sjelfva originalet. - Af sådana anledningar L'alule kanne lomen af de orientaliska spraken att alltmer anses umbladig och med likgiltighet behandlas, samt utgjorde nu mindre ett Brohmne af allminnare betydelse än ett sperialstudium får nægra fa Vetenskopsmon, hvilka af rent intresse for Orientens språk och dess underbara, genom sin från Vesterlandets asigter så bjert alstickande egenheter utmärkta, literatur, åt densamma, så vidt

den då kunde åtkonumas, egnade sig med outtröttlig flit och otrolig ansträngning; hvarom dessa den gamla tidens folianter i sina kolossala pergamentsband, som ofta innehålla gedignare skatter an man i allmänhet är bojd att tro. bara ett ojäfagtigt vittnesbord. Dessa vetenskapsmän voro de, hvilka genom sina oegennyttiga, ofta med stora personliga uppoffringar forenade bemodanden - man erinre sig t. ex. endast Edmund Castellus och hans Lexikon Heptaglotton för 7 olika österländska tungomål, hvarå han använde 17 års oafbrutet och ihärdigt arbete, och som kostade honom synen och nästan hela hans förmögenhet sådane vetenskapsmån voro de, som höllo de orientaliska språkens studium i Europa vid lif, till dess en ny epoch för denna Literatur uppgick genom de narmare förhållanden i hvilka Europa vid slutet af 18:de seklet kom att stå till Orienten. Det literära intresset forenade sig nu med handelns och politikens. Orientens literara skatter, val varda att jemföras med de materiella fordelar som vunnos från Österns vppiga länder, blefvo ej längre en hemlighet för Europas Lärde. - William Jones' och Silvestre de Sacys' namn aro verldsberomda. Deras fortjenster om den Orientaliska Literaturens pånyttfödelse i Europa skola de af dem och genom dem stiftade orientaliska sällskaper, skolor och lärda inrättningar ännu för den sednaste efterverld med vördnad och tacksamhet förkunna.

Numera var det ej blott yttre bevekelsegrunder och biandamål som talade för de österländska språkens studium; man hele munit ett Orientens Internur ligle liven ett deliginligt vårde, att den innehöll arbeten af förtjenst och skaldestycken af sannt poetiskt värde, ehuru af en egendomlig och från den vesterbindsha verklisisigten vida skiljd natur, men inst denigen mockså mer enslige ett dess sprik för den omganitva philologien erhäld och uttera och aumhörliga lide g. ett i historiskt, gengraphiskt, mythologiskt och philosophiskt hinseen le mingfaldiga vigtiga upplysningar derigenom stodo att vinnas.

Hyad nu särskildt, för att komma närmare till vårt egentliga amne, det historiska intresset beträffar, så är det ej blott Orientens historia, som då den ur inhemska källor bearbetas framstår i ett nytt och klarare ljus, äfven för Europeiska folkslag e la dens Il sta Birlillianden till Österberber, bereit Orientens hiller mången lutress ut och viglig upplysning. Sa iterlinne vi t. ex. hos Scherif el Edrisi (skref i medlet af 12 seklet) دارمامش tabast عبست finnark فينهام الم nonn فينهام قلمار danemark للدنية danemark دانماارق londonja فلمار galmar منائون siytin. منائب motalu. I sisuu'nun'le hluse nde har isymmethet den Muhammedanska munismatiken, belyst af Arrhiska historieskrifvares uppgifter och i sin tom belysande dem. vickt en villorijent uppmirksamhet, och hearberd af sålan. min som en Reiske, Kehr, Olof Gerhard och Thomas Christian Tychsen, Adler, Barthelemy, Marsden, Assemani och Silvestre De Sacy, ju längre desto mer vonnit ett utmörkt rum inom den Orientaliska literaturen. Framst

bland alla står dock i detta afseende Christian Martin von Fraehn. Förenande med en sannt classisk bildning en djup kännedom af Orientens språk, särdeles Arabiskan, Persiskan och Turkiskan, äfvensom af dess historia, geographie och palæographie, har Verkel. Stats-Rådet von Fræhn såsom föreståndare för det af honom ordnade Muhammedanska myntkabinettet i S:t Petersburg - det förnämsta och rikaste af alla som nu förtiden finnas, tv doupletterna inberäknade innehåller det icke mindre än 20,000 orientaliska mynt - varit i tillfälle, att för den sak åt hvilken han företrädesvis egnat sig - numismatiken - göra ojemnförligt mer än någon annan bland Europas celebraste Orientalister. Han har äfven, icke blott ur Arabiska källor completterat de få och ofullständiga notiser som om Rysslands äldsta förhållanden uti de inhemska chrönikorna förefinnas, utan ock anfört tydliga och ojäfvade bevis om tillvaron af en liflig handel som ägt rum emellan Orienten och det nordliga Europa under perioden af Arabernas herrskarevälde, och dymedelst lemnat en antaglig och naturlig förklaringsgrund af det på så många olika sätt förklarade och vid första påseendet nog besynnerliga factum, att ei allenast i Ryssland, utan jemväl i Finland och Östersjöprovinserne, i Sverge, Norrige, Danmark, Preussen, Pommern och Mecklenburg, en ofantlig mångd af Arabiska mynt tid efter annan anträffats uti de många jordfynd som redan från äldre tider ägt rum och allt ännu fortsara att ärligen påhittas. Han är det ock, som på det afgjordaste bevisat haltlösheten af sådana för

den Arabiska minismatiken f ga hedrande omdomen, hvilka lanna i 19 århundradet af mån, som icke bordt vara obekante med den Orientaliska literaturen, forkunnades, sisom t. ex. af Jobert och Herbin, hvillen sednare i sitt arbete Dereloppemens des principes de la langue Arabe moderne anfor em Arabiska mynt i allmändet follande hogst ensidiga yttrande (pog. 231): Toutes les anciennes monnaies sont gravées en Cusique et contiennent, presque toutes, les mots suivans: Au nom de Dieu cette piece d'ore a ete frappee l'an trois cents quarante cinq. La date seulement n'est par toujours la même".! - Ett omdome som visserligen icke är egnadt att hos någon väcka intresse för den Orientaliska numismatiken, och som fullt ut kan jemföramed Joherts vitrocle, "att de Kufiska mynten i historiskt afseende ei he niget viele, emelan de Muhammedanske regenternas ansigten sillan hanas a dem aftecknade", (eller som orden falla sig: nullus corum usus esse potest cum raro principum Muhammedanorum cultu figurentur)! - Emelleriil är det verkliga finhållandet helt annat. Just de Arabiska mynten, eller som de vanligen kallas Kufisha (emelan charactererne eller bokstälverna på dem in gammalmediga, si lana de i staden Kula, vid Eulrat. nvujades till de aldstå alskrifterna af Al Coran) just dessa mynt innehille mengfoldige upplysninger dem man forglifves skulle soka på andra äldre mynt, och än mindre finner på nutidens, der uppgiften a mete (vår let synes vara den vigligeste och nåstan den enda. De Kufiska mynten kan man deremot med skål

anse sasom de palitligaste, ehuru tillika de kortaste, historiska urkunder från den tid då Araberna voro jordens måktigaste och mest upplysta folk, hos hvars furstar och måktige en kårlek för prakt och öfverflöd, som öfvergår all foreställning, då redan hade utbildat sig. På dessa mynt finner man ej sållan upplysningar om förhållanden hvilka af historieskrifvarne med tystnad blifvit förbigångna. Väl är det sannt att språk ur Alcoran samt den Muhammedanska trosbekannelsen La allāh illā allāh, Muhammed rasalullah, d. v. s. "det finnes ingen Gud utom Allah, Muhammed är hans prophet," på dessa mynt intaga fornamsta rummet, men afven dessa språk aro så vida upplysande, att genom de olika variationerna af dem kan utronas, till hvilken religions-sect. antingen den orthodoxa Sunnitiska eller ock den Schiitiska, de olika dynastierne bekände sig: men de innehålla dessutom mycket annat, sisom Chalifens namn och Stathallarnes eller Emirernas i de sarskilde provincerna, stundom ar ater Chalifens namn icke angifvit utan blott Emirens, hvaraf man ser att oenighet radt emellan den forre och hans revolterande Emir; vidare, artalet for myntets prägling, alltid utfordt i bokstafver, afvensom präglingsortens eller stadens namn, hvaraf kan utronas sa väl rikets utsträckning som till hvilken dynastie den omnämnda staden på en viss tid horde, jemte andra dylika uppgifter som upplysa om landets delning emellan samtida Emirer, förhållandet af deras beroende af Chalifen, de trognes beherrskare, och deras

dinerale under eller coordinerale med hvarandra m. m. dylikt, som för historiska undersökningar kan vara af vigt. Om derföre lessa Orientaliska mynt ätven iche kunna i artistiskt hinseende måta sig med de forngrekiska och fornromerska, så äro de dock såsom historiska minnesmärken med dem fullt jemförliga. Ja evempel finnes på Kufiska mynt, hvilka, inom det lilla omfänget af en 25 hapeks sillverslant, innehålla inskrifter som ordagranut ölvers tra, och med vanlig, ej alltför mycket sammanträngd, stil upptecknade, fullt ut upptaga en octavsida, och således kunnt innehålla ganska minga, bland dem älven vigtiga, detaljer.

Häraf förklaras lätt det stora värde hvilket så vål kännare som samlare sätta å Kufiska mynt; ehuru visserligen å andra sidan icke kan nekas att detta värde stundom alltför öfverdrifvet uppskattats. Så anför t. ex. v. St. R. von Fræhn, i 6:te numern af Vet.-Acad:s i Petersburg Bülletin, Tom. L. att bland de entringer. det Asiatiska museums myntkabinett i sednare tider gjort, den vigtigaste är en Dirhem eller ett Silfvermynt af Omajiadiske Chaliten Abdul Melik. (under hvars tid de första Arvisha mynt präglades) af år 79 efter Hedschra eller 698 efter Christi i delse slaget i staden Dshey i Irāk adschemi. Nagot äldre Kufiskt mynt än detta, som erhållits genom Vet. Acad:s correpundent Hi von Reich els föranstaltande, klinde man ej; men ett dermel samtidigt prägl, i Damaskus, förvaras å Svenska Kongl.

myntkabinettet i Stockholm, ehuru äran att vara den förste som beskrifvit det tillhör en finsk man, Prof. Carl Abrah. Clewberg (hvars i Åbo år 1755 utg. Dissertation de Numis Arab. in Patria repertis äfven å en bifogad planche framställer samma mynt aftecknadt.) Angående ofvannämnde härmed samtidiga mynt yttrar nu Hr von Fræhn vidare: "Eine Münze von dem nämlichen Jahre, aber in Kufa geprägt, bewahrt das British Museum; Sie wurde, als die Richsche Sammlung, in der sie sich früher befand, abgeschätzt ward, von Marsden und Wilking in London 100 (schreibe hundert) Pfund Sterling taxirt. (Således ett silfver mynt af 20 kop. S:rs vigt ungefär, värderadt till 650 Rubel Silfver.) "Wir hier zu Lande" tillägger slutligen v. Fræhn, "bieten der Orientalischen Numismatik gewiss auch die gebührende Ehre, aber mit solchem colossalen Maasstabe ein Stück der Art zu messen, konnten wir uns doch nun und nimmermehr unterfangen." - Detta var skrifvet år 1843. Sedan dess hafva dock de Omajiadiska mynten af Hedschra's år 79 förlorat något i värde och betydenhet, emedan man numera funnit på mynt af samma Chalif, Abdulmelik, präglade tidigare eller år 77 och 78. Af sådana rara klenoder förvaras ett guldmynt (Dinar) af år 77 i Orientaliska myntkabinettet i Jena, beskrifvet af Prof. Stickel år 1845, samt ett dylikt å Kejserl. Museum i Majland. En annan Dinar af år 78 finnes åter så vål a myntkabinettet i Paris som i Petersburg; (dit det kommit genom Herr V. Stats-Rådet v. Frahns äldste son, hvilken var LegaAndrisk myntprägling begynte, och för är 87 saknas innu matsvarande Kuliska mynt. Fördtrigt presenteras af dem den Omnikadiska dynastiens alla regeringsår, d. v. s. från år 77 t. o. m. är 132 etter Hegina eller 715 till 750 etter var tiderikning. De yngre. Abassediske, mynten anses ei mer så dyrhara, och förekomma vida oftare. — Äfven hos oss, i Finland, hafva Orientaliska mynt väckt ett välförtjent intresse; och ehuru de samlingar af dessa mynt, som hos oss förefinnas, icke åga den utsträckning och betydenhet, att de kunde tilla någon jemtbrelse med de sam och allmintalinda Osterlänliske myntk binetterna i Sit Petersbang. Kasin. Stocklichen. Kopenhama, London, Oxtod. G. tha. Dresden, m. fl., äro de likvål af den vigt, att de väl förtjente beskrifvas och allmängöras, emedan de, gömda i sitt nuvarande mörker, äga föga eller intet värde.

Bland våra publika samlingar intager den i Universitetets Mynt- och Medalj-Kabinett förvarade det första rummet. — Redan före branden i Åbo, år 1827, ägde Universitetet en liten Orientalisk myntsamling, ehuru det i sanning är förvånande, att den varit så högst obetydlig, att (enl. Bülletin Scientifique, utgitven i Peters and 1841) en at manner anlatær Lingarumn Orientalium Adjuncten af Tengström till V. Stats-Rådet v. Fræhn insånd förteckning å de i Åbo befintliga Kufiska mynten, upptager endast 14 hela mynt och 6 fragmenter, alla (med undantag af ett Chalif-mynt, prägladt i Baghdad under Motaszid

billah år 281, eller 894 efter vår tidr.) hörande till den så talrika och vanliga klassen af Samanidiska i Transoxanien slagna mynt. Att i Abo Universitets myntkabinett endast 20 Kufiska mynt, och bland dem 19 Samanidiska, då förefunnits, bevisar således att man med största likgiltighet behandlat insamlandet af Orientaliska mynt till Landets eget Universitet - ty enligt hvad i det följande skall visas hafva flere betydliga fynd af desse mynt i Finland anträssats - men denna likgiltighet sinner sin förklaring, äfvensom sin ursäkt, deri, att sådana fynd, då de någon gång kunde räddas från att förstöras i smältdegeln, vanligen afsändes till Kongl. samlingarna i Stockholm. Så anför Hildebrand i sin nyligen utgifna Förteckning öfer Anglosachsiska mynt förvarade i Kongl. Svenska myntkabinettet, pag. LXXII af Inledningen, att enl. Handlingar i f. d. Antiqvitets-Archivet de i Pelkane år 1787 anträffade Kufiska mynten, ända till 40 lods vigt, blifvit inlösta för Kongliga samlingarna i Stockholm.

Vida rikare är för det närvarande vårt Universitets Orientaliska myntsamling, som till största delen uppkommit genom frikostiga bidrag af Grefve van Suchtelen och Kejserliga Vetenskaps-Academien i S:t Petersburg, elmru visserligen äfven bland egne landsmän icke saknats dem, som med berömlig liberalitet bidragit till samlingens förökande.

Denna samling innehåller, utom sex Persiska medaljer, tunga, väldiga guldpiècer — en gafva af Hans Majestät Kejsaren — följande Orientaliska (till största delen silfver-) mynt:

- 9 Chalif-mynt, ildand dem 1 et Ombijalen Heschan, de öfrige Abassider.
- 1 Edrisid-mynt, prägladt i Bedaa i Mawarannahr (Transoxanien).
- 62 Sammanidiska mynt, präglade i åtskilliga städer i Mawarannahr.
 - 3 Ortokider (desse regerade i nordliga Mesopotamien, år 1100-1225), bildermynt.
 - 2 Hulaguider (d. ä. Dschingisider i Iran, uti 13:de och 14:de seklet.
 - 1 Scheibanid (dessa herrska i Chawaresm och Transocanien).
 - 1 Dschelairid eller Ilchanid (härstammande från Hulagu Chan).

Af Gyldene Hordens eller Ulus-Dschudschi-mynt:

100 st. of Chargerne: Tokugu, Usbek, De hani Bek, Bioti Bek, Milanti Chize, Al hallch, Gladjazettin Bubk, Tokumisch, Bek-Pulit, m. d. priglide i Saraj, Nea-Sara, Krim, och i Hordens högqvarter (Urdu).

Af Krimska Chaner:

6 mynt af den siste Chanen Schahin-Giraj, präglade i Baghtschisaraj.

Af Turkiska Sultaner (Osmanider):

32 mynt, dels af guld, dels af silfver och koppar.

Af Baburider, eller Stor-Mogols mynt:

14 stycken (bland dem ett som i dessa dagar blifvit till Universitetet föräradt af Hr Apothekaren Mæxmontan).

Af Persiska Schahers mynt:

32 stycken, dels i guld dels i silfver och koppar.

Af Scherifers i Marokko mynt:

8 stycken.

Summa 271 Orientaliska mynt, ibland dem flere rara och sällsynta, isynnerhet en numus bilinguis, funnen i Rautus år 1832.

Borgå Gymnasium äger jemväl ett antal Orientaliska mynt uti sin myntsamling, hvilken, genom den nuvarande Præfectens Hr Prosten Lector Borenii nit, årligen ganska betydligt ökats, och som ibland annat innehåller ett ganska rart myntfragment, prägladt i Chusistanska staden Destüva, af hvilket slags mynt endast 3, utom detta, hittils äro kända.

Bland privata samlingar af Orientaliska mynt i Finland åro mig endast 3 bekanta, nemligen IIr Kammarrådet Schaumans, IIr Öfverstelieutenanten Carl Tamelanders och IIr Landshöfdingen Stichæi samlingar. Äfven dessa innehålla ett och annat mynt af större värde, och Kammarrådet Schaumans jemväl en numus anecdotus, en Boujid eller Buwaihid af år 358.

Men alla dessa samlingar skulle äga ett ojemförligt större värde, om man tillika visste, på hvilka ställen och under hurudana förhål-

Lan len till an lra jemte dem funna forntidssaker dessa mynt blifvit i jælen antraffale. Ett gammalt mynt ager visserligen redan sisom sidant sitt varde och sitt intresse, men dubbelt instructivt kan det blifva då man tillika har sig bekannt, hvar och huru det varit förvaradt i jorden, hvilka andra fynd derjemte ägt rum, och om i närheten äfven förut dylika skatter förefunnits m. m. dylikt. Ty vårr har man dock vid dessa omståndigheter hisinfills fistat alltfor ringa uppmirks anhet och atnojt sig med att blott samla. - Det var först år 1840 som Leopold von Ledebur gewom sitt arbete Ueber die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse eines Handels-Verkehrs mit dem Orient adagalade vigten af att närmare känna sjelfva fyndorterna för de Kuliska mynten, emedan man derigenom bör kunna bestämma hufvudstationerna för den stora handelsväg som otvifvelaktigt i en längre tid blifvit begagnad för Österländska Lundeln, anda from Kaspiska hafvet uppfor Wolga till Bulghör ch derilmin till Finska viken och Ostersjons stapelplatser. Händer det nämligen att just å de punkter, dem historien betecknat . . m vigtiga hamlels-orter, foretrådesvis Orientaliska mynt blifvit i större mångd oftare antrållade, så kan man med säkerhet sluta, att dessa orter jemväl varit nederlagsplatser för den Orientaliska handeln, såsom fallet år t. ex. med Wisby på Gottland, Colberg och Wollin i Pommern m. m.

Med anledning af Ledeburs ofvan citerade skrift utgaf Hr

Uebersicht der Ausgrabungen von altem Arabischen Gelde in Russland, nebst chronologischer und geographischer Bestimmung des Inhalts der verschiedenen Funde. Sednare har H. C. von Minutoli i Berlin år 1843 utgifvit en skrift i samma arme: Topographische Lebersicht der Ausgrabungen griechischer, römischer, arabischer und anderer Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den Küstenländern des Baltischen Meeres Statt gehabt: och sednast eller 1847 har Herr Saveljeff i sitt på Ryska språket författade arbete Мухаммеданская Нумизматика въ отношении къ Руской Исторіи icke allenast upprepat hvad af Ledebur och Fræhn blifvit anfördt utan ock completterat deras uppgifter med en mångd andra fynd. I alla ofvannämnde arbeten äro jemväl i finsk jord anträffade fynd omnimnda, hufvudsekligast med ledning af de uppgifter som i Liljegrens strödda anteckningar om fynd i Svensk jord. inforda i Kongl. Witterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademiens handlingar Tom. XIII. samt i Brenners Thesaurus Numorum förekomma. Då likvål dessa uppgifter med afseende a Finland and nog ofullständiga, och hvad Ledebur beträffar icke fullt pålitliga, har jag sökt att här i ett sammanhang uppställa alla dvlika fynd så vidt det hitintills lyckats mig att om dem erhålla någon kunskap.

Att tid efter annan åtskilliga större och mindre fynd af i forntiden at jordens sköte anförtrodda skatter blifvit funna i Fin-

land, der de å landets språk åro allmant bekanta under namn af Aarni-haudat, är nogsamt kändt. I en tid då den allmänna säkerheten till person och egendom ämm ej var tryggad genom bestämda lagar, fanns ingen pålitligare och såkrare depositions och sparbank än jorden, hvilken, ehuru utan rånta, dock alltid med full valuta återställde det åt hennes vård ofta, men sårdeles under krig och hotande faror, anfortrodda godset. Men icke sällan honde att capitalet alldrig aterfordrades, emedan ägaren omkommit och artvingarna förgälves gjorde sina ausprik gillande, så framt ej en lycklig träff någongang gynnade deras elterforskningar. Sålunda hafva ända till våra tider större och mindre skatter från 9:de och 10 seklet förvarats i jorden, och derifrån, tid efter annan, genom någon lycklig tillfällighet hlitvit atertunua. Beklagligtvis är det dock mer än sannolikt att ganska många af dessa fynd, sårdeles i åldre tider, gått för vetenskapen oåterkalleligen forlorale, emed in den af slumpen gynnade hittaren histat att i hemlighet bortsälja det funna, för att icke (till följe af en numera visserligen antiquerad, men allt ännu på flere ställen af allmogen såsom gållande anseld lag, hvilken stadg de att så lana fynd borde Kron in hembjinkis och endast Indel tillfalla hittaren) åter gå i mistning af hvad lyckan lemnat i hans hånder. Att sådant jemväl i sednaste tider inträffat har jag haft tillfälle att nyligen erfara af några bland allmogen i Reso Socken. Samma förhållande har ägt rum i Ryssland, Preussen och Sverige. Så omformaler Hildebrand, i sitt ofvantore citerale arbete. "att

emedan den allmänna af Konung Christoffer 1442 stadfästade Landslagen tillerkände hittaren 3:del af värdet men Konungen ägarens rätt; det sednare stadgandet i 1734 års lag att hittaren af gamla fynd skall erhâlla fulla värdet jemte 1:del deröfver likvål icke kunde på lång tid ur allmogens minne utplåna de äldre föreskrifterna om Kronans rättighet till 3:delar af hvarje jordfynd. Först i sednare tider har denna villfarelse allmännare blifvit skingrad genom Kongl. Förordningen af den 17 April 1828 angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande, samt genom underrättelser införda i några af de sednare årens almanachor, till följe hvaraf antalet af de i laga ordning amnälde fynden varit i ständigt tilltagande." I Ryssland hafva högst betydliga fynd i äldre tider blifvit inköpte af Judar och uppsmälta; så förmodar Fræhn att det afven gått med det betydliga fyndet vid Lorat, ej långt från Velikie Luki nära Norgorod, der omkring år 1800 en hel kittel med silfvermynt, hvaraf blott en del vägit 7 pud eller 14 lisp., anträffades, och af hvilka blott några få blifvit råddade och beskrifne af Fræhn i dess Novæ Symbolæ ad rem Numarium Muhammedanorum. I sednare tider har dock detta missbruk genom de af Ministern för folkupplysningen vidtagne visa åtgärder helt och hållet upphört. Afvenså i Preussen och i Bäjern, der Vet. Acad. i München betalar åt hittaren dubbla värdet af fynden och dessutom i vigtigare fall utverkar för honom särskilda belöningar, minnespenningar m. m. dvlikt. -Det vore derföre högst önskansvärdt att jemvål hos oss intresset

for dessa ferntidens minnesmärken bletve mera allmänt väckt och att allmögen gjordes upprufiksim derpå, att en vida högre betalning än metallens värde at Universitetet för dylika antiquiteter erlägges, samt att guld- och söltver-ubetare da de åtkomma dylika ratiteter ei måtte forhasta sig att dem uppsmölta innan deras vetenskapliga värde blifvit utrönt.

Men det är tid att skynda till uppräknandet af de jordfynd som intill denna tid i Finland anträffats.

- 1) Enligt Liljegrens förut nämnda anteckningar omtalas är 1547 den 15 Juni i Konung Gust. I:s bref gamla på Åland tunns fremmande mynt; att desse varit Orientaliska, blir sannolikt derigenom, att några i sednaste tider derstådes funna mynt jemväl varit sådana, och 1739 upptogos dersammastådes enligt Liljegren, ur ett stenrös, af Eric Larsson i Dåvö (läs Dånö) 5 gamla silfvermynt.
- 2) På Saaris hemman i Salo by, Uskela Socken, hittades Le 1080 bland Anglosa(hsiska Tyska och Byzantinska mynt atven Kufiska, af hvilka ett Kufiskt kom till Assessor Brenner, ch mages till Abo Universitets hibliothek, sas im det heter i Prof. Bilmarks 1700 utgitna Diss. de Numis quibusdam antiquis in Finlandia repertis, pag. 5: in paraecia Uskela reperti sunt nummi andici, quotum nonnulli in Bibliothecam Academia abocusis commigratumt, ulti contra temporum hominumque injurius sol-

licite servantur". Branden i Åbo 1827 förstörde dem dock, med undantag af ett eller par stycken som återfunnos i askan. — Liljegren nämner väl icke orientaliska mynt bland detta fynd, men af nyss citerade ställe hos Bilmark synes att jemväl sådane der förefunnits.

- 3) Enligt ett af Liljegren citeradt bref ifrån Professor Clewberg till Berch har år 1762 och tid efter annan i Nousis socken anträffats flere betydligare samlingar af mynt, hvaraf blott 4 Ethelreds penningar blifvit insände; största delen, (hvaribland tvifvelsutan ock Arabiska mynt) "var redan fallen i guldsmedernas omilda händer".
- 4) År 1787 fann man i *Pelkäne* i jorden en armring af silfver laggd i spiral tre hvarf, med en fyrkantig knapp på den ena och en ögla på den andra ändan, ringen vägde 14½ lod; dessutom 65 Anglosachsiske mynt af Ethelred och Cnut, 25 Irländska, 14 Tyska samt 40 lod *Kufiska* mynt, som allt inlöstes för de Kongl. samlingarna i Stockholm.
- 5) För omkring 15 år sedan fanns en rik skatt af silfvermynt och andra forntida minnesmärken, ibland dem ett massivt tungt värjfäste af silfver, under gräfning i en backe å *Tuomola* militie-boställe i *Reso* socken, tätt invid stora landsvägen ett par stenkast från kyrkan. Största delen af detta fynd, som ock innehållit Kufiska mynt, skall blifvit såld till guldsmeder. Dock torde ett och annat Kufiskt mynt funnit den lyckligare vägen till

en samlares myntkabinett. Detta är tvifvelsutan samma fynd hvarom Hildebrand i dess förut citerade arbete om Anglosachsiske mynt pag. 72 anfor följande: "I Reso Socken Åbo Län har i sednare åren anträffats ett fynd hörande till vår fjerde class (till hvilken Hildebrand räknar mynt från medlet af 10 till slutet af 11 seklet). Genom Hr Brukspatron Ph. D:r Pinellos godhet, heter det vidare, har jag blifvit satt i tillfälle att se 45 mynt af detta fynd hvaribland voro 17 Anglosachsiska samt 28 Tyska, de flesta af Kejsar Otto. Med benäget tillstånd utvaldes håraf 13 Anglosachsiska och 10 Tyska mynt för Kongl. myntkabinettet." ")

6) Ar 1832 i September antraffades på kapellansbolets åker i Rautus Socken af Wiborgs Lan ett fynd af omkring 20 st.

Att detta i Reso Socken år 1831 eller 35 påträffade rika jordfynd hallits sa hemligt, och blott smaningom blifvit föryttradt, och salunda skingradt, finner sin förklaring deri, att, enligt hvad jag nyligen af någre bland allmogen på orten erfarit, förhållandet vid fyndet varit följande: då denna skatt af vallherden Paulin, en gammal gubbe, och en liten gosse vid namn Ström först påhittades (och detta, enligt Paulins egen uppgift, till följe af flere åt honom af den osynlige skattvårdaren — Haltia — förunnade syner och uppenbarelser) hade desse båda upptagit endast ett mindre antal silfvermynt, och begifvit sig upp till gården, för att begära häst och kärra till skattens afhemtande. Så snart man der kommit under fund med sakens sammanhang, var man ej sen att, under lyckönskningar för de nu plotsligt riktade skattgräfvarnes välgang, undfagna dem med bränvin till den mängd, att de, glömmande sitt egentliga värf, insomnade. Då de slutligen vaknade erhöllo de oförtöfvadt häst och begäfvo sig till skatten, som — var försvunnen.

silfvermynt, af hvilka ett par skola varit trekantiga. Till storleken uppgifvas några varit så stora som en silfverrubel, men de flesta lika med 20 kopek silfver. Enligt hvad Hr Prosten Lector Borenius hast godheten meddela mig, skall detta fynd blifvit inlöst af Öfverste Fock, och af honom troligen föräradt till någon samling i Petersburg eller England. Måhända har något sådant varit å bane, men det säkra är, att 9 af dessa mynt, alla Kufiska, nu förvaras i vårt Universitets mynt- och medalj-kabinett, jemte en beskrifning öfver dem, gifven af Hr V. Stats-Rådet Fræhn, hvilken beskrifning i finsk öfversättning står att läsas i 50:de numern af Sanan Saattaja Wiipurista för år 1833. Nästan alla dessa mynt äro rara och märkvärdiga, såsom det af Chalifen Rhadi, den 20 Abassiden, i Baghdad år 324 = 936 präglade, det af Hasan ben Merran i Miafarekein (i Mesopotamien) från slutet af 10:de seklet, det af Hoeihu Chanen Ilek Nasr af år 399 = 1008; det af den 3:dje Samaniden Ahmed, prägladt i Enderabe (öster om Balch) o. s. v., men märkvärdigast bland alla och en verklig klenod är den redan nämnda Numus bilinguis som utom de Arabiska charactererna innehåller en skrift, den ingen annu lyckats dechiffrera; ett dylikt, hittadt vid Revel, ager Vet.-Acad. i Petersburg och hälften af ett annat dylikt mynt år funnen vid Gesle, flere finnas ej.

7) Enligt Finska Vet. Soc:s Handlingar Tom. I. pag. 731 förärade Lands-Kamereraren i Uleaborg, Assessoren och Riddaren Bergbom i Mars månad 1841 till härvarande Universitet

ett på grånsen mellan Kuolajärvi och Sodankylä Lappförsamlingar under en större jordsten påträffadt fynd, som befunnits vara omlindadt med nåfver och bestod af 174 st. små silfvermynt, en flåtad halsring af silfver, tvenne armringar af blandad metall, en brisk af samma amne, en liten vågbalance af metall, med leder att hopvikas och 2 dertill hörande vågskålar samt 12 stycken större och mindre vigter af metall. Ehurn några orientaliska mynt ej ingått i detta fynd, äro dock, enligt hvad allmänt af antiquarier erkännes, de flåtade silfverhalsringarna, sådana man åfven i Sverige ofta anträffat, af orientaliskt ursprung, hvilken asigt ytterligare bestyrkes deraf att "liknande smycken ännu i dag begagnas i vissa trakter af Asien", (Hildebrand l. c. XI.); afvensom det är högst sannolikt, att vågbalancen med dess tillhörigheter äro österländska, isynnerhet derföre att just de Kufiska mynten företrädesvis gått och gällt i Europa icke efter sin stämpel, utan efter vigt, såsom den flerestädes men särdeles på Gottland och Öland funna mängden af halfvor samt större och mindre fragmenter, hvilka icke höra till samma mynt och nästan aldrig passa till hvarandra, tydligen ådagalägger. Åfven på hela mynt finner man skåror som troligen derföre blifvit å dem anbragta att de lättare skulle kunna sönderbrytas och växlas till smått eller, att tala enligt Finska språkbruket, söndras.

8) På stranden af en nåra Nordenlunds egendom i Syssmä socken belägen insjö hittades 1841 om hösten ett Kufiskt silfvermynt och förårades af Herr Capitainen Baron Stjernerantz

till Borgå Gymnasii samling. Myntet är beskrifvet i Borgå Tidning för 1841, N:o 88.

Nära Kexholm påträffades år 1842 af en Rysk soldathustru i sanden vid Wuoxens strand 3 stycken Kusiska silfvermynt af hvilka det raraste blott är ett fragment. Dessa mynt blefvo af dåvarande Kyrkoherden i Kexholm Hr Prosten Adam Höijer förärade till Borgå Gymnasii samling. Beskrifningen öfver dem är införd i Borgå Tidning för år 1843 N:o 78 och 1847 N:o 29. Ehuru dessa mynt alla 3 funnos på en gång, erhölls fragmentet, som man troligen ansett vara af mindre värde, först sednare. Alla åro de dock märkvärdiga såsom Omajiadiska och Abbasidiska Chalif mynt, men särdeles fragmentet som är prägladt i Destunca i Chusistān, en myntort, hvarifrån, så vidt man härtills vet, blott 3 mynt, slagna under Chalifen Walid I. år 93, 95, 96, kommit till våra länder, och förvaras dels i Charkoff i Grefve Stroganoffs samling, dels i Upsala.

10) För ett par är sedan förärades till Universitetet, genom Herr Protokolls-Secreteraren Falck, af Hr Phil. Dir Prosten Homén ett Kufiskt mynt funnet redan är 1826 i en sandbank invid Eura Prestegård. Det hör till Samaniderne och är prägladt i Samarkand år 305 efter Hedschra eller 917 efter Christi födelse under Chalifen Moktadir billahs' tid af Emiren Nasr ben Ahmed.

- 11) Ar 1843, i Mars, skänktes af vice Landtmätaren M. K. F. Tudéer till Universitetets myntsamling ett i en sandgrop invid Haga rusthall i Sääxmäki funnet Kufiskt silfvermynt, också en Samanid'slagen i Samarkand; årtalet är utnött, men det måste vara prägladt emellan 331 och 345 efter Hedschra då Emiren Nuh. ben Nasr, hvars namn tydligen å myntet kan skönjas, regerade i Mawarannahr (Transoxanien).
- 12) År 1847, i Februari, insändes af Kyrkoherden i Finström på Åland, Hr Prosten och Ordens-Ledamoten von Knorring till Alexanders Universitet en något illafaren Samanidisk Dirhem funnen år 1846 å Finströms prestegårds åker vid kyrkan på en åkerväg som våren förut afskalats till matjord, och der man förgäfves efterletat några flere. Myntet är prägladt under nästnämnde Nuh ben Nasr år 334 uti staden Schasch eller Alschasch vanligen Taschkent kallad.
- 13) Samma gång förårades, genom Hr Professoren Palmén, af Herr Apothekaren Montell ett Chalif-mynt, funnet på Gödby, i Finströms socken. Myntet är utmärkt väl bibehållet och förskrifver sig från år 191 efter Hedschra eller 806 efter Christi födelse således från Harān Arraschāds tid. Det är prägladt i fredens stad (medinatussalām), d. ä. Baghdād.

Huruvida några flere fynd af Orientaliska mynt i Finlands jord anträffats är mig tills vidare obekannt; men åfven det redan anförda torde vara tillräckligt att bevisa, det Finnarna i 9:de och 10:de seklet, likaså väl som Skandinaverne stodo i handelsförbindelser med Orienten, som från nordens länder för betalning i silfver och andra dyrbarheter, af hvilka Österlandet hade ett så stort öfverflöd, tillhandlade sig, såsom Ibn Fozlan berättar, zobel, gråverk och andra pelsvaror, bernsten och slafvinnor. Slutligen kan man med säkerhet antaga, att de betydliga från Asien till Östersjöns kuster bragta skatter, som i dessa länder anträffas, till största delen gått genom finska händer, ty af finska folkstammar var det som Bjarmalands och Bulghars betydliga handel underhölls. På ömsesidor om Rysslands största, månggrenade floder bodde då Finska eller Tschudiska folkstammar: Tschuwascher, Tscheremisser, Mordviner, Permier och Weser eller, som de af Orientalerne kallades, Wiisu.



FÖREDRAG

PÅ FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETENS ÅRSDAG DEN 29 APRIL 1849,

HALLNE AF SOCIETETENS D. V. ORDFÖRANDE

I. ILMONI.

Introduction.

Då Finska Vetenskaps-Societeten för jemnt ett år sedan firade en högtid sådan som denna, — och hvilken jag, såsom Societetens d. v. Vice Ordförande, af en bedröflig anledning fick äran öppna, — hade denna Societet uppnått det första decenniet af sin tillvaro, och vi mönstrade då med en flygtig blick denna framfarna tidrymd jemte Societetens derunder upplefvade skiften, dess sträfvanden, men ock dess i synnerhet mot slutet deraf gjorda bittra förluster. Af ett nytt decennium har Vetenskaps-Societeten nu tillryggalagt det första året och äfven på denna korta tid måste vi blicka tillbaka med blandade känslor. Societeten har derunder fortfarit i sin stilla, anspråkslösa verksamhet, — har, bland annat, också haft den glädjen att i sin famn sluta en frejdad vetenskapsman, som väl redan länge varit medlem af Socie-

teten, men ifrån sin vidtafskilda vistelseort hittills icke kunnat omedelbart deltaga i hennes göromål. Men å andra sidan är äfven detta lilla tidskifte for Vetenskips-Societeten tecknadt af dodens spår. Hon har nämligen derunder förlorat icke allenast sin celebraste Hestersle lamot. Kemiens Konung, den vieltfrejdade Baron Berzelius, hvars odödeliga förtjenster om Naturvetenskaperne aro alltför stora, för att af mig, och vid detta korta tillfalle, hunna ens antydas, och hvars bortgång begråtes af hela den bibliade verlden. - icke allenast Honom har Vetenskaps-Societeten förlorat, utan äfven ännu en af sina Ordinarie medlemmar, tillika en af hennes stiftare, Professoren och Riddaren J. G. Linsén, - en man, utmärkt af en sällspord lärdom och æsthetisk bildning, af en djup och säker känsla för det rätta, sanna och skona, hvilkas ideer bodde i hans brost med letvande klarhet, - en man mera än de fleste dödlige pröfvad af olyckan, som derfore ook hade patryckt hans redan ursprungligen slutna retliga lynne en egen prägel af vemod, ja stundom kantighet. Men inom detta dystra skal klappade ett det ådlaste hjerta, dolde sig en fornklassisk karacter, nård af de förgångne Stores andar, och i all sin rikedom blott af få förtrogne närmare känd. Genom dessa egenskaper utofvade hans personlighet uppa sina omgifningar att starkare inflytande än man kunde vilja tro, såsom vanligen är fallet med dessa djupa naturer, dessa olösta gåtor i de menskliga individualiteternes outtomligt rika sfer. Det nu sagda är icke blott den sörjande Vanskapens, utan afven den ojälviga

Sanningens sista gärd åt den hädangångne. Frid öfver hans stott och Högaktning åt hans minne! — Hvad i öfrigt angår Professor Linséns personlighet, och hvad han verkat både i Vetenskaps-Societeten och vid Universitetet, kommer att af en skickligare hand skildras.

Hvilka öden och möjligtvis älven förluster, som förestå Vetenskaps-Societeten i den närmaste framtiden, kunna vi icke ens ana. Icke utan oro blicka vi in i denna framtid, särdeles för det närvarande, då vi befinna oss i en af mensklighetens mest oroliga tidsepoker, då de brusande lössläppta passionernas stormvindar rasa till den grad, att man nästan är frestad att antaga tillvaron af en pandemisk vansinnighet, - men en tid, då derjemte allt utvisar, att ur denna förfärliga smältningsprocess en total och omätlig förvandling kommer att ega rum inom Andens verld, ehuru ingen dödlig ännu kan veta, hurudan denna månde blifva. Men, med hänsigt till våra kulturförhållanden, har jag redan på den sistfirade årsdagen haft tillfälle att uttala min tro angående denna tids anda och betydelse. Derföre nu ej vidare derom. Jag-kan endast, äfven vid detta tillfälle, bifoga den varma önskan, att den Högste länkaren af mensklighetens öden måtte tillåta Fridens himlaburna ängel att äfven fortfarande lyckliggöra vårt älskade Suomi, och att inga utbrott af den lösliga tidens yrande dämoner måtte störa detta lugn och söndersplittra den verkliga lycka, som vårt land åtnjuter framför de flesta andra, kanske alla länder, under det i snart sagdt hela den öfriga civiliserade verlden samfundslifvet kämpar mel djupt sjukliga rigtningar. Ty — såsom vår nu lefvande storste skald sjunger —

"Här är oss ljuft, här är oss godt, Här är oss allt beskärdt; Hur ödet kastar än vår lott, Ett land, ett fosterland vi fått, — Ilvad finns på jorden mera värdt Att hållas dyrt och kärt?" — —

Ja, måtte vi alla genom förnuftig, ådel handling visa, att vi rått veta vårdera denna skatt! Och uti alla dessa önskningar, åfvensom i den dermed innerst forknippade, att vår hulde Monark och Hans narmaste hoga Omgifning måtte stadse vål gå, instanmer sakert hvarje sannt fosterlandskt hjerta, tv dettas karlek år ei en frasande eld, utan en mild laga, som med sanning belvser foremalen och värmer själens innersta märg! Detta lugn är hulvudvilkoret for den fosterlandska kulturens fortgång i vår aflagsna vra af verlden, och salunda åfven för vår Vetenskaps-Societets framtida bestånd, för dess sträfvandens framgång. - Hvad mı dessa strafvanden angar, så hafva de varit - det tror jag mig kunna såga - allvarliga, så mycket Societetens medlemmars andra officiella varf det tillatit, och jag hoppas de icke skola vara utan nytta såsom offer på den allmänna vetenskapsbildningens altare. Man har förebrätt var Vetenskaps-Societet att den vore alltlör litet fosterlandsk till sina forskningars syfte och föremal. Denna forebraelse är dock, fror jag, orattvis. Ur

ett i detta afseende af Societetens Herr Secreterare, enligt Diarierne, mig benåget meddeladt öfverslag af Societetens till en stor del i dess Acter införda föredrag och meddelanden ser jag, att, af 273 sådane hittills i Societeten hållna, 85 uteslutande behandlat Finska föremål under följande rubriker:

Naturalhistoria	•			•										21.
Fysik och Meteorologi						4						•	•	18.
Mineralogi	•													-
Historie och Statistik			•			٠					٠			13.
Litteratur-Historia .		•		•	•		•		• .	•			٠	7.
Geologi, Geografi, Etn	og	rafi,	F	lol	ogi	, n	1. I	n.	•		•			19.

Summa 85;

— således ungefår en tredjedel af hela antalet. Härtill komma ännu 9 me ldelanden om fornamligast Finska naturföremål af Sallskapet Pro Fauna & Flora Fennica, införda i Societetens Acter. och 250 till Societeten insända Klimatologiska och Meteorologiska anteckningsböcker, hvilka, likaledes af rent Finskt innehåll, af Societeten såsom forsknings-materialier begagnas. Härvid bör ei heller forbises den omståndigheten, att Societeten behandlat så få ämnen ur Finsk Historie och Filologie, af det skäl, att denna nationelt Finska litteratur, just för sin stora rikedoms skull, redan utbildat åt sig ett eget fält och egen uteslutan le for den arbetande Association. Att yrka det alla, eller t. o. m. blott de

flesta vetenskapliga meddelanden borde omfatta rent Finska föremål, är en orimlig fordran; tv - utom det att sådant strider emot den universelare vetenskapliga tendensen af denna Vetenskaps-Societet, såsom af andra dylika vetenskapliga Samfund, får det fosterlåndska intresset en ensidig rigtning, om det söker underordna mensklighetens allmänna kultursträfvanden sina speciela. Sa mycket ock hvarje enskildt folk är bestämdt att enligt och ur sin egendomliga natur bidraga till den allminna bildningen, likså mycket måste å andra sidan äfven Vetenskapens allmänna resultater i hvarje särskildt land bearbetas och kunna blott så komma detta till godo. - Hvad nu slutligen angår Vetenskaps-Societetens göromal under dess sednaste nu tilländalupna år, eller dess historia öfverhufvud för denna tid, så kommer en Arsberättelse derom att, efter vanligheten, nu genast af Societetens ständige Secreterare, Hr Prof. och Ridd, af Schulten, uppläsas. De föredrag, som derefter vid detta tillfälle bli hållna, äro, ett ur hvarje Section i stadgad ordning, följande: Ur den Mathematico-Fysiska Sectionen af Hr Professor Woldstedt. Framställning af de nyaste forskningarne i Fixstjern-Astronomien, - ur den Naturalhistoriska af mig. Om det nuvarande Skolsystemets inflytelse på helsan, - och sist, a Vetenskaps-Societetens vägnar och ur den Historico-Filologiska Sectionen. af Hr Prof. Gylden en Minnesteckning ofver framlidne Prof. och Ridd. Linsén.

Om det nuvarande Skolsystemets inflytelse på Helsan.

Ett af de vigtigaste föremål för både Statsmaktens och Läkare-konstens gemensamma bemödanden är det uppväxande slägtets både kroppsliga och andliga Helsa. Bland de förhållanden, hvilka mest kunna inverka på denna helsa, till dess utveckling eller förstöring, är ett af de väsendtligaste Uppfostran i all dess vidd, den fysiska och den psychiska: — det kan derföre vara nyttigt att i denna tid, då uppmärksamheten fästes på alla sferer i samfundslifvet, äfven i vårt land ännu en stämma höjer sig att, å Vetenskapens och Läkarekonstens vägnar, uttala några påminnelser i detta vigtiga ämne, som för öfrigt icke heller borde anses ovärdigt denna högtids betydelse.

Till en början är det nödigt att jag med få ord antyder Naturens lagbundna gång vid det menskliga individets utveckling; ty det är väl dock Hennes gudastiftade lagbok, som skall utgöra rättesnöret för de menskliga åtgärderne, och den förra är i det väsendtliga öfverensstämmande med Förnuftet, emedan begge äro hvarann motsvarande yttringar af samma Eviga Urgrund för lif och tanke. — De åldrar, uti hvilka menniskovarelsen utvecklas, ifrån sitt gåtfulla första ursprung till möjligast fullständig individualitet och personlighet, kallas af fysiologerne med rätta "Omo-

genhetens aldrar"; tv har - uti dem - ar varelsen annu icke utbildad, utan stadd i ett bestämligt vardande till hvad den enligt sin ide han blifva. Af dessa evolutionslillrar forbigår icg hår de tvanne forsta. Dialdern och Barnaaldern, tillsammans upptagande ungefürligen lifvets forsta septennium, hvilka utmikrkas förnämligast af den första dentitionsprocessen och en öfvervägande mottaglighet af yttre intryck: - ty under denna tideryml, så vigtig den ock annars år, kan det annu icke blitva friga om nagon Skolupptostran. Jag en last gor derem den anmärkning. att den sednare större delen deraf, då språket, taltörmågan, detta första underhara uttryck af menniskans andeliga lif, framtrider. utgör afven den altta aldern for den religiosa kluslans forste gro 11, hvilken klinsla och otelhatt är den innersta, heliga, at askuldens genius vardade raten till all sann billning, och endast genom moderskärlehens värme kan rätt utveckla sina hjertblad. Lychliga derlire de barn, hvilha få genomgå denna bildningskurs; men de äro, tyvärr, få! - Det nu följande evolutionsskiltet. Pojkåldern, som kan (i de tempererade Haderne) råknas ifnin Tie-Sie till 14:e-10:e aret och siledes är migelinett septennium lingt, utgör just den ligte skolgingers tid samt utmirkes hufvudsakligast af följande: De sista resterne af ett lägre vegetati onslit (mildletånder m. m.) forsvinna. - det stallighlifvande Tund prograted sublides, - Respiration, Arteriellitet och Muskelsystem utvecklas raskt, - en fri andedrägt blir ett trängande behof och driften till röreber, hvilka åre lilliga, reska, blir memut-

ståndlig, - allt är lif och rörlighet, men sömnen är ock, till ersättning derför, kring 10 timmar lång, ihållande, djup; - i det psychiska utbildas Sinneperceptionen och Förståndet, Minnet ernär sin största höjd, Inbillningskraften är liflig, allt vill ikläda sig objectivitet, lek blir allt mera allvar, fröjd vid lärande och ansträngning, känsla för ära och utmärkelse vakna; - men förnuftet kan sägas ännu slumra och dess ideer, som ännu icke kunna fattas i sin renhet, förkroppsligar den liftiga inbillningen till concreta gestalter, - de begge könen skilja sig gerna i umgänget. Men denna ålders förra och sednare hålft åro dock hyarannan något olika, - den förra har ännu stor Receptivitet, den sednare alltmera Activitet, o. s. v. - Det nu intradande sista utvecklingsskiftet är den egenteliga Ynglingaåldern, hvilken kan anses börja med det 14:e-16:e året, sluta vid det 21:e-23:e, ja t. o. m. 25:e, så likaledes upptagande vid pass ett septennium eller något mera, och hvars utmärkande karacterer äro väsendtligast dessa: Pubertetsactens och sexualdriftens frambrytande och vidare utveckling, concentrerade mest till bröst- och bäcken-sferen, olika efter de särskilta könens natur, - de kroppsliga functionernas, i synnerhet Respirationens och Blodberedningens, fullständiga utbildning, och såsom exponent af den förenämnda frambrytandet af stämmans karacteristiska fulltonighet, - alla hinder för nyssnämnde Centralfunctioner äro ock nu fördersligare än någonsin; inom den psychiska sferen uppnår Förståndet sin sista utbildning och Fantasien blir rikare än någonsin, - Förnuftet, sinnet för

Universalitet, för Ideerne, det högsta i lifvet, och medvetandet af det Eviga äfvensom af nödvändigheten att lefva derför, uppvakna, hvadan det ideela alltmera nu genomskimrar det materiela, - Olvertvgelsen stadgas, ehuru ofta genom tviflets luttringsprocesser och först längre fram, - Viljan blir stark, ja enthusiastisk, känner knappt nagra skrankor, ty lifvet svallar och vill ha luft, - uti särskilda djupt anade rigtningar åt de kommande värfven arbetar sjelfverksamheten alltmera, - med ett ord, denna alder är både till det kroppsliga och andliga Menniskovarelsens Blomningstid, och om då utvecklingen går normalt, så uppnår menniskoindividualiteten nu sin harmoniska utbildning och af naturen bestämda personlighet. Men afven denna alder maste indelas i en tidigare och en sednare period, hvarann mycket olika, Jen forra med mindre, den sednare med större sjelfständighet och fulländning, m. m.; och denna älder, hvilken tillhör Gymn sii- och Student-lifvet, öfvergår småningom i Menniskoindividets middagstid, den s. k. Mannaaldern. - Vi se af allt detta hurusom den kroppsliga sidans utveckling alltid har ett forspring framfor själslifvets, såsom öfverhufvud i Naturen det materiela framträder först, det ideela seduare.

Om vi nu med denna Naturordning för Individets evolution jemtora, med hänsigt till helsoforhallandena, det satt, som i de flesta länder, äfven i vårt, är vanligt att utöfva undervisningen icke allenast i publika Skolor, utan äfven, hvad här ock bör afses, i enskilda Pensions- och Skolanstalter, så måste det

väl medgifvas, att förfarandet i dessa inrättningar ingalunda år till alla delar naturtroget, och derföre icke heller i allo kan frikallas från ett större eller mindre ingrepp i det uppgryende slägtets helsa; samt gäller detta i synnerhet de s. k. lärda skolorne. De omständigheter, i hvilka det nuvarande skolsystemet afviker från Naturen, och hvarigenom det kan blifva skadligt, äro förnämligast följande: 1:0 Den, att skolgången börjas ganska ofta alltför tidigt, relativt till det spåda individets fysiska och psychiska utbildning, åtminstone i stor mångd fall redan före det 7:e-S:e året, och detta till följe af dels föräldrars fåfänga, dels andra orsaker, - för tidigt kroppsligen, för att utan mehn kunna uthärda det uthållna stillasittandet m. m., för tidigt för själen, emedan dennas krafter ännu äro för svaga, men isynnerhet den religiösa grunden, hvars nödvändighet är ofvanföre antydd, ännu är alltför löslig, hvilket fundament åter måste läggas inom familjen, såsom sagdt, ty i skolan kan det ej mera ske, på sin höjd något stadgas. — 2:0 Skadar ifrågavarande system framför allt annat derigenom, att den intellectuela uppfostran bedrifves alltför ensidigt, icke allenast mycket öfvervägande framför de öfriga själssferernes - Inbillningskraftens, Handlingens, Modets, Känslans, - utan äfven, hvad ännu vigtigare är, alltför mycket på den kroppsliga naturens bekostnad. Det är nämligen en afgjord och kånd sak, att i de flesta stater, och äfven hos oss, skoltimmarnes antal i veckan uppgår till 30 à 40, och derutöfver (jag vet, att det t. ex. i Bayern varit åtminstone en tid blott 26,

men detta är ett undantag från det vanliga), och häraf belöpa sig i medeltal på dagen 5 à 6 timmar eller mera. Men utom denna tid, som gossen tillbringar i skolan, måste för honom fullt ut lika många timmar atgå för att hemma inlära sina läxor, ja olta dubbelt så många, eller mer, för gossar med mindre goda natursgafvor, helst den nutida skolundervisningen består, strängt taget, mera i ett beständigt examinerande än i ett verkligt utbildande och ledning, - hvadan man kan antaga, att öfverhufvud och i lindrigaste fall minst ett halft dygn måste af den arme gossen tillbringas likasom fastsmidd vid stolen och hopkrumpen. Dock icke nog dermed, - äfven af nattens, at hvilans helgd egnade, stunder maste han ej sällan, då han är mindre väl lottad, uppostra en eller annan, om han vill allvarligt fullgöra sina pensa. Sadant är ett helgerån på Lifvets fridlysta område och kan ej förfela att utveckla sina menliga följder, - detta i synnerhet i en period, da allt är lif och Naturen genom idkelig rörelse i det fria och ostörd tillräcklig hvila hänvisat åt den kroppsliga organismens i synnerhet centrala functioner, Respirationen och Blodberedningen, den raskaste utveckling, hvilket äfven för hvarje den enklaste betraktelse ådagalagges genom den oemotstim lliga drift, hvarje lefvande vasen, särdeles menniskan i de uppgryende aren, röjer att ibra sig, såsom åfven redan blifvit aiunärkt. — 3:0 Utgöres en orsak, som nära sammanfaller med den foregrende, af högst olikartade larolamnens liktidiga bibrin-Luule till alltfor stor mingfald eller deras sammanblandade in-

dressering i det unga väsendets hufvud. Så inläres t. ex. hos oss liktidigt icke mindre än 5 till 6 språk utom modersmålet, af hvilka 4 t. o. m. bőrja, i lägre klasser, nästan på samma tid och derjemte några särskilda slags vetenskapsstycken. Omvexling i sysselsättningar är visserligen välgörande för hvar och en, särdeles de unge; men någonting helt annat är detta ett barnasinnes liktidiga uppfattande af flere de mest heterogena saker på en gång: och erfarenheten har visat, att denna läroämnenas stora mångfald förorsakar, hos de spådare åldrarne, kroppsligen en stegrad nervretlighet, hvilken åter i sin mon disponerar för flere sjukdomar, - i själen åter, som ännu ej har förmåga att till ett sammanfatta denna för stora diversitet, vållas deraf förbistring och oreda uti ganska många fall; och att i barndomen t. ex. sammanblanda flere språk, har dock vanligen den följden att intet läres väl. - 4:0 Har man ansett den omständighet verka skadligt, att flere lärare, liktidigt befatta sig med samma elever, i synnerhet om detta sker, såsom uti en och annan privat-anstalt, på lägre klasser; hvilket än vidare måste befordra kunskapsförrådets ensidiga stegring. En hvar af dessa lärare har det berömliga nit, att i möjligaste grad söka hos sina skolarer uppjaga skicklighet i sitt läroämne (ty, huruhelst författningar må bestämma slikt, beror detta dock, hvad kunskapens detalj vidkommer, mycket af lärarens godtycke); men ofta förmår en sådan lärare ej att sätta sig på lärjungens ståndpunkt och vet, eller besinnar ej, hvad

allt äfven hans Colleger fordra: och så stegvas ej sällan skolarbetet enormt för gossarne, dem till skada. Dessutom torde detta lärarnes flertal vara, åtminstone i de lägre klasserne, hinderligt för det kärleksfulla forhallande, som bör ega rum emellan lärare och lärling; ty då skolan är, såsom en stor författare träffande sagt, "det utvidgade foräldrahuset", så kan detta kärleksfulla förtroende i synnerhet af en yngre gosse lättare egnas åt en enda person, likasom varande i faders ställe, än fördeladt åt flere. Till allt detta kan ännu läggas äfven ett i flere skoleanstalter inträffande tätare ombyte af lärare, hvilket, jemte dess menliga inverkan på själsutbildningen, åfven mycket kan skada kroppens helsa.

Betrakte vi nu alla dessa inflytelser i deras sammanhang, så skola vi, med hänsigt till deras af naturliga skål djupare ingrepp i den spådaste åldern och qvinnokönet, kunna ur dem förklara tillvaron af de sjukdomar, hvilka erfarenheten visar vanligen vidlåda skolungdom. I universelare form höra hit, — i följd af de omåttligt stegrade intellectuela förmögenheternes förminskande af organismens saft- och kraft-förråd, — en bristfällig Respiration, hämmad Blodbildning och ofullständig Nutrition, hvilket röjer sig genom aftyning, afmagring, blek, sjuklig ansigtsfärg, slapp muskulatur m. m., ett tillstånd som utgör en rik disposition för en mångd lokalsjukdomar, och hvaraf man finner lefvande typer någon gång åfven hos oss, men än mera uttikes, uti dessa bleka underdjur af vehikler för menskligt kunskapskram, hvilka vid 30 års ålder åro utmärglade gubbar. Af-

ser man åter speciela sjukdomar, så bör här först nämnas, att hos de individer, hvilka i en tidigare âlder haft Engelska sjukan, genom denna hjernans och det sensitiva lifvets förtidiga utveckling jemte hämmandet af det respiratoriska momentet, denna sjukdom icke blott icke utrotas under pojkåldern, utan tvertom anyo befordras, ehuru med főrändrade former, — och i sammanhang härmed framträda äfven deformiteter i Benbyggnaden, hvilket fenomen i sednare tider mycket tilltagit, i synnerhet i flickskolor. Hit måste äfven räknas Skroflerne, en sjukdom, som — utgörande den civiliserade mensklighetens nuvarande cardinaldegeneration, i ett fruktansvärdt stigande, med alla dess bedröfliga följder, Tuberkellungsoten m. m., - visserligen har många andra orsaker, men älven i skolans sedentära, instängda lif har en rikelig näring. Ur samma källa härflyter ock Bleksjukan, ett lidande, hvilket i sednaste tider tilltagit hos qvinnokonet, i synnerhet i de högre stånden, till en verkeligen oroande grad och som med skäl af de fleste läkare tillskrifves flickskolors och pensionsanstalters merendels förvända läroskick. Vidare må, såsom till särskilda organer lokaliserade specialsjukdomar af nämnde orsak, omförmälas: störd Digestion, stockningar i Underlifvet och hvarjehanda Dyspeptiska lidanden, hvilka i allmänhet äro stillasittandets följder, — flere slags Bröstsjukdomar, mest alla med stark Hectisk disposition, - Congestioner åt Hjernan, hvilka ej sällan leda till Hjerninflammation, Fallandesot och andra Krampsjukdomar, m. m. Ett särskildt afseende förtjenar derjemte här den så kallade Spinal-irritationen, hvilket egna lidande hos Ryggmärgen eller dess Omsvepen, om det och af äldre tiders läkare blifvit såsom sådant oftast förbisedt och derföre äfven fordom förekommit oftare ån det nu vill synas, likvål — enligt säkra iakttagelser — bestämdt och i stor progression tilltagit i vår tid, särdeles hos ungt folk af de bildade klasserne, och det man af många skäl måste i en hufvudsaklig mon härleda ifrån det nuvarande skollifyet. Yttermera kunna hit råknas åfven en förtidigt framkallad sexualdrift med alla deraf härrörande sjukdomar, i synnerhet i Nervsystemet, som for öfrigt af den gemensamma orsaken lider af en vtterligt sjuklig känslighet och receptivitet för alla möjliga intryck. -Slutligen fa vi icke heller förbise de afvikelser inom det Psychiska lifvet, hvilka hjaröra af detta förhållande och till sin upprinnelse aro redon mest ur den allmanna Erethismen lätt förklarliga. Sadana aro: förstämning och disharmoni uti själen, tafatthet och oformåga för allt practiskt, modlöshet, misstroende, ett vresigt, passioneradt lynne, ja ovilja för studier och bildning, hvilket alt illa klider glädjens af naturen rosenfriska ålder. Men äfven Oskuldens genius viker hort och i dess ställe insmyga sig lättare in under andra förhallanden, i den slappa obevakade själen, Lasterne med sina sirensånger, fruktansvärdast bland alla en viss hemlig, hvars råtta luftstreck är skolqvalmet, och som oftast ohjelpligt sönderfräter lifvets innersta nervträdar. Andteligen följa in ihagavarande grundorsak åfven verkliga själssjukdomar, och de nyaste statistiska forskningarne synas äfven bekräfta detta.

De sjukdomar och öfriga afvikelser, hvilka nu blifvit omnämnda, hafva visserligen - och flere af dem i vida större mon - äfven andra orsaker än Skolsystemet. Jag vill derföre för ingen del skylla detta ensamt för dem, utan påstår endast, att äfven detta ofta framkallar, alltid underhåller och förvärrar, sådana lidanden. Likväl väntar jag mig vigtiga inkast emot det ofvananförda, förnämligast dessa: För det första, att denna skildring af det nuvarande Skolsystemets menliga inflytelser är öfverdrifven, och att nämnde, detta tillvitade, sjukdomar utgöra ett så litet antal, att de kunde anses endast för undantag. Det är likväl icke så: att sådana sjukdomar kunna hafva den nämnda orsaksgrunden, detta bestyrka bestämda iakttagelser af så utmärkta läkare som Tissot, Hecker, Albers, m. fl., och i synnerhet Lorinser, hvilken åt detta ämne egnat mångåriga, grundliga forskningar, - hvarjemte den enklaste fysiologiskt-pathologiska betraktelse bekräftar saken. Följderne af nämnde orsak äro dessutom flere an de synas vara, af det skal, att de ofta först längre fram utveckla sig, i synnerhet under studentlifvet; ty bland sjukdomar, som numera oftare än fordom förekomma bland de Studerande vid Universiteterne, såsom t. ex. Lungsot, Dyspeptiska lidanden, Spinal-irritation och andra Nervaffectioner m. m., hafva - såsom Albers t. ex. visat - en stor del sin rot redani det föregående Skol- eller Gymnasiiskistet. Att för öfrigt nämnde följder icke äro - såsom man kunde vänta - ännu svårare och frequentare, detta är att tillskrifvas det moderliga, dem

motverkande skydd, den unga menniskovarelsen åtnjuter af Naturens, den menskliga vrångheten merendels så underbart försonande Alstringskraft, hvars verksamhet likvål åfven har sin bestämda gräns. Man må ej heller anföra till föredöme vara förläders allvarliga och, sasom man tycker, för helsan icke menliga Skolordning; ty denna kan icke heller fullt gillas, men skadade mindre an var tids, dels genom det mindre antal distraherande och i det hela ej så mycket ansträngande läroämnen den innehöll, dels genom de flere upplifvande lekar och förlustelser den tillhörde, dels ock emedan menniskonaturen var i åldre tider vanligtvis af förklemande inflytelser mindre försvagad, och derjemte skolgången då börjades sednare än nu. Och hvilket föredöme af motsatt art hafva vi icke i de gamle Grekerne, hvilka - harmoniska som de voro i allt - äfven uti uppfostran sökte så harmoniskt utveckla både kroppens och själens förmögenheter, att mångt och mycket af deras methoder ännu, i trots af tidernes aflägsenhet och kulturkaracterernes olikhet, kunde äfven af oss upptagas till efterföljd. - Vidare anföres såsom inkast, att de muvarande kulturförhållandena fordra detta tidiga infärande af ett i mójligaste mátto mángfaldigt kunskapsförrád, som en bildad menniska i vår tid måste ega, och hvilket derföre bör ingå i summan af den allmänna skolbildningen; och härpå får jag svara följande: En af denna tidens stora, menniskorna beherrskande, lögner är äfven den allmänna, ehuru ej alltid i tydliga ord utsjungna ton, att kunskaper och färdigheter måste förvärfvas för

att dermed lysa och "göra lycka" som man säger, och till uppnaende af detta uppfostrans högsta mål så fort som möjligt, måste allt uppbjudas. Så framtvingas hos det spåda flickeharnet genom pensionens driffnusvärme de slumrande anlagen till en onaturlig växt och blomstring, för att så tidigt som möjligt medelst talanger pryda sällskapslifyet i salongen: så plägar föräldrars skrytsamma fälänga eller ock otölighet forcera den unge gossen till att med det görligaste första genomgå sin skolkurs, och sedan skynda till Universitetet, för att, likaledes ilande derifrån, fordersammast erhålla någon tjenst i staten; - ja, vår tid har brådtom, en hetsig feber glöder i mensklighetens ådror! Jag är icke någon ignorantismens loftalare, utan yrkar tvertom, att man bör förskaffa sig tidsenlig bildning, denna sann, rik, djup, och att den bör redan i skolan fullständigt grundläggas; men det är detta brådstörtade, omognade och oharmoniska jag förkastar, såsom enligt det nu visade - ledande till både moralisk och fysisk ohelsa: och det är icke massan af genom lexor och examina inlärdt kunskapskram, utan förmögenheternas naturenliga utveckling, som är all uppfostrans mål. Men äfven bildningen sjelf förlorar genom denna skefva ilande fart, dels direct, dels förmedelst de dämoner, som derunder och derigenom fördunkla henne. Föreställe vi oss nämligen att ynglingen, såsom vanligt är, på nämnde sätt omogen och alltför ung inträder ifrån Skolan eller Gymnasium i Universitetet, så är han väl utrustad med denna behöfliga massa af kunskaper och förståndsbildning, men saknar

James merendels bolding stally a karacterent sjellsbindighet i tankeformaga och öfvertygelse, - är derföre icke heller vuxen ett verkeligen Aurdemiskt studium, hvors visendinga elementer just dessa egenskaper aro, sasom alven slere utmärkte tänkare också i vårt land redan förut ådagalagt. Når han nu icke eger denna formalligha eus o la sjedliestimmingens djupa motvigt. G mis e lan konna l'itare in ellest dukt under t'er de ming a frestelser hvilka omhvärfva honom, vorden en fri Student. Bland dessa Le pleus militig sie dim n. Egenlitelen, hvilken tidt och olta framträder och hviskar till honom: "Du förträfflige vngling! hville glimsinde egensk per her Du iche, harn mångfabliga äm icke dina kunskaper! Du är filosof, besitter en del af det absoluta och kan dermed construera Dig hvad Du behagar, - vet bättre än någon annan att tala och skrifva om natur, stat, samhillelif, hillhilag, m. m. Hvad hillyes Dig att akta på den grånicie III alament, den så kallede in aghepridvede Erfarenheten. Skala ifrån Dig dessa gunda fördomer och handli efter din egen ljust ingilvelse; ty Du ir den, på hvilkens lockige hufvud Tidens genius l'ager sin hand, signale: Ille faciet!" Och han filjer iche si sillim trestarens rad, men far langre fram angra det bittert n. g. I g forbigar de minga andra dim mer. som fresta denne vingling - Lattsinnighetens, Digdrifveriets, Flindens in fl., of hvilka den sistnämnde, höljd i sin Pariser-lejonhud, söker att uppsluha, om icke annat, atminstone hans både materiela och andliga ressourcer. Dessa frestare, hvad de an annat gora, bort-

jaga ifrån honom forskningens och meditationens milda genier och vetenskapligheten uteblir. Om åter ynglingen icke så brådstörtadt hastar från skolan, utan, följande Naturens bud, genomgår de af Henne äfven i det psychiska bestämda evolutions-stadier, hvilka enligt eviga lagar äro bundna vid vissa tider af individets lif, så skall han i de flesta fall göra skäl för det sköna, betydelsefulla namnet Student; ty han känner då hvad ett Akademiskt studium vill säga, han lefver i vetandets stilla riken, utan att rubbas af dagens sorl: han har, för att nyttja den herrlige Tegnérs ord, "den heliga blygsamhet som är ungdomens krona," och han studerar ej för examina, men består omsider väl vid den sista dimissionsexamen, som anställes af den bleke, valmokransade allexaminatorn Döden. Vidare hörer icke hit att orda om det Akademiska studiet och Studentlifvet, hvilka för öfrigt äro så vigtiga föremål, att de väl förtjena sin egen beträktelse.

Då jag i det föregående tror mig hafva ådagalagt det nuvarande Skolsystemets skadlighet för helsan i flere afseenden, så är det nödvändigt, att jag nu slutligen äfven söker i korthet uppgifva de åtgårder, genom hvilka, enligt min tanke, denna skadlighet kunde häfvas eller motverkas; och dessa äro hufvudsakligen följande: 1:0 Det aldravigtigaste, att den intellectuela och psychiska uppfostran icke drifves på bekostnad af den fysiska, aldraminst i de spådare åren. Det är derföre nödvändigt, att

icke allenast något reducera eller minska antalet af lärotimmarne för dagen - hvilka dessutom kunde till en del upptagas af ölverläsning under lärarnes ledning, - utan äfven att derjemte egna någon stund dagligen åt den kroppsliga naturens ändamålsenliga utbil lande, hvilket på långt när icke i alla skolanstalter eger rum, eller behörigen iakttages. Salunda, da kroppsiörelse, helst i det fria, är det båsta medlet dertill, och i synnerhet Gymnastiken är en bepröfyad väg att bringa kraft och harmoni uti de kroppsliga, afven centrala, functionerne, samt att i det psychiska utveckla mod, beslutsamhet och kraft, så är en oaflåtlig lordran, att en Gymnastikanstalt borde finnas vid hvarje skola och dagligen atminstone en timme der egnas at kroppsöfningar, helst de blott nagra få minuter langa intervallerne mellan larotimmarne ej kunna i nämnde hänsigt tagas i någon beräkning. Men dessutom kunde, vid lämplig väderlek, anstållas med Skolungdomen extraforlustelser ute i det fria, beräknade - sasom det hofves - så vål på kroppskrafternas harmoniska utbildning, som ock, når tillfälle gifyes, på nyttiga kunskapers inhemtande. Sådana forlustelser hafva i vart land numera utgjorts af knappt flere ån Skridskolöpning 1 à 2 ganger om hösten: t. o. m. den glada, oskyldiga Bollslagningen har nödgats försvinna och ge vika för det oupphörliga encyclopediska inproppandet af traditionelt kunskapskram i de unga hjernorne. Men hvarföre kunde icke den förra af dem foretagas nagra dagar a rad, så länge detta kan ske, den sednare tidt och ofta om varen, efter det marken blifvit bar och torr?

Om vintern åter kunde, utom annat, vid lämpliga tillfällen anställas den för vårt nordliga land egnade och så utmärkt uppfriskande Skidlöpningen: vid slutet af vårterminen och början af höstterminen deremot vore Simöfningar, i så många afseenden högst nyttiga, en lämpelig kroppsöfning. Slutligen: då Naturalhistorien har en både för tanke och känsla så mäktigt lifvande kraft, och afgjordt, med afseende på detta, alltför mycket försummas vid våra lägre läroanstalter, så föreslås, att icke allenast Botaniska excursioner oftare anställdes än sådant sker - hvilket är ytterst sällsynt - utan äfven, i synnerhet under torra friska höstdagar, Mineralogiska excursioner skulle företagas, såsom ock demonstrationer i Astronomien hållas på klara vinteraftnar under bar himmel: och all denna hurtiga objectivitet skulle ofelbart inge de vettgirige unge, jemte uppfriskade krafter, en vida mera lefvande kunskap om Naturens föremål, än de torra Compendierne inprägla i minnet. – 2:0 Borde ett mindre antal läroämnen än vanligt förehafvas liktidigt till inöfning, och heldre först efter hand denna nödvändiga heterogeneitet bibringas det unga individet; ty den af flere uttalade regeln är dock, äfven i sanitär hänsigt, sann, att de yngre årens fattningsgålvor ei böra förspridas på en större mångd olika ämnen, utan snarare sammanträngas till några färre stora föremål, som kunna ge varaktiga och en menniskas handlingssätt hela lifvet igenom bestämmande intryck. Så t. ex. är en lefvande, omståndligare framstållning af märkvårdiga naturföremål eller stora historiska karacterer för den unge gossen

af vida mera nytta an dessa magra register på namn och årtal; - men det maste medgifvas, att härtill behöldes flere annorlunda författade läroböcker än sådane nu vanligen äro. – 3:0 Vore nödvändigt att den af Naturen utstakade gangen af de särskilda själsförmögenheternas utveckling skulle, vid successionen af de särskilta läroämnena, afses mera än det synes vara fallet, samt derefter både läromethoder och dessas individualisering lämpas, och sålunda borde t. ex. i början företagas så litet abstracta föremal till infärande som möjligt, men dessutom allt göras i högsta matto objectivt, i symmethet naturfórem d formedelst afbildningar, o. s. v. Derjemte vore det, i afseende å den harmoniska utvecklingen af sjidsformögenheterne, törhända icke ovigtigt att, till känslans och det æsthetiska sinnets väckande, äfven små Declamationsofningar skulle nagon gang anställas, helst sadant, utom sin framtida nytta i och för sig, skulle gagna som en lämpelig gymnastik för Respirations- och Tal-organerne: detta jemte öfningar i de tva formerne af skon konst, Sang och Ritning, såsom brukligt varit. — 4:0 Af redan ofvanföre framställta skäl borde i allmänhet uti skolor hvarje klass halva sin Lärare, och endast på de aldrahögsta klasserne äfvensom i Gymnasierne, såsom en slags förheredelse till de Akademiska studierna, en lärare för hvarje hufvudamme finnes: och i sammanhang härmed är äfven nödigt att ombyte af lärare så sällan som möjligt borde få ega rum. -- 5:0 Torde hvarje Skolanstalt behöfva åfven nigon officiel Läkarevård: denna icke allenast för att vaka öfver det allmänna

helsotillståndet i skolan, utan äfven att individuelt i tid motarbeta utvecklingen af sjukdomar, särdeles sådana, som stå i orsakligt förhållande till skollifvet, - hvilket allt en låkares blick förmår att säkrast och tidigast skönja. Att för öfrigt äfven Skolinrättningens lokal, byggnadssätt, inredning, m. m. d., förtjenar uppmärksamhet i sanitärt afseende, behöfver väl knappt nämnas, hvarföre äfven den nya Gymnasii- och Skolordningen hos oss innehåller föreskrifter derom. — 6:0 År slutligen af vigt att Skoltiden till sin början och uthållning något förändras, åtminstone in casu. Det är nämligen högst nödigt, att skolgången i det längsta möjliga uppskjutes för klena och sjukliga barn, i synnerhet rhachitiska, skrofulosa och nervsvaga, tills deras fysik hunnit något stadga sig; hvilket visst icke alltid iakttages. Å andra sidan, då man öfverväger vår tids stora fordringar af rikedom och mångfald i skolbildningen, och likväl de dagliga lärotimmarnes antal borde minskas såsom nu yrkadt är, så vore väl, äfven med afseende å de Akademiska studiernes fromma, nödigt att Skoloch Gymnasii-tiden utsträckes ett och annat år utöfver det vanliga, och att en ynglings afgång till Universitetet icke skulle, åtminstone i vår Nord, utom i eminenta undantagsfall tillåtas förr än vid det 18:e eller 20:e året. Måhända kunde dessutom Skolferierne om vintern, till och med i vårt land, något förkortas, dock ingalunda sommarferierne, hvilka här nog behöfva sin vanliga utsträckning. — Beträffande nu yttrade grundsatsers tillämpning på Flickskolor och Pensionsanstalter för unga Fruntimmer, si in den dels af det anförda tydlig, dels till sin natur alltfor omståndlig, för att här kunna närmare framstållas.

Men det är tid att jag slutar. Amnet är så rikt, att man derölver kunde skrilva en bok: är derföre ock svårt att sammentringa inom en liten stunds föredrag. - Mina anmärkningar halva utgatt ej ifrån tadelsjuka, utan ifrån innerlig öfvertygelse om nielvändigheten af förbättringar uti ett af de vigtigaste föremål for mensklig åtgård. Tadlandet hirvid är riktadt blott emot tidens anda, som i sin hvirfvel rycker mer eller mindre både corporationer och enskilda. Jag vågar derföre ock tro, att mina vilmenta amm'irkningar icke skola illa upptagas af sjeltva Školans min: det allvar och nit, hvarigenom dess föreståndare och lärare afven i vart land i allmanhet utmärkt sig, är mig en borgen derfor. - Mitte de icke trottna att arbeta i sitt tysta kall, ouktalt mödan är stor och striden svår emot hindren, - bland hvilka dagens fördomar och ofta äfven föräldrars vrånghet icke åro de minsta! De belonas vanligen ej af forgånglighetens hafvor, men så mycket mer af det "heliga Vittnet i deras inre" och af merlvetan let att hafva egnat sitt lif åt ett det skonaste, ådlaste varl på jorden, det att vårda Mensklighetens blomstergård, sambillets och ett helt folks framtid, - att förbereda skördar för Evigheten. At deras sträfvanden välsignelse och framgång!

-000

DÉDUCTION

DE LA THÉORIE DES PARALLÈLES D'UN PRINCIPE NOUVEAU,

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 25 Avril 1842.)

Entre le très-grand nombre de principes distérents, sur lesquels on a fondé la théorie des parallèles, je n'ai pas remarqué le suivant, que je croirais cependant digue d'attention, tant par son indépendance apparente de la notion même de la ligne droite, que par son évidence singulière, qui paraît comparable à celle de quelques autres axiomes géométriques dont la vérité n'a jamais été révoquée en doute *):

Un cercle c étant décrit du rayon r, et un autre C de celui de 2r, en aura e.c > C, en prenant pour e un entier

³) Par exemple celui, qu'une ligne droite entièrement renfermée dans une figure plane, rencontrera, si on la prolonge suffisamment, nécessairement les limites de cette figure: ou cet autre, d'après lequel la ligne droite: définie de la manière d'Euclide, est censée plus courte qu'un arc de cercle quelconque compris entre les mêmes limites.

artitraire aussi grand qu'en vendra (p. ex. 1000, 1000, 111 etc.), mais d'une valeur determinée et independante de la grandeur du cercle c.

La théorie des parallèles se tire de ce principe comme il suit.

L'angle BAC (Tab. IV, fig. 3) étant posé droit et celui de ACD sign. élevez CF perpendieul ire à CA, adoptez l'entier et tel que

E. A DCF > l'angle droit,

et prolongez CA vers E jusqu'à ce que

 $CE = \varepsilon e$. CA,

la lettre e ayant la signification déterminée ci-dessus.

Du centre C et du rayon CE décrivez l'arc de cercle EH rencontrant AB et CF en G et H: je vais prouver que CD, jui langée sufficationent, rencontrera nécessairement la droite AG entre ses limites A et G.

Car si cela n'avait pas lieu, la droite CD, qui se trouve rentennée d'us la figure plane ACHG, rencontrerait, si on la prolenge it suffismement. Lan GH en quelque point M. Du centre E et du rayon EH décrivez l'arc de cercle KHLN, rencontrant AC et AG puisangées en le et L, et EN, perpendiculaire à EK, en N.

L'angle DCF étant plus grand que 1 de l'angle droit, on aura d'abord

MCH $>\frac{1}{\epsilon}$ · CEGH.

Or les perpendiculaires sur CE terminées par l'arc EGH décroissent à mesure qu'elles s'éloignent de CH, et les mêmes perpendiculaires, prolongées jusqu'à l'arc HLN, croissent dans les mêmes circonstances, ainsi qu'on peut le prouver indépendamment de la théorie des parallèles par la méthode employée dans la 15:e proposition du 3:e Livre des Éléments d'Euclide. Donc évidemment

ACHG
$$<$$
 ACHL,
ACHL $<\frac{1}{\epsilon e}$ ECHN,
 $<\frac{1}{\epsilon e}$ EKHN;

d'où résulte

ACHG
$$< \frac{1}{\varepsilon e}$$
 EKHN $< \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{\varepsilon}$ EKHN.

De plus, en nommant q le quart de cercle décrit du rayon LEN, on aura, en vertu de l'axiome adopté ci-dessus,

$$q > \frac{1}{\epsilon} \cdot \text{EKHN},$$

et, à plus forte raison,

EC étant, d'après la 20:e prop. du 1:r Livre des Eléments d'Euclide, plus grand que ½ EN. Donc, d'après ce qui précède.

ACHG $< \frac{1}{\varepsilon}$ CEGH.

Or

MCH > 1 CEGH.

Done

MCH > ACHG;

d'où résulte que CD, prolongée, ne saurait rencontrer l'arc GII. Cette droite, suffisamment prolongée, rencontrera donc nécessairement AG quelque part entre ses deux extrémités A et G: ce qu'il fallait prouver.

UNDERSÖKNING

OM KARELSKA LAGSAGANS UPPKOMST,

AF

WILH. GABR. LAGUS.

(Föredr. den 29 April 1844.)

Under Sveriges fornålder var, ibland, civila embeten, Lagmannens onekligen det vigtigaste. På en tid då permanenta öfverrätter i Landet ännu icke voro organiserade, skulle naturligtvis Lagmannen, redan i egenskap af Domare, äga ett ojemförligt större inflytande, än sedermera, då denne Embetsman ställdes under controll af en ständig, med oafbruten uppmärksamset hans åtgärder bevakande, öfverdomstol. Men denna orsak till det höga rum, Lagmannen intog, var icke den enda, eller ens den förnämsta. Ända till dess Länestyrelserne erhöllo sin bestämda form, hörde flere delar af administrationen till omförmälde Embetsmans ressort. Sälunda omnämnes rikets indelning i län icke i landslagen, som dock bestämmer huru Landet var fördeladt i Biskops- och Lagmansdömen. Landslagen handlar ock om Lagmännens vig-

tiga befattning vid Konungaval. Han var folkets man; i sammanhang dermed, innehade han savida lagstiftande makt att det tillkom honom att authentiskt utlägga och författa lagen, eller. för att nyttja Schlyters ord (Foretal till W:stm Lag. s. IXI): "Det var Lagmannen som det tillhönde att utbilda råttssystemet ej blott genom lagarnes till impning på särskilda förekommande fall, utan ock genom deras förkunnande i ett sammanhang för det på tingen församlade folket; och för detta behof blef det nödvändigt att bringa lagarne i skrift genom anteckningar, som, i början korta och ofullständiga, med tiden blefvo alltmera ordnade och fullständige." Troligtvis ligger ock i denna omståndighet orsalen dertill att Lagman i Sverige, på medeltidens latin, kallas Legifor. Det är derföre icke utan allt skäl Lagerbring, med flere författare, ansett Lagminnen i åtskilliga omstån ligheter kunna jemföras med folktribunerne i Rom; hvarvid dock kan annitikas, att betydenheten af en for lifstiden tillsatt embetsman, enligt sakens natur, skulle vara vida större än af en på ett år vald Tribun.

Sturlesons herrliga berättelse om Thorgnys uppträdande på Alshärjartinget i Upsala lemnar en åskådlig bild af Lagmannens anseende och inflytande i de tider, då det demokratiska elementet i svenska Statsförfattningen ännu var det öfvervägande.

Ofelbart är det minnet af hvad Lagmännen fordom betydde, som varit orsaken dertill att desse Embetsmån blifvit framställde utur en synpunkt, som med nu gällande rättsfärhållanden icke är sammanstämmande. Von Stiernman nemligen, i sitt för-

tienstfulla Arbete: Svea och Göta Höfdinga-minne, har inom kretsen af sina undersökningar äfven upptagit Lagmans embetet. Andra delen af anförde Arbete, uti hvilken handlas om Lagman i Finland har, ehuru ända till för några år sedan otryckt, flitigt blifvit begagnad af Porthan. I hög grad anmärkningsvärdt förefaller, att v. Stiernman alldeles icke vidrört inrättandet af Karelska lagsagan. Att Porthan icke handlar om beförde inrättning torde sålunda förklaras, att, oaktadt hans plan visserligen var att äfven meddela underrättelser om alla institutioner i Finland och de personer som der bestridt Domare-, afvensom andra vigtiga embeten, höll han sig dervid inom den tidrymd, som är utstakad genom det Arbete, han commenterade, eller Juustens Chronicon, som upphör med 1572; och det enda egentliga undantag ifrån denna plan, Porthan tillåtit sig, är att han framställt alla för honom tillgångliga detaljer, rörande Juustens öden, gifte, barn och efterkommande. Under sådane förhållanden och då ämnet hittills icke blifvit af någon behandladt, torde icke allt intresse förnekas en undersökning om Karelska Lagsagans uppkomst. Följande samma plan som von Stiernman, till hvars Höfdinga-minne denna undersökning kan anses utgöra ett supplement, skole vi ock lemna en förteckning öfver Lagmännen i berörde lagsaga, jemte korta biographiska anteckningar, rörande desse Embetsmän samt längd öfver för oss kände Under-Lagman i Karelen under äldre tider.

De Härader, som i sednare tider räknades till den Karelska Lagsagan, underlydde ursprungligen den södra Finska. Nå-

gar fich thing, genem hvilken impitturlet af ett sirshildt Karesid Lamons Ame thist skulle hatva billyit and chilldt, finnes nu mera icke i behåll: åtminstone har jag hvarken i Kongl. Svenska Rüks Arklivet, eller i Palmskolds, eller andra af mig begagnole, sandingor, rio ale Sveriges inte Historia, Ivelats att ofverkomma n., n salan. Förhallandet med första bildandet af ili gavarande Lagsaga var tvifvelsutan enahanda som det, hvaruppå man för de äldre tiderne har så många exempel, att nemligen, al sirskilda antelningur, antalet af de i lagen bestämda Lignrundbinena för tillfället nigen ging blef blverskridet. Såhunds funcer man att redan fore Koming Eriks af Pommern författning at den 29 October 1495, hvarigenom stadgades att Fin-Lind, son dinills urgint ett enda Lugmansdame, skulle fordelas i 2:ne sådane, särskilde Lagman i norra och södra Finland på vissa filler varit tillt in admole. Afven förekomma under nimnde pe i I Lugadu i Tayestlank i Nyland, pe Aland, hvilke Porthan dock anser för att hafva varit endast vicarierande; obestridligt år ock att någre af dem varit blott Under-Lagman, men att de alle varit det, håller jag för tvifvel underkastadt. Och äfven efter det Finland delades i 2:ne Lagsagor, fanns der dock för en I n re til al interim en tralje Ligman, nemligen i Österbotten och Satakunden. Att Karelska Lagsagans utbrytning ifrån den sodra finska för sig gått under Konung Johan III:s tid, torde med skäl kunna slutas af Hertig Carls anklagelse-puncter emot II geneald Ejelke vid Kilestogen i Stockholm 1605. Till upp-

lysning i den fråga, som utgör föremål för nårvarande undersökning, innehåller berörde anklagelse-puncter följande: Hvad södra Finland vidkommer, hvilket Hogenskild formalt att i 2:ne eller 3:ne Lagmansdome vara fordelt, så vore en sådan disposition rattvisligen och väl betänkt gjord utaf Konung Johan, på det att allmogen måtte sålunda battre och begvämligare skipas lag och rätt, efter som landet vore mycket begripit, och icke utan stor tidsspillan kunde utaf domhafvanden kringresas. Och emedan Konungen äger, efter Sveriges lag att rättvisa och sanning styrka och icke tillstädja att olag gå för rätt och lag, ty borde Hans Maj:t ju hafva den makten att så stadga och förordna som han kunde pröfva sine land och undersåtare vara gagneligast dertill och Riks-Råd borde honom styrka och råda, till förtiga att denne södre Finlands lagsagas fördelning uti flere Lagmansdömen vore merendels utaf sjelfva Riksens Råd härkommen, hvilke alla hafva trungtat efter Lagmansrantans uppbord, utan nagot anseende dertill, huru lag och ratt vore blifven befordrad. Af denna anklagelse-punct finner man, det Bjelke pastatt, att öfverträdelse af lag hade ägt rum vid inrättandet af en mångd nya lagsagor, savida nemligen lagsagornes antal var uti landslagen bestämd, och anordnandet af detta årende således icke hörde till förvaltningen och Konungens prerogativer, utan borde utur legislatif synpunkt betraktas. Redan af det nyss anförda berättigas man till den öfvertygelsen att Karelska lagsagan under K. Joben III:s tid blifvit inrattad: och kan ifven bretiet, når detta sten, med fullhomlig sakerhet utredas. Harvid ma namnas att i sodra Finland funnits en Lagman, som von Stiernman iche kannt, och hvilken fblickeligen in finbig agen i bemibble fbeforeres birgrephiska firtechning Alver desse Embetsmin, nemilgen Herman Persson Floring till Willn's, Lethis, Hannula, Launasaari, Friskala och Pepot, hvilken ir 1575 synes hafva erkillit bernilde Legmans I'me eiter den rollthure Riks-Marsken Clas Fleming. I denne Herman Flemings tid har Korelska Lagsagans tildande för sig gått, och det år 1578. I sistnämnde års råkenskaper för Lill Savolax äfvensom för Jääskis härad upptages ännu Herman Fleming, såsom Lagman i berörde härader; men i Mijande breis rikning firekommer, i nimade egendap, Cas Alesson (Tott). Afven finnes linne i behalf beliffiga domer, gibre sistuitmente in of hvilka inhemus on Total bealth ifrigavarande embete. Så förvaras på Sarflax egendom en i Perno socken den 15 November 1578 afsagd Lagmans dom af Lar-Torstensson till Brötorp, på Lagman i Karelen Clas Akessons vägnar. En urkund af den 24 Januari 1579 har följande rabilk: Jog Lasse Torstonse in till Brittorp, Lagranisting i Wildio hafvande på Clas Akessons vägnar till Sjundely, Riddare, Lagman i Kurelene Logsuga. Sistnimmle le den 24 Augusti her Ton sielf, i egenskap at Legmen i Norelen, algiert en mil. Afren mie hier therapus ett of Clas Abesson den 3 Juni 1580 afgifvet intyg, som har denna börjun: Anno 1578 den tid Lame Torstensson till Brötorp på mina vägnar Lagmansting med allmogen i Borgå Socken hållit.

Likasom, enligt hvad i det föregående är antydt, de Lagsagor i Tavastland, o. s. v., hvilka i aldre Handlingar omnumnas, endast voro temporära, så utgjorde ock tvifvelsutan Karelska Lagmansdömet i början en blott provisionell anordning. Deraf kan det förklaras, att Carl IX:s bref af den 31 October 1602 är tillskrifvet alla Finnar i norra och södra Finne Lagsagan, ehuru denna skrifvelse patagligen är meddelad Finlands samtlige inbyggare. Johan Buraeus i dess handskrifna Collectanea, uppsatte troligen omkring början af 1600 talet och intagne i Palmsköldska samlingen på Upsala Universitets Bibliothek, omtalar likaledes endast 2:ne Lagsagor i Finland. Sannolikt var det först genom den af Axel Oxenstjerna utarbetade Regeringsformen af den 29 Juli 1634 i. 26 som ifrågavarande Karelska Lagmansdöme blef definitift organiseradt. Det drog väl äfven ut någon tid, innan den nya inrättningen blef allmännare känd, hvarföre ock hvarken Messenius i den år 1636 författale dedicationen af 10:de tomen af Scondia Illustrata, eller Paulinus Gothus i sin Historia Arct., som utkom likaledes 1636, ännu haft kunskap om andra Finska Lagsagor an Norr- och Söder-Finne.

Lagmans Embetet i Karelska Lagsagan har innehafts af:
1. Clas Akesson (Tott) 1578—1586. Anteckningar om denne man, hvilken spelade en af de förnämste rolerne i

Sveriges och Findands Historia, förekomma på flere stillen i von Stiernmans Höfdinga-minne.

2. Marten Boije till Genauthy. Biel 1576 den 17 April Ryttmisture för Nylands Rytture. His Ishöfling i Wema hiro I 1580—1590. Förekommer 1580 den 15 December siem tillhömminde! Lyman i Karelska Lugsagar. Undimndes 1590 den 22 November till Betellningshavende ölver alla Finska Ryttme. Confirmerales i Lagmansemberet af Konting Sigismun! 1594 den 13 Juli; men ti lydes den 22 Mars 1596 afsti haltve Lugmans! Imat i Wilhurgs län till Axel Kurch; och är det tvifvelsutan derpå som syftas, då i Hertig Carls i det föregien le ibern; de unklagelse-puncter förmides, att Södra Finne Lagsaga äfven i 3:ne Lagmansdömen varit fördelad.

Död den 25 November 1596.

Gift 1577 med Margareta Björnram, dotter af Guvernören Gver Finland II...s Larsson (Björnram) till Isnis och Anna Olom. Peder Nilssons dotter i Pepat. II in erhäll at Kannag Sigismund 1597 den 10 November på behoglig tid alla de litstids förläningar i gårdar och räntor som hennes man innehaft.

Son af Riks-Rûdet och Guvernören öfver Finland Nils As lersson Beije till Gennils och Bita II m., Röks-Rolet Christer Classon Horns dotter till Äminne.

3. Axel Kurck till Annala. Ryumisture vill Finska Adelsturan 1553 den 23 Maj. Erhölt 1559 den 12 Juni hefellning att vera Kuntung Sigismund följaktig till Dantzig och

derifrån till Polen; s. år den 4 September Häradshöfding i Öfre Satakunden; 1590 den 7 Augusti i Wemo harad; 1594 den 13 Juli i sistnämnde embete confirmerad. Erhöll, enligt hvad i det föregående nämndes, Konung Sigismunds fullmakt, gifven i Warschau den 23 Mars 1596, å halfva Lagmansdemet i Wiborge län; men synes efter Boijes ded innehaft hela Karelska Lagmansdömet. Så förekommer han, såsom Lagman, 1596 i Stor Savolax; 1598 i Kymmenegårds och Nyslotts Län, i Borgå, Sibbo, Helsinge och Perno Socknar; 1599 i Stor Savolax. 1597 den 9 Mars Ståthållare på Narven. 1598 den 20 November Krigs-Öfverste i Finland. Hörde till Konung Sigismunds trogne anhängare, hvarföre han vid Riksdagen i Linköping 1600 af Hert. Carl anklagades; dömdes till döden; men fick, på Finska Adelns förbön, tillgift. Affärdades 1602, jemte Henric Horn, såsom Commissarius till Liffland, för att underhandla om stillestånd med Polackarne. Var Häradshöfding i Österbotten till den 16 November 1606, då Philip Scheding erhöll fullmakt å nåmnde tjenst. Utnämnd till General Krigs-Öfverste öfver Finska krigsfolket 1604 den 9 December. Commissarius att emottaga freds-ratification i Stolbova med Ryssland 1617 den 16 Mars.

Född 1555: Han lefde annu atminstone 1626.

Gift 1:0 med Karin Boije, dotter af Nils Andersson Boije till Gennäs och Brita Christersdotter Horn till Åminne; 2:0 med Kirstin Lejon, dotter af Ståthållaren Hans Björnsson (Lejon) till Lips och Karin Henrikslotter Horn till Kanckas. Han hale i intetdera giftet barn.

Son af Riks-Rådet och Lagmannen öfver Satakunden och Osterbotten Jons Kuntsson (Kurck) till Lunko och Ingeborg, Tönne Eriksson Totts dotter till Benhammar.

- 4. Arvid Ericsson Stålarm till Lindö. Erhöll 1002 den 8 September fullmakt å Karelska Lagmansdomet. Stathuller ofver helt Finland, af hvilken anledning hans biographie år intagen i von Stiernmans Höfdinga-minne.
- 5. Arvid Tönnesson (Wildeman) till Tjusterby, var Lagman i Karelen 1697—1617. Under hans tid lades, genom Kongl. Brefvet 1611 den 15 September, Kexholms fün under Karelska Lagsagan. Wildeman var och Haralsholding i Borgå län, men, som uti Kongl. Brefvet 1614 den 14 Januari stalgales, att Lagman iche finge tillika vara Häralshölding, nödgules Wildeman afstå berörde Häralsrätt. Underrättelser om honom, i egenskap af Stäthollare öfver Kexholm, Nyslott, Nöteborg, och Wilburg, förekomma äfven i von Stiernmans Höfdingaminne.
- 6. Axel Oxenstierna. Ingen annan anle lning till den förmodan, att han varit Lagman i Karelen, gifves, än att i Karelska Lagmans rättens dombok för 1618 förmäles att Henric Horn, å Oxenstiernas vägnar, den 16 April nämnde år hallit Lagmansting i Sääminge socken.

7. Clas Christersson Horn, Friherre till Åminne. Lagman i Karelen och Ingermanland 1624—1630. Öfverste vid Nylands Regemente, då han 1634 den 6 September kallades till Riks- och Krigs-Råd.

Född 1587. Död den 1 Mars 1644 (1651?)

Gift med Sigrid Oxenstierna, dotter af Bengt Gabrielsson Oxenstierna Guvernör öfver Södermanland, Nerike och Wermeland och Brita Knutsdotter Posse.

Son af Christer Classon Horn till Åminne och Karin Thuresdotter Bjelke.

- 8. Clas Carlsson Horn till Kanckas blef 1630 Lagman i Karelen och Ingermanland. Var Ståthållare öfver Stockholms stad och slott, och förekommer hans biographie i von Stiernmans Höfdinga-minne.
- 9. Carl Philipsson Bonde erhölt den 25 Februari 1634 (icke, som det förmäles i Uggla's rådslängd, 1637) fullmakt å Karelska Lagmansdömet. Kallas i Handlingarne Lagman i begge Karelerne. Innehade Lagmansembetet ända till sin död 1652 den 29 Februari. Han var Ståthållare i Nerike, af hvilken orsak äfven hans biographie är införd i von Stiernmans Höfdinga-minne.
- 10. Axel Gustafsson Lillie, Grefve, Friherre till Kiides Pogost. Hans fullmakt å Lagmans embetet i Karelen utfärdades 1652 den 14 Maj. Hans biographie finnes ock i von Stiernmans Höfdinga-minne, ibland Guvernörerne öfver Halland.

- 11. Seved Baat, Friherre. Utn'amades till Lagman i Karelen 1663 den 4 Februari. Äfven hans biographie förekommer i von Stiernmans Holdinga-minne, ibland Landshöldingarne öfver Gottland.
- 12. Christer Classon Horn, Frihere till Aminne. Hans fullmakt att vara Lagman i Karelen utfärdades 1069 den 21 Augusti. Utnämndes 1674 den 8 Maj till Lagman i Wermland, af hvilken orsak ålven hans biographie är intagen i von Stiernmans Höfdinga-minne.
- 13. Bengt Classon Horn, Friherre till Aminne, Hef 1674 den 8 Maj Lagman i Karelen efter brodren Christer Classon Horn. Hans biographic finnes likaledes i von Stiernmans Höfdinga-minne, ibland Landshöfdingare i Halland.
- 14. Gustaf Gabrielssen Oxenstierna. Grefve till Korsholm och Wasa. Riks-Råd 1673 den 8 Januari. Utnämmdes till Lagman i Karelen 1678 den 3 Mars. Som, genom 1. 14 i Kongl. Resol. på Ridd. och Adelns besvår 1650 den 29 November, stadgades "att de Riks-Råd, hvilke Lagmanstingen sjelfve i Personen bivista vela och kunna, måge deras Lagmans lame behålla uti deras lifstid, och att elter deras dod samma Lagmansdöme sedan andra utan Rådet måge blilva confererade; men att de af Rådet som icke sjelfve kunna i person vara tillstådes vid Lagmanstingen, sådane Lagmansdomen genast aftråda, till att kunna blifva uppdragne någon annan capabel

person, som uti Lagsagan bör bo och vara, och med intet annat Embete sig befatta" nödgades Oxenstjerna afstå berörde Lagmansdöme. Hans biographie finnes intagen i Biographiska Lexica öfver namnkunnige Svenske män, samt, emedan han var Lanktmarskalk vid Riksdagen i Stockholm 1672, i Rehbinders, von Stiernmans, äfvensom Rothliebs Landtmarskalks Historia.

- 15. Johan Lorensson Creutz, Friherre till Häfverö, Abborfors och Sarflax m. m., sluteligen Grefve. Lagman i Karelen 1680—1703. Som han sluteligen befordrades till President i Åbo Hofrått, är hans biographie intagen i sagde Hofråtts Historia.
- 16. Lars Brommenstedt. Utnämndes till Lagman i Karelen 1704 den 23 Januari. Han blef sluteligen Vice-President i Åbo Hof-Rätt, hvarföre äfven hans biographie finnes i nämnde Hofrätts Historia.

Samuel Blomfelt blef efter Brommerstedt Lagman i Karelen 1721 den 3 November. Om honom och de följande Lagmännen i Karelen kan umlerrättelser hemtas utur Lasthems Svea och Götha Höfdinga-minne sedan 1720.

Under-Lagman i Karelska Lagsagan hafva under de äldre tiderne, mig vetterligen, varit:

Lasse Torstensson till Brötorp 1578—1592.

Samuel Arvidsson (Wildeman) till Gammelby och

Jochim Berndes (il) Stransberg 1000 Legendering 1610 i Borga lan, ester den fullmakt de af Arvid Tonnesson bekommit.

Sigfrid Jönsson (Wilkin) ver Arvil Timessons Under-Lagman i Stor Savolax 1612.

Menrie Horn Under-Lagman 1618.

Eric Michelsson (Sölverarm) till Michigus. Under-Lagman i Karelska Lagsagan 1624—1635.

Henric Hartensson Tect. 1635—1637 Carl Danles Under-Legman. Som han tillika var Assesser. Elses hans biographie i Åbo Hofrätts Historia.

Anders Israelsson (Svart). Cel Decles Leder-Lagman 1639—1645. Var Assessor och finnes äfven hans biographie införd i Åbo Hofrätts Historia.

Henrie Jacobsson Car Bunda Univer-Laguare 1648. Erie Mantzouville Under-Lagman 1655.

Eric Hollsten förekemmer 1903 sis in Vice Legmin i Kymmenelin, is Lagsega, se Wieselgen Dela Gardishe Arch. II: 193.


M.g. Abraham Kollanius Under-Lagman 1650 —1667; om denne minnesvärde man skola underrättelser meddeles i min Athanbarg en Finsk ölverslaninger at Svenska Leger.

Johan Larsson Rokes Under-Ligmon 1607-

Samuel Olsson (Wallenstierna) höll, såsom Vice-Lagman, den 22 och 23 September 1680, ting i Borgå på Gustaf Gabrielsson Oxenstiernas vägnar; äfven var han Assessor i Åbo Hofrätt, af hvilken anledning hans biographie är införd i samma Hofrätts Historia.

Matthias Knutsson Halitzius, adlad Ehrenhoff var Johan Creutz' Lagmans Substitut 1687 till 1691 den 23 April, då han utnämndes till Häradshöfding i Lill Savolax.

Henric Tammelin var 1704 Vice-Lagman i Karelska Lagsagan. Blef sluteligen Borgmästare i Helsingfors.



IDÉTILL UPPDRAGNING AF ETT UR GENOM INFLY-TANDET AF ATMOSFERENS TÄTHETS SUCCES-SIVA AF- OCH TILLTAGANDE,

AF

CARL AUG. WOLSA.

(Föredr. den 5 Febr. 1849.)

Man observerar, åtminstone på våra nordliga orter, att barometern inom en månad oscillerar på ofta mer än $\frac{1}{15}$:del af hela höjden. Och man kan med tämmelig säkerhet antaga, att om medelhöjden är 25,5 Sv. decimal-tum, det alltid någon gång under loppet af en hel månad skall hända, att barometern står under 25,09 dec. tum, och en annan gång öfver 26,11 dec. tum. Skilnaden häremellan är $\frac{1}{25}$:del af hela atmosferens medeltryckning.

Luftens täthet förhåller sig åter såsom tryckningen, då alla öfriga omständigheter äro lika. Och häraf följer, att man under loppet af en månad med tämmelig sannolikhet kan antaga en variation i atmosferens täthet af $\frac{1}{50}$:del öfver och under medeltätheten, hvaraf uppkommer en differens i täthet af $\frac{1}{25}$:del. Men hvad man ännu i detta antagande kunde fela, uppfylles troligen deraf, att luftens täthet ännu varierar efter temperaturen, som

nödvändigt alltid är underkastad några graders variation under en månad, äfven uti ett eldadt boningsrum. Då temperaturen i ett sådant rum oscillerar reguliert inom de särskilda timmarne af hvarje dygu, och barometern åter ändrar sig mera smaningom, så skall, allt efter behof, antingen temperaturens stigande eller fallande inom ett dygn kunna bidraga till att öka variationen af luftens täthet i rummet.

Under förutsättning af dessa villkor är det möjligt, att förmedelst en stor manometerkulas uppstigande och nedfallande, genom förändringen i luftens täthet, åstadkomma ett vanligt pendelurs uppdragande minst en gång på en månad. Detta är ganska lätt att bringa i verkställighet, om uret drifves af fjäder, i stället för vigt. Se här, huru det kan ske.

Lät Fig. 1 i Pl. IV föreställa den del af urverket, hvarigenom uppdragningen sker: Punkten p inuti det lilla kugghjulet a föreställer då profilen af den axel, hvars hjul (här ej synligt), genom den om axeln lindade spiralformiga driffjädern, verkar såsom ursprungligt drifhjul för hela urverket. Fjädern sitter inuti en cylindrisk urhålkning af hjulet a, och är vid detsamma fastgjord med sin andra ända. Detta hjul a, äfvensom hjulet b, äro för öfrigt helt och hållet fritt rörliga omkring axeln p, med den inskränkning blott, att hakarne c mota hjulets a rörelse i anseende till b at ett håll, och att det måste spänna fjädern, då det genom nämnda hakar tvingas att åtfölja hjulet b åt det andra hållet. Da ater hjulet b rörer sig med hakarne undan hju-

lets a kuggar, så återhålles hjulet a genom haken d, som fasthänger vid urverkets fasta ställning. Genom hjulets b periodiska rörelse fram och åter förorsakas således urverkets uppdragning; och hjulet b erhåller åter denna rörelse genom manometerkulans e fria upp- och nedstigande, derigenom att ett snöre löper ifrån manometerkulan t. ex. ett och ett halft hvarf omkring hjulet b, och derester sluter sig i en några skålpunds constant motvigt f mot en del af manometerkulans vigt, hvarjemte detta snöre dessutom, på den sidan som denne motvigt hänger, kan ledas öfver en extra trissa litet längre bort ifrån manometerkulan, så att motvigten icke kan komma att häfta vid den sistnämnda. Manometerkulans återstående vigt uppbäres af en annan större motvigt g, som med kulan communicerar genom ett särskildt snöre, löpande öfver en extra trissa h. Motvigten f behöfver då blott vara så stor, att den vid kulans uppstigande förmår kringvrida hjulen b och a, samt derigenom spänna fjädern. När åter fjädern är spänd, så yttrar han sin verkan på den i 'anseende till hjulen a och b fritt rörliga axeln p, hvilken drifver hela urverket.

Lat oss nu anställa en calcul öfver dessa förhållanden och constructioner.

Drifkraften, som erfordras för ett ur, antingen detta drifves af en fjäder eller ock af en vigt med snöre, är proportionel emot producten af driftrissans radie och den kraft som vid trissans kant verkar såsom drifvande på urverket. Och då för ett

ur, som drifves med vigt, det på en viss tid framlupna vigtsnőrets längd är proportionel emot drif- eller snörtrissans radie, så kan denna framlupna snörläng l., multiplicerad med den applicerade vigten, anses som mått på den erforderliga drifkraften för uret. Strängare bör denne sats uttryckas så, att producten af den applicerade drifvigten och den längd, som den nedskrider på en viss tid, bör anses som mått på drifkraften; ty om vigtens skridlängd förkortas genom block, så är vigtens qvantitet derigenom äfven så mångfaldig af den för ett enkelt snöre erforderliga, som graden af den aliqvot, vigtens skridlängd utgör af snörets utslagna längd. Nu visar erfarenheten, att för välgjorda ur, sådana som den mera utbildade konsten numera förmår åstadkomma, den friction, som hjulens kuggar och tappar erfara, är flere gånger mindre än det motstånd, som verkar i sjelfva pendelingreppet. Men drifkraftens förmåga att motverka detta motstand förhaller sig inverse sasom pendelingreppshjulets radie; alltså förhåller sig den erforderliga drifkraften för hvarje ur, under lika öfriga omståndigheter, sasom pendelingreppshjulets radie. Det är också klart, att drifkraften äfven beror af kuggarnes antal och form i ingreppshjulet, samt af pendelns långd, i anseende till dess hastighet, och af ingreppsarmarnes construction.

För ett ur, som går med två hjul, har jag af en känd mekanikus erhållit den uppgift, att det drifves af 3 lods vigt, som på ett dygn nedskrider vid pass 6 fot. Häraf erhåller man då till drifkraft på ett dygn producten af 32 skålp. och 6 fot

0,56

Denne product har jag med en seçundpendel och ett ingreppshjul af 0,57 dec. tums radie funnit för ett dygn = 0,5. För ett dubbelt smalare hjul, af 0,28 dec. tums radie, som lätteligen låter göra och använda sig, skulle denne product vara = 0,25, hvilket för en månad, eller 30 dygn gör

7,5

Om nu manometerkulan e, som kan sammanlödas af tunna förtennta bleckplåtar, innehåller 10 fot i diameter, så är dess rymd = $\frac{1}{6} \pi 10^3 = 523,6$ kub. fot. En kubik-fot luft väger ungefär $\frac{1}{13}$ skälp. Således är vigten af den luft, manometerkulan i sitt rum undantränger, = $\frac{522,6}{13}$ skälp., och kulans genom lufttäthetens ökning på $\frac{1}{25}$:del förorsakade uppstigande kraft = $\frac{523.6}{13\times25}$ skälp., eller

1,6112 skâlp.

Om således manometerkulans motvigter passas så, att de vid barometerståndet 25,00 dec. tum hålla sig i jämvigt med kulan, så skall densamma vid ett ännu lägre barometerstånd t. ex. 25,08 dec. tum nedfalla till golfvet, och derefter åter vid ett barometerstånd af 26,11 dec. tum uppstiga med kraften 1,6112 skålp., hvilken kraft hon skall använda för att jämnt förmå spänna fjädern. Dividerar man denne kraft uti den för en månad bestämda drifkraften 7,5, så finner man den längd, som kulan med denne kraft 1,6112 skålp. bör framskrida vid spännandet af fjädern,

4,655 fot.

Kulans diameter var 10 fot, och spelrummet för dess upp- och nelstigande 4,655 fot, hvarjemte urverkets och trissormas höjd kan antagas till 5 fot. Hela apparaten erfordrar således ett rum af vid pass 19½ fot i höjd och ungefär 21 fot i längd samt 10 fot i bredd, hvilket, om ej i sig sjelft utgörande ett eldalt boningsrum, dock bör vara så beläget emellan dylika eldade ram, att dess temperatur bibehåller sig någorlunda jämn hela året igen m. eme lan eljest den yttre luftens alltförstora och långsamma af årstidens temperaturgång beroende dilatations-fenomener skulle förhindra kulan att, såsom här antages vara nödigt, uppoch nedstiga en gång i månaden. Dessa fordringar äro visserligen något svåra att uppfylla, men de innefatta dock ingenting omöjligt.

Så snart nu kulan, genom ofvannämnda orsaker, en gång hiller på att upp- eller nedstiga, så måste denna rörelse fortfara med samma kraft ända fram, så langt som kulan slipper i anseende till spelrummet, utom då fjäderns spänning icke mera skulle tillåta rörelsen uppåt, eller åt det ena hållet, ifall fjädern redan vore till sista slutet uppdragen: åt det andra hållet har dock kulan alltid frihet att röra sig, så snart åter ändringen i luftens tåthet det fordrar. Skulle åfven kulan vid ett ovanligt högt barometerstånd tryckas med utomordentlig kraft uppåt, så kan dock ingen större spännkraft verka på fjädern, ån motvigten f hel och hållen, hvilken antages ej vara större, ån fjäderns styrka med-

gifver, eller uret för sin gång tillåter. Häraf ser man att urets mekanism ej kan förderfyas genom förstora variationer i lufttätheten, allenast vigten f icke tages mycket förstor.

Som det under någon lång tid ändock möjligen kunde hända, att barometern en hel månad skulle hålla sig inom endera af de höjder 25,09 och 26,11 dec. tum, förbi hvilka qvicksilfverpelaren nedåt och uppåt bör oscillera, för att uret måtte kunna uppdragas; och då man ej gerna vill göra kulan större än 10 fot i diameter, i afseende på att öka dess kraft; så synes det då, som urets uppdragning någon gång skulle kunna komma att försummas, ifall barometern en hel månad kunde hålla sig inom gränserna: öfver 25,09 eller under 26,11 dec. tum. Men man kan göra driffjädern så tillräckligt lång, att han med en jämnt fortsarande likastor elasticitet kan tillåta slere så stora uppdragningar efter hvarandra, som af ett manometerkulans uppstigande förorsakas. Och som det är troligt, att barometern under de flesta månader många gånger oscillerar öfver de bestämda ståndpuncterna, så kunna derigenom ofta en hel mängd uppdragningar af uret ske efter hvarandra under en kort tid. Derigenom kommer då uret mestadels att vara uppdraget för flere månaders gång; så att sannolikheten af dess beständiga gång derigenom synes höjd till en så hög grad, att deröfver icke mera något tvifvel bör ega rum.

Låtom oss ej glömma, att en barometrisk variation af i det allrahögsta 1 del at atmosferens tryckning stundom kan inträffar, och att denna tryckningsvariation har ett ganska stort inflytande på manometerkulans förmåga att sammanhålla sig och bihehålla sin form oförändrad. För att derföre vara säker, att kulan, vid ett tillskott i atmosferens tryckning af 1 del, icke, oaktadt sin någorlunda sferiska form, skall sammanplattas, måste man antaga, att kulan hålles uppblåst till 1 del af atmosferens tryckning. Vid en så ringa skilnad emellan det inre och yttre lufttrycket kan man då åtminstone med full säkerhet antaga, att täta, valsade och dertill änna på bada sidorna förtennta bleckplatar måste vara så ogenomträngliga för luften, att denna ursprungliga olikhet på 1 dele emellan det inre och yttre lufttrycket äfven i all framtid miste bibehålla sig. Kulytans böjning kan ej heller håraf förändras, då hon är sferisk.

Låt nu vid barometerns lägsta stånd kulans inre luft utveckla ett öfverskott i tryckning af 10:dels atmosfer. Vi vilje då undersöka, om kulans yta förmår uthärda denne spänning.

Då kulans diameter år 10 fot, så år dess storcirkel = 25 π = 78.54 qvadrat-fot. Atmosferens tryckning år ungefär 2114 skålp, på en qvadrat-fot, och $\frac{1}{10}$:del deraf 211 skålp,; alltså år pressionen, som fördelar sig på en storcirkelperiferi i kulans yta, = 75.33 × 211 skålp, = 16572 skålp.; och då periferien är 31,416

fot = 31416 decimal-gran, så är den spänning, som verkar på en blecktråd af ett grans bredd, = $\frac{16572}{31416}$, eller ungefär $\frac{1}{2}$ skålp. = 16 lod. Då äfven en messingstråd af 1,4 qvadrat-decimalgrans tjocklek kan bära 18 skålp., så måste en blecktråd af ungefär ett qvadrat-decimalgrans tjocklek kunna många 10-tal gånger hålla den ofvanbestämda spänningen af $\frac{1}{2}$ skålp. Hvad åter styrkan af bleckplåtarnes lödningar vidkommer, så kunna plåtarnes kanter gerna fästas så långt inpå hvarandra, att äfven en sålunda lödd blecktråd af den nämnda tjockleken förmår bära flere gånger mer än $\frac{1}{2}$ skålp.

Vi skole likaledes erinra oss, att äfven alltid någon variation i temperaturen af kulans luft, samt en deraf beroende olika inre spänning på olika tider, måste antagas, ehuru hela instrumentet supponeras befinna sig inom eller emellan eldade rum. Antages äfven denna temperatur-variation inom eldade rum någongång kunna uppgå ända till 20° C., så blir den deraf beroende luftdilatationen inom kulan ändock aldrig så stor som den förut antagna pressionsolikheten af 1^{1} 6:dels atmosfers tryckning; men blefve den äfven större, så förmår kulan dock alltid uthärda den. Inga farhågor böra således i dessa omständigheter finnas förhanden.

Beträffande kulans vigt, så kan man antagå, att en qvadrat-fot bleck (ungefär en plåt) af ett decimalgrans tjocklek väger ungefär 15 lod, eller, i anseende till lödningarne, 16 lod = ½ skålp, för hvarje qvadrat-fot på kulans yta. Denna yta år =
 4 × 75, 4 = 314.0 qv d. att t; aller hela kulans vigt = 157 d. p.
 = 7 lisp, 17 skålp. Håraf ser man då, att motvigten g bör vara ungefär 7½ lisp., och det öfriga kan ersåttas genom vigten f.

Betydligheten af motvigten g fordrar, att axeln till trissan h, som alltså har att bära 15 lispts tyngd, utom trissans egna, måste vara af rätt grof caliber och tät metall, construerad ungefär på samma sätt, som axlarne till större astronomiska meridiancirklar, hvarjemte det är af stor vigt, att trissans h periferi och axeltappar äro så noga svarfvade, att kulans utvecklade uppstigande eller uppdragande kraft

1,6112 skålp.

i triss as alla mijliga ligan lõnma kaingvaida henna ol ehin lault. Sjellva trissans pariheri miste älven dert are hilles stellig genom ett tillräckligt antal förstärkningsradier. Då trissans radie supponeras vara = 2,5 fot = 2500 gran, och felet i svarfningen ej gerna hör öliverstiga 1 gran, så är detta tel blott $2z^{1}_{10}$: del af trissans radie. Det han siledes firers ha tillfälliga ajinnaheter uti balansen emell a kultus vigt och dess motvigt, s m hanna uppgi till zz^{1}_{10} : del af hvarderas vigt $7\frac{1}{2}$ lisp., z^{1}_{10} : del af 150 skilp., eller

0,05 skälp.

Denna lilla ojämuhet uti kulans vigt är i jämförelse med dess utvecklade uppdragande kraft 1,6112 skillp. så chetyillig, att den kan negligeras. — Och för att tillika upphälva all friction

för axeltapparne till trissan h, kunna desamma hvila och rulla sig på horisontela skifvor i stället för lager, hvarvid deras normala lige ölver skifvorna kan tilhehillas och dirigeras genom en kugg-gång emellan tapparne och skifvorna.

En annan idée är att grunda sig helt och hållet på de stora årliga atmosferiska temperatur-ostillationerna, i alseende på att åstadkomma urverkets uppdragning, dervid åfven stundom några ovanligt stora barometeroscillationer, opbråknadt, kunna komma med till hjelp.

Erfarenheten har visat, att här vid ungefär 60° latitud det högsta ärliga maximum i atmosferens temperatur i skuggin alltid uppgär till minst + 25 Celsii, och det lägsta minimum till minst — 15° Celsii. Skilnaden käremellan är 40° C. Da luttens dilatation för 100° C. är ungefär 0.%, så blir den för nämnda skilnad

0.14

Denne differens, i det minsta, emellan luftens täthet kan di en ging hvart är mel sikerhet antagas ega rum. Med antagande alltsi, att manometerkulans diameter, sisom förut. är 10 fot, så erinre vi oss vår föreglende bestömning, att vigten at en luftkula af 10 fots diameter är $\frac{523.6}{15}$ skillp. = 40.25 skillp. En variation af 0.14 i tätheten häraf är 0.14×40.25 skillp. eller

5,61 skålp.

För en månad hafve vi bestämt drifkraften till 7.5: alltså för ett år eller 12 månader, 90. Då man nu häruti dividerar

5,64 skålp.; så får man det nödvändiga spelrummet för kulans årliga stigande och fallande

16 fot.

Fjäderns spänstighet måste således nu uppgå till 5,64 skålp.; och kulans motvigter hålla henna i jämnvigt vid + 25° Celsii, hvarigenom fjädern kommer att spännas vid — 15° Celsii. Men kulan måste nu befinna sig i ett rum, som står under omedelbart inflytande af den yttre temperaturens gång.

Härvid är nu blott att anmärka, att det fel, som kan uppkomma af trissan h, här är af ännu mindre betydenhet, än vid
den förra constructionen; men att, i anseende till den stora af
temperaturen beroende täthetsvariationen af kulans inre luft, denne luft ifrån början måste comprimeras till mer än ‡:dels atmosfers tryckning, hvilket kulan äfven väl förmår uthärda. Allt
det öfriga blir sedan likt med det föregående, ehuru nu urets
uppdragning sker blott en gång för hvart år.

Stutanmärkning. Om de här uppgisna dimensionerna af instrumentets utsträckning skulle förekomma något stora, så bör dock denne omständighet icke afskräcka ifrån att göra-ett försök af idéen; ty det är ganska sannolikt, att den minsta erforderliga drifkraft för ett pendelur är ännu vida mindre, än den kraft, jag här antagit, emedan denne kraft så ofantligt beror på storleken af det primitiva ingreppshjulet i ett ur samt af ingrep-

pets inrättning: och i sådant fall är det troligt, att instrumentets skala kan tåla vara betydligt mindre, än den jag antagit. Vid den sednare idéen inträffar det dessutom äfven många gånger under året, vid höst och vår, att äfven barometern förändrar sig så betydligt, att den deraf härrörande lufttäthets-variationen, ökad med en af temperatur-omväxlingen beroende dylik variation, kan åstadkomma, att uret opåräknadt uppdrages mer än en gång om året.



SYMBOLE

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

AD FLORAM CRYPTOGAMICAM TRANS-CAUCASI,

AUCTORE

ALEXAND. V. NORDMANN.

(Societ, exhib. d. 3 Decembr. 1849.)

000

Die botanische Ausbeute, welche ich mit meinem verstorbenen Reisegefährten Thomas Döllinger während einer sehr beschwerlichen und gefährlichen Reise in den ungesunden Littoralprowinzen des westlichen Trans-Caucasus zusammenbrachte, bestand aus ungefähr 1140 phanerogamischen Pflanzen und 60 Species Farrn und Moosen. Unter den erstgenannten, welche in dem classischen Werke Flora Rossica, von Prof. v. Ledebour, aufgenommen und beschrieben werden, haben sich jetzt schon gegen 50 als neue Species herausgestellt, und eine ungleich noch grössere Anzahl sind neu in dem Verzeichnisse der Pflanzen des grossen Russischen Reichs, so dass eine Zusammenstellung derselben nicht ohne Intresse seyn dürfte, besonders indem ich

dabei den Standart genimer angehen klinme als es in der Place Rossica der Fall ist. Eine solche Zusammenstellung soll denn auch nächstens erfolgen. Diesmal gebe ich nur das Verzeichniss der Farrn und Moose, und bemerke dass die Moose von dem begülten en Brands giller Bruch vergliehen warden sind. Die undarch bringlishen, and hen been Uswilder und Nieberungen in Imeretien und Mingrelien und das herrliche Alpenplateau des türkischen Grenzgebirges Adshara, auf dessen höchsten Abdachung wir, oberhalb der Region des Rhododendron caucasicum, drei Wochen in und über den Wolken, freudigen Andenkens, zubrachten, hatten eine unendlich reichere Ausbeute von Cryptogamen geliefert, wenn nicht die mehr in die Augen fallenden Phineogramen und Gegenstinde ses des Zoulogie meine Zeit zu sehr in Anspruch genommen håtten. Gegenwärtiges Verzeichniss kann als ein Beitrag zu Hr Weinmann's "Syllabum muscommendation from hours pur in Imperior Rossley collectionism? betrachtet werden.

I. Fam. Equiseteac.

Equisetum elongatum. Wild.?
 In locis humidis Caucasi occidentalis. In Awhasia etc.

II. Fam. Lycopodicae.

2. Lycopadium Selago. L. In regione subalpina Adshariae.

III. Fam. Ophioglosseae.

3. Ophioglossum vulgatum. L.

In sylvis prope Pizundam, Bambori, Gagra etc.

IV. Fam. Filices.

- 4. Polypodium vulgare. L.

 In regione subalpina montium Somlia, Sahornia & Kazistavan.
- 5. Scolopendrium officinarum. Sm.
 In sylvis provinciae Awhasiae.
- 6. Pteris cretica. L.

 In rupestribus ad fluvium Phasin prope
 Cutaisium.
- 7. Asplenium septentrionale. Sw.

 In monte Somlia regione subalpina.
- 8. " Trichomanes. L. Cum autecedente.
- 9. " Filix femina. Bernh.
 In Awhasia, Mingrelia, Guria etc.
- 10. " Adiantum nigrum. L.

 In sylvis Awhasiae & Guriae.
- 11. ,, Ruta muraria. L.

 In rupestribus prope castellum Pizunda.
- 12. Aspidium aculeatum. Sw.

 Ubique frequens in sylvis.

13. Adiantum Capillus Veneris. L.

In rupestribus et locis lapidosis ad fluvium Phasin prope oppidum Cutaisium.

V. Fam. Osmundcae.

14. Osmunda regalis. L.

In locis humidis Mingreliae.

VI. Fam. Musci.

15. Tetraphis pellucida. Hedw.

In arboribus patrescentibus ad fluvium Apsäh et in Pterocarya caucasica prope castellum Drandarium.

16. Weissia cirrhata. Hedu.

In cortice Pini maritimae putrescentis prope castellum Pizunda in Awhasia.

17. Barbula mnralis. Hedu.

In lapidibus et muris prope Gelentschick & Bambori.

18. , tortuosa. Schwgr.

In sylvis & lapidibus prope pagum Dudrubsch versus montem Hirtscha in Awhasia.

19. Didymodon (Cynodontium Schwgr.) longirostre.
Web. & Mohr.

In fago sylvatica putresc. prope pagum Dudrubsch & Bambori. 20. Dicranum scoparium. Hdw.

Cum Hypno curvato et Jungermania nemorosa in fagetis prope Dudrubsch.

- 21. " glaucum. Hdw.

 Ad fluvium Apsäh in Fraxino prope Dudrubsch et ad torrentem Apsäh.
- 22. " fiagellare. Hdw.

 Cum antecedente & in arboribus prope
 Suchum-kalé.
- 23. Polytrichum undulatum. Hdw.
 In sylvis prope Suchum-kalé.
- 24. " juniperinum. Hdw.

 In locis uliginosis prope castellum Pizunda.
- 25. Funaria hygrometrica. Hdw.
 In sylvis prope Drandarium ad flumen
 Codor (Corax vet.).
- 26. Bryum caespiticium var γ. badium. Bruch. Prope Drandarium.
- 27. ,, capillare, var β. majus.

 Cum antecedente.
- 28. Mnium affine. Blond.

 In ruinis prope Suchum-kalé.

A. F. NORDMANN

3

- 29. Mnium punctatum. IIdw. In radicibus fagi putrescentis prope Dudrubsch.
- 10. Maium undulatum. Hdw.

 Ad flumen Apsäh in locis uliginosis.
- 31. " cuspidatum. Hdw.

 In alno ad promontorium Drandarium.
- 32. " heterophyllum. Schugr.

 Ad flumen Skurtscha in radicibus Atui
 cum Mnio cuspidato, in Awhasia australi.
- 33. , rostratum. Schwgr.

 In radicibus fagi in dumetis versus montem Hirtscha.
- 34. Pterogonium filiforme. Brid.

 In fago sylvatica versus montem Hirtscha in Awhasia.
- 35. Anomodon attenuatus. Bruch. Leskea attenuata.

 IIdw.

 Cum Hypnis prope Drandarium.
- 36. , repeus. Bruch. Pterogonium repens. Bried.

 Cum Hypno cupressiforme in fagetis prope
 castellum Bambori.
- ; .. , vitivulosus. Hook Neckera viticulosa. Ildw.

38. Leskea sericea, Hdw.

Ad flumen Apsäh in fraxino.

39. Leskea polycarpa. Ehrh.

Cum Hypno populeo in Pterocarya caucasica prope Drandarium.

40. Neckera crispa. Hdw.

In arboribus ad Suchumkalé & Drandarium.

- 41. " complanata. Bruch. Leskea complanata. Hdw.
 In Rhododendro pontico prope Suchum et
 in Fraxino prope castellum Gelentschick.
- 42. Hypnum euchloron, nov. spec. Bruch.

Ad arborum truncos in Awhasia prope Gelentschick, versus montem Hirtscha, Suchum-kalé etc.

H. vage ramosum. Caulis 2—4 uncialis basi defoliatus. Rami primarii reptantes, secundarii ascendentes supra incurvi. Folia dense conferta, vel undique patentia vel falcato secunda, nitentia, lanceolata, acuminata, concava, serrulata, plicata, angustissime rhomboideo areolata, costa subexcurrente. Perichactia fructifera in ramis primariis lateralis. Folia perichactialia imbricata, inferiora ovata, obtusa; superiora

e lata basi angustissime acuminata, plicato apice serrata. Seta sub-uncialis recta vel flexuosa ficcitate dextrorsum torta. Capsula obliqua vel horizontalis oblonga curvula annulata fusca. Operculum oblique rostellatum. Peristomii externi dentes linearilanceolati, densissime articulati, ficcitate incurvi, ferruginei; interni membrana reticulata plicata lutescens in processus linearilanceolatos carina perforatos, ciliolisque binis ternisve brevissimis producta.

Florescentia in ramis primariis dioica.

- 43. Hypnum nemorosum. Koch. II. affine. Hook.

 In trunco fagi sylvaticae prope Suchum-kalé
 et versus montem Hirscha in Awhasia.
- 44. " cylindricum. Bruch. Leskea Badensis. Braun.

 Ad arborum emortuarum truncos prope Suchum-kale et Drandarium.
- 45. .. recognitum. Hdw.
 In fago sylvatica versus montem Hirtscha
 in Awhasia.
- 46. .. longirostre. Ehrh.
 In arboribus, putrescentibus versus montem
 Hirtscha et prope Suchum-kalé.

47. Hypnum alopecurum. Lin.

In arboribus prope Suchum-kalé & Drandarium.

- 48. ., cupressiforme. Brid. L.

 Frequens in arboribus per totam Awhasiam etc.
- 49. , rutabulum. Hdw.

 In arboribus div. spec. prope Suchum-kalé,
 Drandarium, Gelentschick, Bambori et versus montem Hirtscha.
- 50. .. serpens. Hdw. var. major.

 Ad truncos arborum emort. prope Gelentschick et versus mortem Hirtscha.
- 51. , populeum. Hedw.

 In arboribus prope Suchum-kalé et Drandarium.
- 52. .. velutinoides. Bruch. Rabenhorst Deutschlands Krymptogamen — Flora II. p. 298.? Cum H. rutabulo et populeo prope Suchum-kalé, Bambori & Drandarium ad truncos arborum haud infrequens.

H. dense caespitosum, repens. Caulis uncialis vel paulo longior, rami pri-

marii ascendentes dein replantes, secundarii erecti. Folia remotiuscula erecto-patentia vel patula, siccitate laxe in-cumbentia, semi amplexicaulia, lanceolata concava substriata, primaria pallescentia subintegerrima, reliqua laete viridia apice serrulata, subnitentia, augustissime rhoboideo-areolata, costa apice evanescente. Perichaetia fructifera in ramis primariis secundariisque axillaris. Folia perichactialia imbricata vaginulam velantia, infima ovata acuminata, summa ovato-lanceolata teniussime acuminata acuminibus patulis rectis vel flexuosis omnia integerrima ecostata. Vaginula cylindrica, ramulo perichactiali duplo brevior. Seta erecta vel subarcuata, semiuncialis rufa omnino tuberculoso-asperrima, siecitate dextrorsum tor-Capsula obliqua, subnutans, ovalis, dorso convexiusculo, laevis annulata. Operculum e convexo oblique rostratum, capsula paulo brevior.

Peristomium Hypni populei, internum lutiscens, processus perforati, cilia bina ternave introrsum appendiculata. Florescentia dioica, in ramis tam primariis quam secundariis axillaris. Flos masculus gemma ovata 9—12 phylla, folia floralia ovata acuminata concava ecostata. Antheridia oblonga, paraphyses filiformes. Femineus gemma oblonga, ereophylla, folia perichaetialia illis perichaetii fructiferi similia. Archegonia haud copiosa, paraphyses filiformes.

Statura et foliis Hypno populeo simile, diversum tamen pedicello omnino scaberrimo operculo rostrato et florescentia dioica.

53. Hypnum confertum. Dicks.

Cum H. praclongo, populeo et velutinoideo in arboribus prope Suchum-kalé.

- 54. , polymorphum. Hedw.

 Cum H. murale et rutabulo in locis uliginosis prope Pizundam.
- 55. ., salebrosum Hoffm.

 Cum II. rutabulo in Pterocarya caucasica
 prope Drandarium.
- 56. sylvaticum. Hdw.
 In arborum radicibus, Pterocarya, Corylo,
 Alno, etc. prope Drandarium et Suchum-kale.

57. Hypnum curvatum. Swartz. Isothecium myurum. Brid. Bryol.

In fago sylvatica versus montem Hirtscha.

58. ,, praclongum. Hedw.

In Rhododendro pontico ad Suchum-kalé.

59. [7, murale. Neck. Meth. Musc.

In locis uliginosis et umbrosis ad castellum Pizunda.

NOTE

annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin annin anni

SUR LA CONVERGENCE DES FRACTIONS CONTINUES INFINIES À NUMÉRATEURS ET DÉNO-MINATEURS POSITIFS*),

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 2 Mars 1846.)

Il y a eu des géomètres qui ont regardé comme convergente une fraction continue quelconque dont les numérateurs et les dénomi-

^{*)} Ayant en connaissance, un peu avant l'impression de cette note, d'un ouvrage de M. Stern sur ce sujet, publié dans le Journal de M. Crelle en 1848 et s'accordant pour ses principaux résultats avec le mien, j'ai hésité à faire paraître ce petit travail, bien que j'en aie fait mention dans le compte-rendu de notre Société daté en décembre 1847 et inséré au 2^d Tome de ses actes. Je me suis cependant déterminé à le publier ici tel que je l'avais rédigé avant d'avoir vu le mémoire de M. Stern, tant à cause de sa liaison avec d'autres recherches relatives à la convergence des fractions continues, dont j'ai fait part à notre Société et qui vont être bientôt publiées, que parce que le géomètre très-estimable de Gœttingue n'a pas expressément énoncé le théorème digne de remarque qui fait l'objet de cette note, et dont la seconde partie se trouve ici prouvée d'une manière à la vérité un peu moins simple, mais plus élémentaire que dans l'ouvrage de M. Stern.

nateurs finissent par être positifs, puisque les valeurs d'une telle traction, quelque loin qu'on la pousse, se trouvent toujours comprises entre des limites finies. Ces géomètres nous paraissent avoir eu tort. La série p. ex.

$$\frac{3}{4.1} - \frac{4}{4.2} + \frac{5}{4.3} - \frac{6}{4.4} + \frac{7}{4.5} \dots$$

dont les termes, quoique décroissants, surpassent toujours 4, n'est pas convergente dans l'acception généralement adoptée de ce mot: on ne doit donc pas attribuer cette propriété à la fraction continue

$$\frac{\frac{1}{2 \cdot 2}}{3 \cdot 1^{2}} + \frac{1}{\frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 2^{2}}} + \frac{1}{\frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 3^{2}}} + \frac{1}{\frac{2 \cdot 5}{6 \cdot 4^{2}}} + \cdots$$

qui n'est que cette série même sous une forme dissérente. D'un autre côté p. ex. la fraction continue

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{1}} + \frac{1}{\frac{2}{2}} + \frac{1}{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\frac{2}{4}} + \dots$$

qui répond à la série convergente

$$\frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{4.5} + \frac{1}{5.6} - \dots$$

doit visiblement être censée de même convergente.

La question de la convergence ou non-convergence d'une fraction continue de l'espèce dont il s'agit serait, d'après ces remarques, facile à résoudre, si la série infinie à termes alternativement positifs et négatifs, qui lui répond, suivait une loi simple et évidente; mais ceci n'a pas lieu en général, même dans le cas où la fraction continue elle-même suivrait une loi très-simple. Il m'a donc paru de quelque intérêt de trouver une règle simple et sûre, pour décider la question dans un cas quelconque; ce qui m'a réussi par la découverte du théorème suivant d'une généralité et simplicité remarquables:

Une fraction continue quelconque de la forme

$$\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots\right) 1$$

où a1, a2, a3,.. sont positifs, est convergente si la série des dénominateurs

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

est non-convergente: non-convergente, si cette série est convergente.

La première partie de ce théorème se prouve assez facilement comme il suit.

D'après une note insérée dans le Tome 2^d de ces Actes, p. 861 et suiv., la fraction continue en question répond à la série

$$\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_1 q_2} + \frac{1}{q_2 q_3} - \dots \pm \frac{1}{q_{n-1} q_n} \mp \dots 2$$
),

1313

$$q_{1} = a_{1}$$

$$q_{2} = 1 + a_{1} a_{2}$$

$$q_{3} = q_{1} + a_{2} q_{3} = a_{1} + a_{2} + r,$$

$$q_{4} = q_{2} + a_{4} q_{3} = 1 + a_{1} (a_{2} + a_{3}) + r,$$

$$q_{5} = q_{3} + a_{5} q_{4} = a_{1} + a_{3} + a_{5} + r,$$

$$q_{6} = q_{4} + a_{6} q_{5} = 1 + a_{1} (a_{2} + a_{4} + a_{6}) + r,$$

$$q_{7} = q_{5} + a_{7} q_{6} = a_{1} + a_{3} + a_{5} + a_{7} + r,$$

$$q_{8} = q_{6} + a_{8} q_{7} = 1 + a_{1} (a_{2} + a_{4} + a_{6} + a_{5}) + r,$$

 r_3 , r_4 , r_5 ,... représentant, pour abréger, des nombres positifs dépendant des a_1 , a_2 , a_3 ,..

Le n' terme de la série 2) s'exprime donc, lorsque n est pair, par

$$\frac{-1}{\left[a_{1}+a_{3}+\ldots a_{n-1}+r_{n-1}\right]\left[1+a_{1}\left(a_{2}+a_{4}+\ldots a_{n}\right)+r_{n}\right]^{2}}$$

lorsque n est impair par

$$\frac{+1}{\left[1+a_{1}(a_{2}+a_{4}+..a_{n-1})+r_{n-1}\right]\left[a_{1}+a_{3}+..a_{n}+r_{n}\right]};$$

expressions qui, l'une et l'autre, s'évanouissent pour $n=\infty$, si la série

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

ne converge pas, puisque dans ce cas-là, si n est pair, l'une des sommes

$$a_1 + a_3 + \dots + a_{n-1}$$
 et $a_2 + a_4 + \dots + a_n$

ou toutes deux, prennent évidemment des valeurs infinies pour $n = \infty$, et, si n est *impair*, la même chose a lieu pour celles de

$$a_2 + a_4 + \dots + a_{n-1}$$
 et $a_1 + a_3 + \dots + a_n$

La seconde partie de notre théorème s'établit de la manière suivante.

En désignant par s la somme de la suite

$$a_m$$
, a_{m+1} , a_{m+2} , a_{m+n-1} ,

et par s_p celle de tous les produits possibles de termes différents au nombre de p de la même suite, on aura évidemment

$$s^p > s_p$$
.

Or la fraction continue

$$\frac{1}{a_m} + \frac{1}{a_{m+1}} + \frac{1}{a_{m+2}} + \dots$$

répond à la série

$$\frac{1}{q_1'} - \frac{1}{q_1'} q_2' + \frac{1}{q_2' q_3'} - \dots + \frac{1}{q_{n-1}' q_n'} + \dots,$$

où

$$q_1' = a_m$$

$$q_2' = 1 + a_m a_{m+1}$$

$$q'_{3} = q'_{1} + a_{m+2} q'_{2} = a_{m} + a_{m+2} + a_{m} a_{m+1} a_{m+2}$$

$$q'_4 = q'_2 + a_{m+3} q'_3 = 1 + a_m a_{m+1} + a_m a_{m+3} + a_{m+2} a_{m+3} + a_m a_{m+1} a_{m+2} a_{m+3}$$

$$q'_{5} = q'_{3} + a_{m+4} q'_{4} = a_{m} + a_{m+2} + a_{m+4} + a_{m} a_{m+1} a_{m+2} + a_{m} a_{m+1} a_{m+4} + a_{m+4} a_{m+$$

Done, lorsque n est pair,

$$q'_n < 1 + s_2 + s_4 + \dots + s_n$$
 $< 1 + s^2 + s^4 + \dots + s^n$
 $< \frac{1 - s^{n+2}}{1 - s^2},$

'et, lorsque n est impair,

$$q'_n < s + s_3 + s_5 + \dots s_n$$

 $< s + s^3 + s^5 + \dots s^n$
 $< \frac{s - s^n + s^2}{1 - s^2};$

d'où résulte

$$\frac{1}{q_{n-1} q_n} > \frac{(1-s^2)^2}{s(1-s^n)(1-s^{n+2})}, \text{ pour } n \text{ pair,}$$
$$> \frac{(1-s^2)^2}{s(1-s^{n+1})^2}, \text{ pour } n \text{ impair.}$$

La série

étant posée convergente, il y aura toujours quelque valeur déterminée de m qui rend p. ex.

$$s < \frac{1}{2}$$
,

quelle que soit celle de n. Dans ce cas-là

$$(1-s^2)^2 > \frac{9}{10}$$
, $1-s^n < 1$, $1-s^{n+1} < 1$, $1-s^{n+2} < 1$;

d'où résulte, pour une valeur de n quelconque,

$$\frac{1}{q_{n-1} q_n} > \frac{\alpha}{8}.$$

Or, en posant pour abréger

$$f_{n} = \frac{1}{a_{1}} + \frac{1}{a_{2}} + \dots \qquad \qquad \varphi_{m+n} = \frac{1}{a_{m}} + \frac{1}{a_{m+1}} + \dots + \frac{1}{a_{m+n}},$$

on aura

$$\frac{(-1)^{m+n-1}}{q_{m+n-1}q_{m+n}} = f_{m+n} - f_{m+n-1},$$

$$\frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}} = q_{m+n} - q_{m+n-1},$$

d'où s'ensuit facilement que m ayant la signification que nous venons de supposer, le $m+n^{\circ}$ terme de la série 2) se trouve, abstraction faite des signes, plus grand que

$$\frac{1}{a_{1} + \frac{1}{a_{2}} + \cdots + \frac{1}{a_{m-2} + \frac{1}{a_{m-1} + \varphi_{m+n-1} + \frac{9}{8}(-1)^{n}}} \right) = \left\{ \frac{\frac{1}{a_{1}} + \frac{1}{a_{2}} + \cdots + \frac{1}{a_{m-2} + \frac{1}{a_{m-1} + \varphi_{m+n-1}}}, \frac{1}{a_{m-1} + \varphi_{m+n-1} + \frac{9}{8}(-1)^{n}} \right\} = \left\{ \frac{1}{a_{1}} + \frac{1}{a_{2}} + \cdots + \frac{1}{a_{m-2} + \frac{1}{a_{m-1} + \varphi_{m+n-1}}}, \frac{1}{a_{m-1} + \frac{1}{\varphi_{m+n-1}} + \frac{9}{8}(-1)^{n}} \right\} = \left\{ \frac{1}{a_{1}} + \frac{1}{a_{2}} + \cdots + \frac{1}{a_{m-2} + \frac{1}{\varphi_{m+n-1}} + \frac{9}{8}(-1)^{n}}} \right\}$$

quelle que soit la valeur de n: limite qui ne saurait décroître indéfiniment quelque grand que devienne n.

La fraction continue 1) sera donc, dans la supposition actuelle, non-convergente.

L ir tion continue generale

$$\frac{b_1}{c_1} + \frac{c_2}{c_2} + \frac{b_4}{c_3} + \dots$$
 3)

élant mise sous la forme 1), on aura dans le cas de n > 1

$$\sigma_{*} = \left[(1 + (-1)^{\epsilon}) \cdot \frac{l_{1} b_{1} b_{1} ... b_{n-1}}{2 l_{2} b_{3} b_{4} ... b_{n}} \right. + (1 - (-1)^{\epsilon}) \cdot \frac{l_{2} l_{3} b_{4} ... b_{n-1}}{2 l_{1} l_{2} l_{2} ... b_{n}} \right] c_{*}.$$

La convergence de la fraction continue 3) se décidera donc sur-le-champ, si b_s , c_s sont positifs, par l'examen de la série dont le terme général s'exprime par cette formule, c'est-à-dire par celui des deux séries dont les termes généraux sont

$$\frac{b_1\,b_1\,b_2\,\dots b_{2\,n-2}}{c_2\,b_4\,b_4\,\dots b_{2\,n}} \circ c_{2\,n} \quad \text{et} \quad \frac{b_1\,b_2\,b_3\,\dots b_{2\,n-2}}{c_2\,b_3\,b_2\,\dots b_{2\,n-1}} \circ c_{2\,n-1}.$$

Si ces séries sont toutes deux convergentes, 3) sera nonconvergente: dans tout autre cas elle sera convergente.

NOTE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DES NOMBRES IRRA-TIONNELS EN FRACTIONS CONTINUES RATIONNELLES.

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 11 Oct. 1847.)

Le développement d'un nombre irrationnel α , positif et moindre que l'unité, en une fraction continue

$$\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3} + \dots$$

où m_1 , m_2 , m_3 , ... désignent des entiers positifs, se fait, comme on sait, par la détermination successive des entiers positifs m_1 , m_2 , m_3 , ... les plus grands possibles contenus dans les nombres s_1 , s_2 , s_3 , ... déterminés par les équations

$$\alpha = \frac{1}{s_1}, \ s_1 = m_1 + \frac{1}{s_2}, \ s_2 = m_2 + \frac{1}{s_3}, \dots^*$$

^{*)} Voir p. ex. les Additions aux Élémens d'Algèbre d'Euler, l'édit. de 1774, p. 381 et suiv.; la Théorie des nombres de Legendre, 3° éd., T. I, p. 17; etc.

D'un autre côté, on entend par la semme d'une fraction continue infinie la limite vers laquelle tendent indéfiniment ses valeurs partielles, de sorte qu'à partir de quelqu'une d'entre elles, elles différent toutes de cette limite moins qu'un nombre donné quelconque. Il se présente donc bien naturellement d'examiner, si une fraction continue quelconque de la forme en question

produite par le développement d'un nombre irrationnel donné a, a véritablement pour somme ce même nombre a, ainsi qu'on l'adopte communément.

La même question s'offre dans le cas heaucoup plus général, où un nombre irrationnel quelconque, positif et moindre que l'unité, se trouve, au moyen des équations

$$\alpha = \frac{s_1}{s_1} \quad s_1 = b_1 + \frac{s_2}{s_2} \quad s_2 = b_2 + \frac{s_3}{s_2} \cdots,$$

développé en la fraction continue

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \frac{a_4}{b_3}$$

dont le premier numérateur a_1 est un entier arbitraire positif, les autres numérateurs a_2 , a_3 , ... sont des entiers arbitraires positifs ou négatifs, les dénominateurs b_1 , b_2 , b_3 , ... des entiers positifs et les quotients-complets s_1 , s_2 , s_3 , ... des nombres positifs

plus grands que les numérateurs correspondants pris positi-

Cette dernière question, surtout digne d'attention à cause de son universalité, n'étant, que je sache, éclaircie nulle part d'une manière satisfaisante, mais méritant d'autant plus de l'être que beaucoup de recherches relatives aux fractions continues y sont particulièrement intéressées, j'ai cru devoir m'attacher à combler cette lacune de la théorie de ces fractions par les considérations qui vont suivre.

Ayant posé pour abréger

$$r_{m} = \frac{a_{m}}{b_{m}} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \frac{a_{n}}{b_{n}},$$

on aura pour $\alpha - r$, l'expression

$$+ \frac{\frac{a_1}{s_1} \cdot \frac{a_2}{s_2} \cdot \frac{a_3}{s_3} \cdot \frac{a_{n+1}}{s_{n+1}}}{(b_1 + r_2)(b_2 + r_3)(b_3 + r_4) \cdot \cdot (b_{n-1} + r_n) \cdot b_n} 2),$$

le signe + ayant lieu si n est pair, et celui de — si n est impair: résultat facilement tiré de ceux de la page 664 du Tome 2^d de ces Actes, si l'on y applique les relations évidentes

$$\alpha = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_m}{a_m} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \frac{a_{m+2}}{b_{m+2}} + \dots + \frac{a_m}{a_m}.$$

Les équations

$$s_{m-1} = b_{m-1} + \frac{a_m}{s_m}, \ s_m = b_m + \frac{a_{m+1}}{s_{m+1}},$$

où s_{m-1} , s_m , s_{m+1} sont des nombres positifs, b_{m-1} , b_m des entiers positifs et a_m , a_{m+1} des entiers positifs ou négatifs lesquels, pris positivement, sont respectivement moindres que s_m et s_{m+1} , nous font voir que, dans le cas de a_{m+1} positif,

$$b_m > = [a_m]^{\circ}),$$

et, dans celui de anti négatif;

$$b_{*} > = [a_{+}];$$

d'où résulte que le cas de

$$b_m = [a_m]$$

entraîne vice-versa celui de am+1 positif.

Il en est facile de conclure que, quels que soient les entiers m et n dont n > = m, $[r_m]$ sera = < 1 et, de plus, compris entre les limites

$$\frac{\begin{bmatrix} a_m \end{bmatrix}}{b_m} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots \frac{a_{m+p}}{b_{m+p}}$$
 et
$$\frac{\begin{bmatrix} a_m \end{bmatrix}}{b_m} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots \frac{a_{m+p}}{b_{m+p} \pm 1},$$

m+p désignant un entier quelconque qui ne dépasse pas les bornes m et n-1, et + ou - étant employé dans la seconde

^{*)} La notation [a], que nous avons employée auparavant, désigne + a ou - a suivant que a se trouve respectivement positif ou négatif.

Du développement des nombres en fractions continues. 409 limite suivant que a_{m+p+1} se trouve respectivement positif ou

finite survant que a_{m+p+1} se trouve respectivement positif or négatif.

Ceci observé, on prouvera de la manière suivante que $\alpha-r_1$ pris positivement sera, pour une valeur de *n quelconque* au-delà d'une certaine limite, *moindre* que tout nombre positif donné, et que par conséquent le nombre développé α constitue la véritable somme de sa fraction continue 1).

Dans le développement de α , tel que nous le supposons ici, on trouvera nécessairement, après une certaine valeur de n,

- a) b_{κ} toujours = 1,
- b) b_n toujours = 1 et 2,
- c) b_{κ} toujours = 2;

ou bien, après une valeur de n quelconque,

d) des valeurs de $b_a >= 3$.

Examinons ce que deviendra, dans chacun de ces cas, pour des valeurs de n indéfiniment augmentées l'expression cidessus 2).

Dans les cas a) et b) le dénominateur de cette expression contiendra évidemment, pour de telles valeurs de n, un nombre indéfini de facteurs de la forme

$$1+r_m$$

où la fraction continue r_m ne pourra commencer que par

$$+\frac{1}{1+}$$
, $+\frac{1}{2+}$ ou $+\frac{1}{2-}$,

et sera par conséquent, d'après ce qui précède, comprise entre les limites

$$+1 \text{ et } +\frac{1}{2}, \text{ ou } +\frac{1}{2} \text{ et } +\frac{1}{3}.$$

Dans le cas c) on aura, après une certaine valeur de n, α) a_n toujours = -1,

ou bien, après une valeur de n quelconque,

$$\beta$$
) des valeurs de $a_n = +1$, $+2$ ou -2 .

Le cas α) ne pourra avoir lieu, puisque le nombre α est supposé *irrationnel*; dans celui de β) le dénominateur de 2) contiendra, pour des valeurs de n indéfiniment grandes, un nombre illimité de facteurs de la forme

où r_m est positif.

Enfin, dans le cas d), le même dénominateur renfermera, à cause de $[r_m] = < 1$, un nombre de facteurs plus grands que 2 ou égaux à 2, qui croîtra visiblement au-delà de toute limite avec le nombre n.

Si à ce qui précède on ajoute que, d'après l'hypothèse relative aux s_1, s_2, \ldots , le numérateur de l'expression 2), pris positivement, se trouve toujours < 1, et qu'aucun des facteurs du dénominateur de la même expression ne saurait être moin le que l'unité, il devien-

411

dra de la plus grande évidence que l'expression en question, c'est-à-dire $\alpha - r_1$, prendra, pour quelque valeur de n suffisamment grande, et par suite aussi pour toutes les valeurs de ce nombre encore plus grandes, une valeur aussi petite qu'on voudra, et que par consequent le nombre donné α sera, dans l'hypothèse de développement actuelle, toujours la véritable somme de la fraction continue 1): ce qu'il fallait prouver.



BESKRIFNING AF EN VÅG,

annimment of the continue of t

AF

CARL AUG. WOLSA.

(Föredr. den 16 April 1849.)

Vi hafve visserligen en mångd vägningsinstrumenter, både i allmänna lifvet samt vid tekniska och vetenskapliga inrättningar: men intet enda af dem torde vara för ett allmännare praktiskt behof så dugligt i afseende på enkelhet, säkerhet, lätt kontrollerbarhet, bequämlighet och användbarhet för bestämmande af ifrån de allraminsta till de allrastörsta vigter, att icke mycket återstår att önska.

Den allmännaste våg är den med två skålar, hängande på hvar sin ända af en vid midten horisontelt upphängd stång; men denna våg, ehuru visserligen den mest känsliga, har den ofullkomlighet, att, för det första, dertill behöfves ett system at motvigter för den ena skålen: att, för det andra, mycken tid och möda förspilles till att passa dessa motvigter efter den vägda kroppens vigt: och att, för det tredje, ännu dertill alltid händer.

att den utrönta vigten ligger emellan tvenne vigtsenheter uti det redan med stort besvär sammanpassade motvigtsystemet, så att härvid alltid för hvarje vägning blir någonting obestämdt, eller taget på må få.

Dessa omständigheter vid den allmänna vågen: kostnaden och det besvärliga användandet af ett stort antal motvigter, samt vigtmåttets incontinuitet dervid, föranleda tanken på en våg utan något motvigtsystem och med en vigtskala, hvarpå vigtqvantiteten kan observeras såsom continuerligt fortgående uti hurudana delar som helst.

Besmanet uppfyller ingalunda dessa fordringar. Ehnru motvigtsystemet här undvikes, så fordrar en vägning med besman dock ännu mera tid, än den allmänna vågen, emedan man måste mycket noga jemka och passa besmanets upphänge, för att vid vägningen få besmanet i jemvigt; och derefter är man åter så lätt blottställd för faran att rubba upphängets läge, innan man hinner alläsa vigtqvantiteten. Sjelfva skalan må, för sin del, erkännas vara en fullkomning, i afseende på möjligheten af interpolation af vigtqvantiteten.

Pyndaren är beqvämare än besmanet; och dess skala erbjuder framfor alla andra den fördel, att vigtsablehringen bilder ett system af lika långa delar på skalans långd, hvilket för interpolation efter ögonmått är ganska beqvämt. Men så har hela denna väg-idé, just för skalans likformiga indelning, den olagen-

het, att den helt plötsligt sätter en gräns för möjligheten af vägning i fortgående storlek, nemligen derigenom, att skalans längd upphör. Denna våg erfordrar ock dessutom en flyttbar motvigt.

Dessa äro de våginrättningar, som hafva den största och allmännaste användning i praktiken. Någon gång använder man äfven med fördel *Decimal-vågen*, vid ovanligt stora vigters bestämmande. Nyttan af denna våg, för begagnande vid vissa speciella fall, bör erkännas; men jag vill dock här längre fram visa, huru man äfven vid decimal-vågen kan undvika behofvet af motvigter, om man ställer en sådan våg i förbindelse med min här ifrågavarande.

Sedan har man slutligen en mångd så kallade Snällvågar, mer eller mindre liknande manometer-vågen; andra åter med spännbara fjädrar, och skruf-spiralformiga elastiska metalltrådar; areometer-vågar, m. m. Alla dessa hafva endast en speciell tillämpning. De äro blott användbara för vissa särskilta fall, i tekniska och fysiska experimenter, vanligen i sådana händelser, då endast ytterst små vigter, såsom gran, äss, o. s. v., behöfva bestämmas; men de kunna nästan aldrig begagnas till att måta ifrån de minsta till de största vigter. Dessutom äro alla dessa vågar vida mer complicerade, dyrare och svårare att förfärdiga än den våg, jag här tänker framställa; och tillika äro deras delar lätt bragte i oskick. Också bero några af dem på osäkra

grunder, såsom på fjädrars elasticitet, och dessa kunna icke så bestämdt genom mathematiska formler graderas och controlleras, som bör kunna fordras af en fullkomligt pålitlig våg. Redan den omständighet, att dessa vågar passa endast för vissa särskilta behof, der ganska små vigter behöfva mätas, ger mig anledning att icke ställa dem i jemförelse med min här ifrågavarande våg, hvilken är ämnad att med all möjelig beqvämlighet förena den allmännaste användbarhet i praktiken.

Då jag ansett en förbättring möjelig uti hvad hittills blifvit i denna väg åstadkommet, har jag företagit mig det problem, att construera en i högsta måtto enkel, säker, lätt kontrollerbar, lequam och användlar väg. Genom allmänna undersökningar angaende villkoren för uppfyllandet af dessa fordringar, har jag stannat vid idéen om vigtens måtande genom den större eller mindre afvikelse från vertikal-linien, som tyngdpunkten af en enkelt formad solid kropp, hvilken kan röra sig rotatoriskt omkring en horisontel axel, erfar genom vigtens hångande på ena sidan om vågens rotations-axel och i dess vertikala rotationsplan. Genom denna idé har jag lyckats construera en våg, som jag hoppas kunna medelst följande beskrifning visa ega alla de uppgifna egenskaperna.

Förklaring: En tunn skifva abA (Pl. IV, Fig. 2), all tråd eller metall, upphänges i hålet a, med en derigenom gaende staltralssögla, hvilken med sin öfra spetsiga ända fasthånger vid

nedra ändan af en vertikalt hängande stältråd, som uppbär hela vågen. Ifrån hålet b hänger på en omvänd dylik ögla vågskålen C medelst tre keder, som sluta sig tillsamman ofvantill uti en enda ked, hvilken fasthänger vid öglan i hålet b, och nedantill under skålen, der dessa keder, på samma sätt förenade till en, sluta sig i en upphängd krok, hvarpå kunna hängas sådane för vägning bestämda saker, som ej få plats på sjelfva skålen. Vågen skall kunna vrida sig rotatoriskt omkring öglan i punkten a, och likaledes skall skålens ögla vid b kunna fritt vrida sig af och an. För att öka vågskifvans vigt, sitter en gjuten tackjerns kula A infattad i skifvan. B är en liten blykula, hängande på snöret Bd, hvilket på den å skifvan uppdragna indelta cirkelbågen oe utvisar den vägda kroppens vigt.

Idéen af denna våg är då: att når vågen är tom, visar lodsnöret Bd på strecket 0 och när någon kropp lägges på skålen, måste vågskifvan vrida sig omkring upphängningspunkten a, så att dess tyngdpunkt kommer längre ut ifrån vertikal-linien genom a, på det hela instrumentet åter må komma i jemvigt. Derigenom kommer då lodsnöret Bd att visa längre in på bågen oe, och der bestämma den sökta vigten.

Theori: Då vågen är tom, skall linien ab stå fullkomligt horisontel, och do vertikal. Då en oändligt stor vigt pålägges, ställer sig ab vertikal, och lodsnöret dB flyttar sig till de, som är parallel med ab och vinkelrät emot do.

Den belastade eller obelastade skålens vigt verkar, i hvarje vågens läge, såsom om skålens massa vore concentrerad i punkten b, emedan skålen i alla möjliga lägen tynger med hela sin vigt lodrätt ned ifrån punkten b. Sammaledes ock med lodet B, som tynger ifrån punkten d. Således blir, uti hvarje vågens läge, hela den obelastade vågens, d. ä. skifvans, lodets och skålens gemensamma, tyngdpunkt till sitt läge på sjelfva skifvan aldeles oföråndrad, och är det tydligt att denna punkt, när vågen är tom, befinner sig vertikalt under a.

Låt ac vara vertikal-linien genom a, då vågskålen är tom, och c centrum gravitatis till hela vågen samt M hela vigten af allt som hånger på öglan vid a, när vågen är tom. Låt af blifva vertikal då vigten n pålägges, och ag jemte cf vara vinkelräta emot af, samt bg vinkelrät emot ag. Kalla ac = R, ab = r och vinkeln caf = bag = v. Då måste

$$M. cf = n. ag,$$
 $MR \sin v = nr \cos v,$
 $\tan v = \frac{nr}{MR}.$

Emedan M, R, r alla äro constanta, så ser man att tangenterna af lutningsvinklarna forhålla sig såsom de motsvarande vigterna; hvaraf följer, att lika stora vigtsdelar kunna utmärkas genom lika stora delar af de horisontela tangent-linierna $0 n 2 n \dots$ $0 2 n 4 n \dots$, $04 n 8 n \dots$, etc.

Häraf ser man då grunden för hela vågens gradering och kontrollering. Jag vill nu förklara, huru allt detta skall praktiskt utföras.

Man gör först sjelfva skifvan ungefärligen i den form. som figuren visar, och med den deri infattade kulan A, afvensom hela skalen, fästad vid det arbitrart placerade halet b. Sedan fäster man provisionelt lodet B med sitt snöre någonstådes vid d ester behag, så att d kommer nära medelpunkten af skiskantens båge, till höger om kulan A. Derefter uppsöker man, så noga man kan, en punkt a, så att då vågen derifrån upphänges, ab står horisontel. I denna punkt borrar man då verkligen hålet a och upphänger så hela vågen. Det är väl, om hålen a och b aro fordrade med messingshölsor inuti, af orsak som lätt begripes. Nu flyttar man stiftet d antingen till höger eller till venster ett litet stycke, så att man får ab att bli fullkomligt horisontel; och hjelper detta icke ännu, så kan man antingen helt litet aftälja skifvans kanter, eller ock på något sätt förändra skålens vigt eller lodets B vigt, anda tills man har ab riktigt noga horisontel. Härvid kan man då alltid, för båttre utseendes skull, jemka punkten d så, att man får lodsnörets noll-streck do att löpa tämmeligen nära förbi kulans A kant. Sedan man då nedtryckt stiftet d, lägger man en vigt x på skålen, hvars punkt x man anmärker efter lodsnörets visning nigonstädes vid skifvans kant. Denna vigt x bör vara så stor, att dess punkt x intraffar ungefär så långt in på bågen ce, som figuren visar. Nu uttager

man stiftet d och uppritar ur dess hål cirkelbågen oe. Sedan drages linien 0x parallel med den emot do vinkelråta de, och midtemellan 0x och de drages ännu en annan med de parallel linie, samt midtemellan denna och de ännu en tredje. Derefter utsättes efter beräkning på linien 0x en multipel p.n af det stycke på samma linie, som svarar emot en viss vigt n, hvilken man vill taga till enhet, så att

$$\frac{\text{linien } p.n}{\text{linien } 0x} = \frac{\text{visten } p.n}{\text{visten } x}.$$

Denna multipel räknas ifrån 0 och slutar någonstådes nåra till vågskifvans kant, hvarefter den sedan med en cirkelöppning indelas uti sina sårskilda enkla delar ifrån n till n, såsom figuren visar. I alldeles lika delar afdelar man ånnu de andra parallela linierna emellan 0x och de.

Sedan allt detta är gjordt, drager man genom centrum doch de utmärkta vigtspunkterna förlängningsradier till bågen och hvarigenom denna blir indelad i sådana vigtsdelar, som man på de horisontela linierna utmärkt. Radierna genom den första horisontela linien gifva vigtsindelningar n och n, genom den andra 2 n och 2 n, genom den tredje 4 n och 4 n, o. s. v. Sedan man kommit till en viss vigt m eller m' på den sista horisontela linien, eller i allmänhet hvar som helst i qvadranten, så finner man dubbla vigten 2 m, 2 m', o. s. v., om man halfverar distanserna ifrån de, och likaledes finner man fyrdubbla vigterna, genom en ännu ytterligare halfvering; i allmänhet finner man p.m.

om man tager $\frac{1}{p}$ del af punktens m afstånd från de. Detta är klart, emedan dessa afstånd äro cotangenter till vinklarne v, och således måste vara reciprok-qvantiteter till tangenterna, eller afstånden på de horisontela linierna.

Sedan man sålunda erhållit bågen oe indelad i större afdelningar, kan man än ytterligare på fri hand göra underafdelningar 1, 2, 3, 4..., eller ock kan man bestämma dessa på samma sätt som de andra. Derigenom får man nu hela bågen indelad i vigtmått ifrån noll ända till oändligheten.

Då allt detta är gjordt, intrycker man åter stiftet d, och upphänger vågen, som då är färdig.

Genom det här brukade sättet behöfver man ej utröna vågens tyngdpunkt och vigt samt afståndet ab, i formeln tang $v = \frac{nr}{MR}$, som man nu helt och hållet undviker, ehuru man lätteligen skulle finna tyngdpunkten, om man upphängde vågen ifrån öglan vid b och droge från b en vertikal-linie, då tyngdpunkten c skulle ligga i afskärningen af vertikalerna genom a och b; ty vertikalen genom b skulle då utvisa tyngdpunkten likafullt, fast icke skålens vigt då kunde verka annorlunda än omedelbart på sjelfva upphängningspunkten. Men man kunde vid dessa mätningar ändock alltid begå något litet fel, hvilket nu helt och hållet undvikes, äfvensom besväret att göra sjelfva rönet och den theoretiska uträkningen af vigtsindelningen.

Jag vill nu visa, att denna våg uppfyller alla de fordringar jag ofvanföre uppgifvit. Den är nemligen ganska enkel, emedan man ej kan tänka sig en våg af enklare construktion än med tvenne rörliga delar (vågskifvan och skålen). Den är i hög grad säker, emedan den är både enkel och indelad genom lika stora afdelningar af räta linier, samt derjemte dess friktion kan göras ganska liten "), och hela vågen mycket stadig och varaktig. Den är lätt kontrollerbar, emedan hela vigtskalan kontrolleras derigenom, att man med en justerad vigt undersöker en enda afdelningspunkt, vid slutet af en af de horisontela linierna, och sedan med en öppnad cirkel öfverfar alla afdelningarne på de horisontela strecken, och tillser att de äro alla lika. Den är sårdeles begväin, emedan vägningen dermed kan ske i ett ögonblick, derigenom, att man blott lägger en kropp på skålen eller på kroken under skålen, och i samma ögonblick aflåser vigten på skalan, der man dessutom alltid är i tillfälle att interpolera efter ogonmatt, och sälunda erhalla vigten fullkomligt bestämd. Den har en ganska vidsträckt användbarhet, emedan den på en begvåm skala upptager alla vigtqvantiteter, ifrån noll till oånd-

^{*)} Friktionen blir alldeles omärklig, om de två axlarne i a och b göras eggformiga; men då får vågen icke vrida sig alltför mycket. Denna inrättning af axlarne passar derföre egentligen för en våg till kemiskt ändamål, eller för vägning af mycket små vigter, dervid man gör särdeles stort afseende på vågens känslighet. Distanserna ab och ac kunna i sådant fall älven vara ganska stora i jemförelse med vågens storlek.

lighet, och således kan anvåndas för både små och stora vigter. så långt som vågens delar förmå uthirda utan att söndersprångas, eller så långt man eljest med tydlighet kan urskilja de vid stora vigter förminskale graderings-intervallerna. Fullkomligt hjelper man sig alltid i praktiken, om man har två sådana vågar, af hvilka den enas kula A kan väga några lod och den andras ett eller några lispund. Vid begagninde nemligen af den förra kommer, vid större tyngders vågning, kulans B snöre mycket nåra till linien de, emot hvilken vigtsablelningarne blifva ganska smi ; och, vid användning af den sednare, ändras, för mycket små vigter, läget af kulans snore så obetvelligt, att vigtskillnaderne ei bli behörigen märkbara. Jag medgilver, att den ofvan omförmilda allm'inna vågen, construerad med eggformiga axlar, i vissa speciella fall, isvnnerhet for kemiskt behof, der en utomordentlig noggrannhet erfordras, eger foretrade framför min vig. emedan den forras noggrannhet endast beror på dess känslighet, men den sednares väsendtligen på den indelta skalans storlek och ögats förmåga att derpå noga afläsa vigten. Men i alla vanliga händelser eger den här beskrifna vågen deremot så många företräden, med alseende å hastig vägning, vigtmättets continuitet, dess expressibilitet i hvad fall som helst, m. fl. förmåner, att dess stora nytta ej bőr kunna betviflas.

På alla de mer eller mindre konstiga snällvågar som finnas, förekommer 1) skälen säsom en del tör sig; 2) den rörliga tunga vägkreppen med dess visare m. m.; 3) den indelta bägen med sina förstirkningsradier och konstiga ställningar; 4) en ställnung eller fot till vägen.

Min vag består af två delar, skålen och vägskifvan, sammanfästade till en. I stället for en klen och arbetsdryg lös gradbage med manga och konstiga ställningar, hvilka misshaga ett oga som alskar enkelhet och enket i former, förekommer har blott en geometrisk cirkelquadrant, ritad på sjelfva vågskifvan. som derföre, utan förstärkningar och konstigt gillerverk, har betydligt företräde framför en annan fysisk båge. Och tillika har den har använda bagen sähunda den fördel, att densamma, säsom befintlig på! en bred skifva, kan graderas genom en helt enkel geometrisk method, då en annan båge måste graderas genom en besvärlig trigonometrisk beräkning, som åter grundar sig på rön. vid hvilka man alltid begår fel. Sjelfva vågen är åfven, sådan den blifvit här föreslagen, starkare och stadigare än alla andra, emedan den består af en bred skifva, som icke kan böjas och brytas, sasom fallet är med smala eller klena hafstånger. En omståndighet till denna vågs fördel, som ej bör öfverses, är ännu den, att densamma kan, enligt denna beskrifning, förfärdigas af hvilken mathematikus som helst, utan nagon kostnad, emedan dertill behölves blott en trädskifva med sin kula, och en tallrik till skal; men hvarje annan vag, som kunde komma i jemförelse med denna, maste goras af instrumentmakare och bestå af metall,

samt med större kostnad möjligen ändå blifva mindre användbar och varaktig.

Om denna våg ställes i förbindelse med en decimal-våg, så att decimal-vågens lilla skål fästes vid dennas skål, så undvikes vid decimal-vågen behofvet af lösa vigter, och vigten atläses i stället på denna med decimal-vågen förbundna våg.



NOTE

SUR LES FRACTIONS CONTINUES À NUMÉRATEURS ET DÉNOMINATEURS ENTIERS ET FRAC-TIONS COMPOSANTES = < 1,

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 1 Nov. 1847.)

Dans deux notes différentes publiées dans les Actes de la Société *) j'ai eu l'honneur de lui présenter quelques considérations relatives aux fractions continues infinies à numérateurs et dénominateurs entiers et fractions composantes moindres que l'unité, par lesquelles j'ai déduit non seulement la convergence de ces fractions, mais encore leur propriété d'avoir pour somme, lorsqu'elles commencent par des numérateurs et dénominateurs positifs, un nombre positif moindre que l'unité, dans tout autre cas que celui, où elles auraient la forme particulière

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a'}{a'+1} - \frac{a''}{a''+1} - \cdots$$

a, a', a", .. désignant des entiers positifs quelconques. Je me suis

^{*)} Tome 2d, p. 661 et 868.

proposé d'établir ici les mêmes vérités relativement aux fractions continues du genre un peu plus général indiqué ci-dessus, exclus seulement le cas où les fractions composantes égales à l'unité seraient immédiatement suivies de numérateurs et dénominateurs de signes différents, puisqu'alors les deux propriétés en question pourraient n'avoir pas lieu °). Les fractions continues de cette espèce m'ont paru d'autant plus mériter d'être considérées ici, que non seulement elles se présentent très-naturellement, ainsi que je l'ai fait voir dans une note précédente °°), lorsqu'il s'agit de développer en fractions continues des nombres donnés, mais encore la méthode dont je me suis servi dans la même note conduit d'une manière extrêmement simple à la démonstration des deux propriétés mentionnées de ces fractions, lesquelles ne s'établiraient pas aisément par les méthodes employées dans les notes citées ci-dessus du Tome 2^d de ces Actes.

Soit

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \dots$$
 1)

*) Ce que prouvent p. ex. les deux fractions continues

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} + \frac{1}{1} - \frac{1}$$

dont la première ne converge pas, et la seconde a pour somme le nombre plus grand que l'unité $\frac{1}{4}(1+\sqrt{5})$.

^{• *)} P. 405 et suiv. de ce Tome.

une fraction continue quelconque de l'espèce citée, où a_1 est un entier positif, a_2 , a_3 ,.. sont des entiers positifs ou négatifs et b_1 , b_2 , b_3 ,.. des entiers positifs tels que

$$b_n > = [a_n],$$

le cas de $b_n = [a_n]$ étant toujours accompagné de celui de a_{n+1} positif. Je prouverai d'abord la convergence de cette fraction continue.

En posant pour abréger

$$l_{m} = \frac{a_{m}}{b_{m}} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots \frac{a_{m}}{b_{m}} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots \frac{a_{p}}{b_{p}}, \qquad \lambda_{m} = \frac{a_{m}}{b_{m}} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots \frac{a_{p}}{b_{p} \pm 1},$$

où p désigne un entier quelconque moindre que n mais pas moindre que m, et le signe de l'unité dans la valeur de λ_m est le même que celui de a_{p+1} , on aura, ainsi qu'il a été remarqué dans la note citée, $[r_m] = < 1$ et, de plus, $[r_m]$ compris entre les limites $[l_m]$ et $[l_m]$ *). Il est de même évident que tant $[l_m]$ que $[l_m]$ ne franchissent pas les limites $[l_m]$ et $[l_m]$ que

Or des formules développées p. 664 du Tome 2^d de ces Actes résulte évidemment

$$b_{p} + \frac{a_{p+1}}{b_{p+1}} + \frac{a_{p+2}}{b_{p+2}} \cdot \frac{a_{p}}{b_{p+2}}$$

^{*)} Pour se convaincre que $[r_m]$ ne saurait dépasser les limites $[l_m]$ et $[\lambda_m]$, il n'y a qu'à considérer que l'expression

$$\lambda_1 - l_1 = \underbrace{\stackrel{\bullet}{\pm}}_{(b_1 + l_2)} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdot \cdot \lambda_p \cdot \pm 1}{(b_2 + l_3) \left(b_3 + l_4\right) \cdot \cdot \left(b_{p-1} + l_p\right) b_p},$$

le premier + ou - ayant lieu suivant que p est respectivement pair ou impair, et le second suivant que a_{r+1} est respectivement positif ou négatif. Pour établir la convergence de la fraction continue 1), il n'y aura donc qu'à prouver que le secret ment de cette apart ma pris positivement devient pair une valeur de p suffisamment grande, moindre qu'un nombre donné quelconque p); ce qui se fera exactement de la même manière que dans la note souvent citée fut démontrée la petitesse indéfinie de $a-r_1$. La seule chose à ajouter à cette démonstration regarde le cas particulier où, après une certaine valeur de p, a, serait toujours a et a toujours a et a le quel n'y fut pas considéré à cause de l'irrationnalité supposée de a. La petitesse

se trouve toujours comprise entre b, et b, ± 1 , et que l'équation

$$l_{n} = \frac{a_{m}}{b_{m}} + \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} + \dots + \frac{a_{m+1}}{a_{m+1}}$$

représente, dans tons les cas, une hyperbole équilatère donnée par les a_m , a_{n+1} ,... a_j , b_m , b_{m+1} ,... b_{j-1} , et ayant pour coordonnées rectangles, parallèles à ses asymptotes, l_m et b_j .

* Que cela entraine la convergence de 1) est évident de ce que r₁ est compris entre l₁ et 2, pour une valeur de n quelconque plus grande que p, et que la convergence d'une fraction continue infinie consiste dans la propriété que toutes ses valeurs partielles, à partir d'une certaine, différent de cette dernière moins qu'un nombre donné quelconque. de $\lambda_1 - l_1$ pour de grandes valeurs de p s'établit cependant dans ce cas-là facilement par la considération qu'alors, en supposant la suite indéfinie de fractions composantes égales à $-\frac{1}{2}$ précédée d'un nombre q de fractions composantes quelconques, on aura

$$l_{p} = -\frac{1}{2}, \quad l_{p-1} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{2}{3}, \quad l_{p-2} = -\frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{3}{4},$$

$$l_{p-3} = -\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{4}{5}, \dots l_{q+1} = -\frac{p-q}{p-q+1}.$$

Le produit des p-q+1 derniers facteurs du dénominateur de la valeur de λ_1-l_1 , sera donc à présent

$$2\left(2-\frac{1}{2}\right)\left(2-\frac{2}{3}\right)\left(2-\frac{3}{4}\right)\left(2-\frac{4}{5}\right)\cdot\left(2-\frac{p-q}{p-q+1}\right),$$

c'est-à-dire

$$2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{p-q+2}{p-q+1}$$
:

expression évidemment égale à

$$p - q + 2$$

et croissante par conséquent au-delà de toute limite avec le nombre p.

La convergence de la fraction continue 1) établie, on prouvera de la manière suivante que sa somme est = 1 lorsqu'elle a la forme particulière

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a'}{a'+1} - \frac{a''}{a'+1} - \dots$$
 2),

où a, a', a'', ... désignent des entiers positifs quelconques, mais < 1 dans tout autre cas.

Pour la forme 2) en aura en esfet

$$\lambda_{i} = 1$$
,

quelle que soit la valeur de p, d'où résulte évidemment, puisque t_1 s'approche pour des valeurs de n et p croissantes indéfiniment de la limite λ_1 , que la somme de 1) ne saurait, dans ce cas-là, être autre que l'unité.

Si 1) n'a pas la formie 2), elle s'en écartera après un nombre déterminé q de fractions composantes, de sorte que celle de

$$\frac{a_{q+1}}{b_{q+1}}$$

ne coïncidera pas avec la correspondante de la forme 2). Or dans ce cas-là on aura nécessairement

a) a_{q+1} positif, avec une valeur de b_{q+1} quelconque; ou bien

b)
$$a_{q+1}$$
 négatif, avec $b_{q+1} > < [a_{q+1}] + 1$.

Soient

$$a_1 = a_1', \quad a_2 = -a_2', \quad a_3 = -a_3', \quad a_7 = -a_9'.$$

où $a_1', \quad a_2', \quad a_9'$ sont des entiers positifs.

Dans le premier cas r_i ne pourra, quel que soit n, franchir les limites

$$\frac{a_1'}{a_1'+1} - \dots \frac{a_{q-1}'}{a_{q-1}'+1} - \frac{et}{a_q'+1} \quad \frac{a_1}{a_1'+1} - \dots \frac{a_{q-1}'}{a_{q-1}'+1} - \frac{a_q}{a_q'+2},$$

dont l'une et l'autre sont des nombres déterminés moindres que Punité, ce qu'on voit facilement en considérant, dans chacune d'elles, d'abord la dernière fraction composante, puis les deux dernières, après-cela les trois dernières, et ainsi de suite.

Dans le second cas on distinguera l'hypothèse de $b_{q+1} > [a_{q+1}] + 1$, c'est-à-dire $b_{q+1} > = [a_{q+1}] + 2$, de celle de

$$b_{q+1} < [a_{q+1}] + 1$$
 ou $b_{q+1} = [a_{q+1}].$

Cette distinction faite, il sera évident par ce qui précède que, quelle que soit la valeur de n dans r₁, cette fraction continue ne pourra, dans la première supposition, dépasser les limites

lesquelles sont toutes deux moindres que l'unité, ni, dans la se-conde, celles de

$$\frac{a'_{q}}{a'_{q}+1} - \frac{a'_{q}}{a'_{q}+1} - \frac{a_{q+1}}{a_{q+1}} + \frac{a_{q+2}}{a_{q+2}} - \frac{a'_{q}}{a'_{q}+1} - \frac{a'_{q}}{a'_{q}+1} - \frac{a_{q+1}}{a'_{q+1}} + \frac{a_{q+2}}{b_{q+2}\pm 1},$$

où a_{q+2} est positif, et qui de même sont l'une et l'autre moindres que l'unité. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas où 1) ne garde pas indéfiniment la forme 2), elle sera, quelque loin qu'on la prolonge, comprise entre des limites déterminées moindres que l'unité; d'où s'ensuit évidemment que cette fraction continue, dont la convergence a été aussi prouvée, aura pour somme un nombre de même moindre que l'unité, puisqu'autrement, en s'approchant indéfiniment de sa somme, elle finirait par franchir les limites ci-tées, ce qui ne pourra avoir lieu.

DEDUCTION

DE QUELQUES RÉSULTATS GÉNÉRAUX RELATIFS AUX FRACTIONS CONTINUES DONT LES SOMMES SONT RACINES D'ÉQUA-TIONS DU SECOND DEGRÉ,

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 8 Févr. 1847.)

L'objet de cette note est la généralisation des relations

$$(t_n) = 2\alpha p_{n-1} p_n + \beta(p_n q_{n-1} + p_{n-1} q_n) + 2\gamma q_{n-1} q_n,$$

$$(u_n) = 2(\alpha p_n^2 + \beta p_n q_n + \gamma q_n^2),$$

$$s_{\pi} = \frac{(t_{\pi-1}) \mp \sqrt{\varkappa}}{(u_{\pi-1})},$$

$$(t_n)^2 - (u_n)(u_{n-1}) = z,$$

$$(t_n) = b_n(u_{n-1}) - (t_{n-1}),$$

$$(u_n)$$
 - $(u_{n-2}) = b_n [b_n(u_{n-1}) - 2(t_{n-1})],$

déduites dans le Tome 24 de ces Actes, p. 1064 et suiv., relativement à la fraction continue

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{b_2} - \frac{1}{a_3}$$

dans le cas où elle représente la valeur de x dans l'équation

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0.$$

En posant, à cet esfet, en général

$$\frac{P_{n}}{q_{n}} = \frac{a_{1}}{b_{1}} + \frac{a_{2}}{b_{2}} + \dots + \frac{a_{n}}{b_{n}}$$
 et $s = \frac{a_{1}}{b_{1}} + \frac{a_{2}}{b_{2}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} + \frac{a_{n}}{a_{n}},$

nous aurons, en vertu du Tome cité, p. 861 et suiv.,

$$p_{n} = a_{n} p_{n-2} + b_{n} p_{n-1},$$

$$q_{n} = a_{n} q_{n-2} + b_{n} q_{n-1},$$

$$p_{n-1} q_{n} - p_{n} q_{n-1} = (-1)_{n}^{n} a_{1} a_{2} \dots a_{n},$$

$$s = \frac{a_{n} p_{n-2} + p_{n-1} s_{n}}{a_{n} q_{n-2} + q_{n-1} s_{n}}.$$

Or, s étant la racine de l'équation

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0,$$

on aura

$$s = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta - 4\alpha \gamma}}{2\alpha} = \frac{-\beta + \sqrt{\alpha}}{2\alpha}.$$

Done

$$\begin{split} s_{n} &= \frac{-a_{n}(p_{n-2} - s q_{n-2})}{F_{n-1} - s q_{n-1}}, \\ &= \frac{-a_{n}(p_{n-2} - s q_{n-2})(p_{n-1} - s' q_{n-1})}{(F_{n-1} - s q_{n-1})(p_{n-1} - s' q_{n-1})} \left(s' \text{ étant } = \frac{-\beta \mp \sqrt{\alpha}}{2\alpha}\right), \\ &= \frac{-a_{n}(p_{n-2}p_{n-1} - s p_{n-1}q_{n-2} - s' p_{n-2}q_{n-1} + ss' q_{n-2}q_{n-1})}{p_{n-1}^{2} - (s + s')p_{n-1}q_{n-1} + ss' q_{n-2}^{2}}, \\ &= \frac{(q_{n-1})^{\perp} (-1)^{n} a_{1} a_{2} \dots a_{n} \sqrt{\alpha}}{(q_{n-1})^{2}} \cdot \cdot 1), \end{split}$$

en mettant pour abréger

$$(t_n) = -a_{n+1} \left[2\alpha p_{n-1} p_n + \beta \left(p_n q_{n-1} + p_{n-1} q_n \right) + 2\gamma q_{n-1} q_n \right] \dots 2 \right).$$

$$(u_n) = 2(\alpha p_n^2 + \beta p_n q_n + \gamma q_n^2) \dots 3 \right).$$

De ces valeurs résulte immédiatement la relation

$$(l_n)^2 - a_{n+1}^2 (u_n)(u_{n-1}) = a_{n+1}^2 (\beta^2 - \frac{1}{2} \alpha \gamma) (p_{n-1} q_n - p_n q_{n-1})^2,$$

$$= z (a_1 a_2 \dots a_{n+1})^2 \dots \dot{4};$$

et l'élimination des p_n et q_n de l'équation 2) conduit à celle de

$$(t_n) = -a_{n+1}[b_n(u_{n-1}) - (t_{n-1})] ... 5).$$

De plus, en vertu de la relation 4),

$$(t_n)^2 - a_{n+1}^2 (u_n)(u_{n-1}) = a_{n+1}^2 (t_{n-1})^2 - a_n^2 a_{n+1}^2 (u_{n-1})(u_{n-2});$$

$$a_{n+1}^2 (u_{n-1}) [(u_n) - a_n^2 (u_{n-2})] = [(t_n) - a_{n+1}(t_{n-1})] [(t_n) + a_{n+1}(t_{n-1})],$$

$$= -a_{n+1} b_n (u_{n-1}) [(t_n) + a_{n+1}(t_{n-1})],$$

$$= a_{n+1}^2 b_n (u_{n-1}) [b_n (u_{n-1}) - 2(t_{n-1})],$$

c'est-à-dire

$$(u_n) - u_n^2(u_{n-2}) = b_n [b_n(u_{n-1}) - 2(t_{n-1})] \dots 6).$$

Pour l'application des relations précédentes, qui ont lieu pour des valeurs quelconques des

$$a_1, a_2, \ldots a_n, b_1, b_2, \ldots b_n, \alpha, \beta, \gamma,$$

il importe d'examiner plus près les équations 2) et 3). En posant

$$s - \frac{r_n}{q_n} = d_n,$$

et éliminant de ces équations p_n et p_{n-1} au moyen des relations

$$p_n = (s - d_n)\gamma_n$$
 et $p_{n-1} = (s - d_{n-1})q_{n-1}$,

on Ironvera

$$\begin{split} (l_n) &= -a_{n+1}q_{n-1}q_n \big[2\alpha(s-d_{n-1})(s-d_n) + \beta(s-d_{n-1}+s-d_n) + 2\gamma \big], \\ &= -a_{n+1}q_{n-1}q_n \big[2(\alpha s^2 + \beta s + \gamma) - (2\alpha s + \beta)(d_{n-1}+d_n) + 2\alpha d_{n-1}d_n \big], \\ &= a_{n+1}q_{n-1}q_n d_{n-1} \big[-2\alpha d_n + (1+\frac{d_n}{d_{n-1}})\sqrt{\kappa} \big], \end{split}$$

$$(u_n) = 2q_n^2 \left[\alpha(s - d_n)^2 + \beta(s - d_n) + \gamma \right]$$

= $2q_n^2 \left[\alpha s^2 + \beta s + \gamma - (2\alpha s + \beta) d_n + \alpha d_n^2 \right]$
= $-2q_n^2 d_n \left(-\alpha d_n \pm \sqrt{x} \right).$

Or, en vertu du Tome 2ª de ces Actes, p. 866,

$$d_n = \frac{(-1)^n a_1 a_2 \dots a_{n+1}}{(s_{n+1} q_n + a_{n+1} q_{n-1}) q_n},$$

c'est-à-dire

$$d_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1} a_1 a_2 ... a_n}{(a_n a_{n-1} + a_n a_{n-2} / a_{n-1})}.$$

et par conséquent

$$\frac{d_n}{d_{n-1}} = \frac{\sigma_{n+1} \, q_{n-1}}{q_n} \cdot \frac{s_n q_{n-1} + \sigma_n \, q_{n-2}}{s_{n+1} \, q_{n-1}} = \frac{\sigma_{n+1}}{s_{n+1}} \cdot \frac{q_{n-1}}{q_n}$$

Done, si l'on pose la fraction continue

telle que, pour des valeurs de n quelconques au-dessus d'une certaine limite, s_n et q_n soient positifs, et

$$1 + \frac{d_a}{d_{a-1}}$$

de même positive et ne décroissante pas au-dessous d'une limite déterminée, les fonctions

$$(t_n)$$
 et (u_n)

prendiont évidemment, pour des valeurs de n du genre cité, le signe de

$$-d_n \cdot \pm 1$$

où le signe de l'unité est celui de \sqrt{z} dans la valeur de s *), et par conséquent celles de

$$(t_{n-1})$$
 et (u_{n-1})

le signe de — d_{n-1}. ± 1, c'est-à-dire celui de

$$\frac{(-1)^n a_1 a_2 \dots a_n}{(s_n q_{n-1} + a_n q_{n-2}) q_{n-1}} \cdot \pm 1,$$

ou, ce qui revient au même, celui de

$$(-1)^n a_1 a_2 \dots a_n \cdot \pm 1,$$

puisqu'en posant même a, négatif, on aura, dans le cas actuel,

$$s_nq_{n-1} + a_nq_{n-2}$$

nécessairement positif, à cause de la convergence supposée de 775.

$$s_{n+1} = \frac{s_{n+1}q_n + a_{n+1}q_{n-1}}{s_nq_{n-1} + a_nq_{n-2}} \text{ et } \frac{d_n}{d_{n-1}} = -\frac{a_{n+1}q_{n-1}}{s_{n+1}q_n},$$

dont la première fait voir que, dans l'hypothèse actuelle de s_{n+1} positif pour des valeurs de n suffisamment grandes, $s_nq_{n-1} + a_nq_{n-2}$ ne saurait être négatif sans que le soient de même

$$s_{n+1}q_n + a_{n+1}q_{n-1}, \quad s_{n+2}q_{n+1} + a_{n+2}q_{n}, \dots$$

^{*)} Ce qui est clair, puisque, dans le cas en question, les facteurs de (la) et (ua) respectifs a_{n+1} d_{n-1} et — d_n prennent le même signe, et d_n devient, pour des valeurs de n croissantes, d'une petitesse indéfinie.

^{**)} La vérité de cette assertion devient évidente, si l'on fait attention aux relations

Si done on suppose

 $a_n = f_n[a_n]$, $(-1)^n f_1 f_2 ... f_n ... \pm 1 = \mathcal{G}_n$, $\mathcal{G}_n(t_{n-1}) = t_{n-1}$, $\mathcal{G}_n(u_{n-1}) = u_{n-1}$, où $f_n = +1$ ou -1 selon que a_n est positif ou négatif et le double signe de 1 a la signification posée ci-dessus, les fonctions t_{n-1} et u_{n-1} prendront, dans l'hypothèse actuelle relative aux

$$s_n$$
, q_n et $1 + \frac{d_n}{d_{n-1}}$,

des valeurs positives pour toute valeur de n au-dessus de quelque limite déterminée.

Or, d'après ce qui précède, on a en général

$$s_{n} = \frac{(\ell_{n-1}) \pm (-1)^{n} a_{1} a_{2} \dots a_{n} \sqrt{\lambda}}{(u_{n-1})},$$

$$= \frac{\varphi_{n}(\ell_{n-1}) + [a_{1} a_{2} \dots a_{n}] \sqrt{\lambda}}{\varphi_{n}(u_{n-1})}.$$

Donc, dans la supposition particulière adoptée relativement à s_n , q_n et d_n ,

$$s_n = \frac{t_{n-1} + [a_1 a_2 \dots a_n] \sqrt{\kappa}}{u_{n-1}} \dots 8),$$

où, quel que soit le signe de \sqrt{s} dans la valeur de s, ce radical est pris positivement, et t_{n-1} , u_{n-1} jouissent toutes deux de la propriété que nous venons d'énoncer.

sans fin : ce qui évidemment répugnerait à la convergence supposée de 7).

à l'infini, c'est-à-dire, puisque q_n est aussi posé positif, sans que a_{n+1} , a_{n+2} , soient négatifs et en même temps

 $[[]a_{n+1}]q_{n-1} > s_{n+1}q_n$, $[a_{n+2}]q_n > s_{n+2}q_{n+1}$, ...
å l'infini; et la seconde nous apprend que cela entrainerait les inégalités $[d_n] > [d_{n-1}]$, $[d_{n+1}] > [d_n]$, ,.

La forme de 7) la plus ordinaire est celle où ses numérateurs et dénominateurs seraient entiers et ses fractions composantes = < 1, exclus toutefois le cas où les fractions composantes égales à l'unité seraient immédiatement suivies de numérateurs et de dénominateurs correspondants de signes différents. Voyons comment s'appliquent alors les remarques précédentes relatives aux fonctions (t_n) et (u_n) .

L'hypothèse considérée ci-dessus relativement à s_n , q_n et d_n aura, dans ce cas assez universel, lieu lorsque

- a) Les numérateurs et dénominateurs de la fraction continue sont tous positifs.
- b) Ses numérateurs sont tous négatifs (excepté le prenuer), et ses dénominateurs tous positifs.

Pour s'en convaincre, il n'y aura qu'à observer que, dans l'un et l'autre de ces deux cas

1:0 s_n sera, pour une valeur de n quelconque, positif, ainsi que le prouve sa valeur

$$b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} + \frac{a_{n+2}}{b_{n+2}} + \dots$$

où $b_n > = 1$ (ce dernier cas étant accompagné de celui de a_{n+1} positif) et

$$\left| \frac{\left| \frac{1}{b_{n+1}} + \frac{a_{n+2}}{b_{n+2}} + \frac{a_{n+3}}{b_{n+2}} \right|}{b_{n+2}} + \frac{a_{n+3}}{b_{n+3}} \right| = < 1^{\circ}$$

2:0 q_n se trouve de même, pour toute valeur de n, positif, ainsi que le font voir sur-le-champ les relations

$$q_1 = b_1,$$

$$q_2 = a_2 + b_1 b_2,$$

$$q_3 = a_3 q_1 + b_3 q_2,$$

$$q_4 = a_4 q_2 + b_4 q_3,$$

où, dans le cas b), $b_2 > a_2$, $b_3 > a_3$, $b_4 > a_4$, . .

3:0 1 + $\frac{d_n}{d_{n-1}}$ sera aussi positive et ne décroitra pas audessous d'une certaine limite finie, quelque grand que devienne n, en vertu de l'équation

$$\frac{d_n}{d_{n-1}} = -\frac{a_{n+1}}{c_{n+1}} \cdot \frac{q_{n-1}}{q_n},$$

qui fait voir que, dans le cas b),

$$\frac{d}{d}$$

reste toujours positif, et, dans celui de a), toujours compris entre o et — 1, sans s'approcher indéfiniment de cette dernière limite, puisqu'alors

^{*)} Voir la note p. 427 et suiv. de ce Tome.

$$q_{n-1} < q_n$$
 et $\frac{a_{n+1}}{s_{n+1}} < 1$,

sans que

$$\frac{a_{n+1}}{s_{n+1}}$$

s'approche indéfiniment de l'unité *).

Il résulte de ce qui précède que, dans les deux cas en question, les fonctions t_{n-1} et u_{n-1} sont, dans l'équation ci-dessus 8), douées de la propriété de rester *positifs* pour des valeurs de n quelconques plus grandes qu'une certaine valeur déterminée.

Si, dans la forme particulière de 7) que nous considérons actuellement, les dénominateurs sont positifs, mais les numérateurs changent de signe quelque loin qu'on prolonge la fraction continue, les deux premières conditions ci-dessus seront toujours remplies, mais la troisième relative à

$$1 + \frac{d_n}{d_{n-1}}$$

pourra n'avoir pas lieu, ainsi que le prouve p. ex. la fraction continue

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{1} + \dots$$

qui exprime la racine positive de l'équation

$$3x^2 - x - 1 = 0$$
.

^{*)} V. le note dernièrement citée.

Les relations

$$\frac{q_{n-1}}{q_n} = 2 + \frac{q_{n-3}}{q_n}, \quad \frac{a_{n+1}}{s_{n+1}} = \frac{2}{\sqrt{13-1}},$$

qui ont lieu ici lorsque n est un terme quelconque de la progression arithmétique

conduisent, pour ces valeurs de n, à

$$1 + \frac{d_n}{d_{n+1}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{13-1}} (2 + \frac{q_{n-2}}{q_n}),$$

équation dont le second membre est évidemment négatif, puisque q_n se trouve, pour une valeur de n quelconque, positif.

Il en résulte que t_{n-1} et u_{n-1} prennent, dans le cas particulier en question. des signes contraires pour les valeurs de n citées, ce qui arrive en effet, puisque les quotients-complets

deviennent ici indéfiniment

$$\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$$
.

J'ajouterai que l'équation

$$\frac{d_n}{d_{n-1}} = -\frac{a_{n+1}}{s_{n+1}} \cdot \frac{q_{n-1}}{q_n}$$

fait assez voir que, malgré le changement continuel des signes du numérateur de la fraction continue 7), la condition souvent citée relative à

$$1 + \frac{d_{\scriptscriptstyle A}}{d_{\scriptscriptstyle A+1}}$$

sera, dans la forme de 7) dont il s'agit, toujours remplie, lorsque la somme de cette fraction continue se trouve *irrationnelle* et, pour des valeurs de *n* quelconques au-dessus d'une certaine limite,

$$q_{n-1} < q_n$$

inégalité qui aura lieu dans le plus grand nombre de cas, ainsi que le font voir les équations ci-dessus

$$q_1 = b_1,$$

 $q_2 = a_2 + b_1 b_2,$
 $q_3 = a_3 q_1 + b_3 q_2,$

Il importe encore de remarquer que les équations

$$(-1)^n f_1 f_2 ... f_n ... = 1 = \varphi_n, \quad \varphi_n(t_{n-1}) = t_{n-1}, \quad \varphi_n(u_{n-1}) = u_{n-1}$$

changent les résultats ci-dessus 2).. 6) en les suivants, où, dans l'hypothèse précédente relative à s_n , q_n et d_n , les fonctions t_n et u_n prennent des valeurs positives pour toute valeur de n au-dessus d'une limité déterminée:

$$t_{n} = -a_{n+1} \varphi_{n+1} \left(2\alpha p_{n-1} p_{n} + \beta \left(p_{n} q_{n-1} + p_{n-1} q_{n} \right) + 2\gamma q_{n-1} q_{n} \right) ... 9 \right),$$

$$u_{n} = 2\varphi_{n+1} \left(\alpha p_{n}^{2} + \beta p_{n} q_{n} + \gamma q_{n}^{2} \right) ... 10 \right),$$

$$t_{n}^{2} + \alpha_{n+1}^{2} f_{n+1} ... u_{n} u_{n-1} = \varkappa \left(\alpha_{1} \alpha_{2} ... \alpha_{n+1} \right)^{2} ... 11 \right),$$

$$t_{n} = \alpha_{n+1} f_{n+1} \left(b_{n} u_{n-1} - t_{n-1} \right) ... 12 \right),$$

$$u_{n} - \alpha_{n}^{2} f_{n} f_{n+1} ... u_{n-2} = b_{n} f_{n+1} \left(2t_{n-1} - b_{n} u_{n-1} \right) ... 13 \right).$$

1

Nous reviendrons une autre fois à ces relations qui, jointes à celle de S), offrent des applications importantes .

^{*)} Relativement à ces applications il sera bon a observer que, d'après ce qui précède, la fonction u_n se trouve, dans les relations en question, nécessairement positive pour des valeurs de n quelconques suffisamment grandes, pourvu que s_n et q_n restent toujours positifs, ce qui n'a pas l'ien pour t_n , dont le signe dépend aussi de la condition établie ci-dessus par rapport à l'expression

1 $\frac{d_n}{d_{n+1}}$

9:e Unterabtheilung: Härte von 1,5 bis 0,5.

ERSTE ABTHEILUNG:

Tab. 1.

Mineralien des Regulären Krystallsystems.

Unterabtheilung: Härte gleich 10.	2:e Unterabtheilung: Hürte von 8,5 bis 7,6.	3:e Unterabtheilung: Härte von 7,5 bis 6,6.	4:e Unterabtheilung: Hårte von 6,5 bis 5,6.	5:e Unterabtheilung: Härte von 5,5 bis 4,6.	6:e Unterabtheilung: Härte von 4,5 bis 3,6.	7:e Unterabtheilung: Ilårte von 3,5 bis 2,6.	8:e Unterahtheilung: Härte von 2,5 bis 1,6.	9:e Unterahtheilung Hårte von 1,5 bis 0,
		1:e <i>Gruppe</i> : 23,0:22,0. Iridium.	1.0 Grynno: 119-115	l:e <i>Gruppe</i> : 19,0:17,5. Platina. 2:e <i>Gruppe</i> : 12,0:11,5.		1 c Course 1 1 1 - 1 2 7	1:e <i>Gruppe</i> : 19,6: 19,0. Gold. 2:e <i>Gruppe</i> : 16,0:12,0.	
			Eisenplatin.	Palladium.	·	Amalgama.	Electrum.	Blei.
						2:e <i>Gruppe:</i> 10,5:10,0.	3:e <i>Gruppe:</i> 11:10,7. Arquerit.	
				3:e <i>Gruppe:</i> 7,8:7,0. Eisen. Eisenkobaltkies.		Kupfer. Selenblei. Tellurblei.	4:e Gruppe: 9,8:9,6. Wismuth.	
			2:e <i>Gruppe:</i> 6,9:6,7. Tesseralkies.	A:e Gruppe: 6,7:6,0. Arseniknickel. Gersdorfit. Speisskobalt, Weisser. Nickelantimonglanz.	1:e Gruppe: 6,7:6,6. Tombazit. 2:e Gruppe: 6,1:6,0. Amoibit.	Steinmannit.	5:e <i>Gruppe:</i> 7,6:6,9. Bleiglanz. Glaserz.	2:e Gruppe: 7, Selenquecksilberb
		2:e <i>Gruppe:</i> 5,0:4,5. Stirian.	3:e <i>Gruppe:</i> 5,3:4,7. Franklinit. Hart-Magneteisenerz. Eisenkies.	Kobaltglanz. Kiselwismuth.	3:e Gruppe: 5,2:3,7. Nickelwismuthglanz. Eisennickelkies. Tennantit.	Rothkupfererz. Cuproplumbit. 5:e Gruppe: 5,2:4,4. Kupferfahlerz.		3:e <i>Gruppe:</i> 6,0: Bromsilber.
			Martit. Iserin.	5:e Gruppe: 5,1:4,7. Weich-Magneteisenerz Kobaltkies. Mikrolith.	Kupferblende. Manganglanz. Zinnkies. Leberblende.	Buntkupfererz. Silberfalderz.		Silberhornerz.
Gruppe: 4,5:3,6	1:e Gruppe: 4,3:4,2	3:e Gruppe: 4,3:3,4	4:e Gruppe: 4,2:4,0	6:e Gruppe: 4,5:4.		6:e Gruppe: 4,1:3,6	•	
iamant.	Galmit. 2:e Gruppe: 3,8:3,4 Pyrop. Pleonast. Spinell.	4:e Gruppe: 3,0:2,9		Cuban. 7:e Gruppe: 3,4:3,3		Zinkblende. Arsenikblüthe.		
	Chlorospinell. Demantoid. Rhodizit. Uwarowit.	Borazit.	Helvin. 7:e Gruppe: 2,8:2,2 Ittnerit. Sodalith. Nosean.	Fluoryttrium. See Gruppe: 2,9:2,0 Lasurstein. Leucit. Analcim.	4:e Gruppe: 3,2:3,1. Flussspath		6:e <i>Gruppe:</i> 3,0:2,9. Würfelerz.	
		5:e <i>Gruppe:</i> 2,0:1,9 Faujazit.		Haiyn.		7:e Gruppe: 2,2:2,1. Glottalith.	7:e Gruppe: 2,3:2,2. Steinsalz. 8:e Gruppe: 1,8:1,7. Kali-Alaun. AmAlaun.	

e 9:e Unterabtheilung: Härte: 1,5:1.

Mineralien des Rhopboedrischen Krystallsystems.

le Unternbtheilung: Härte: 9.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 8:7,6.	3:e Unterabtheilung: Hårte: 7,5:6,6.	4:e Unterabtheilung: Härte: 6,5:5,5.	:e Unterabtheilung: Härte: 5,5:4,6.	6:e Unterabtheilung: 11årte: 4,5:3,6.	7:e Unterabtheilung: Hårte: 3,5:2,5.	8:e Unterabtheilung: Hårte: 2,5:1,5.	9:e Unterabtheilung: Hårte: 1,5:1.
		1:e Gruppe: 22:21. Osmium-Iridium.						,
		2:e Gruppe: 19,5:19.		1: Gruppe: 12:11,5.		1:e Gruppe: 8,6:8,4.	1:e Gruppe: 8,5:8.	
		Iridosmin.		'alladium.		Tellursilber.	Molybdänsilber.	
							Zinnober.	
i				(Gruppe: 7,6:7.	1:e Gruppe: 7,2:6,9.	2:e Gruppe: 7,3:6,5,	2:e Gruppe: 7,5:7,4.	
į				atimomickel.	Mimetesit.	Vanadinbleierz.	Tetradymit.	
				pfernickel.	Grünbleierz.	Antimon.		
						3:e <i>Gruppe:</i> 6,1:5,7.	3:e Gruppe: 6,4:6,1.	
						Polysphärit.	Tellur.	
;						Arsenik.	Poly basit.	
			1:e Gruppe: 5,3:5.	: Gruppe: 5:4,9.	2:e Gruppe: 5,5:5.	4:e Gruppe: 5,3:5,2.	4:e Gruppe: 5,8:5.	
			Lisenglanz.	erit.	Rothzinkerz.	Zinkenit.	Rothgiltigerz.	
			Crichtonit.		Hedyphan.	Haarkies.	Xanthokon.	
			Hystasit.	1	Nussierit.			
Gruppe: 4:3,9.			2:e Gruppe: 4,8:4,3.	Gruppe: 4,7:4.	3:e Gruppe: 4,7:4,1.	5:e Gruppe: 4,9:4,8.		1:e Gruppe: 4,6:4,
orund.			Ilmenit.	L'orcerium, neutrales.	Magnetkies.	Greenockit.		Molybdanglanz.
			Ottrelith.	tibdelophan.	Herrerit.			
			Washingtonit.	inkspath.	Kapnit.			
				Proostit.				
				√illemit.				
	lie Gruppe: 3,2:2,6	3:e Gruppe: 3,2:2.		Gruppe: 3,4:3.	4:e Gruppe: 3,9:3,4.	6:e Gruppe: 3,6:3,2.	5:e Gruppe: 3,4:3.	
N	Phenakit.	Schörl.		Pioptas.	Spatheisenstein.	Volborthit.	Cronstedtit.	
Ł.	Smaragd.	Quarz.		patit.	Mesetinspath.	Dreelit.	Sideroschisolith.	
				iphanit.	Manganspath.			
					Pistomesit.			
			3:e Gruppe: 2,7:2,5.	6: Gruppe: 2,9:2,4.	5:e Gruppe: 3,2:2,8.	7:e Gruppe: 3:2,5.	6:e Gruppe: 3:2,4.	
			Nephelin.	Ludialith.	Perlglimmer.	Lepidomelau.	Iberit.	Chlorit.
	1		Elfolith.	klunit.	Xanthophyllit.	Giesekit.	Leuchtenbergit.	
				fanerinit.	Bitterspath.	Einaxiger Glimmer.	Kämmererit.	
				Javyn.	Breunnerit.	Gigantholith.	Ripidolith.	
	,			l'alkapatit.	Chrysophan.	Kalkspath.	Pennin.	
				1	Seybertit.	Fahlunit.	Brucit. Kupferglimmer.	
					Pyrosmalith.	Rubellan	Kupiergimmer	
	1			1	Ankerit.	Plambocalcit.		
					Dolomit.		7:e Gruppe: 2,1:2.	3:e Grunne: 2 3 1
				7:eGruppe: 2,2:2,1.	**		Coquimbit.	Natron-Salpeter.
				meonu.	Gmelinit.		Jorgannone	Graphit.
					Levyn. Chabasit.			
					Herschelit.			
					Acadiolith.		100	4:e Gruppe: 0,97:0,9
					, a committe			Eis.

Tab. 4.

nterabtheilung: 2:e Unt8:e Unterabtheilung: rte: 8,5:7,6. Härte: 1,5:1.

DRITTE ABTHEILUNG:

Tab. 3.

Mineralien des Pyramidalen Krystallsystems.

1:e Unterabtheilung: Härte: 7,5:6,6.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 6,5:5,6.	3:e Unterabtheilung: Härte: 5,5:4,6.	4:e Unterabtheilung: Hårte: 4,5:3,6.	5:e Unterabtheilung: Harte: 3,5:2,6.	6:e Unterabtheilung: Hårte: 2,5:1,6.	7:e Unterabtheilung: Härte: 1,5:1.
				1:e Gruppe: 8,1:8. Wolframbleierz.		
	i:e Gruppe: 7:6,8. Zinnstein.			2:e <i>Gruppe</i> : 6,8:6,6. Gelbbleierz.	Zinn.	1:e Gruppe: 7,2:7. Blättererz.
	2:e Gruppe: 5,9:5,8 Fergusonit.		1:e Gruppe: 6,1:6. Scheelit.	3:e Gruppe: 6,1:6. Bleihornerz.	Antimonblei?	2:e Gruppe: 6,5:6,4. Quecksilberhornerz.
12 Gruppe: 4,6:4,4	3:e Gruppe: 4,9:3,9.	1:e Gruppe: 4,8:4,1.	2:e Gruppe: 4,7:4,1.			
Zirkon.	Braunit.	Hausmannit.	Kupferkies.			
Engelhardtit.	Rutil.	Yttrophosphit.	Adelpholith.			
	Malakon.	Tephroit.				
	4:e Gruppe: 3,5:2,8.	2:e Gruppe: 3,9:3,6.			2:e Gruppe: 3,6:3,2.	
_	Sarkolith.	Anatas.			Chalkolith.	
_	ldokras.	Oerstedtit.			Uranit.	
_	Gehlenit.					
	Bytownit.	3te Grunne: 3:2 2	3:e Gruppe: 2,7:2,6.	4:e Gruppe: 3:2,3.		
		Skapolith.	Edingtonit.	Kryolith.		
		Nuttalith.	Langion.	Pyrargillit.		
		Dipyr.		Löweit.		
		Apophyllit.				
		Beaumontit.				
		Melilith.				
	5:e Gruppe: 2,2:2,1.				3:e Gruppe: 1,6:1,4.	
	Zeagonit.				Honigstein.	

e U Håi ,

*

.

. *

.

•

.

*

Mineralien des Prismalischen Krystallsystems.

heilung:	2:e Unterabtheilung: Hårte: 7,5:6,6.	3:e Unterabtbeilung: Hårte: 6,5:5,6.	. 4:e Unterabtheilung: Hårte: 5,5:4,6.	5:e Unterabtheilung: Härte: 4,5:3,6.	6:e Unterabtheilung: Härte: 3,5:2,6.	7:e Unterabtheilung: Hårte: 2,5:1,6.	;8:e Unterabtheilung:
		Tantalit. 2:e Gruppe: 6,2:5,7: Kobalt-Arsenikkies. Mispickel. 3:e Gruppe: 5,2:5. Polykras. 4:e Gruppe: 4,9:4,1. Speerkies. Polymignit. Kyrosit. Ostranit.	1:e Gruppe: 8,1:7,9. Plakodin. 2:e Gruppe: 7,3:7. Arsenikeisen. Arsenikalischer Kobalt Grauer Speisskobalt 3:e Gruppe: 5,6:5,1. Uranotantal. Aeschynit. 4:e Gruppe: 4,6:4. Tscheffkinit. Erinit. Göthit.		Antimonsilber. 2:e Gruppe: 7,1:7. Mendipit. 3:e Gruppe: 6,6:6,2. Weissbleierz. Bleivitriol. Geokronit. Caledonit. Silberkupferglanz. 4:e Gruppe: 5,8:5. Antimonkupferglanz. Bournonit. Melanochroit. Kupferwismutherz. 5:e Gruppe: 4,75:4. Kupferantimonglanz. Olivenit. Schwerspath. Altomorphit.	Nadelerz. Wismuthglanz. Schilfglaserz. 3:e Gruppe: 5,8:5,5. Jamesonit. Rothgiltigerz. Kupferglanz. Antimonblüthe. 4:e Gruppe: 4,9:4,5.	
,8:3,4.	Tautolith, Staurolith,	Liëvrit. Manganchrysolith. Brookit. Allanit. 5:e Gruppe: 3,6:3,1. Orthit? Yuvocerit?	Triplit. Zinkkiesel.	Eisenchrysolith. Junkerit.	Witherit. Atakamit. 6:e Gruppe: 3,9:2,9. Coelestin. Brochantit.	ő:e <i>Gruppe:</i> 3,6:3,4. Auripigment.	ee <i>Gruppe:</i> 3,2:2,7. Kupferschaum. Pyrophyllit.
	Xenolith. Saffirin. Oliwin. Andalusit. Spodumen.	Warwickit. Amblygonit. Violan. Xanthit. Anthophyllit.	Monticellit. Glaukophan. Lazulith. Triphyllin. Batrachit. Chiastolith. Herderit. Manganocalcit.	Libethenit. Alstonit. Jeffersonit. Euchroit. Skorodit. Arragonit. Praseolith.	Strontianit. Villarsit.		
3,1:2,8.	3:e <i>Gruppe:</i> 2,6:2,5. Dichroit.	6:e Gruppe: 2,9:2,4. Prehnit. Pollux. Glaukolith. Aedelforsit. Petalit. Hyalosiderit.	6:e Gruppe: 2,6:2,1. Porcellanspath. Harmotom. Thomsonit. Poonalith. Okenit. Natrolith. Mesotyp.	3:e Gruppe: 2,5:2. Peganit. Wavellit. Epistilbit. Stilbit. Philipsit.	7:e Gruppe: 2,9:2,6. Anhydrit. Pinit. Hopeit. Thenardit. Bastit. Pyrosklerit. Pikrosmin. Kalisulphat. Polyhalit.	Gie Gruppe: 3:2,7. Linsenerz. Haidingvit. Fie Gruppe: 2,1:1,7-3 Schwefel. Kali-Salpeter. Zinkvitriol. Bittersalz.	:e <i>Gruppe:</i> 1,6:1,5. Thermonatrit.

SECH

ab. 6.

Mineralien des :

nterabtheilung: lärte: 6,6.	2:e Unterabtheilu Härte: 6,5:5,
cuppe: 3,3:3.	1:e <i>Gruppe</i> : 3,8:
nit.	Andesin.
	Cyanit.
	Babingtonit.
	2:e Gruppe: 2,8:
	Anorthit.
	Labrador.
	Oligoklas.
	Albit.
	Periklin.

FÜNFTE ABTHEHLUNG:

Tab. 5.

Mineralien des Hemiprismatischen Krystallsystems.

le Unterabtheilung: Härte: 7,5:6,6.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 6,5:5,6.	3:e Unterabtheilung: Ilårte: 5,5:4,6.	4:e Unterabtheilung: Härte: 4,5:3,6.	5:e Unterabtheilung: Härte: 3,5:2,6.	6:e Unterabtheilung: Härte: 2,5:1,6.	7:e Unterabtheilung Härte: 1,6:1.
		t:e <i>Gruppe:</i> 7,4:7,1. Wolfram.			1:e Gruppe: 7:6,8. Lanarkit.	
	fte <i>Gruppe:</i> 6,5:6,3. Plinian. Columbit.			1:e Gruppe: 6,8:6. Vauquelinit. Rothbleierz.	2:e Gruppe: 6,4:6,2. Leadhillit.	
		2:e Gruppe: 5:4,9. Monazit.		2:e <i>Gruppe</i> : 5,5:5,3. Bleilasur.	3:e <i>Gruppe:</i> 5,4:5,2. Plagionit. Miargyrit.	
Gruppe: 4,3:4.	·	3:e Gruppe: 4,3:4,0.	1:e Gruppe: 4,3:4,2.	3:e Gruppe: 4, 25 : 4, 1.	4:e Gruppe: 4,5:4,2.	
Gadolinit.		Phosphorocalcit. Brauneisenerz.	Dihydrit.	Strahlerz.	Rothspiessglauzerz. Feuerblende.	
Epidot z. Theil.	Epidot z. Theil.	4:e Gruppe: 3,7:2,6. Rother Mangankiesel.	Malachit.		5:e Gruppe: 3,6:3,5. Realgar.	
Euklas. Weissit.	Augit z. Theil. Hormblende z. Theil. Achmit. Chondrodit. Withamit.	Sphen. Broncit. Augit z. Theil. Hornblende z. Theil. Heterosit.	Kupferlasur, Barytocalcit, Margarit,		6:e <i>Gruppe:</i> 3,2:2,8. Johannit. Kobaltblüthe. Lithionglimmer.	
	Mangansil, v. Franklin				Zweiaxiger Glimmer. Lepidolith. Symplesit. Pharmacolith.	
	3:e Gruppe: 2,7:2,3	1	3:e Gruppe: 2,6:2,2	4:e Gruppe: 2,8:2,1	7:e Gruppe: 2,4:2.	1:e <i>Gruppe: 2</i> ,8::
	Couzeranit. Rhyakolith. Orthoklas. Glasiger Feldspath. Castor.	Skolezit. Brewsterit. Natronskolezit.	Lindsayit. Pyrallolith. Schillerspath. Bucklandit. Heulandit.	Laumontit, Huraulit, Leonhardit, Trona, Eilagit,	Gyps. Botryogen.	Vivianit. Talk.
				Glauberit.	8:e <i>Gruppe:</i> 1,95:1,5. Gaylussit. Eisenvitriol. Tinkal.	2:e <i>Gruppe:</i> 1,5:1 Glaubersalz. Natron.

E

SECHSTE ABTHEILUNG:

Tab. 6. Mineralien des Tetartoprismatischen Krystalisystems.

1 e Unterabtheilung : Härte: 6, 6.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 6,5:5,6.	3:e Unterabtheilung: Härte: 5,5:5.	4:e Unterabtheilung: Härte: 2,5:1,6.	5:e Unterabtheilung: Härte: 1,5:1.
Le Gruppe: 3,3;3. Axinite	t:e Gruppe: 3,8:3,4. Andesin. Cyanit. Babingtonit.	1:e <i>Gruppe</i> : 3,5:3,3. Diaspor.		
	2:e <i>Gruppe:</i> 2,8:2,5. Anorthit. Labrador.	2:e <i>Gruppe:</i> 2,7;2,6. Latrobit.	1:e Gruppe: 2,3:2,2. Kupfervitriol.	
	Oligoklas. Albit. Periklin.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-;	1:e <i>Gruppe</i> : 1,5:1,4 Sassolin.

Tab. 8.

Unterabtheilung: Härte: 6,5:5,6.	2:e Unterabtheilung: Härte: 5,5:4,6.
Fruppe: 7,95:7,9.	
ıntalit mit brau-	
nem Pulver.	1.a Cruppe & B. B. B

SIEBENTE ABTHEILUNG:

Tab. 7.

Krystallinische Mineralien.


Unterabtheilung: Härte: 7,5:6,6.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 6,5:5,6.	3:e Unterabtheilung: Härte: 5,5:4,6.	4:e Unterabtheilung: Härte: 4,5:3,6.	5:e Unterabtheilung: Härte: 3,5:2,6.	6:e Unterabtheilung: Härte: 2,5:1,6.	7:c Unterabtheilung Hårte: 1,5:1.
				1:e Gruppe: 6, 2: 6, 18.	1:e Gruppe: 6,5:6,15	
				Plumbostib.	Bleischimmer.	
					Kobellit.	
					Embrithit.	
		Ite Gruppe: 5,9:5,3.	t:e Gruppe: 5,2:5,1.	2:e <i>Gruppe</i> : 5,97:5,7.	2:e <i>Gruppe:</i> 5,9:5,3.	
		Gelher Yttrotantal.	Wodankies.	Boulangerit.	Silberphyllinglanz.	1
		Schwarzer Yttrotantal.		Federerz.	Arsenikglanz.	
	1:e Gruppe: 4,2:4,1.	2:e Gruppe: 4,2:3,9.		3:e Gruppe: 4,9:4.	3:e Gruppe: 4,3:3,8.	
	Fayalit.	Eisenapatit.		Hypargyrit.	Chazellit,	
				Anglarit.	Martourit.	
					Ehlit.	
te Gruppe 3.	2:e Gruppe: 3,7 : 3,41.	3:e Gruppe: 3,4:2,8.	2:e <i>Gruppe:</i> 3,76:3,3.	4:e Gruppe: 3,82:3,4.	4:e <i>Gruppe:</i> 3, 1 : 2, 62.	lie Gruppe: 3,1:1
orthit.	Cerin.	Saussmit.	Stromnit,	Neukirchit.	Nickelocker.	Damourit.
	Monradit.	Zenxit.	Kroky dolith.	Grüneisenstein.	Kirwanit,	Neolith.
	Chloritoid.	Karpholith.			Beraunit.	
	Sismondin.	Boltonit.			Rosit.	
	Wöhlerit.				Antigorit.	
S	3:e Gruppe: 3,2:2,9.	4:e Gruppe: 2,62:2,4.	3:e Gruppe: 3:2,7.	5te Gruppe: 2,9:2,73.		2:e Gruppe: 2,5:2
	Polylith.	Pektolith.	Stilpnomelan.	Bucholzit.		Pholerit.
	Bustamit,	Berzelit.	Mosandrit.	Pikrophyll.		Vermiculit.
	Bamlit.	Fischerit.	Osmelith,	Groppit.		Kakoxen.
	Anthosiderit.			Raphilit.		Prasilith.
	Hypochlorit.			Huronit.		
				Rosellan.		
	4:e Gruppe: 2,76:2,3.		l:e Gruppe: 2,5:2,4.	6:e <i>Gruppe:</i> 2,5:2,2.	5:e Gruppe: 2,3:1,9.	
	Barsowit.		Neurolith.	Serpentin.	Nemalith.	
	Sacharit.			Steatoid.	Oxalit.	
	Krablit.			Mesole.	Hydroboracit.	
				Commingtonit.		
			5:e Gruppe: 2,2:2.			
			Antrimolith.			
			Cluthalit,			

ACHTE ABTHEILUNG:

Tab. 8.


Amorphe Mineralien.

te Unterabtheilung: Harte: 6,5:5,6.	2:e Unterabtheilung: Hårte: 5,5:4,6.	3:e Unterabtheilung: Hárte: 4,5:3,6.	4:e Unterabtheilung: Härte: 3,5:2,6.	5:e Unterabtheilung: Härte: 2,5:1,6.	6:e Unterabtheilung: Hårte: 1,5:1.
he Gruppe: 7,95:7,9.			,		1:e <i>Gruppe</i> ; 7. Sclenbleikupfer.
nem Pulver.	1:e Gruppe: 6,6:6,3. Uranpecherz.	1:e Gruppe: 6,9:6,8. Bismuthit.		1:e Gruppe: 6,5:6,4. Kilbrickenit.	2:e Gruppe: 6. Wolframocker.
	2:e Gruppe: 5:4,7. Weisskupfererz.	Bleigummi.	1:e <i>Gruppe</i> : 5:4,6. Pittinerz. Mennig.	2:e Gruppe: 5,5:4,7. Weissgiltigerz. Digenit.	3:e Gruppe: 5,6:5,2. Selenkupferblei. Condurrit.
ne Gruppe: 4,6:4,3.		2:e <i>Gruppe:</i> 4,8:4,6. Thorit.	2:e Gruppe: 4,2:3,98. Gummierz.	3:e Gruppe: 4,3. Selen?	4:e Gruppe: 4,7:4,3 Wismuthocker.
	3:e <i>Gruppe:</i> 3,8:3,5. Turgit. Stilpnosiderit.	3:e <i>Gruppe:</i> 3,8:3,4 Antimonocker. Voltzit. Trombolith.	3:e Gruppe: 3,5:3. Wasserkies. Tagillith. Hisingrit. Layendulan.	4:e Gruppe: 3,2:3. Thuringit. Nickelblüthe.	
ce Gruppe: 3,1:2,9.	4:e Gruppe: 3,2:2,56.	4:e Gruppe: 3,2;3.	4:e Gruppe: 2,9:2,7.	5:e Gruppe: 2,85:2,5.	5;e Gruppe: 2,83;2,5.
Erlan.	Hepatinerz.	Kupfermangan.	Chonikrit.	Agalmatolith.	Grünerde.
Nephrit.	Jogynäit	Thraulit.	Aspasiolith.	. Onkosin.	Speckstein.
Isopyr.	Botryolith.		Natron-Gelbeisenerz.	Paragonit.	Mysorin.
	Gurhoffian.		Kali-Gelbeisenerz.	Bergholz.	Talksteinmark.
	Kupferblau.		Rhodochrom.	Melopsit.	
te Gruppe: 2,8:2,5.	5;e Gruppe: 2,38;2,3.	5:e Gruppe: 2,83:2,4.	5:e Gruppe: 2,6:2,3.	6:e Gruppe: 2,3:1,9.	file Gruppe: 2,4:2,2.
Katait.	Variscit.	Chiolith.	Gibbsit v. Beaux.	Pimelith.	Kerolith.
Sordavvalit.		Karphosiderit.	Gibbsit.	Eisensinter.	Fettbol.
Sphirwlith.		Esmarkit.	Predrazit.	Wolchonskoit	Pinguit.
Tachylith.		Polyargit.	Eisensteinmark.	Miloschin.	Kaolin.
		Pikrolith.	Retinalith.	Dermatin.	Bol.
		Hydrophit	Steinmark.	Pissophan.	Gelberde.
		Chalilith.		Halloisit.	Erdkobalt.
					Cimolith. Smelit.
5:e Gruppe: 2,2:2.		6:e Gruppe: 2:19.	6:e Gruppe: 2,2:1,8	3.7:e Gruppe: 1,6:0,8	7:e Gruppe: 2:1,6.
Opal.		Schrötterit.	Opalinallophan.	Meerschaum.	Malthazit.
· ·			Kieselkupfer.	Anthrazit.	Aluminit
			Chloropal.	Kollyrit.	
			Allophan.	Aphrodit.	
			Delyauxit.		1













INDEN COMMENTATIONUM.

Pag.
F. NYLANDER, Ericphori monographia t.
W. NYLANDER, Additamentum alterum adnotationum in monographism formicarum borealium
N. NORDENSKIÖLD, Ueber das atomistisch-chemische Mine- ral-System und das Examinations-System der Mineralien 42.
F. Woldstedt, Die Höhen der Dreiecks-Punkte der Finländischen Gradmessung über der Meereshäche
G. GEITLIN, Om Österländska mynt sunna i Finsk jord 2001.
I. ILMONI, Föredrag på Finska Vetenskips-Societetens årsdag den 29 April 1849
N. G. DE SCHULTEN, Deduction de la theorie des paralle- les d'un principe nouveau
W. G. LAGUS, Undersökning om Karelska Lagsagans uppkomst 355.
C. A Wolsa, Idé till uppdragning af ett ur genom inflytan- det af atmosferens täthets successiva af- och tilltagande 371.
A. v. NORDMANN, Symbolæ ad floram cryptogamicam Trans-
N. G. DE SCHULTÉN, Note sur la convergence des fractions continues infinies à numérateurs et dénominateurs positifs 397.
N. G. DE SCHULTÉN, Note sur le développement des nom- bres irrationnels en fractions continues rationnelles 405.
C. A. Wolse, Beskrifning af en våg
N. G. DE SCHULTEN, Note sur les fractions continues à un- mérateurs et dénominateurs entiers et fractions composan- te «1
N. G. DE SCHULTEN, Déduction de quelques résultats généraux relatifs aux fractions continues dont les sommes sont racmes d'équations du second degré

ACTA

SOCIETATIS SCIENTIARUM

FENNICÆ.

TOMI TERTII

FASCICULUS II.

HELSINGFORSIÆ.

Ex officina typographica A. W. GRÔNDARL.
MDCCGLII.



ACTA

SOCIETATIS SCIENTIARUM

FENNICÆ

TOMI TERTII

FASCICULUS II.

LIBRARY NEW YORK BOTANICAL GARDEN,

HELSINGFORSIÆ.

Ex officina typographica A. W. GRÖNDAHL.

MDCGCLII.

IMPRIMATUR:

G. F. AMINOFT.

BIDRAG

TILL BLODKÄRLSYSTEMETS JEMFÖRANDE ANATOMIE,

AF

E. J. BONSDORFF.

1

Det arteriella kärlsystemet hos Paddan (Bufo vinereus, Schneid.)

(Föredr. den 1 Nov. 1847.)

Förord.

Då jag härmedelst till allmänheten, öfverlemnar första häftet af mina undersökningar inom den jemförande angiologiens gebit, nödgas jag beklaga att detta sker under obekantskap med innehållet af Burows, i Regensburg år 1834 tryckte afhandling: de vasis sanguiniferis ranarum. Då likväl manuscriptet till efterföljande undersökningar varit färdigt i nära 3 år, och jag, oaktadt alla uppbjudne, mig till hands stående, medel, icke kunnat erhålla förberörde afhandling, har jag likväl ansett mig sent omsider böra offentliggöra mina undersökningar om det arteriella kärlsystemet hos paddan, i det hopp att desamma likväl kunna

lemna något bidrag till den jemförande angiologien, men anser mig äfven böra anmärka, det jag mera speciellt beskrifvit arteriella kärlsystemets peripheriska utgreningar och af sådan orsak förbigått en speciell i detaille gående jemförelse, emedan denna redan ligger i de af mig använde benämningarne å artererne, i hvilket afseende jag strängt iakttagit de benämningar som blifvit antagne i allmänt tillgänglige handböcker i anatomien.

Hvad den bifogade planchen vidkommer, har det icke varit möjligt att å några få figurer framställa alla af mig beskrifne grenar. Den hufvudsakliga disposition af artererne är likväl naturtroget framställd, de mera speciella detaillerne inhämtas lättast af sjelfva beskrifningen. Vid den anatomiska beskrifningen af artererne har jag till grund för benämningen af musklerne, lagt en under mitt inseende, af Med. Licentiaten A. Collan år 1847, utgifven academisk dissertation: jemförande anatomisk beskrifning öfver muskelsystemet hos paddan.

Hjertat utgöres hos paddan, likasom i allmänhet hos de nakna amphibierne, af 2 genom ett ganska tunnt septum full-komligt skiljda atria och en enkel ventrikel, ifrån hvilken Aorta*) utgår och förlöper, med en uppåt något convex båge, emellan främre ytan af de båda hjertförmaken inom hjertsäcken, och delar sig snart i 2:ne lika stora grenar, hvilka under en nästan råt vinkel skilja sig från hvarandra, den ena förlöpande åt höger,

^{*)} Vid dess ursprung förekomma tvänne valvulæ semilunares.

den andra åt vänster. Der Aorta sålunda delar sig, upphör äfven densamma att vara omsluten af hjertsäcken, hvilken tvertom vid delningsvinkeln slår sig tillbaka till hjertat. Emedan båda dessa grenar emellan æsophagus och ryggraden åter förena sig till aorta abdominalis, och ifrån desamma grenar utgå till hufvudet och främre extremiteterna, kan jag icke undgå att anse dessa 2:ne grenar af aorta såsom motsvarande arcus aortæ och aorta thoracica hos menniskan och däggdjuren. Arcus aortæ förekommer sålunda hos paddan dubbel, en arcus aortæ dexter och en sinister.

- I) Arcus aortæ dexter, (Pl. V. Fig. 1 N:o 2) förlöper åt höger, emellan de båda capita af m. sternohyoideus, *) emellan m. stylohyoideus och stylopharyngeus, till sidan af första verteberns corpus, der densamma böjer sig nedåt. Härifrån fortlöper den vidare på högra sidan om æsophagus; motsvarande aorta thoracica hos menniskan och däggdjuren, långs högra sidan af ryggraden till ledföreningen emellan 4:de och 5:te vertebern, der den böjer sig snedt öfver till vänstra sidan för att under en spetsig vinkel förenas med samma arter från vänstra sidan, till en gemensam stam, motsvarande aorta abdominalis.
- II) Arcus aortæ sinister, (Pl. V. Fig. 1 N:0 3) är något kortare än den högra och har samma förlopp som denna.

^{*)} Den del af m. rectus abdominis, hvilken enligt Collan fäster sig på tungbenet, är egentligen en skild muskel, som uppkommer från processus xiphoideus, der m. rectus abdominis slutar, och motsvarar m. sternohyoideus, som sålunda hos paddan uppkommer med 2:ne portioner.

Isrân osvan heskrisne arcus aortw utga steva grenar i soljan le ordning: A) A. caretis externa B) A. pulmono-cervicalis C) A. Laryngea, D) A. occipitalis, och E) A. subclavia.

A) Carotis externa (Pl. V. Fig. 1 N:o 4) utgår på hvardera sidan från arcus aortæ under en ganska spetsig vinkel, c.h förlöper sne li öfver m. hveglossus uppåt och negot bakåt. Hår sväller den snart till en, i förhållande till stammen, stark sinuös utvidgning. Denna sinus caroticus, 2) (Pl. V. Fig. 1 och 2 N:o 5), hvilken utgör ett bihjerta af en nästan sphaerisk gestalt. Er hellgen under m. omahveideus emellan tunglænsin lan af m. stylohvoideus och arcus aortæ, med hvilken densamma genom lås cellvälnad är förenad, och skickar framåt tvenne gre-

^{*)} Denua sinus torde motsvara den hos försattare vidrörda glandula carotidez, hvilkens inre byggnad Huschke (Tiedemann und Treviranus, Zeitschrift für Physiologie B IV sid. 113 ansett bestå uti ett rete mirabile, hvilken byggnad dock Stannius (Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere Berlin 1846) pag. 216 not, icke funnit å densamma Vid injection af det arteriella systemet ifrån truncus arteriosus har jag, oaktadt sinus caroticus varit fylld, icke sett injectionsmassa härifrån intranga i olvan anmarkte vena carotico cerebralis, men val da injection utföres genom nyss anmärkte ven, i hvilkens öppning i sinus, 2 fina semilunara valvler förekomma, hvilka hindra blodets inträngande hit ifrån sinus caroticus. Då härtill kommer att jag, vid vivisiectioner utforde å paddor, sett tydlig rhytmisk contraction i denna sinus, torde intet tvifvel kunna äga rum att ju densamma är att anses såsom ett accessoriskt hjerta, utgörande en återstod från ett tidigare utvecklings stadium, då respiration utfordes genom galar, såsom alven Huschke l. c. formodar, då han anser densamma sasom en alerstod af första branchial bagens capillar kärlsystem.

nar: Art. lingualis och pharyngea adscendens samt mottager vena carotico-cerebralis (Pl. V. Fig. 1 N:0 6 Fig. 2 N:0,9).

a) Art. lingualis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 6) hufvudsakligen bestämd för tungan, utgör fortsättningen af carotis externa, och förlöper, utgående ifrån främre sidan af sinus caroticus, framåt snedt öfver m. stylohyoideus, under m. omohyoideus och geniohyoideus samt emellan den sistnämnde och öfversta eller främsta delen af m. sternohyoideus, vidare under den främre böjningen af cornu minus ossis hyoidei. Här böjer sig ifrågavarande arter inåt, endast betäckt af den yttre huden och m. mylohyoideus, convergerande med samma arter från andra sidan till främre ändan af m. hyoglossus, der densamma, emellan nämnde muskel och m. genioglossus, med 2 slutgrenar insänker sig i tungan.

Under detta förlopp afgifver a. lingualis:

- α) R. R. musculares, fina grenar, hvilka ifrån yttre och inre sidan öfvergå uti tungbenets närbelägna muskler: mylohyoideus, sternohyoideus, genioglossus, hyoglossus, constrictor pharyngis.
- β) R. R. linguales, (Pl. V. Fig. 2 N:o 7) tvänne nästan lika starka grenar, hvilka, utgörande slutgrenar af tung-arteren, med ett ganska slingrande förlopp förlöpa långs undre ytan af tungan framåt, mot den vid nedre käkbenet fästade delen deraf. Under detta förlopp dela de sig i flera finare grenar, hvilka, inträngande emellan tungans egna transversella och de med desamma solfjäderformigt sammanväfda fibrerna af m. hyo-

ghosas, ingli fireninger med Art. mazillaris externa, genem den fela decomma under m. transverealis menti, emellan flotet für m. geni glassis och genishverdess, kommande art. sulmentalis (Pl. V. Fig. 2 No 8).

- b) Art. pharyngea, (Pl. V. Fig. 2 N:o 10) en i förhållande till de 2 föregænde, ganska fin gren, utgir från bakre silan at sinus carasicus och förlöper snedt öfver m. styristisniskus upplit längs den främre ytan af pharyna, i hvilken den sedermera utgrenar sig *)
- B) Art. pulmono-cercicalis (PL V. Fig. 2 N:0 11) utgår från undre sidan af arcus aortæ, å det ställe der carotis externa utgår från den öfre, är något starkare än carotis och förlöper, tått långs med sjelfva stammen bakåt, hvarester den snært delar sig i 2:ne grenar: a. pulmonalis och occipito-dorsalis scapulæ.
- a) Art. pulmonalis (Pl. V. Fig. 2 N:0 12) förlöper nedåt och bakkt emot lungroten, hvarest den delar sig i 2:ne grenar: r. superficialis och profundus.
- c) R. superficialis, mindre än den djupa gren, förlöper med ett slingrande förlopp bakåt långs yttre ytan af lungsäcken, i hvilken den vidare utgrenar sig, samt synes åfven skicka grenar in uti lungans substans, hvarest desamma communicera med grenar ifrån r. profundus.

Denne gren selves ofte, sirdeles di 2 an. palatina ascendentes utgi ilein Art. larjugen.

- β) R. profundus, (Pl. V. Fig. 2. N:o 12) starkare än den föregående, förlöper äfven bakåt och intränger vid lungroten i sjelfva lungsäcken, hvarest densamma, starkt slingrande, förlöper under de hudartade celler, hvilka likasom ett gallerverk, med rhomboidala och polyedriska mellanrum, öfverdraga den inre ytan af lungsäcken, ända till spetsen af densamma. Under detta förlopp afgå ifrån hvardera sidan af densamma grenar, hvilka med ett likaledes starkt slingrande förlopp tränga in emellan lungsäckens celler, hvilka af desamma omgifvas med en kärlkrans.
- b) Art. occipito-dorsalis scapulæ, (Pl. V. Fig. 2 N:o 13) ungefär lika stark som den föregående, förlöper uppåt, bakåt och utåt snedt öfver yttre sidan af m. stylohyoideus och tränger, emellan m. sternocleido-mastoideus och levator f. attractor scapulæ, fram till främre randen af skulderbladet, hvarest densamma delar sig i 2:ne grenar: a. cutanea dorsalis scapulæ och maxillaris interna, af hvilka den förra är starkare, och att anses såsom fortsättning af stammen.
- α) a. cutanea dorsalis scapulæ (Pl. V. Fig. 3 N:0 2) viker från a. maxillaris interna uppåt och bakåt, och förlöper, parallelt med ryggraden, tätt under huden, till bakre ytan af låret, hvarest den skickar sina sista grenar, hvilka anastomosera med grenar ifrån a. cutanea femoris posterior.

Under detta förlopp afgå från densamma följande grenar:
α') a. cutanea occipitalis utgår från stammen, genast efter det den skiljt sig från a. maxillaris interna, emellan öfre

randen af det öfre skulderbladet och främre randen af m. levator anguli scapulæ och förlöper uppåt öfver pars mastoidea.
Här delar den sig i 2 grenar, af hvilka den ena utgrenar sig i
luden i nacken, den andra deremot i huden mellan ögat och
örat.

- a") R. R. cutanei, slera grenar, hvilka, utgående såvål från yttre som inre sidan af stammen, under dess förlopp åt låret, utgrena sig i den nårbelägna huden samt dess slemkörtlar.
- ân den föregående, men dock i förhållande till sin långd genska stark, förlöper framåt och uppåt, under den bakre ändan af pars mastoidea ossis temporum, långs inre ytan af m. digastricus maxillæ inferioris, till m. temporalis, hvarest densamma kommer fram till ansigtet, och förlöper vidare tått under främre randen af det cartilaginösa öronbrosket samt öfvergår, hår ännu temmeligen stark, i a. maxillaris externa. Under detta förlopp afgifver densamma följande grenar:
- β) R. R. musculares 2 till 3 fina grenar, hvilka förlöpa framåt och utåt för att utgrena sig i m. sternocleido-mastoideus och levator f attractor scapulæ.
- β') a. tympanica, en fin gren, hvilken utgår från stammen, der den förlöper på inre sidan af m. digastricus maxillæ enferri , nin. intill hörsel sinken, och förlöger ink det inre örat, i hvars membranösa del den vidare utgrenar sig.

- β") R. R. auriculares anteriores, ytterst fina grenar, hvilka utgå från stammen, der den förlöper under främre randen af det cartilagineusa örat, i hvilket desamma utgrena sig, men synas åfven intränga i det inre af örat.
- \$\beta^{\mu}\$) R. mylohyoideus, hvilken utgår från stammen, der den framtränger långs inre sidan af m. digastricus, förlöper nedåt på inre sidan af nedre käkens ledförening, till hvilken äfvensom till den här belägna yttre huden densamma, förr än den utgrenar sig i den bakre randen af m. mylohyoideus, afskickar grenar.
- C) Art. laryngea (Pl. V. Fig. 2 N:o 14) utgår från bakre sidan af arcus aortæ, och förlöper på inre sidan af m. stylohvoideus, framåt och inåt under tungbensfästet af berörde muskel, till larynx, hvarest den delar sig i flere mindre grenar, hvilka utgrena sig i larynx, dels i dess slemhinna dels i dess muskler.

Under detta förlopp afgifver densamma följande grenar:

- a) A. palatina adscendens, en stundom 2 fina grenar, hvilka utgå från stammen, kort förr än den tränger under tungbenet och m. stylohyoideus, och förlöper under nyssnämnde muskel uppåt till bakre delen af svalget, i hvars slemhinna de vidare utgrena sig.
- b) R. hyoglossus, en ganska fin gren, hvilken, utgående från inre sidan af stammen, förlöper inåt under cornu minus af

tungbenet och utgrenar sig i den här belägna delen af m. hyoglossus.

D) Art. occipitalis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 15) en ganska stark gren, hvilken ut ar fran areus aorta, der densamma pa sidan af we phagus, emellan 1:sta och andra vertebern, höjer sig for att öfverga i aarta thoracica. Haritrin förlöper densamma upplit lings sill in at oesophagus och 1:sta vertebern titt på inre sidan om m. attractor scapula, hvarest den böjer sig bakåt och tränger emellan 1:sta och 2: fra vertebern tätt intill deras corpus, på inre sidan af m. intertransversalis och rectus capitis posticus muj r till maken, hvarest den förlöper uppåt under m. splenius capitis och exculturis, hviller af densamma förses med grenar, hvarester den, vid inre sidan af den sistnämnde muskeln, framity inger till sidan af os excipitis och parieto-frontale. Hirilian torloper den framit i en suleus af sistnimmde ben, betäckt endist at den vitre huden, till bokre vinkeln at ögonhalan, hvarest densamma delar sig i 2:ne grenar: a. temporalis och frontalis, hvilka hvardera åter dichotomiskt utgrena sig.

Under dette follopp afgeiten densamme foljanle grenar:

- a) R. R. ad mm. levatores scapulæ, utgå från stammen, der den sinker sig emellan 1:sta och 2:sha vertebern, och torlopa utåt emellan m. attractor scapulæ och levator anguli scapulæ, i hvilka begge muskler desamma vidare utgrena sig.
- b) A. cervicalis, (Pl. V. Fig. 3 N:0 4) en ganska stark gren, hvilken utgar tran stammen der den är heligen under m.

splenius capitis och rectus capitis posticus major, hvilka muskler äfven af densamma förses med grenar, viker genast under en nästan rät vinkel bakåt och nedåt, förlöpande tätt framom spetsen af 2:a, 3:e och 4:e vertebernes processus transversi*) betäckt af de djupare ryggmusklerna, ända till os sacrum.

Under detta förlopp afgifver den:

- α) R. R. musculares, fina grenar, hvilka, under hela dess förlopp, utgå mest från yttre sidan och utgrena sig i m. splenius capitis, rectus capitis och ryggmusklerne.
- β) R. R. spinales, fina grenar, hvilka under stammens förlopp utgå från inre sidan af densamma och tränga genom foramina intervertebralia till ryggmärgshålan, å hvars inre yta äfvensom den bakre sidan af ryggmärgen de vidare utgrena sig.
- 7) R. R. lumbales, ganska fina grenar, hvilka genomborra mm. intertransversales och emellan nyggkotomes processus transversi tränga in i bukcaviteten, hvarest de omfatta spinalmerverne och utgrena sig i de här belägna musklerna samt skicka fina grenar, hvilka, dels tränga in i ryggmärgscanalen genom foramina intervertebralia, dels åtfölja spinalnerverna framat. Den första af dessa tränger mellan 3:dje och 4:de verteberns processus transvers, den sista på sidan af basis ossis coccygis. Den 3:dje och de följande anastomosera med aa. renales.

^{*)} För att se arteren måste dessa bortskaffas, då man verkställer præpararation från ryggsidan.

- c) A. meningea postica, utgår från stammen under m. rectus capitis posticus major och förlöper inåt till membrana obturatori i pesterior atlantis, hvilken den genemborrar för att tränga in i cerebralcaviteten. Här förenas den med samma arter från andra sidm och bilder ett kirdnit, hvariträn grenen utga till inre ytan af cranium.
- d) A. temporalis, (Pl. 5. Fig. 3 N:0 5) förlöper framåt emellan bakre sidan af bulbus oculi och m. temporalis, vidare emellan nämnde muskel och m. pterygoideus internus, hvarest den delar sig i 2:ne grenar: a. maxillaris externa och infra-orbitalis.
- a) A. maxillaris externa, (Pl. V. Fig. 3 N:0 6) starkare än a. infraorbitalis, förlöper, betäckt af m. temporalis, långs undre sidan af öronbrosket, hvarest den emottager a. maxillaris interna, snedt öfver m. pterygoideus internus till bakre randen af m. temporalis. Härifrån förlöper densamma under arcus zygomaticus till främre randen af m. masseter, hvarifrån den vidare, endast betäckt af den yttre huden, fortsätter sitt lopp såsom a. submentalis (Fig. 2 N:0 8) långs nedre käken vid ursprunget för m. mylohyoideus till m. transversalis, under hvilken den sänker sig emellan m. genio- och hyoglossus till tungan, hvarest den förenas med slutgrenarna af a. lingualis.

Under detta förlopp afgisver a. submentalis:

lpha) R . cutanci, hvilka utgrena sig i den närbelägna luden.

- a") R. mylohyoideus, hvilken utgår från inre sidan af stammen under en nästan rät vinkel och utgrenar sig i m. mylohyoideus.
- Art. infraorbitalis (Pl. V. Fig. 3 N:o 7) skiljer sig under en rät vinkel från a. maxillaris externa och förlöper, vid sitt ursprung betäckt af m. temporalis, sedermera endast betäckt af den yttre huden, långs undre sidan af bulbus oculi framåt till ansigtet der den vidare utgrenar sig i den närbelägna huden och nedre ögonlocket, (rr. palpebrales inferiores) samt förenas vid den inre ögonvinkeln med en gren af a. frontalis.

Under detta förlopp afgifver densamma

- β) A. alveolaris superior, som utgår från stammen, vid
 främre randen af m. temporalis, och förlöper framåt till öfre maxillen, uti hvilken den intränger genom ett fint hål, för att derstädes vidare utgrena sig.
- e) A. frontalis, (Pl. V. Fig. 3 N:0 S) lika stark som a. temporalis, förlöper i samma riktning som stammen, förr än densamma delat sig i a. temporalis och frontalis, långs yttre randen af os parieto-frontale, till inre ögonvinkeln der densamma delar sig i 2 grenar: a. ethmoidea och r. communicans cum a. infraorbitali, af hvilka den sednare, såsom ofvanför blifvit anfördt, vid inre ögonvinkeln förenas med fortsättningen af a. infraorbitalis.

Under detta förlopp afgå ifrån densamma följande grenar:

- a) AA. palpebrales superiores, (Pl. 5. Fig. 3. No 9) fina grenar, hvilka, 2—4 till antalet, utgå från yttre sidan af stammen och utgrena sig i öfre ögonhocket.
- β) AA. meningeæ anteriores, 2 fina grenar, hvilka utgå ifrån stammen kort efter det densamma skiljt sig från a. temporalis och intrånga, genom fina hål i bakre väggen af orbita, i fråmre delen af hjerneaviteten, å hvars inre yta de vidare grena sig.
- 7) A. ethmoidea, (Pl. V. Fig. 3 N:o 10) en i förhållande ganska stark gren, utgörande fortsättningen af stammen, böjer sig inåt och tränger genom ett hål i os ethmoideum. Härifrån förlöper den vidare inåt under os nasale i näscaviteten, hvarest den förlöper, emellan slemhinnan och näsans skiljovägg, till yttre ändan af os intermaxillare superius, hvarest den tränger fram under yttre huden, i hvilken den vidare utgrenar sig, och anastomoserar med grenar från a. submentalis.

Under detta förlopp afgå från a. ethmoidea följande grenar:

- a') A. palpebralis interna, den största af alla de grenar, hvilka gå till ögonlocken, utgår från stammen, kort förr än den tränger genom os ethmoideum, och förlöper under yttre delen af os nusale, långs inre ögonvinkeln framåt, för att utgrena sig i den hår belägna delen af ögonlocken.
- a") AA. nasales internæ, 2-3 fina grenar hvilka, utgående från yttre sidan af stammen, der den förlöper bakom näsans

labyrinth, förlöpa framåt för att utgrena sig i slemhinnan å näsans labyrinth.

- d) R. communicans cum a. infraorbitali, en ganska fin gren, hvilken viker från den föregående utåt långs inre randen af orbita, hvarest densamma snart förenas med fortsättningen af a. infraorbitalis.
- E) Art. subclavia, (Pl. V. Fig. 2 N:o 16) lika stark som A. occipitalis, tätt bakom hvilken densamma utgar från det ställe af arcus aortæ der densamma öfvergår i aorta thoracica, gör i sitt ursprung en liten böjning inåt och förlöper sedermera utåt bakom æsophagus, långs inre ytan af 3:dje verteberns processus transversus och m. serratus anticus major, samt på inre sidan af plexus brachialis. Härifrån fortsättes densamma, utan att förut hafva afgifvit några grenar, såsom A. axillaris*), och förlöper utåt, snedt öfver plexus brachialis, till ursprunget för caput longum af m. triceps, hvarest densamma delar sig i 2:ne grenar: a. brachialis och profunda brachii. Grenar hvilka utga ifrån a. axillaris**) äro:
- a) A. thoracica externa prima, (Pl. V. Fig. 2 N:o 57) en i förhållande till stammen ganska stark gren, utgår ifrån inre

^{*)} Gränsen emellan a. subclavia och axillaris hos paddan är icke särdeles marquerad, då desamma likväl i Anatomien skiljas, har jag äfven velat följa samma åsigt och, såsom skett, bestämma plexus brachialis såsom gränsen emellan desamma.

^{**)} Jag har icke kunnat finna några grenar, som skulle utgå ilrån a. subclavia.

och delar sig snart i 3:ne grenar:

- a) R. superior s. a. thoracica externa 1:ma (Pl. V. V., L. N., 17) had a larger of the desamma, der den är belägen under m. larger hallen, jande den andledligne larger i m. part som major, af densamma förses med grenar.
- 3) R. inferior s. a. thoracica externa 2:da (Pl. V. Fig. 2 N:o 18) är ganska läng och förlöper nedåt längs inre ytan af de här belägna bukmusklerna hvilka, jemte m. pectoralis minor, of densamma förses med grenar. Dessutom afgår ifrån densamma en ganska lång gren, R. acromialis,) hvilken viker uppöt och, förlöpande på inre sidan af m. subscapularis och nedra skulderbladet, utgrenar sig i m. deltoideus.
- 7) R. ad m. sternocleido-mastoideum, den minsta af de 3 granne. Religier upper och mit tir me unrem sig i sernaländen af m. eternocleido-mastoideus.
- b) A. thoracica externa 3:a, mindre an den föregående, türlöger från mere silm af som men. For in den tränger under der leige hulveder af m. træepe, haldt och delte sig som ti 3:ne grenar, hvilka utgrena sig i m. serratus anticus major, caput, longum m. tricipitis och m. latissimus dorsi, af hvilka den som utgrena sig i den simuliente. Utliger vidne beldt enrellan m. serratus anticus major och latissimus dorsi för att utgrena sig

^{*;} Utgir ofta frin stammen.

i huden på sidan af ryggen, der den står i communication med rr. cutanei ifrån a. cervico-dorsalis scapulæ.

- c) A. subscapularis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 19) en ganska stark gren, hvilken utgår från yttre sidan af stammen, der den är belägen emellan m. subscapularis och anconeus longus, gifver genast en kort gren till den förstnämnde muskeln, som stundom förhåller sig såsom a. circumflexa humeri anterior, och förlöper sedan, långs bakre randen af densamma, till axillen, hvarest den skickar flere grenar till den här belägna huden. Härifrån böjer den sig uppåt och inåt snedt öfver m. subscapularis, hvilken den, jemte portio sternalis m. pectoralis majoris, ytterligare förser med grenar och fortsättes sedermera nedåt, långs inre ytan af portio abdominalis m. pectoralis majoris, i hvilken den vidare utgrenar sig.
- d) A. circumflexa humeri posterior, starkare än art. circumflexa hum. anterior, utgår från yttre sidan af stammen kort förr än den delar sig i a. brachialis och profunda, *) och förlöper, under den afsmalnade främre ändan af m. suprascapularis och deltoideus, omkring os humeri under caput, hvarest den anastomoserar med grenar ifrån a. circumflexa humeri anterior, samt skickar grenar till benet och ledcapseln. Dessutom afgå ifrån densamma:

^{*)} Denna är olta en gren af a. subscapularis.

- c) R. suprascapularis, en i förhållande till stammen stark gren, förlöper bakåt och delar sig snart i 2:ne grenar, af hvilka den ena utgrenar sig i muskeln, den andra intrånger i ca-
- 3) R. deltoideus utgår från stammen, der densamma böjer sig framåt emellan os humeri och m. deltoideus, och förlöper framåt för att utgrena sig i medlersta delen af m. deltoideus,
 hvarest den anastomoserar med grenar ifrån r. inferior af a. thoraena 2:da.
- e) R. anconæus utgår dels från a. subscapularis dels från sjelfva stammen nära intill der den nyssnämnde gren utgår, förlöper utåt och utgrenar sig i caput longum af m. triceps, samt skickar en gren till den här belägna huden.
- f) A. brachialis (Pl. V. Fig. 2 N:0 20) skiljer sig från a. profunda brachii under en spetsig vinkel och förlöper under anconæns longus, emellan denna och m. supscapularis, snedt utot emellan caput internum af triceps och m. coracolrachialis, på inre sidan af den tvåhöfdade muskelns sena till amnvecket, hvarest densamma sänker sig emellan sistnämnde sena och det längre hufvudet af m. flexor carpi radialis. Härifrån böjer den sig, motsvarande a. radialis, något inåt radialsidan af underarmen snedt under m. pronator teres secundarius och pronator teres, af hvilken sednare den betäckt vidare fortsätter sitt lopp till radialsidan af handen. Här kommer den fram emellan nedre ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedre ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedre ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedre ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedre ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedere ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedere ändan af flexor carpi radialis och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere in teres secundarius och flexor digitorum compedere i

munis och delar sig i r. dorsalis och volaris af hvilka den förra, såsom fortsättningen af stammen, är vida starkare än den
sednare.

Under detta förlopp afgå från densamma följande grenar:

- a) A. circumflexa humeri anterior utgår ifrån inre sidan af stammen, der den är belägen under caput longum af m. triceps, och förlöper framåt och utåt under m. subscapularis, långs inre ytan af os humeri nära intill caput, hvarest den communicerar med grenar ifrån a. circumflexa humeri posterior, och skickar grenar så väl till ledcapseln som till m. subscapularis.
- β) A. nutritia magna humeri utgår från främre sidan af stammen och förlöper, långs undre randen af m. subscapularis, framåt fästet för m. coraco-brachialis, hvilken af densamma förses med en gren, samt fortgår sedermera nedåt långs främre ytan af os humeri, uti hvilket den sedermera tränger genom ett fint hål.
- γ) A. cutanea humeri interna, ganska stark, utgår från inre sidan af stammen kort förr än densamma sänker sig i armvecket, förlöper inåt till huden, hvarest den vidare utgrenar sig på inre sidan af nedra hålften af öfverarmen och underarmen samt handen.

Grenar hvilka utgå från a. radialis äro:

a) A. recurrens radialis*) utgår från inre sidan af stam-

^{*)} Motsvarar icke strängt taget a. recurrens hos menniskan, einedan denna hos paddan icke anastomoserar med a. collateralis, men dess recurrenta förlopp och läge samt frånvaron af aa. collaterales hos paddan torde vara skal för den använda benämningen.

men der densamma ir beligen under ölse inden af m. provator teres och delar sig genast i 2:ne grenar:

- der armledgungen, hvarest densamma utgrenar sig i den nämnde muskeln och äfven synes skicka fina grenar till ledeapseln.
- c') R. anconœus, en sin gren, hvilken sörlöper i motsatt riktning emot den söregsende, nedst och utgrenar sig i ösre delen af m, anconœus quartus.
- B) R. R. musculares are sina grenar, hvilka utgå från både yttre och inre sidan af stammen under dess sörlopp på framarmen och utgrena sig i slexor carpi radialis och ulvaris, pronator teres, pronator teres secundarius, anconœus quartus och slexor digitorum communis.
- 7) R. volaris utgår från inre sidan af stammen, snedt inåt och framåt, emellan m. flexor digitorum sublimis och flexor carpi radialis, till radialsidan af carpus, hvarest den delar sig i 2:ne grenar: r. volaris och r. dorsalis radialis digiti secundi.
- y") R. dorsalis, (Pl. V. Fig. 2 N:037) såsom fortsättningen af stammen vida starkare ån den föregående, förlöper långs radialsidan af metacarpus, emellan den rudimentära tummen

^{*)} Emedan paddan egentligen icke har mer än 4 utbildade Sagrar och en rudimentair tum, har jag dock räknat tummen såsom första fingret.

och andra fingret, gifver en fin gren till tummen och fortsätter vidare sitt förlopp långs radialsidan af 2:dra fingret, hvarest den vid nagelleden förenas i en båge med a. dorsalis ulnaris digiti II:di.

δ) R. dorsalis (Pl. V. Fig. 2 N:o 38) ar, sasom fortsättningen af stammen, betydligt starkare än den föregående, ifrån hvilken den under en spetsig vinkel böjer sig något utåt under flexor digitorum sublimis, tranger in i ledcapseln, emellan ulnarandan af os antibrachii och den första serien af ossa carpi, till ryggen af handen under m. extensor digitorum brevis, hvarest den förstärkes genom den inre gren af a. profunda brachii. Härifrân böjer den sig sedermera inat, förlöpande med en at fingrarne convex bage, (arcus carpcus dorsalis) snedt öfver basis af 2:dra, 3:dje och 4:de fingrets os metacarpi, under m. extensor brevis digitorum, till interstitium emellan 2:dra och 3:dje fingret under namn af a. interossea Il:da, (Pl. V. Fig. 2 N:o 40) och delar sig snart i 2:ne grenar: a. dorsalis ulnaris digiti II:i och a. dorsalis radialis digiti III:i. Ifrån arcus carpeus dorsalis utgå de öfriga 2:ne ac. interosseæ dorsales, om hvilka nedanföre.

Ifrån r dorsalis a. radialis utgå följande grenar:

8') R. carpeus profundus, en ganska fin gren, hvilken utgår från stammen vid främre ändan af os antibrachii och utgrenar sig i ledcapseln emellan carpi ben.

- d') A. interossea dorsalis III:a (Pl. V. Fig. 2 N:o 41) utgår från början af arcus carpeus dorsalis, förlöper emellan 4:de och 5:te fingrets ossa metacarpi hvarest den delar sig i a. dorsalis radialis digiti IV:i och a. dorsalis uluaris digiti IV:i, hvilka vid nagelleden förenas, den förra med a. dorsalis uluaris digiti V:i den sednare med a. dorsalis radialis digiti IV:i.
- o") A. interossea dorsalis II:a utgår äfven från arcus dorsalis och förlöper emellan 3:dje och 4:de fingrets os meta-carpi samt delar sig, såsom den föregående, gaffelformigt i a. dorsalis radialis digiti II:i och a. dorsalis ulnaris digiti III:i.
- o") A. interossea dorsalis I:a utgör, sasom ofvanför blifvit anfördt, fortsättningen af stammen och delar sig i a. dorsalis ulnaris digiti II:i och a. dorsalis radialis digiti III:i hvilka, på ofvan anfördt sätt, förenas den förra med a. dorsalis radialis digiti II:di, den sednare med a. dorsalis ulnaris digiti III:i.

I allmänhet må anmärkas om digitalartererne, att de å hvarje finger på radial- och ulnarsidan förlöpande artererne, genom tvärgrenar, hvilka förlöpa emellan undre ytan af phalangen och senan af dess flexor, stå med hvarandra i communication, samt att desamma dessutom afgifva grenar, dels till simhuden emellan tårna och den öfriga yttre huden, dels grenar hvilka utgrena sig djupare i mm. interossei externi och interni.

g) A. profunda brachii (Pl. V. Fig. 2 N:0 39) utgâr frân yttre sidan af a. axillaris, der densamma är belägen under caput longum af m. triceps, och förlöper, emellan caput exter-

num och longum af nämnde muskel, snedt utåt till ulnarsidan af öfverarmen. Här fortsätter den sitt förlopp emellan anconæus externus och supinator longus, hvilka af densamma förses med grenar, till yttre sidan af armbägsleden, skickar här grenar till m. extensor digitorum longus och abductor s. extensor indicis longus, sänker sig (motsvarande a. ulnaris hos menniskan) under m. extensor longus digitorum och extensor carpi radialis och böjer sig sedermera emellan den sednare m. och anconæus quartus framåt långs ulnarsidan af underarmen. Vidare fortsätter den sitt lopp, emellan m. extensor carpi ulnaris och extensor digitorum longus, snedt inåt dorsalsidan af carpus, emellan sistnämnde muskel och extensor indicis longus, hvarest den delar sig i r. volaris och dorsalis. Under detta förlopp afgå ifrån ifrågavarande arter följande grenar:

- a) A. nutritia ossis humeri, en temmeligen stark gren, hvilken utgår från yttre sidan af stammen vid nedre ändan af os humeri under m. anconæus externus, loch förlöper utåt långs yttre ytan af os humeri, i hvilket den intränger genom ett hål litet ofvanom condylus externus ossis humeri.
- β) R. R. musculares, hvilka vid yttre sidan af armbågsleden utgå från stammen och utgrena sig i m. extensor longus digitorum och extensor indicis longus.

Dessutom afgifver den, under sitt ofvan beskrifne förlopp å underarmen, grenar till de sträckmuskler, emellan hvilka den förlöper.

- 7) R. volaris, en ganska fin gren, hvilken vid carpus böjer sig utåt under extensor digitorum longus och fortsättes, långs ulnarsidan af 5:te fingret, såsom a. dorsalis ulnaris digiti V:ti, för att förenas med a. dorsalis radialis digiti V:ti, som otvandere lähvit beskrifven sås m en gren af den 3:1:e a. interpossea.
- d) R. dorsalis är, såsom fortsättningen af stammen, starkare än r. volaris och förlöper snedt inät tvärs öfver basis af 5tte och 4:de fingrets ossa metacarpi under m. extensor digitorum longus, för att, efter ett ganska kort förlopp, hel och hållen öfvergå i r. dorsalis af a. radialis och sålunda deltaga i bildningen af arcus carpeus dorsalis. Kort förr än den sålunda öfvergår i arcus carpeus dorsalis, skickar den en fin r. carpeus till carpus, hvarest den deltager i bildningen af rete carpeum dorsalc.

Med alseende å förloppet af de grenar hvilka ofvanföre hafva blitvit hedritue is in utgjende him anna ander. Haldfer det sig aldeles lika på hvardera sidan. Sedan arcus aortæ å hvardera sidan afgifvit ofvan beskrifne a. sublavia, böjer den sig på sidan af corpus ossis hyoidei och vid början af oesophagus nedåt samt förlöper, såsom aorta descendens thoracica, till trakten af 5:te vertebern, der densamma från hvardera sidan, under en nælit gunda spulig vinkel. Hvergåt i en som som numera for namn af artin descendens all vinalis, hvilken, emedan a metenterios-collissa, som är starkere, genust i förenings-

vinkeln ifrån densamma afgår till bukcavitetens organer, numera betydligen förminskad till volume, förlöper, långs corpora vertebrarum, emellan båda njurarne till nedre hälften af os coccygis, der densamma slutligen delar sig i de båda arteriæ iliacæ communes.

Aorta abdominalis är sålunda i förhållande till de öfriga artererne af ganska underordnad volume, om man jemför densamma med förhållandet hos menniskan och däggdjuren.

II. Aorta descendens thoracica (Pl. V. Fig. 1 N:o 7) förekommer, såsom ofvan blifvit anfördt, en på hvardera sidan, hvilka afgifva lika beskaffade grenar.

Grenar hvilka utgå från aorta thoracica:

A) A. æsophogea, (Pl. V. Fig. 1 N:o 8) vanligen en på hvardera sidan, utgår från aorta thoracica, på högra sidan kort efter det arten fått namn af aorta thoracica, å vänstra sidan kort förr än begge aortæ thoracicæ förenas*), i hvilket fall den förra förlöper nedåt, den sednare uppåt långs bakre väggen af æsophagus, i hvilken desamma vidare utgrena sig och anastomosera med hvarandra.

III. Aorta descendens abdominalis (Pl. V. Fig. 1. N:o 9) delar sig genast då densamma bildas, genom föreningen af hvardera aorta thoracica, såsom ofvanför blifvit anfördt, i 2:ne

^{*)} AA. œsophageæ variera i afseende å sitt ursprung hos olika individer; stundom uppkomma båda på ena sidan.

hufvu lgrener. arteria m verteria et ha eta el de cinalis, sălunda likvăl, att, dâ det blod som flyter genom den vănstra aorta thoracica hufvudsakligen torde öfvergă i a. mesenterico-cœliaca, deremot blodet ifrăn den högra öfvergăr i aorta abdominalis, emedan bâda aortæ thoracicæ sammansmâlta med hvarandra sălunda att den vănstra lägger sig likasom tvărs öfver den högra, och blott den vägg af hvardera arteren, som sālunda kommer i beröring med den andra, försvinner.

- 1) A. mesenterico-caliaca, (Pl. V. Fig. 1 N:0 10 Fig. 2 N:0 22) något starkare än den bakre gren eller aorta abdominalis s. str., förlöper, emellan de båda bladen af ligamentum gastro-hepaticum, på högra sidan af æsophagus till cardia, hvarest den delar sig i 2:ne nästan lika starka grenar: a. cæliaca och menenterica, men algitver dessforman has homen a. ovaria superior , en fin gren, hvilken utgår från bakre sidan af a. mesenterica-, edunca, men förlöper nedlat met vänster till blire leden af ovarium å samma sida.
- A) A. caliaca (Pl. V. Fig. 2 N:0 23) är en ganska kort stam, bildande åt höger en liten båge hvilken genast delar sig i trenne grenar: a. coronaria ventriculi dextra anterior och posterior samt æsophagea inferior.
 - a) A. coronaria centriculi dextra anterior 00) (Pl. V.

^{*)} Utgår kanske lika ofta från aorta abdominalis.

^{**)} Motsvarar să val a, coronaria ventriculi som gastrospiplaica dextra och h-patica hos menniskan.

Fig. 2 N:o 24) förlöper från höger åt vänster, emellan de båda bladen af mesenterium, och delar sig, då den uppnår den främre randen af ventrikelns curvatura minor, i r. ascendens och descendens, hvilka bägge förlöpa långs berörde curvatur, den förra uppåt mot cardia, hvarest den anastomoserar med aa. æsophageæ, den sednare deremot nedåt emot pylorus, der den i en båge förenas med r. ascendens af a. jejunalis. Bägge afgifva grenar hvilka förlöpa långs främre ytan af ventrikeln och intränga till dess tunica propria.

Under detta förlopp afgifver ifrågavarande a. coronaria:

- a) A. hepatica, (Pl. V. Fig. 2 N:0 25) förlöper, med en åt vänster convex båge, framåt och uppåt längs capsula Glissonii, står, genom en r. communicans, i förening med a. jejunalis och delar sig, då den uppnått lefvern, i 2:ne grenar en r. sinister och en dexter, hvilka utgrena sig hvar i sin lob af lefvern. Förr än a. hepatica delat sig i sina 2:ne till lefvern trängande grenar, afgifver densamma
- α') A. cystica, hvilken förlöper i samma riktning som stammen och sedermera utgrenar sig så väl å öfre som undre ytan af gallblåsan.
- b) A. coronaria ventriculi dextra posterior, kortare än den föregående, förlöper äfven åt vänster, men mera bakåt till den bakre randen af ventrikelns curvatura minor. Då den uppnår ventrikeln, delar den sig i 2 grenar, hvilka förlöpa långs bakre väggen af ventrikeln emot pylorus, hvarest desamma ana-

stomosera med den bakre gren af a. j janalis. Under detta förlopp longs curvatura minor, skickar densamma grenar, som forlopa a bakre ytan af ventrikeln och intränga till densammas tunica propria, å hvilken de vid curvatura major anastomosera
med grenar ifrån a. coronaria ventriculi dextra anterior.

- c) A. æsophægea inferior, utgår kort efter det a. cæliaca skiljt sig fran a. mesenterica, och forloper uppat langs högra sidan af cardia till æsophægus, der den anastomoserar med grenar ifrån aa. æsophægeæ superiores..
- B) A. mesenterica *) (Pl. V. Fig. 2 N:0 26) förlöper emellan de båda bladen af mesenterium nedåt intestina, och delar sig snart i en öfre och en undre gren eller a. jejunalis och colica communis, af hvilka den förra skickar grenar till duodenum och jejunum, den sednare deremot till intestina ileum och tjocktarmen. Följande grenar utgå från a. mesenterica:
- a) A. jejunalis (Pl. V. Fig. 2 N:o 27) förlöper, såsom de öfriga intestinal artererna, emellan bladen af mesenterium till jejunum och delar sig nära tarmen i 2:ne grenar, en r. adscendens och r. descendens.
- a) R. adscendens, starkare än r. descendens, förlöper utåt, längs den vid mesenterium fästade randen af den öfversta delen af tunntarmarne, duodenum och vänstra hälften af ventrikelns curvatura minor, hvarest den ingår förening med a. co-

[&]quot;) Motsvarar så väl a, mesenterica superior som inferior hos menniskan,

ronaria ventriculi dextra anterior och posterior, så att genom denna en ganska stark arteriell båge bildas. Under detta förlopp skickar den grenar till främre och bakre väggen af den öfversta delen af tunntarmarne och nedre hälften af ventrikeln, motsvarande sålunda äfven a. coronaria ventriculi sinistra hos menniskan.

- β) R. descendens, något mindre än den föregående, förlöper nedåt på samma sätt som den långs jejunum, och förenas till en arteriell båge med r. adscendens af a. ilea I:ma, ifrån hvilken båge grenar öfvergå till den hithörande delen af tunntarmen, för att utgrena sig så väl på främre som bakre väggen af tarmen.
- b) A. colica communis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 28) star-kare än den öfre gren, med hvilken den för öfrigt har lika förlopp genom mesenterium till tjocktarmen, delar den sig i 5 grenar, af hvilka 3 utgöra likasom ett knippe och alla utgrena sig i den del af tunntarmen, som icke af den föregående erhållit några grenar, och 2 utgöra ett annat knippe, som skickar grenar till tjocktarmen. Af dessa skulle jag anse de 3 motsvara aa. ileæ, den 4:de colica media och den 5:te a. mesenterica inferior s. hæmorrhoidalis interna.
- a) AA. ileæ äro trenne till antalet och utgå alla från nästan samma ställe af stammen, förlöpande emellan de båda bladen af mesenterium, och dela sig i 2 grenar, hvarefter hvardera af dessa nära tarmen åter dela sig i 2 grenar hvilka ytterligare,

genom e mmunication med dylika grenar ikeln den feljande. Freenas till en boge, itran hvilken sedermera grenar utgå så vid till främre som bakre ytan af tarmen.

- a') A. ilea I:a (Pl. V. Fig. 2 N:o 42) delar sig i en r. ascendens och descendens, af hvilka den förra förenas med r. descendens af a. jejunalis, den sednare med r. ascendens af a. ilea II.a.
- a") A. ilea II:da (Pl. V. Fig. 2 N:o 43) afgifver a ileocolica, och delar sig sedermera i r. ascendens, som förenas med r. descendens af den föregående, och r. descendens som förenas med r. descendens af den följande.
- a") A. ilea III:a (Pl. V. Fig. 2 N:o 44) delar sig afvenledes i r. ascendens, hvilken förenas med r. descendens af föregående, och r. descendens, som förenas med r. adcendens af a. ileo-colica.
- a") A. ileo-colica (Pl. V. Fig. 2 N:o 45) utgår från stammen af a. ilea 2:da, förlöper, såsom de ofvan beskrefne mellan bladen at mesenterium, till slutet af tunnammerne och deler sig i r. adscendens, som förenas med r. descendens af a. ilea 3:a, och r. descendens som förlöper till början af colon och här förenas med a. colica media.
- β) A. colica media (Pl. V. Fig. 2 N:0 46) förlöper, mellan de bada bladen af mesocolon, uppåt till den del af colon, som är fästad vid mesocolon, för att förenas med r. descendens af

ileo-colica. Under detta förlopp skickar densamma grenar till främre och bakre ytan af colon.

- 7) A. hæmorrhoidalis interna (Pl. V. Fig. 2 N:o 47) delar sig i en liten r. adscendens, som förenas på ofvan anfördt sätt med a. colica media, och r. descendens hvilken utgör den egentliga stammen och förlöper nedåt långs mesocolon och intestinum rectum ända till sphincter ani. Under detta förlopp skickar den grenar till colon och rectum samt rr. hæmorrhoidales.
- e) A. lienalis en i jemförelse med de föregående fin gren, hvilken utgår från stammen af a. mesenterica och, mellan de båda bladen af mesenterium, förlöper till mjälten, i hvilken den vidare utgrenar sig.
- 2) Aorta abdominalis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 29 Fig. 1 N:o 11) något mindre än a. mesenterico-cæliaca, förlöper såsom ofvanför blifvit anfördt, till os coccygis der den delar sig i de båda aa. iliacæ, och afgifver under detta förlopp följande grenar hvilka utgrena sig egentligen i det uropoëtiska och generationssystemet.
- A) Aa. adiposæ, (Pl. V. Fig. 2 N:o 30) 2:ne från avrta abdominalis utgående arterer, en för högra och en för den vänstra sidan. Den högra utgår från främre sidan af avrta, nära ursprunget för a mesenterico-cæliaca, förlöper åt höger genom den öfra delen af njuren till det ställe der de fingerlikt delta fettloberne sammanhänga med njuren och delar sig här i 2

grenar, af hvilka den ena r. adiposus utgrenar sig i ofvananfiode fettpartie, den andra deremot, hos honan i ovarium.

Den vanstra a. adiposa utgår åfvenledes från fråmre siden af aorta, men lägre ned, förlöpande åt vänster och förhåller sig på samma sätt som den högra, men skickar dessutom en rarenalis till högra njuren.

B) Aa. renales, (Pl. V. Fig. 1 N:o 13) trenne eller 4 till 5 särskildt från främre ytan af aorta, der densamma förlöper emellan bägge njurarne, utgående arterer, hvilka utgrena sig i hvandera njuren. Af dessa kommer en eller 2 såsom en stam från aorta men delar sig sedermera i 2:ne grenar, en för hvardera njuren. då de öfriga enskildt utgå från aorta och utgrena sig i endera njuren.

Ifrån hvar och en af aa. renales utgå dessutom hos

- a) R. R. ovarii (Pl. V. Fig. 2 N:0 31) hvilka emellan Melen af ovarii mesenterium förlöpa frambt och, delade i flere premar, utgrena sig i ovarium å hvardera sidan.
- b) AA. tubæ Fallopii (Pl. V. Fig. 2 N:0 32) hvilka. flere till antalet, inom njursubstansen utgå från aa. renales, förlöpa uppåt till öfra randen af njuren, härifrån emellan de båda isladen af det mesenterium som fästar oviducten, till den vid mesenterium fästade sidan deraf, hvarest de bilda arteriella bågar, ifrån hvilka grenar utgå till det inre af oviducten.

Både hos hanen och honan utgå vidare från aa. renales:

- c) AA. lumbales internæ hvilka förlöpande bakåt, på sidan af corpora vertebrarum, till interstitium emellan processus transversi, här gaffelformigt utgrena sig och anastomosera med de ifrån a. cervicalis kommande aa. lumbales externæ.
- A) A. iliaca communis (Pl. V. Fig. 1 N:o 14) förekommer en på hvardera sidan, hvilka, såsom ofvan blifvit anfordt, utgöra slutgrenarne af aorta abdominalis. Hvardera a. iliaca communis skiljer sig från hvarandra under en spetsig vinkel och förlöper ifrån nedre ändan af os coccygis, åtföljd af n. ischiadicus, snedt långs undre ytan af m. ileo-coccygeus till bakre delen af lårbens hufvudet, der densamma under namn af a. ischiadica under m. glutæus maximus tränger fram till bakre delen af lårret. Här gifver den a. circumflexa femoris externa och fortsätter sitt förlopp emellan m. biceps femoris och semitendinosus till knävecket, hvarest den under namn af a. poplitea förlöper till ursprunget för m. gastrocnemius, och snart delar sig i sina 2 slutgrenar a. tibialis antica och a. tibialis postica. Af dessa är den förra vida starkare och att anses såsom fortsättning af stammen. Grenar hvilka utgå ifrån a. iliaca äro:
- a) Truncus communis a. vesicalis et epigastricæ utgår från yttre sidan af stammen, kort förr än den tränger ut ur bukcaviteten, och delar sig genast i sina 2 grenar a. vesivalis och epigastrica.

- a) A. vesicalis, något starkare än den följande, förlöperframåt och inat med ett slingrande förlopp, långs yttre randen af turinblasan, ända till dess fundus, hvarest den synes anastomosera med grenar af samma arter från andra sidan, och skickar under detta förlopp flere grenar till urinblåsan.
- 3) A. epigastrica förlöper utåt från den föregående, långs undre randen af m. transversus abdominis, till inguinaltrakten, hvarest densamma lägger sig under m. rectus abdominis, långs hvars undre eller inre yta den sedan förlöper vidare uppåt, fördelande sina grenar så väl i denna, som båda mm. obliqui, och skickar dessutom
- β) A. cutanea femoris anterior s. externa, en lång gren hvilken, under nedre randen af m. obliquus abdominis, tränger ut till huden å främre och yttre sidan af låret, hvarest den vidare skickar grenar, som anastomosera med sista grenarne af a. dorsalis scapulæ.
- b) A. cruralis, (Pl. V. Fig. 1 N:0 16) en ganska kort stam, hvilken utgår från yttre sidan af a. iliaca communis, der densamma passerar m. sphincter ani internus och delar sig nästan genast i 2:ne grenar: a. circumflexa femoris interna och circumflexa ilei.
- α) A. circumflexa femoris interna (Pl. V. Fig. 1 N:o 17) utgör fortsättningen af stammen och förlöper tvärs nedåt och inat till inguinaltrakten, emellan nedre randen af mm. ob/iqui o ch transversus abdominis, till öfre ändan af m. vastus inter-

nus och adductor magnus, hvilka af densamma förses med grenar, och anastomoserar med grenar ifrån a. circumflexa femoris externa.

- β) A. circumflexa ilei, (Pl. V. Fig. 1 N:0 18) en ganska fin men lång gren, hvilken utgår från stammen nära os ileum och förlöper uppåt, långs inre randen af samma ben och fästet för m. ileo-coccygeus. Under detta förlopp skickar densamma grenar till m. ileo- och sacrococcygeus.
- c) A. circumflexa femoris externa (Pl. V. Fig. 1 N:0 19) utgår ifrån stammen, der densamma sänker sig under m. glutæus maximus, utåt långs m. rotator communis under m. semitendinosus och semimembranosus, nära dessa musklers ursprung, och anastomoserar med grenar ifrån a. circumflexa femoris interna. Genom denna communication bildas en arteriell kärlkrans omkring randen af acetabulum, ifrån hvilken sedermera grenar utgå till m. rotator communis femoris och ledcapseln samt caput femoris.

Under detta förlopp afgisver densamma följande 2:ne grenar:

- a) A. coccygea hvilken, utgående från inre sidan af stammen under m. glutæus maximus, förlöper tvärs inåt mot den cartilaginösa ändan af os coccygis, och utgrenar sig här i m. sphincter ani externus, samt den närbelägna huden.
- β) R. muscularis hvilken utgår från yttre sidan af stammen och förlöper nedåt och utåt, emellan m. sphincter ani externus och glutæus maximus, för att utgrena sig i m. semiten-

dinosus. Härifrån forsättes densamma vidare såsom a. cutanea femoris interna öfver nimnde muskel och m. subcutaneus femoris, hvilken jemte m. semimem'ransus af densamma förses med grenar, till huden nina anus, der den anastomoserar med samma arter fran andra sidan, och salunda omkring anus bildar en arteriell kärlkrans, ifrån hvilken an. hæmorrhoidales externæ, hvilka anastom sera med au. hæmorrhoidales internæ utgå och utgrena sig i sphincter ani samt huden.

d) A. femoris profunda, en ganska stark gren, utgår från un he sidan at stammen, der densamma sänker sig emellan m. biceps femoris och semitendinosus, och böjer sig, efter ett kont finlipp framat och utat, under m. semitendinosus, emellan m. adductor brevis och semimembranosus, samt emellan den sistnima le och m. subsutaneus femoris hvilka alla muskler, jemte den närgränsande huden, af densamma förses med grenar.

Under detta forlopp afgisver a. profunda semoris soljande 2 grenar:

a) A. perforans I:ma utgår från bakre sidan af stammen och delar sig snart i 3:ne grenar, af hvilka en utgrenar sig i m. semitendinosus; den 2:dra sänker sig i djupet och utgrenar sig i m. adductor magnus och den 3:dje förlöper uppåt emellan m. glutæus maximus och öfre ändan af m. semitendinosus, för att utgrena sig i den sistnämnde m. och anastomosera med grenar ifrån a. circumflexa femoris externa.

- β) A. perforans II:a*) utgår från fråmre sidan af stammen, der densamma böjer sig bakåt och utgår en ganska kart stam, hvilken hastigt delar sig i flera grenar, 3 à 4, hvilka vidare utgrena sig i m. biceps femoris, vastus externus och internus samt cruralis. Dessutom skickar den grenar hvilka dels utgrena sig i m. adductor magnus och genomborrande denna trånga fram till inre sidan af låret, för att utgrena sig i m. gracilis, sartorius, adductor brevis och pectineus, samt såsom a. cutanea femoris interna (Pl. V. Fig. 2 N:o 33) öfvergå i den hithörande huden.
- e) A. articularis superior externa (Pl. V. Fig. 3 N:0 12) utgår från a. poplitea, kort förr än densamma delar sig i sina 2:ne grenar, och förlöper, snedt ölver vena poplitæa, till yttre sidan af knäleden under senan af m. biceps femoris, hvarefter densamma, långs yttre silm af knäet, fortsätter sitt förlopp. tätt under huden, nedanom knäleden till crus.

Under detta förlopp skickar ifrågavarande arter följande grenar:

- a) R. suralis ** hvilken utgrenar sig i m. gastocnemius.
- β) R. articularis superior externus, (Pl. V. Fig. 3 N. o. 12) en fin gren, hvilken, utglende från stammen under semm af m. biceps femoris förlöper framåt öfver condylus externus femoris, under vastus externus och anastomoserar med den från

^{*)} Motsvarar a. perforans 2:da och 3:a hos menniskan.

^{**)} Denna ar osta en gren af a. poplitea.

- a. tibialis antica kommande r. articularis superior internus, samt skickar grenar till ledcapseln.
- 7) R. cutaneus anterior cruris utgår från stammen på yttre sidan af knäleden, och förlöper nedåt och framåt snedt öfver ursprunget för m. peroneus longus, tätt under huden, i hvilken den utgrenar sig å främre sidan af crus.
- 3) R. articularis inferior externus, (Pl. V. Fig. 3 N:0 13) en ganska fin gren, hvilken utgår från stammen, kort förr ån den delar sig i sina 2:ne slutgrenar, och förlöper, tätt under condylus externus tibiæ, uppåt till ledcapseln der den synes anastomosera med grenar ifrån a. articularis inferior interna.
- ε) R. peronei longi utgår från stammen, vid yttre randen af m. peroneus longus, tätt under knäleden och utgrenar sig snart i m. peroneus longus.
- g) R. tibialis antici är, såsom fostsättningen af stammen, den starkaste af alla i frågavarande arters grenar, och förlöper framåt och nedåt, långs inre ytan af m. tibialis anticus i hvilken ensam den utgrenar sig.
- f) A. suralis superior (Pl. V. Fig. 3 N:o 15) utgår från yttre sidan af a. poplitea, förlöper nedåt och delar sig snart i 2:ne grenar:
- a) R. cutaneus posterior cruris förlöper nedåt tätt under huden, i hvilken densamma utgrenar sig å bakre sidan af crus.

- 3) R. gastrocnemius utgör fortsättningen af stammen och förlöper nedåt för att utgrena sig i öfre ändan af m. gastrocnemius.
- g) A. tibialis postica, (Pl. V. Fig. 2 N:o 34) mindre ån a. tibialis antica, ifrån hvilken densamma viker bakåt, och förlöper nedåt till inre sidan af crus, emellan m. gastrocnemius och tibialis posticus, långs inre randen af den förstnämnde muskeln till malleolus internus, hvarest densamma är belägen emellan den inre randen af tendo Achillis och berörde malleolus. Härifran fortsätter den sitt förlopp, endast betäckt af den vitre huden, på inre sidan af tarsus, langs m. adductor hallucis longus, till inre sidan af os sesamoideum magnum hvarest den delar sig i 2:ne fina grenar, af hvilka den ena förlöper långs inre randen af nämnde ben, och den andra starkare böjer sig emot dess plantaryta, hvarest den skickar flere grenar som härstädes bilda ett nät. Härifrån fortsättes densamma sasom a. dorsalis tibialis hallucis (Pl. V. Fig. 2 No 48) langs inre sidan af namnde tå till nagelleden, hvarest den i en bage förenas med a. dorsalis fibularis kallucis, med hvilken den dessforinnan, å undre ytan af berörde tå, anastomoserar genom en tvärgren.

Under detta förlopp afgifver densamma följande grenar:

a) R. gastrocnemius hvilken utgår från stammen, kort efter det densamma skiljt sig från a. tibialis antica, och förlöper nedåt i knävecket, långs inre ytan af m. soleus, hvarest den vidare utgrenar sig.

- β) R. cutaneus cruris internus, en fin gren hvilken, ungefär å midten af crus, utgår från inre sidan af stammen och utgrenar sig i huden å samma sida af crus, samt anastomoserar med grenar ifrån R. cutaneus cruris externus från a. tibialis antica, och rr. cutanei tarsi.
- 7) A. tarsea, en i förhållande till stammen ganska stark gren, hvilken utgar från yttre sidan af stammen något nedanom tarsalleden och höjer sig utåt emellan aponeurosis plantaris och m. plantaris, å plantar ytan af tarsus, till inre randen af m. flevor digitorum lengus, hvarest densamma delar sig i 2:ne grenar, en r. externus och internus.
- i) R. externus skickar grenar till m. flexor digitorum Lugus och forsätter sedermera sitt forlopp, emellan nämnde muskel och m. plantaris, till nedre ändan af astragalus, hvarest den emottager en communicationsgren ifrån a. tibialis antica, hvilken genomborrar ligamentum inteross um emellan astragalus och ca'caneus, för att från dorsalytan komma till plantarytan af tarsus, och skickar grenar till den härbelägna m. tilialis posticus inferior.
- 7") R. internus är starkare än den yttre, böjer sig åter utåt, förlöpande emellan aponeurosis och m. plantaris, i en båge till inre sidan af tarsus, långs hvilken den sedermera förlöper nedat. Under detta förlopp gifver densamma grenar till de nämnde musklerna och synes anastomosera med det arteriella

kärlnät som bildas genom grenar från stammen af a. tibialis postica å undre ytan af os sesamoideum magnum.

- δ) A. malleolaris posterior interna utgår, kort efter den föregående, från stammen vid öfre ändan af calcaneus och förlöper inåt tarsalleden, hvarest den delar sig i 2:ne grenar: r. superior s. a. articularis och r. inferior s. r. calcaneus internus, af hvilka den sednare är något starkare.
- δ') R. superior s. a. articularis böjer sig uppåt, långs inre sidan af tarsalleden och utgrenar sig dels i ledcapseln, dels i nedra ändan af tibia. Här communicerar den med den från a. tibialis antica kommande a. malleolaris anterior interna.
- o') R. inferior s. calcaneus förlöper nedåt emellan calcaneus och m. adductor longus hallucis, hvilken af densamma förses med grenar, och skickar grenar, hvilka intränga dels i nedra ändan af calcaneus, dels i den hithörande ledcapseln och står dessutom i communication med grenar ifrån a. tarsea.
- ε) R. R. cutanei tarsi interni, 3 till 4 grenar hvilka utgå från inre sidan af stammen, der den förlöper långs m. adductor hallucis longus, och utgrena sig i huden på inre sidan af tarsus, samt anastomosera med grenar ifrån r. cutaneus cruris internus.
- 5) A. plantaris externa utgår från a. dorsalis tibialis, invid inre randen af os sesamoideum magnum, och tränger ige-

nom m. interesseus primus till planta pedie, hverest den, emellan m. flexor brevis sublimis och profundus, förlöper tvårs utåt till yttre sidan af planta pedie, upptagande under detta i obeppen fin gren ifrån r. externus af a. tarsea. Under detta förlopp skickar den grenar till flexores breves digitorum pedis och m. m. interossei interni, samt en fin gren, hvilken förlöper framåt i hvarje interstitium interosseum och vid första tåleden förenas med a. a. digitorum pedis dorsales.

h) A. tibialis antica (Pl. V. Fig. 2 N:0 35) utgör fortsättningen af a. poplitea, förlöper inåt knävecket och framåt till öfre ändan af m. tibialis posticus, hvilken den genomborrar och fortsättes sedermera tätt långs bakre ytan af tibia, emellan denna eli sistninnade muskel, till ungel r millen af lænd. Instest den tränger in genom ett hål hvarifrån den fortlöper vidare snedt nedåt och framåt genom en canal i benet. Härifrån framtränger densamma, sedan den afgifvit sina grenar till det inre af benet, ungefär å midten af tibia, under m. tibialis anticus till främre ytan af tibia och förlöper nu vidare, emellan m. tibialis anticus och benet nedåt foten, framtränger, emellan de båda capita af oftanämnde muskel, under m. peroneus brevis, eller emellan denna och tarsalleden, såsom a. pediaea, under m. extensor digitorum brevis sublimis, hvarest den delar sig i sina 2 slutgrenar: a. tarsea interna och externa.

Under detta förlopp afgå ifrån a. tibialis antica följande grenar:

- a) A. articularis superior interna, en fin gren hvilken i knävecket utgår från stammen, förlüper tramdt i jussa poplitæn, emellan m. biceps och semitendinosus, till inre sidan af knäet der den framtränger emellan fästet för m. semitendinosus och sartorius, hvarefter densamma skickar grenar till leden seln, hvilka anastomosera med grenar ifrån a. articularis externa.
- B) A articularis inferior interna, *) af lika styrka som den föregående, utgår ilvån stammen i fossa poplitæta och förlöper framåt till fåstet för m. semimembranosus, hvarest den i siellva knävecket, tränger, emellan tästet för sistnämnde muskel och m. subcutaneus femoris, till inre sidan af crus. Här böjer den sig under ligamentum luterale internum gena, omkring condylus internus tiliæ, till framre ytan af tibia, anastomoserar med de öfriga aa. articulares och utgrenar sig i ledcapseln och condylus internus tibiæ.

Då ifrågavarande arter i knävecket uppnått fåstet för m. subcutaneus femoris, skickar den

- B) R. cutaneus cruris internus, (Pl. V. Fig. 2 N:o 36) hvilken förlöper framåt och snart utgrenar sig i huden på inre sidan af crus under knäleden, samt anastomoserar med grenar ifrån r. cutaneus cruris anterior.
- 7) A. malleolaris anterior interna, en ganska stark gren, hvilken utgår från stammen kort efter det den inträngt i m. ti-

^{*)} Utgår ofta från en gemensam stam med den föregående

bialis posticus, och förlöper genom berörde muskel, som af densamma förses med grenar, till malleolus internus. Här förlöper den emellan tendo Achillis och malleolus internus, i en fåra af den sednare, och förenas med r. superior af, den från a. tibialis postica utgående, a. malleolaris posterior interna.

Ifrån denna förening utgå sedermera grenar till den här belägna ledcapseln.

d) A. metatarsea (Pl. V. Fig. 2 N:o 49) utgår från yttre sidan af stammen, emellan de båda capita af m. tibialis auticas, och förlöper emellan denna och ursprunget för m. pero-onæus brevis utåt till yttre sidan af os metatarsi 5:tum, der den skickar grenar till huden å undre sidan af tarsus, hvilka communicera med grenar ifrån rr. cutanei tarsi interni. Härifrån förlöper den vidare, endast betäckt af huden, långs yttre randen af 5:te tåen såsom a. dorsalis fibularis digiti V:ti, hvars korta muskler af densamma förses med grenar, och förenas vid nagelleden med a. dorsalis tibialis digiti V:ti.

Kort ester det den utgått från stammen afgisver den R. peronæus brevis, hvilken förlöper nedåt långs inre ytan af m. peronæus brevis i hvilken den vidare utgrenar sig.

ε) A. malleolaris anterior externa, en ganska fin gren, hvilken, å samma ställe som den föregående, utgår från inre sidan af stammen till tarsalleden, men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram, emellan fästet för m. peroneus brevis utåt och tränger fram i men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram i men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram i men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram i men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram i men böjer sig här under m. peroneus brevis utåt och tränger fram i m. peroneus bre

ronœus longus och yttre hufvudet af m. tibialis anticus, till malleolus externus, hvarest den skickar grenar till ledcapseln.

- c) A. tarsea externa förlöper ifrån a. tarsea interna utåt emellan det 3:dje och 4:de os metatarsi, hvarest densamma delar sig i 2:ne grenar: a. interossea IV:a och III:a, hvilka, under en spetsig vinkel, skilja sig från hvarandra.
- g') A. interossea quarta förlöper snedt utåt öfver det 4:de os metatarsi och vidare emellan 4:de och 5:e tåens os metatarsi framåt, emottager, vid basis af de anmärkte tårnas första falang, en gren ifrån a. plantaris externa, och delar sig dersammastådes i 2 grenar: a. dorsalis tibialis digiti V:ti hvilken förenas med a. dorsalis fibularis af samma tå, och a. dorsalis fibularis digiti IV:ti, hvilken förenas med a. dorsalis tibialis af samma tå.
- stammen, i det 3:dje intersiitium interosseum under extensor brevis och longus digitorum och delar sig, såsom den föregående, i a. dorsalis tibialis digiti IV:ti och a. dorsalis fibularis digiti III:i, af hvilka den förra förenas med samma tås a. dorsalis fibularis fibularis och den sednare med 3:dje tåens a. dorsalis tibialis.
- η) A. tarsea interna (Pl. V. Fig. 2 N:o 50) förlöper snedt in åt öfver nedre delen af tarsus, under extensor digitorum longus och brevis, och delar sig, kort förr än den uppnår basis af os metatarsi 2:dum, i 2:ne grenar: a. interossea II:a och I:a.

- η΄) A. interossea II. (Pl. V. Fig. 2 N:0 51) förlöper framåt emellan 2:dra och 3:dje tåns os metatarsi och delar sig, såsom de föregående aa. interosseæ, i 2:ne grenar: a. dorsalis tibialis digiti III:i (Pl. V. Fig. 2 N:0 52) och a. dorsalis fibularis digiti II:di, (Pl. V. Fig. 2 N:0 53) hvilka vid nagelleden förenas, den förra med a. dorsalis fibularis digiti III:i, den sednare med a dorsalis tibialis digiti II:di.
- η") A. interossea I:a (Pl. V. Fig. 2 N:o 54) förlöper emellan första och andra tåns ossa metatarsi, och delar sig, vid basis af nämnde tårs falanger, i 2:ne grenar: a. dorsalis tibialis digiti 11:di (Pl. V. Fig. 2 N:o 55) och a. dorsalis fibularis hallucis, (Pl. V. Fig. 2 N:o 56) af hvilka den förra, på ofvan anfördt sätt, förenas medl 2:dra tåns a. dorsalis fibularis, den sednare med den ifrån a. tibialis postica kommande a. dorsalis tibialis hallucis. Alla dessa ofvananmärkte au. dorsales digitales skicka dessutom hvar och en grenar till fingrarnes korta extensorer och huden samt, der de gaffelformigt grena sig. en fin gren till simhuden emellan tårna.

Förklaring

öfver

PLANCHERNE.

- Fig. 1. Föreställer en padda, tecknad från undre sidan, sedan lefvern och tarmkanalen blifvit aflägsnade, för att framställa arcus aortæ och aorta abdominalis.
 - a) Hjertat.
 - b) Ryggraden.
 - c) Njurarne.
 - d) Fingerlikt delad fettmassa.
 - e) Urinblåsan.
 - 1) Truncus arteriosus eller aorta.
 - 2) Arcus aortae dexter.
 - 3) Arcus aortae sinister.
 - 4) Carotis externa lateris dextri.
 - 5) Sinus caroticus kallad glandula carotidea.
 - 6) Vena carotico cerebralis.
 - 7) Aorta thoracica dextra.
 - 8) A. oesophagea.
 - 9) Aorta abdominalis.
 - 10) A. mesenterico coeliaca.

- 11) Aorta abdominalis.
- 12) A. occipito dorsalis scapulae.
- 13) AA. renales.
- 14) A. iliaca.
- 16) A. cruralis.
- 17) A. circumflexa femoris interna.
- 18) A. circumflexa ilei.
- 19) A. circumflexa femoris externa.

Fig. 2. Föreställer en padda, med öppnad buk- och bröstcavitet, samt artererne injicierade från truncus arteriosus.


- a) Hjertat.
- b) Lesvern.
- c) Ventrikeln.
- d) Treflikig fettlob.
- e) Tuba Fallopii.
- f) Ovarium.
- g) Lungan.
- 1) Truneus arteriosus.
- 2) Arcus aortae dexter.
- 3) D:o D:o sinister.
- 4) Carotis externa.
- 5) Sinus carolicus.
- 6) A. lingualis.
- 7) R. R. linguales a. lingualis.
- 8) A. submentalis.

- 9) Veua carotico cerebralis.
- 10) A. pharyngea.
- 11) A. pulmono-cervicalis.
- 12) A. pulmonalis.
- 13) A. occipito-dorsalis scapulae.
- 14) A. laryngea.
- 15) A. occipitalis.
- 16) A. subclavia.
- 17) A. thoracica externa prima.
- 18) D:o D:o secunda.
- 19) A. subscapularis.
- 20) A. brachialis.
- 21) A. axillaris.
- 22) A. mesenterico-coeliaca.
- 23) A. coeliaca.
- 24) A. coronaria ventriculi dextra anterior.
- 25) A. hepatica.
- 26) A. mesenterica.
- 27) A. jejunalis.
- 28) A. colica communis.
- 29) Aorta abdominalis.
- 30) A. adiposa.
- 31) A. A. ovarii.
- 32) A. tubae Fallopii.

- 33) A. cutanea femoris interna.
- 34) A. tibialis postica.
- 35) D:o antica.
- 36) A. cutanea .cruris interna.
- 37) R. dorsalis radialis digiti 2:di r. volaris a. brachialis.
- 38) R. dorsalis a. brachialis.
- 39) A. profunda brachii.
- 40) A. interossea dorsalis 2:da.
- 41) D:o d:o d:o 3:a.
- 42) A. ilea prima.
- 43) D:o secunda.
- 41) D:o tertia.
- 45) A. ileo-colica.
- 46) A. colica media.
- 47) A. hoemorrhoidalis interna.
- 48) A. dorsalis tibialis hallucis.
- 49) A. metatarsea.
- 50) A. tarsea interna.
- 51) A. interossea 2:da.
- 52) A. dorsalis tibialis digiti tertii.
- 53) A. d:o fibularis d:o secundi.
- 54) A. interossea prima.
- 55) A. dorsalis tibialis digiti 2:di.
- 56) A. d:o fibularis hallucis.
- 57) A. thoracica externa prima.

Fig. 3. Föreställer en padda tecknad från öfre sidan sedan huden blifvit löspraeparerad.

- a) Den undre ytan af huden å ryggen.
- 1) A. occipito-dorsalis scapulae.
- 2) A. cutanea dorsalis scapulae.
- 3) A. maxillaris interna.
- 4) A. cervicalis.
- 5) A. temporalis.
- 6) A. maxillaris externa.
- 7) A. infraorbitalis.
- 8) A. frontalis.
- 9) A. palpebralis superior.
- 10) A. ethmoidea.
- 11) A. iliaca sinistra.
- 12) A. articularis superior externa.
- 13) A. d:o inferior d:o.
- 14) A. suralis.
- 15) A. suralis superior.



BIDRAG

TILL BLODKÄRLSYSTEMETS JEMFÖRANDE ANATOMIE,

AF

E. J. BONSDORFF.

11.

Om ett accessoriskt vensystem hos Paddan, öppnande sig i Sinus caroticus.

(Föredr. den 4 Mars 1850.)

Då jag i en föregående afhandling om det arteriella kärlsystemet hos paddan, anmärkt om den af mig så kallade sinus caroticus, vidrörde jag tillika i korthet de olika meningar, hvilka, ibland anatomer, varit rådande beträffande byggnaden och betydelsen af densamma. Ehuru jag icke förr än nästkommande sommar, då tillfälle, att erhålla paddor, erbjuder sig, kan afsluta mina redan påbegynta undersökningar om det venösa blodkärlsystemet hos samma djur, har jag likväl ansett mig böra meddela en observation om ett venöst kärlsystem hos paddan, som icke, såsom vanligt, öppnar sig i någon af hjertats atria, utan i sinus caroticus, och således erbjuder ett icke ringa intresse. Se-

dan min förberörde afhandling om det arteriella kärlsystemet redan hade blifvit tryckt, har jag erhållit Burows af mig långe saknade afhandling: de vasis sanguiferis ranarum, och finner deral att han, vid sin framställning af artererne, följt en annan plan än jag, i det afseende att, då han blott mera i allmänhet beskrifyit det arteriella systemets förhållande och företrädesvis capillar kärlsystemet hos grodorne, jag strängt monographiskt beskrifyit och benämnt artererne hos oftanämnde djur. Då Burow afhandlar det venösa kärlsystemet finnes af honom intet anmärkt beträffande det accessoriska vensystem, som jag i det följande skall meddela, enligt samma plan som legat till grund för min framställning af det arteriella systemet. Af ofvan anförd anledning kan jag icke nu redogöra om något sammanhang äger rum emellan detsamma och det i hjernan och ryggmärgen förekommande venösa kärlsystem, som enligt Burow, såsom vanligt för blodet till hjertat. Framdeles hoppas jag kunna utreda detta förhållande. För större tydlighets skull skall jag vid beskrifningen utgå från stammen till grenarne, således i en direction, motsatt den i hvilken blodet flyter i venerne, och anser mig, beträffande sjelfva medelpunkten för detta system eller sinus caroticus, böra hänvisa till min förberörde afhandling "), tilläggande blott, hvad den rythmiska contraction, hvilken jag å sinus caroticus observerat, beträffar, att tiden för inträdande contraction i berörde sinus caroticus, synts mig inträffa liktidigt med atriorum systole och hjert-

^{*)} Se Acta Societatis Scientiarum Fennieæ Tom. III. pag. 450 noten.

kammarens diastole. Den gemensama stammen för detta venösa system har jag ansett mig böra kalla vena carotico cerebralis, emedan den öppnar sig i carotis och företrädesvis upptager blod som, genom den af mig så kallade arteria occipitalis, blifvit öfverfördt till nervsystemets centraldelar.

Vena carotico cerebralis (Pl. V. Fig. 2 N:o 9 Fig. 1 N:o 6) är ungefär lika stark som a. lingualis, och utgår från yttre sidan af sinus caroticus. Härifrån förlöper densamma nästan rakt bakåt, uti det trekantiga rum, som begränsas framtill af m. stylohyoideus, baktill af m. stylopharyngeus och inåt af pharynx. Här böjer den sig sedermera uppåt, emellan bakre väggen af pharynx och undre ytan af m. attractor scapulæ och os sphenoideum, till det ställe af basis cranii der ögonglobens muskler hafva sitt ursprung, och förlöper, tätt vid os sphenoideum, nära förenad med dess periosteum in uti ögonhålan, hyarest den delar sig i 4 fina grenar v. palpebralis externa, pterygopalatina, ophthalmica och vena communicans, af hvilka vena ophthalmica är att anses såsom fortsättning af stammen, och vena communicans kunde anses såsom en gren af densamma.

a) Vena palpebralis externa, en ganska fin gren, hvilken förlöper utåt emellan yttre sidan af m. retractor oculi och m. rectus oculi externus, till yttre ögonvinkeln, der densamma vidare utgrenar sig i öfre och nedre ögonlocket. Denna ven emottager således det blod som, genom arteriæ palpebrales, föres till ögonlocken.

- b) Vena pterygopalatina, af lika styrka med den föregående, förlöper framåt under membrana palati och förenas med en från den inre vinkeln nedåt förlöpande ven i en båge, hvarifrån grenar utgå till gomens membran.
- c) V. ophthalmica, starkare än de föregående, förlöper under ursprunget för ögommusklerne till syn-nerven, der densamma tränger ut från hjerncaviteten in i ögomhålan, åtföljer sedermera samma nerv till det ställe hvarest densamma genomborrar scleratica, och delar sig hår i flere fina grenar, hvilka bilda en kärlkrans omkring syn-nerven, samt synes åfven skicka ytterst fina grenar till ögonglobens muskler.
- d) V. communicans förlöper inåt bottnet af ögonhålan, hvarest densamma genom ett hål tränger in i hjernhålan. Hår förlöper den något snedt inåt och nedåt, tätt vid corpora mamillaria å främre ytan af medulla oblongata, och delar sig i tvänne grenar, af hvilka den ena förenas med samma ven från andra sidan till en nedåt convex båge, den andra åter förlöper långs främre ytan af ryggmärgen nedåt och snedt inåt, så att den å ryggmärgens medellinie förenas, med samma ven från andra sidan, till vena spinalis anterior.

Vena spinalis anterior, förlöper, tätt omsluten af pia mater, vid fissura medullæ spinalis anterior nedåt ända till os coccygis, och delar sig under detta förlopp i flere grenar som åter förenas. Under detta förlopp skickar den grenar till ryggmärgen och de i ryggmärgscanalen belägna långa spinal nervrötterne.

Dessutom afgår från vena communicans kort efter det den inträngt i hjerncaviteten.

V. cerebri profunda, en ganska fin gren, hvilken förlöper, långs ytan af hjernan, under den cerebrala delen af nervus
opticus, och sedermera sänker sig i det inre af hjernan i hvilken den vidare utgrenar sig.

Huruvida det blod, som ifrån de beskrifne grenarne i centripetal riktning flyter tillsammans i ofvananmärkte vena carotico cerebralis, ifrån sinus caroticus fortsätter sitt lopp till hjertat, eller öfvergår i arteria lingualis, kan jag icke för det närvarande afgöra.



SYMBOLAE

AD ANATOMIAM COMPARATAM NERVORUM ANIMALIUM VERTEBRATORUM,

AUCTORE

E. J. BONSDORFF.

I.

Nervi cerebrales Corvi Cornicis (Linn.)

(Societ. exhib. d. 5 Nov. 1849 et 4 Febr. 1850.)

Praemonenda.

Quamvis viri, de anatomia comparata nervorum maxime merki, uti: Cuvierus, Joh. Müller, Meckel, Weber, Valentin, Stannius, Retzius, Bendz, Eschricht, R. Wagner, Schlemm, Carus, Treviranus, Bidder, Volkman, Serres, Magendie, Grant, Desmoulin, Svan, Bojanus cet. multa jam ad accuratam, cognitionem nervorum, qui sunt animalium vertebratorum, contulerint, haud pauca adhuc investiganda in hac anatomiae parte restant. Quam vero vim anatomia nervorum comparata in physiologiam systematis nervosi exerceat, unicuique facile patet, ut jure contendere possimus, hano physiologiae partem multis vitiis laborare, usque dum anatomia nervorum comparata, conjunctis viribus anatomiae cultorum, manervorum comparata, conjunctis viribus anatomiae cultorum.

gis fuerit explicata. Ut etiam nos, pro virium modulo, aliquid ad cognitionem nervorum animalium conferamus, in animum induximus seriem hujus modi disquisitionum in medium profetre inscriptam, Symbolæ ad anatomiam comparatam nervorum animalium vertebratorum, cujus particulam primam: de nervis cerebralibus Corvi cornicis publico eruditorum examini jam offerimus.

Cap. I.

I. Nervus olfactorius Bulbum gignit cinereum, in parte horizontuli ossis ethuroidei situm, e quo nervus mollioris consistentiae, quam ceteri nervi cerebrales, deorsum decurrit cavitatemque nasalem intrat, ubi surculos mittit tenerrimos ad membranam, mucosam superioris partis labyrinthi nasalis.

II. Nervus opticus, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 1) omnium nervorum cerebralium maximae crassitudinis, e chiasmate nervorum opticorum, ubi fibrae nervi cujusque lateris se invicem decussant, in basi cranii prorsum decurrit ad foramen opticum, quo perforato, vaginam e dura matre accipit atque in orbitam tendit. Heic, in media parte fossae conicae quae musculis rectis oculi circumdatur, prorsum ad superficiem posteriorem bulbi oculi tendit, ubi, tendine m. pyramidalis ⁹) atque qua-

^{*)} Apud Corvum Cornicem etiam tertia adest palpebra, quam membranæ nictitantis nomine designarunt, quæ quidem musculis propriis, m. quadrato et pyramidali, movetur.

drati circumdatus, seleroticam, perforat atque more solito in retinam abit.

- III. Nervus oculomotorius, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 2) omnium nervorum oculi, motoriae indolis, maximus, in basi cranii prorsum ad foramen oculomotorium *) tendit, unde orbitam, infra originem m. recti oculi inferioris, intrat atque mox in duos ramos sese dividit: r. internum et externum.
- A) R. internus, (Tab. VI. Fig. 1 N:0 3) ramo externo aliquanto minor, in inferiore et interna parte n. optici prorsum et introrsum tendit, missisque 2 vel 3 ramis tenerrimis ad m. rectum oculi inferiorem, in duos ramos dirimitur, ex quibus r. superior in m. rectum oculi internum, inferior vero ad m. obliquum oculi inferiorem abit.
- a) RR. ad m. rectum oculi inferiorem, (Tab. VI. Fig. 1 N:0 4) 2 vel 3 rami tenerrimi qui, in angulo, in quo r. r. externus et internus a se invicem discedunt, oriundi, mox in m. rectum oculi inferiorem distribuuntur.
- b) R. ad m. rectum oculi internum (Tab. VI. Fig. 1 N:o 5) sursum versus nervum opticum atque partem posteriorem glandulae Harderi porrigitur et in m. rectum oculi internum abit.
- c) R. ad m. obliquum oculi inferiorem, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 6) in interna superficie glandulae Harderi atque margine

^{*)} Ita foramen paullo infra foramen opticum situm designamus,

interno m. recti œuli interni, decesum ad superficiem inferiorem m. obliqui oculi inferioris decurrit, ubi ulterius in ramos sese dividit.

- B) R. externus, (Tab. VI. Fig. 1 N:0 7) praecedente major, continuationem efficit nervi cujus mentionem facimus atque, ad latus externum nervi optici, infra m. rectum oculi superiorem, al ganglion ciliare antiorsum et extrorsum procedit. In hoc decursu sequentes gignit ramos:
- a) R. ad m. rectum oculi superiorem, (Tab. VI. Fig. 1 N:0 S) ramum tenerrimum, qui, mox e ramo externo oriundus, sursum atque extrorsum per telam adiposam ad superficiem interiorem m. recti oculi superioris pergit, ubi in ramos dispertitur.

Canglion ophthalmicum, s. ciliare, (Tab. VI. Fig. 1 No. 9) colong a ovatum acque rubicumdi vel flavescentis coloris. ad Laus externum nervi optici situm, magnitudinem proponens seminis sinapis nervi hujus, de quo quaeritur concludit ramum externum, qui intumescens totus in illud mutatur. Ab anteriore parte lunjus ganglii duo nervi ciliares sat crassi) nascuntur, quorum alterum truncum ciliarem internum, alterum vero truncum ciliarem externum vocare juvat.

^{*)} Hanc nervorum ciliarium originem e ganglio, Muck etiam observavit in Corvo pica, monedula vid. ejus librum inscriptum: Dissertatio anatomica de ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus animalium præside Tiedeman, Landeshuti 1815 p. 46 & 47.

- a) Truncus ciliaris internus (Tab. VI. Fig. 1 N:o 10) mox in tres vel quatuor ramos ciliares dividitur, qui, ad latus externum nervi optici, in adversum tendunt, seleroticaque prope insertionem nervi optici perforata, in superficie externa tunicae choroideae ad iridem procedunt.
- β) Truncus ciliaris externus (Tab. VI. Fig. 1 N:o 11) magis extrorsum quam truncus memoratus procedit, atque cum n. ciliari, qui duobus efficitur surculis tenerrimis, quarum alter: ex. ramo ophthalmico n. trigemini, alter vero e. n. abducente, uti infra fusius explicabimus, ortum ducit, coalescit. Nervus noster hinc major factus mox tres nervos tenues ciliares ablegat, qui nervorum ciliarium more in iridem abeunt.
- IV. Nervus trochlearis, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 12) nervo oculomotorio multo tenuior, in basi cranii prorsum ad foramen trochleare *) tendit quod quidem penetrat. In orbita nervus noster, inter marginem internum musculi recti oculi superioris atque glandulam Harderi, in adversum procedit ad marginem musculi obliqui oculi superioris, ubi totus quantus in ramos dirimitur, qui omnes ad musculum nuperrime allatum pertinent.
- V. Nervus Trigeminus s. tridivisus, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 13, Fig. 2 N:o 1) omnium nervorum cerebralium maximus, duabus constat portionibus, majore dico atque minore, quarum portio major tantummodo in ganglion semilunare Gasseri in-

^{*)} Ita foramen hocce appellare placet ad externam partem foraminis optici situm.

tumescit, minor vero mere motoriae indolis, in sulco ganglii allati procedens, in truncum communem rami secundi atque tertii nervi trigemini abit.

Ganglion semilunare Gasseri, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 14, Fig. 2 N:o 2) hand exiguae magnitudinis atque maximam partem intra cavitatem cranii situm, fere candem praebet formam quam apud hominem et mammalia, qualem e tabula facilius potes colligere. Quia, r. maxillaris superior atque inferior trunco communi e ganglio semilunari nascuntur, duo tantummodo rami ab ipso ganglio prodeunt: r. ophtalmicus et truncus maxillaris, qui quidem mox in ramum maxillarem superiorem atque inferiorem discedit, uti infra explicabimus.

A) Ramus primus s. ophthalmicus, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 15) caeteris ramis n. trigemini minor, ab anteriore parte ganglii Gasseri oriundus in basi cranii, infra nervum abducentem et trochlearem, in adversum tendit ad foramen ophthalmicum *) quo perforato juxta internam orbitae parietem, supra nervum opticum et infra musculum obliquum oculi superiorem, s. inter musculum allatum atque glandulam Harderi, ad parietem anteriorem orbitae progreditur, ubi in duos ramos r. externum s. n. nasalem et r. internum s. ethmoidalem sese dividit **)

^{*)} Ita foramen hocce ad externam partem foraminis optici et trochlearis situm significamus,

^{**)} Schlemm, in opere, observationes neurologica, inscripto, Berolin 1834 edito, pag. 18 nervum recurrentem in Meleagride Gallopavone observavit,

In hoc decursu sequentes gignit ramos:

- a) R. ciliarem (Tab. VI. Fig. 1 N:o 16), ramum brevissimum atque tenerrimum, qui e. r. ophthalmico n. trigemini, ubi in orbita sub origine musculi recti oculi externi procedit, oriundus, in adversum per telam adiposam tendit, ut cum ramo ciliari nervi abducentis in truncum communem coalescat, qui totus in truncum ciliarem externum ganglii ciliaris abit.
- b) R. nasalem*) (Tab. VI. Fig. 1 N:o 17) ramo eth-moidali minorem, qui, inter os lacrymale et intermaxillare superius per cavitatem nasi, ad aperturam externam nasi progreditur, ubi ramos tenerrimos ad bulbum plumarum rigidarum, quae aperturam nasi externam cingunt, ablegat. In hoc decursu sequentes mittit ramos:
- α) R. frontalem ramum brevissimum, qui e nervo nascitur, paullo antequam orbitam relinquit, et mox in duos ramos

e ramo primo nervi trigemini prodeuentem et ad nervum facialem pergentem, quem Stannius, de anatonia comparata nervorum meritissimus, in opere: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie Berlin 1846 inscripto pag. 283 apud aves in universum adesse affirmat. Hunc connexum nervi ophthalmici cum nervo faciali apud Corvum Cornicem non exstare pro certo statuere audemus. Uti infra explicabimus, n. vidianus apud avem allatam, ortum ducit e ramo secundo nervi trigemini.

^{*)} In Schlemmii opere citato p. 19 nomine nervi frontalis et in opere de avium nervis rostri atque linguæ a Bamberg typis edito nervi supraorbitalis nomine denotatur.

dispertitur, qui, infra parietem superiorem, el angulum lacernomicabile procedunt, surculosque mittunt ad bulbum plumar un cutis palpebrae superioris.

- 3) RR. nasales internos, duos vel tres ramos tenerrimos, qui in membranam munosam conchae superioris nasi al cunt.
- c) N. ethmoidalem (Tab. VI. Fig. 1 N:o 18 et 19), qui') precedente major appre continuationem proponens cami ophthalmici, procsum et introrsum al nervum eun lem lateris oppositi apprepriment et al marginem p steriorem septi norium et vomeris procedit, ubi in sulco vomeris decurrit, et ope telae cellulosce cum nervo e lem lateris oppositi o njunctus, de estant al toramen incisivum tendit. Foramine hoc perforato, al existem oris pervenit, ubi nervi landati mrinsque lateris, que telae cellulosa inter se conjuncti, a restri membrana tantum te ti puranduntor, may veno par foramen, in superficie interiore essis intermaxillaris, canalem osseum intrant. In canali hocce nervi nostri, paullum tantummo lo a se invisem distantes, in media parte matri superioris usque al api em pamelant. In hac decursa rami sequentes e n. ethmoidali nascuntur:
- e nervo, quum e nervo nasali discedit, oriundus, in parte interna

^{*)} A. Schlemmio I. c. nervi nasalis, et a Ritzelio in dissertatione: commentatio de nervo trigemino et glossopharyngeo avinm inscripta, Fuldæ 1843, nervi maxillaris superioris nomine designatur.

conchae superioris prorsus et extrorsum ad partem inferiorem aperturae externae nasi procedit, ramosque heic gignit ad bulbum plumarum rigidarum nasi externi, atque membranam mucosam conchae superioris, pertinentes.

- β) RR. palatini (Tab. VI. Fig. 1 N:0 20), 3 rami tenerrimi, qui e nervo, in superficie inferiore rostri superioris decurrente, oriundi, ad membranam rostri hujusce pertinent.
- γ) R. communicans n. ethmoidalis (Tab. VI. Fig. 1 N:0 21) ramus tenerrimus cujus ope n. uterque ethmoidalis, in palato decurrens, secum invicem conjunguntur.
- d) RR. reticulares rostri tenerrimi, qui e nervo orti, qui in canali osseo rostri supra allato decurrit, ad substantiam spongiosam vel reticularem rostri pertinent.

Ramus secundus et tertius (Tab. VI. Fig. 2 N:o 25) n. trigemini, s. maxillaris superior et inferior, trunco communi ab inferiore et externa parte ganglii semilunaris Gasseri nascuntur, qui quidem truncus maxillaris communis sub angulo fere recto a ramo ophthalmico extrorsum et deorsum foramen, inter os petrosum, corpus et alam majorem ossis sphenoidei situm, permeat atque paullo antequam canalem allatum relinquit, in duos dissolvitur ramos: r. maxillarem superiorem et inferiorem, quos infra singulatim explicabimus.

B) Ramus secundus, s. maxillaris superior angulo acuto a r. maxillari inferiore sursum versus extrorsum et prorsum or-

bitam intrans mox in sequentes ramos dispescitur. In hoc progressu rami e nervo nostro prodeunt:

- a) N. recurrens s. eidianus *) (Tab. VI. Fig. 2 N:0 3) e margine posteriore n. maxillaris superioris oriundus, et rete mirabile, (Tab. VI. Fig. 2 m.) in parte posteriore orbitae situm atque e carotide cerebrali conformatum, penetrans, per canalem vidianum superiorem, ubi cum nervo faciali coalescit, retrorsum ad aperturam externam canalis allati decurrit. Paullo antequam nervus noster aperturam relinquit, paullulum intumescit (vid. Tab. VI. Fig. 2 N:0 4) **) atque in duos ramos ejusdem fere magnitudinis r. internum et externum discedit.
- a) R. internus s. communicans c. n. glossopharyngeo, rago et sympathico, (Tab. VI. Fig. 2 N:o 5) e nervo vidiano, paullo priusquam canalem vidianum superiorem reliquit, ortus, sub angulo acuto e ramo externo deorsum et prorsum discedit, atque mox in duos ramos dirimitur, quorum alter, haud exiguae magnitudinis, in ganglion petrosum nervi glosopharyngei, alter vero in ganglion cervicale supremum abit.
- a') R. ad ganglion petrosum nervi glossopharyngei (Tab. VI. Fig. 3 N:o 5), ramus brevissiums, sed haud exiguae magnitudinis, qui ad marginem posteriorem ganglii cervicalis su-

^{*)} Ramum huncee nervo linguali et sphenopalatino hominis et mammalium reuera aequiparandum putamus.

^{***)} Hanc intumescentiam nervi recurrentis ganglio maxillari nervi lingualis aquiparandam, esse putamus, quare illam intumescentiam gangliolormen lingualem (Tab. VI. Fig. 2 N:o 4) appellamus.

premi, quocum etiam est conjunctus, deorsum porrigitur atque totus in ganglion petrosum nervi glossopharyngei abit. Permeant autem hae fibrae, uti nostrae saltem disquisitiones docuerunt, ganglion commemoratum atque in ramum communicantem nervi vagi cum glosspharyngeo abeunt, unde, intra vaginam nervi vagi, ad ramum ejus lingualem porriguntur. In ipso angulo, quo r. noster c. nervo glossopharyngeo coalescit, ganglion petrosum (Tab. VI. Fig. 2 N:o 22) nervi commemorati situm est.

- a") R. ad ganglion cervicale supremum, ramus brevissimus, e nervo in marginem posteriorem ganglii cervicalis supremi transit, ejus vero fibrae primitivae, si non omnes, tamen ad maximam partem ganglion allatum penetrantes, in nervum sphenopalatinum, quem infra uti ramum e ganglio cervicali supremo prodeuntem explicabimus, abeunt.
- β) R. externus (Tab. VI. Fig. 2 N:o 26) fibrillas continet ad nervum facialem pertinentes et magis extrorsum et retrorsum, quam ramus internus tendit, atque, ad marginem internum musculi digastrici maxillae inferioris, in duos ramos, r. digastricum et stylohyoideum discedit.
- β) R. digastricus, (Tab. VII. Fig. 1 N:0 6) ramo sequente minor, ad marginem internum nervi vagi, quocum etiam est connexus, paullo infra foramen jugulare extrorsum inter musculum rectum capitis anticum et splenium capitis in musculum digastricum abit.

(Tab. VI. Fig. 3 N:o 1), proceedente diquante maior, continuationem efficit r. externi, aque de reum et procesum inter m. styl hydideum et ramum ossis hydidei ad m. stylohyoideum procedit.

Ganglion of keno; alatinum 1) (T. VI. Fig. 2 No. 6) apud Carum Comicam in sapadicie externa rami secundi nervi trigemini occurrit, ubi n. recurrens a nervo allato ortum ducit. Invenimus beie straum nervosum rabicamli coloris, quod quidem superficiem externam nervi maxillaris superioris, inter originem nervi recurrentis atque nervi subcutanei malae, tegit. In ipso angulo vero, in quo nervus vidianos superior et subentoneus mobile e norvo mozillari superi ri a scinta ganglian alest minimun, quod, verrucae instar in superficie externa rami secundi nervi trigemini situm, cum nervo allato intime est conjunctum. Gaughini have splace julificants, in posteriore parte orbitae, inter pencessam mus ullerem et tympunirum ussis qualitati augue in superficie interna crais mir bills. pesitum, romana qui, e ganglio cervicali supremo oriundus, intra vaginam nervi recurrentis procedit, radicem habet sympathicam. Radicem sensitivam e ramo secundo nervi trigemini, radicem vero motoriae indolis e ramo petroso superficiali majore superiore nervi facialis accipit. E

^{*)} Apud Strigem G. R. Treviranus etiam ganglion, ganglio sphenopalatino aquiparandum, observavit. Vide Tractatum ejus: Ueber die Verbreitung der Antlitznerven im Lubyrinthe des Ohrs der Vögel in Zeitachritt für Physiologie von Tiedeman und Treviranus Heidelberg u. Leinzig 1833 Band V pag. 95.

ganglio sphenopalatino fibrae rubicundi coloris nascuntur qui in nervum subcutaneum malae, cutaneum anguli oris posteriorem et lacrymalem abeunt, omnesque intra vaginam nervorum, quorum mentionem nuperrime fecimus, prorsum tendunt, quos tamen ideo non uti ramos diversos, e ganglio prodeuntes, afferre possumus.

Sed praeterea e ganglio commemorato ortum ducit:

R. ad rete mirabile orbitale? (Tab. VI. Fig. 2 N:o 7) ramus tenerrimus qui, ab externo margine ganglii, inter originem n. subcutanei malae et cutanei anguli oris posterioris, exsistens, paullo post in rete mirabile abit.

Praeter nervum recurrentem s. vidianum, cujus mentionem jam fecimus, e ramo secundo nervi trigemini sequentes nascuntur rami.

b) N. subcutaneus malæ*) (Tab. VI. Fig. 2 N:o 8), ramus tenerrimus qui ab externa parte n. maxillaris superioris, prope originem nervi recurrentis, oriundus, et in origine ganglio sphenopalatino tectus, extrorsum ad superficiem internam ossis temporum procedit. Heic canalem intrat osseum musculumque temporalem penetrat atque ad cutem externam, in posteriore parte oculi, ulterius tendit, ubi in duos ramos discedit, quorum alter retrorsum, alter vero in adversum ad cutem huc pertinentem tendit.

^{*)} Hujus nervi mentionem etiam faciunt Stannius l. c. p. 283 et Ritzel l. c. p. 16 Bamberg, qui in opere citato nervos avium minus diligenter examinavit, plane nihil de n. subcutaneo malæ affert.

- e) N. cutaneus anguli oris posterior) (Tab. VI. Fig. 2 N:0 9) codem modo ac r., de quo modo diximus, in origine phenopolitico terms. atque e nervo maxillari superiore oriundus, rete mirabile supra allatum penetrans, ad marginem ossis quadrati procedit. Hinc transverse supra musculum ossis quadrati extrorsum et prorsum tendit atque in duos vel tres ramos discedit qui ad cutem anguli oris pertinent, ramumque cutaneum nasi externum heic ablegat.
- ad marginem maxillae superioris atque anguli oris procedit, ramisque heic genitis et usque ad bulbum plumarum rigidarum extensis, supra angulum oris ad partem externam radicis nasi porrigitur, ubi cum ramo cutaneo anguli oris anteriore nervi infraorbitalis coalescit, ramosque dispergit ad plumas setaceas radicis nasi.
- d) N. palpebralis superior (Tab. VI. Fig. 2 N:o 11) nervo infraorbitali, e quo sub angulo acuto sursum discedit, aliquanto minor, juxta marginem internum glandulae lacrymalis atque superficiem superiorem et externam bulbi oculi usque ad marginum superiorem tenti protenditur, ubi in duos discedit ramos, ramum internum et externum.
- a) R. internus tenerrimus ab interno margine nervi, ubi in superficie superiore bulbi oculi prorsus tendit, oriundus, di-

^{*)} N. palatinus posterior qui, ut monet Ritzelius, multis avibus, exceptis sessoribus, omnino deest, etiam in Corvo cornice desideratur.

recto ad angulum internum oculi pergit. Ramis tenerrimis heic cum ramo frontali rami ophthalmici nervi trigemini conjungitur atque surculos ad membranam nictitantem, conjunctivam et palpebram superiorem dispergit *)

- β) R. externus praecedente major et continuationem continens nervi de quo quaeritur, sub lacunar orbitae ad marginem supraorbitalem tendit, ubi surculos porrigit tenerrimos ad cutem huc pertinentem atque ad bulbum plumarum palpebrae superioris.
- e) N. infraorbitalis (Tab. VI. Fig. 2 N:o 12) n. palpebrali superiore, e quo angulo acuto deorsum ad inferiorem partem bulbi oculi discedit major, protinus rectà ad angulum externum oculi procedit, ubi in ramum subcutaneum nasi inferiorem et alveolarem anteriorem dirimitur.

In hoc decursu e nervo infraorbitali sequentes prodeunt

a) N. lacrymalis, (Tab. VI. Fig. 2 N:o 13), ramus tenerrimus, qui, e nervo infraorbitali, paullo postquam a nervo supraorbitali discessit, oriundus, rectâ decurrit et ad partem posteriorem bulbi oculi in duos sese dividit ramos, quorum alter in glandulam lacrymalem abit, alter vero extrorsum ad partem externam marginis supraorbitalis progreditur, ubi surculos gignit

^{*)} Ramus noster internus n. palpebralis superioris a Ritzelio l, c, p. 16 nervi conjunctivæ anterioris et inferioris nomine designatur.

tenerrim s, al cutem atque plumas partis externae palpobrae su-

- β) N. cutaneus anguli oris anterior, (Tab. VI. Fig. 2 No. 14) e nervo, ubi in superficie inferiore buibi oculi procedit, criundus, denranm arque extroraum al angulum cris prrigitur et in plures rames tenerrimes liscalit, qui partim cum ramis tenerrimes nervi cutanei anguli ocis posterioris, cujus mentionem supra jum fecimus, partim cum ramo conununicante nervi alvectaris inferioris coalescunt, plexumque formant qui surculos gignit ad cutem anguli cris pertinentes.
- 7) N. subcutaneus nasi inferior (Tab. VI. Fig. 2 No. 15) faxta angulum intermum ocali e nervo oriundus, directo antrorsum al radicem nasi tendia, ut i in plures dirimitur ramos ad cutem plumasque pertinentes.
- d) N. alceolaris posterior (Tab. VI. Fig. 2 N:o 16) continuationem efficit nervi aque sub usse l'acrymali firamen intent maxillae superioris, ubi surculus mittit tenerrinus al partem posteriorem marginis alve luris maxillae superioris pertinentes.*)
- c) Ramus tertius s. maxillaris inferior, (Tab. VI. Fig. 2 No. 17) daubus ceteris ramis nervi trigemini, quanum mentinam jum terimus, major, e gangilo semilunasi, uti supra jam explicavimas, reseitur trunco cum rama secundo communi. Angulo acuto

^{*)} A. Ritzelio nervus maxillaris lateralis appellatur nervus de quo queritur, qui tamen l. c. p. 17 statuit nervum honca in notatoribus tantum aderse.

a ramo secundo nervi trigemini deorsum paullumque extrorsum discedens, in fossa temporali inter musculum pterygoideum externum et temporalem progreditur, ubi in quinque ramos, n. pterygoideum externum, temporalem posteriorem et anteriorem, alveolarem inferiorem atque buccinatorium dispescitur.

- a) N. pterygoideus externus (Tab. VI. Fig. 2 N:o 18), ramus tenerrimus, eo fere loco, ubi e ramo secundo nervi trigemini discessit nervus maxillaris inferior, interdum etiam e trunco communi rami secundi et tertii nervi trigemini oriundus, in adversum et extrorsum ad musculum pterygoideum externum pergit.
- b) N. temporalis posterior (Tab. VI. Fig. 2 N:o 19) e posteriore margine nervi maxillaris inferioris in fossa temporali nascitur surculosque mittit ad partem posteriorem musculi temporalis.
- c) N. temporalis anterior e nervo prope originem rami praecedentis ortum ducit, atque rectâ et extrorsum ad partem anteriorem musculi temporalis tendit.
- d) N. alveolaris inferior, (Tab. VI. Fig. 2 N:o 20) omnium ramorum, qui e nervo maxillari inferiore prodeunt, maximus, sub angulo acuto deorsum et extrorsum a praecedente inter musculum pterygoideum externum et temporalem discedit, atque ulterius in superficie interna maxillae inferioris ad aperturam

procedit.)

In hoe decursu rami sequentes e nervo alveolari inferiore produent:

- a) R. communicans cum nervo cutaneo anteriore (Tab. VI. Fig. 2 N:o 21), ramus tenerrimus, qui, ab anteriore margine norvi, mbi is al marginem anteriorem musculi pterygoidei externi paredit, exsistens, oblique super musculum pterygoideum externum porrigitur. In adversum nervus noster ad angulum oris progreditur, ubi cum nervo cutaneo anguli oris anteriore coalescit plexumque format anguli oris, de quo supra jam locuti sumus.
- 3) R. R. dentales, surculi tenerrimi, qui e nervo in camili alventari procedente nascuntur, atque al marginem superiorem maxillae inferioris pertinent.
- 7) N. mylohyoideus (Tab. VI. Fig. 1 N:o 22) ab inferiore margine nervi, ubi ad superficiem externam et membranam foraminis ovalis maxillae inferioris progreditur, oriundus in canuli mylohyoiden.) al superficiem internam maxillae inferioris porrigitur. Juxta originem musculi mylohyoidei in adversum per-

^{*)} Chordam tympani cujus ope n. alveolaris inferior connexum habet cum nervo faciali, et de qua loquitur Platner in opere Ueber das Quadratenbein inscripto pag. 38 in Corvo cornice observare mihi non contigit,

^{**)} Ita canalem osseum maxillæ inferioris cujus apertura interna in margine interno foraminis ovalis maxillæ inferioris est sita, appellamus.

git et plures surculos ablegat, qui in musculum mylohyoideum abeunt. Praeter surculos ad musculum allatum pertinentes, nervus noster ramum submentalem gignit.

- γ΄) R. submentalis (Tab. VI. Fig. 1 N:0 23) in superficie interna musculi mylohyoidei prorsum ad angulum rostri inferioris pergit, ubi surculos gignit tenerrimos qui ad cutem anguli allati atque cutem corneam superficiei internae maxillae inferioris pertinent.
- e) N. buccinatorius, (Tab. VI, Fig. 2 N:o 23) qui omnium ramorum n. maxillaris inferioris maxime introrsum infra musculum pterygoideum externum tendit atque circa marginem internum ossis quadrati se flectit. Hinc infra musculum pterygoideum internum ad superficiem internam et articulationem maxillae inferioris porrigitur atque in musculum buccinatorem abit.*)

Sequentes e. n. buccinatorio prodeunt rami.

- a) N. pterygoideus internus (Tab. VI. Fig. 2 N:o 24) ramus tenerrimus qui, e nervo, ubi circa marginem anteriorem ossis quadrati sese flectit, oriundus, prorsum et extrorsum in musculum pterygoideum internum abit.**
- VI. Nervus abducens (Tab. VI. Fig. 1 N:o 25) Nervis motoriis oculi, quorum mentionem supra fecimus, minor per ca-

^{*)} N. buccinatorius saepe una cum nervo temporali e. n. maxillari inferiore nascitur vid. Fig. 2:dam Tabulæ III. N:o 23.

^{**)} N. pterygoideus internus saepe e trunco nervi maxillaris inferioris ortum ducit, ut etiam e fig. II:da Tabulæ commemoratæ colligere potes.

nalem osseum, in basi cranii situm, in adversum procedit atque for men singulare paullo infra foramen opticum intrat. Heic, in orbita protsum inter nervum opticum atque originem musculi re il externi parrectus, plures ablegat surculos brevissimos, usque ad musculum rectum oculi externum diffusos. In hoc decursu sequentes gignit ramos:

- A) R. ciliarem (Tab. VI. Fig. 1 No 26), qui e nervo, paullo antequam is surculos progignit ad musculum rectum externum pertinentes, criumlus, per telam adiposam prorsum procedit, mox vero cum ramo ciliari n. ophtalmici coalescit, qui quislem trumcus ciliaris nervi trigemini et abducentis in truncum ciliarem externum ganglii ciliaris transit.
- B) R. ad musculum quadratum (Tab. VI. Fig. 1 No. 27) qui inter musculus rectos oculi in orbita progreditur atque in musculum quadratum membranae nictitantis abit.
- eundem servat decursum atque in musculum allatum abit. *)
- VII. Nereus facialis (Tab. VL Fig. 4 N:o 5) Radices nervi facialis in truncum coalescunt, qui, in sulco marginis anterioris nervi acustici, quocum ope telae cellulosae atque ramonum communicantium est conjunctus, procedit. Quad vero atti-

^{*)} Ramos nervi abducentis ad musculos membranæ nictitantis Schlemmins I. c. p. 19 primus detexit et descripsit. Saepe nervi allati, ut monet Schlemmins, trunco communi e nervo abducente nascuntur.

net ad connexum illum inter nervum facialem et acusticum difficile omnino est dijudicatu, utrum fibrillae ramorum communicantium sint nervo faciali an nervo acustico tribuendae, at docuerunt tamen nostrae disquisitiones, fibrillas istas maximam partem e nervo acustico in nervum facialem abire, quare etiam interdum nobis visi sunt rami ad canales semicirculares e nervo
faciali prodire, uti monet *Triviranus* quoque *) qui ramos canalium semicircularium ramos esse putat nervi facialis, apud Strigem otum et Ardeam cineream.

In meatu auditorio interno una cum nervo acustico decurrit nervus facialis, sed e nervo acustico prorsum ad aperturam superiorem canalis Fallopii discedit ubi in ganglion geniculum **) (Tab. VI. Fig. 4 N:o 10) quadantenus intumescit, et, ramo communicante ad nervum nostrum sphenopalatinum progenito, retrorsum flectitur nervus facialis, usque ad canalem vidianum superiorem atque totus, quantus est, in nervum recurrentem n. trigemini abit, ita tamen ut fibrillas nervi facialis, quae albo colore sunt imbutae, usque ad ramum externum nervi recurrentis, de quo supra jam locuti sumus, possimus persequi.

In hoc decursu e nervo faciali sequentes rami prodeunt:

^{*)} Ueber die Verbreitung des Antlitznerven im Labyrinthe des Ohrs der Vögel. Vide Tide manni et Trevirami Zeitschrift für Physiologie, Heidelberg et Leipzig 1833, Bd V. H. 1 pag. 96. Hanc nervi facialis distributionem in labyrintho auris celeberrimus Stannius l. c. p. 284 apnd aves in universum habere locum, jure non affirmat.

^{**)} Interdum ganglion hocce geniculum non observavimus.

- A) R. petrosus superficialis major inferior (Tab. VII. Fig. 1 N:o 29), (s. r. communicans cum nervo sphenopalatino) ramus tenerrimus qui, e ganglio geniculo oriundus, canalem tenerrimum osseum intrat, atque, in adversum porrectus, eo loco, quo n. sphenopalatinus in ramos pterygopalatinum et nasopalatinum nostrum Séärpae discedit, cum nervo commemorato coalescit.
- B) R. petrosus superficialis major (Tab. VI. Fig. 4), ramo praecedente minor, in canali vidiano in adversum procedit atque mox in ramum recurrentem abit, ubi fibrillae, ad ramum, de quo quaeritur, pertinentes, intra vaginam nervi verosimile ad ganglion sphenopalatinum tendunt.
 - B) R. digastricus (Tab. VII. N:o 6).
- C) R. stylohyoideus (Tab. VI. Fig. 3 N:o 1) de quibus vide supra pag. 515, ubi de nervo recurrente rami secundi nervi trigemini locuti sumus.
- VIII. Nervus acusticus, (Tab. VI. Fig. 4 N:o 7) qui, nervo praecedente aliquanto major, una cum nervo faciali in meatu auditorio interno procedit, uti supra jam monuimus, ramis communicantibus cum nervo faciali est conjunctus, et in duos ramos diffunditur r. cochleae dico et vestibuli s. r. internum et externum.
- A) R. internus s. cochleæ, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 47) ramo vestibuli major, retrorsum et introrsum e nervo vestibuli

tendit atque cochleam intrat, ubi surculos mittit tenerrimos, ad ampullam membranaceam cochleae pertinentes.

- B) R. vestibuli*, ramo cochleae aliquanto minor et mollis consistentiae, extrorsum ad vestibulum tendit, ubi in tres ramos dirimitur, qui quidem omnes canales semicirculares intrant, et surculos ablegant, ad canales semicirculares membranaceas extentos.
- a) R. ad canalem semicircularem superiorem (Tab. VI. Fig. 4 N:0 8) e vestibulo mox sursum tendit ad ampullam canalis semicircularis superioris, quam intrat et surculos emittit ad ampullam membranaceam canalis semicircularis illius, de quo agitur.
- b) R. ad canalem semicircularem inferiorem (Tab. VI. Fig. 4 N:0 9) ramus brevissimus, qui, more rami praecedentis, canalem semicircularem intrat, sed paullo post etiam.
- a) Ramum ad canalem semicircularem externum ablegat, ad canalem semicircularem externum usque porrectum.

IX. Nervus Glossopharyngeus. (Tab. VI. Fig. 1 N:o 28) Radices Glossopharyngei, juxta radices nervi vagi e medulla oblongata prodeuntes, truncum formant ejusdem fere magnitudinis ac nervus abducens. Intra cavitatem cranii ille, de quo quaestio

^{*)} Sape pro r. vestibuli duo rami e nervo acustico, vel margine posteriore nervi facialis, originem ducunt et ad vestibulum tendunt, quorum alter canalem semicircularem superiorem, alter vero canalem semicircularem inferiorem intrat,

est, in margine anteriori nervi yagi, eum quo etiam connexus esse videtur, ad foramen jugulare procedit, ubi lamina ossea tenuissima, saepe vero fibrosa, e nervo vago secretus ") in ganglion jugulare seu Mülleri (Tab. VI. Fig. 1 N:o 29) ") intumeseit, quod quidem ganglion, ad marginem anteriorem ganglii radicis nervi vagi situm, ramo communicante cum hoc ganglio conjunctum est em). Igitur nervus noster e ganglio jugulari ortus, foramen jugulare permeat atque deorsum tendit ad superficiem externam ganglii cervicalis supremi quocum etiam intime est conjunctus *****) ramoque communicante nervi vagi brevissimo, sed nervo glossopharyngeo majore, augetur. Mox vero nervo huic de quo agitur, ramus internus nervi recurrentis (vid. Tab. VI. Fig. 2 N:o 5) incrementum affert, qui quidem ramus angulo acuto cum trunco nervi glossopharyngei conjungitur. In ipso angulo ganglion occurrit triquetrum atque rubicundi coloris, quod cum ganglio petroso hominis et mammalium est comparan-

o) Si nervos cerebrales ab interna parte præparaveris truncus nervi glossopharyngei in conspectum haud venit, nisi elevato ganglio cervicali supremo.

^{°°)} Nonnisi in latere dextro capitis, quod exhibet figura, ganglion allatum conspicuum est, et quidem magnitudinis triplo majoris.

^{***)} Ramum tenerrimum e ganglio hocce prodeuntem et per os temporum versus cavitatem tympani procedentem sæpe observavi, sed ulteriorem decursum hujus nervi explicare mihi non contigit.

[&]quot;") Connexum huncee, de quo secundum nostras disquisitiones persuasum nobis est, Treviranus 1. c. pag. 96 denegat. Ritzel vero 1. c. pag. 23 affirmat.

dum, e quo nervus glossopharyngeus arcte ad superficiem internam arteriae maxillaris internae pergit, mox vero in ramum pharyngeum et lingualem dirimitur.

Ganglion petrosum n. glossopharyngei (Tab. VI. Fig. 2 N:o 22) formam praebet irregulariter triquetram, et in ipso angulo, quo nervus glossopharyngeus cum ramo interno nervi recurrentis s. vidiani superioris coalescit, atque ad inferiorem marginem ganglii cervicalis supremi situm est.

Ganglion hocce ramis communicantibús cum ganglio cervicali supremo atque cum ganglio radicis nervi vagi intime est connexum.

E nervo glossopharyngeo sequentes rami nascuntur:

- A) R. pharyngeus s. posterior*) (Tab. VI. Fig. 1 N:o 30) ad maximam partem fibras, e nervo vago derivandas, continens, ut jam Stannius l. c. observavit, et ejusdem fere magnitudinis cum ramo linguali, retrorsum paullumque deorsum partem superiorem oesophagi versus tendit, ubi in tres ramos discinditur.
- a) R. pharyngeus s. strictiore ejusdem fere magnitudinis cum ramo linguali s. anteriore retrorsum et paullum deorsum partem posteriorem pharyngis versus tendit, ubi, ramulis ad membranam mucosam pharyngis ablegatis, ulterius uti b) ramus æ-

^{°)} Ramus noster pharyngeus apud Sieboldium et Stannium sub rami descendentis nomine occurrit, vide libr. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie inscriptum Berlin 1846 pag. 285.

sephageus superior s. de condens (Tab. VI. Fig. 1 No. 31), in stratum musculare oesophagi abit.

- qui, surculo tenerrimo sympathico e ganglio cervicali supremo prodeunte au tus, in membranum mucosam pharyngis protenditur surculosque mittit tenerrimos ad membranam illam mucosam atque papillas partis posterioris palati.
- B) R. lingualis, (Tab. VI. Fig. 1 Nio 33) continuation bervi, de que explicamus, in adversum, arteria linguali comitatus, linguam versus partizitur, atque in ramos, duos, ramum lingualem dico atque laryngeum superiorem, discedit.
- a) R. lingualis sens. strict. (Tab. VI. Fig. 1 Nio 34) per angulum acutum a ramo sequente deorsum atque antrorsum, super comunessis hypidei, al radicem linguae discedit. Hinc in adversum flectitur nervus et, ablegatis surculis tenerrimis ad cutem linguae hus pertinentem, ad marginem linguae procedit atque in cutem et papillas dorsi linguae dispertitur.
- ramo praecedente aliquanto minor, fibras continet primitivas, ut nobis saltem visum est, ad ramum communicantem nervi vagi cum trava elessa plarymente cujus mentionem supra jam fecimus. diffusos. Oblique supra ramum lingualem nervi vagi sub cornu ossis hyoidei ad laryngem procedit, ubi, emissis ramis tenerrimis ad papillas membranae mucosae circa rimam glottidis atque partem pesteriorem lorsi linguae. Laryngem intrat surculosque gig-

nit tenerrimos ad superficiem internam laryngis superioris per-

X. Nervus vagus s. pneumogastricus (Tab. VI. Fig. 1 N:o 36 Tab. VII. Fig. 1 N:o 19) Excepto nervo trigemino et optico omnium nervorum cerebralium maximus, ad aperturam internam foraminis jugularis procedit, et in ipso foramine in ganglion radicis nervi vagi intumescit, quod quidem ganglion ramo communicante tenerrimo cum ganglio cervicali supremo nervi sympathici est connexum. Per foramen jugulare e cavitate cranii egressus nervum accessorium Villisii accipit, et ad externam superficiem ganglii cervicalis supremi oblique supra carotidem ad venam jugularem internam decurrit, ubi nervo hypoglosso augetur. Ramo communicante sat crasso ad ganglion petrosum nervi glossopharyngei ablegato, ubi etiam in plexum ganglioformem paullulum intumescit, sub glandula submaxillari atque vagina cellulosa cum vena jugulari interna conjunctus, ramum cardiacum longum e ganglio cervicali supremo accipit*) et juxta marginem oesophagi deorsum ad plexum brachialem procedit. Inter plexum brachialem et carotidem cavitatem pectoris intrat, magisque introrsum infra arteriam subclaviam inter bronchum et venam subclaviam atque arteriam pulmonalem ad diaphragma tendit. Diaphragmate perforato in superficie anteriore ventriculi glandularis, ad nervum vagum lateris oppositi magis magisque appropinquant nervi, vagi utriusque lateris et angulo acuto inter se coalescunt, qui quidem truncus

^{°)} Vide infra, ubi ramorum ganglii cervicalis supremi mentionem facimus.

communis nervorum vagorum ad ventriculum muscularem por-

Ganglion radicis (Tah. VI. Fig. 1 No. 37) in immine jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion, internessentiam process value.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion, internessentiam process value.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion, internessentiam processor.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibrosa inclusion.

Jugulari situm atque vagina fibro

R. auricuralis? quem quidem teneminum e murgine in-

Plexus ganglioformis nursi cagi (Tab. VL Fig. 1 No. 14) have some all the second control of the second control

- A) R. R. communicantes cum ganglio cercicali supermo, (Tab. VI. Fig. 1 No. 45) 2 vel 3 rami brevissimi, qui, e margine anteriore nervi vagi prodessate, moz in marginem posteriorem ganglii cervicalis supremi discedunt.
- C) R. communicate ad acreum giourglarya general. Tab. VL Fig. 1 No 40) hand enique magnitudinis, e margine proceriore nervi vagi oriundus, moz în nervum glassophurpagenum abic. Un nostrae sultem disquisitiones docuerum, nervus, de quo agi-

tur maximam vero partem fibras continet quae, ad ramum internum nervi recurrentis pertinentes, ganglion petrosum glossopharyngei tantummodo permeant et per ramum communicantem de quo quaeritur, in truncum nervi vegi et quidem ramum illius lingualem abeunt.

- D) R. laryngo lingualis *) (Tab. VII. Fig. 1 N:0 7) hand parvus, fibrillas continet all nervum hypoglossum, nervum recurrentem secundi nervi trigemini et nervum vagum pertinentes. E margine interno nervi vagi, nascitur nervus de quo quaeritur et. inter cornu ossis hyoidei et cesophagum, introrsum ad laryngem procedit, ubi in duos ramos sese dividit. ramum lingualem dico et laryngeum superiorem.
- a) R. lingualis **), (Tab. VII. Fig. 1 N:08 Tab. VI. Fig. 3 N:06 & 7) haud exiguae magnitudinis, angulo obtuso a ramo laryngeo in adversum inter cornu majus ossis hyoidei et laryngem discedit. Hino porro eodem cursu al superficiem inferiorem linguae progreditur, atque angulo acuto cum ramo eodem lateris oppositi coalescit, truncumque format communem, qui, eandem servans directionem, in media parte superficiei inferioris linguae ramos ablegat ad cutem linguae, usque al apicem se extendentes.

e) Ita hunc ramum appellare juvat, quia exceptis ramis museularibus, qui nervo hypoglosso ab origine sunt tribuendi, in duos dirimitur ramos lingualem et laryngeum superiorem, ramo linguali nervi trigemini et laryngeo superiori nervi vagi apud hominem et mammalia comparandos.

o) Stannius l. c. p. 285 hujus rami mentionem facit uti rami nervi hypoglossi, quam sententiam etiam fouet Bamberg l. c. p. 30.

In hoc decursu rami musculares, a nervo hypoglesso diffusi, excistuat, hemque rami oriuntur terminales, sensitivae indolis, qui nobis judicibus e ramo recurrente nervi maxillaris superioris sunt derivandi.

Rami musculares:

- a) R. ad membranam mucosam faucis, qui e nervo linguali, ad latus externum laryagis, oriumlus, ablique supu. massulum sternohyrideum in membranam musesam laris suque museulum nuperrime allatum abit.
- β) R. sternohyoideus ramus tenerrimus qui, ablegato ramus parendente, mos e mervo linguali criundus ramulos minit el musculum sternohyoideum.
- 7) R. hyoglossus, (Tab. VI. Fig. 3 N:o 10) ejusdem bere imignilis linis com mano practedente, inter musallum ceratorii sum et hynghesium recitum princelle surcul sque tenerrinas gignit qui in musculum hyoglossum rectum abeunt.
- e nervo prodiens, mox in musculum ceratoglossum abit.

Rami terminales sensitiva indolis:

c) R. terminalis lateralis, (Tab. VI. Fig. 3 N:o 9) qui quidem in utroque latere linguae e trunco communi nervorum lingualium ad basin linguae oriundi, ramos ad cutem corneam superficiei superioris linguae pertinentes ablegant.

- β) R. terminalis medius, (Tab. VI. Fig. 3 N:0 8), praecedente major, in superficie inferiore linguae in adversum usque ad apicem linguae porrigitur.
- b) R. laryngeus superior, (Tab. VII. Fig. 1 N:0 9)*) haud exiguae magnitudinis, ad latus externum laryngis angulo obtuso e ramo linguali ad marginem externum tracheae discedit, unde deorsum, usque ad laryngem inferiorem progreditur. Antequam laryngem inferiorem assecutus est nervus, in duos ramos ejusdem fere magnitudinis, ramum externum et internum, dirimitur.
- a) R. externus (Tab. VII. Fig. 1 N:o 10) juxta arteriam laryngeam inferiorem deorsum et extrorsum in musculum furculotrachealem et sternottrachealem abit atque ramo tenerrimo cum nervo laryngeo inferiore coalescere videtur.
- β) R. internus (Tab. VII. Fig. 1 N:o 11) eundem decursum cum nervo laryngeo servans, ad bifurcationem tracheae tendit ubi ramos ablegat tenerrimos ad superficiem internam laryngis inferioris diffusos.
- E) R. recurrens s. laryngeus inferior, (Tab. VII. Fig. 1 N:o 12) ab interno margine nervi, paullo antequam is in cavitate pectoris supra bronchum porrigitur, oriundus, deorsum et introrsum

o) Stannius I. c. p. 285 jure ramum laryngeum superiorem, ramum nervi hypoglossi putat, quam sententiam etiam nos fovemus, quia fibrillas nervi hypoglossi in ramum commemoratum descendere vidimus.

tendit, mox vero rimum cardianum et in erdum rumum primonalem gignit suque sursum flections laryngem inferierem versus, ubi in ramos dispertitur ad inferiorem partem tracheae et sesophici perimentes, a mumique minit e minimicantem, qui com ramo externa nervi laryngei superioris confessit.

- chum le ream et interesum temin, originem etterie esta invice versus, ubi ad cor procedit.
- nerrimus qui, e nervo recurrente vel ramo cardiaco oriundus, in pulmonem abit, sed saepe desideratur.
- F) R. R. pulmonales, (Tab. VII. Fig. 1 No 15) 2—3 rami brevissimi, qui, e margine externo nervi vagi, ubi supra bronchum procedit, orti, ramis communicantibus ad formam plexus secum invicem comjunei. succello allegani tenerim ad pulmonem. Praeter surculos hosce ad pulmonem pertinentes, 2—3. ramos cardiacos inferiores etiam gignunt, qui juxta venam cavam inferiorem, in cor abeunt.
- G) R. R. hepathici 2 rami tenerrimi qui, e margine interno neral y gi. aki dia la guar perforas, prodeuna arque la capsula Glissonii introrsum ad hepar tendunt.
- H) R. R. gasteici glandulares (T. N. VII. Fig. 1 No. 17) qui ab externo margine nervi vagi nascuntur aque al ventriculum glandularem pertinent.

- I) R. R. gastrici musculares (Tab. VII. Fig. 1 N:o 18) qui ramos terminales nervi vagi utriusque lateris efficiumt, atque deorsum in superficie anteriore ventriculi glandularis porrecti in ventriculum muscularem abeunt.
- XI. Nervus accessorius Villisii, *) omnium nervorum cerebralium Corvi Cornicis sine dubio minimus, a posteriore parte medullae spinalis supra radices nervi cervicalis tertii oriundus et tres radiculas e medulla oblongata accipiens, sursum versus foramen magnum ad radices nervi vagi tendit, quo in decursu tribus radiculis e medulla spinali augetur atque totus in ganglion radicis nervi vagi abit, ubi quae sint fibrillae n. accessorii propriae, omni cura adhibita, tamen explicare nobis non contigit.
- XII. Nervus hypoglossus (Tab. VI. Fig. 1 N:o 52) e medulla oblongata ortum ducit et per foramen condyloideum e cavitate cerebri egreditur. Infra musculum rectum capitis anticum majorem, ad marginem posteriorem carotidis porrectus mox in

o) Egregie jam et pro more suo accurate Celeb. Bischoff, in opere quod inscribitur: Nervi accessorii Villisii anatomia et physiologia Darmstadii MDCCCXXXII, hunc nervum descripsit, qualis est in Ciconia alba, Ansere, Falcone Buteone, Strige scope, Columba cenate, Gallina et Psittaco æstivo, ut vix quidquam novi addere possimus, at vero ramus, quem apud Ciconiam in Tabula III, Fig. 1:ma X:o 7 uti ramum n. vagi ad musculos colli descripsit, et ramo externo n. Accessorii respondere putat, secundum nostras investigationes, est r. externus vel digastricus n. vidiani superioris, cujus fibrillæ a nervo faciali, qui in canali vidiano cum ramo recurrente n. trigemini coalescit, sunt derivandæ. Vide Librum Bischoffii supra allatum pag. 41.

truncum nervi vagi abit, fibrillasque mittit, quae, intra vaginam nervi vagi ad ramum laryngo-lingualem nervi nuperrime allati tendunt.

Antequam nervus hypoglossus cum nervo vago coalescit, ramum sympathicum accipit e ganglio cervicali supremo, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 55) ramosque gignit sequentes:

- A) R. communicantem cum nervo cervicali primo qui, e nervo hypoglosso paullo infra foramen condyloideum oriundus, deorsum inter musculum rectum capitis anticum majorem et longum colli procedit, atque cum ramo anteriore nervi cervicalis primi coalescit.
- B) R. ad musculum rectum capitis anticum (Tab. VI. Fig. 1 N:o 46) qui, e margine anteriore nervi hypoglossi paullo antequam cum nervo vago coalescit, oriundus, mox in musculum rectum capitis anticum majorem abit. Ulteriorem decursum nervi hypoglossi vide supra, ubi de ramo laryngolinguali nervi vagi locuti sumus.

Pars cephalica nervi sympathici. Funiculus cervicalis nervi sympathici, in canali vertebrali cum singulis nervis cervicalibus connexus, sursum tendit ganglionque format triquetrum in singulis nervis cervicalibus adnexum. E canali vertebrali egressus funiculus noster ad superficiem internam carotidis procedit, mox (vid. Tab. VI. Fig. 1) vero in duos dirimitur ramos, qui, ramis communicantibus tenerrimis secum invicem conjuncti, in superficie interna carotidis proceptant, atque tandem in marginem

inferiorem ganglii cervicalis supremi abeunt, quod quidem ganglion more solito originem partis cephalicae nervi sympathici putamus.

Ganglion cervicale supremum, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 48) infra foramen jugulare ad superficiem internam nervi vagi et glossopharyngei atque carotidis situm, et haud exiguae magnitudinis, formam praebet semilunarem vel triquetram quam e figura prima tabulae allatae facile potes percipere. Ganglion hocce, ramis communicantibus cum plerisque nervis cerebralibus connexum, fibrillis nerveis nervo vago, glossopharyngeo, et n. recurrenti rami secundi nervi trigemini propriis, nobis judicibus, re vera augetur, quamvis nobis non licuerit fibrillas hasce satis certo investigare. Ramos itaque communicantes inter ganglion allatum atque nervos cerebrales, quos observare nobis contigit, uti e ganglio cervicali supremo prodeuntes definimus.

Rami hi e ganglio cervicali supremo nascuntur:

- a) R. pharyngeus, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 57) ab angulo inferiore ganglii oriundus, in superficie interna arteriae maxillaris internae, introrsum procedit atque in membranam mucosam faucium abit, ubi ramo pharyngo-palatino nervi glossopharyngei conjungitur.
- b) R. communicans ad nervum vagum s. n. cardiacus longus,? (Tab. VII. Fig. 1 N:o 26) ramorum qui e ganglio cervicali nascuntur maximus, e margine inferiore ganglii oriundus, deor-

sum juxta carotidem procedit et totus quantus in truncum cervicalem nervi vagi abit. °)

- c) R. ad ganglion petrosum glossopharyngei, ramus brevissimus qui, e margine posteriore ganglii oriundus, mox in ganglion petrosum abit.
- d) R. R. communicantes ad plexum ganglioformem nervi vagi, (Tab. VI. Fig. 1 N:0 45) duo vel tres rami brevissimi, qui e margine posteriore ganglii cervicalis nascuntur, et retrorsum procedentes, in plexum ganglioformem nervi vagi abeunt.
- e) R. communicans ad nervum hypoglossum (Tab. VI. Fig. 1 N:o 55) e margine superiore ganglii oriundus sursum tendit nervum hypoglossum versus quocum coalescit.
- f) R. petrosus profundus, e margine superiore ganglii prodiens, mox cum nervo recurrente rami secundi nervi trigemini coalescit fibrillasque sine dubio mittit, intra vaginam nervi allati procedentes, ad ganglion sphenopalatinum.
- 2) N. sphenopalatinus, cee (Tab. VI. Fig. 1 N:o 49 Fig. II. N:o 16) omnium ramorum, qui e ganglio cervicali supremo

^{*)} Quia fibrillas hujus nervi intra vaginam nervi vagi ad ramos cardiacos nervi vagi tendere opinamur, ramum ganglii cervicalis supremi allatum, nervo cardiaco longo apud hominem esse comparandum putamus.

^{***)} Ramus hicce itaque est radix sympathica ganglii sphenopalatini. E. H. Weber in opere, Anatomia comparata nervi sympathici, inscripto, ramum huncce uti ramum primum e ganglio cervicali supremo prodeunte descripsit et in tabula XII. sub. N:o 18 depinxit, ramum nostrum recurrentem totum uti ramum e ganglio commemorato putavit.

^{***)} Vide E. H. Weber I. c. pag. 27.

prodeunt, longe maximus, fibrillas continet quae ad maximam saltem partem a ramo interno nervi recurrentis sunt derivandae, quae quidem, ganglion allatum permeantes, cum fibrillis rubicundi coloris, e ganglio cervicali supremo sinc dubio ortis, commixtae in nervum nostrum sphenopalatinum abeunt. E margine anteriore ganglii cervicalis supremi oritur nervus, de quo quaeritur, et canalem pterygopalatinum *) intrat, ubi, arteria pterygopalatina (!) comitatus, in adversum ad aperturam anteriorem canalis allati porrigitur. In canali pterygopalatino procedens ramo communicante nervi facialis augetur, atque mox in duos ramos dirimitur, qui quidem, in canali allato, ope telae cellulosae connexi, ad aperturam anteriorem canalis a se invicem discedunt, quorum alter, externus s. pterogypalatinus, extrorsum ad inferiorem superficiem orbitae, alter vero internus s. r. nasopalatinus Scarpæ, introrsum supra os pterygoideum tendit.

α) R. pterygopalatinus, (Tab. VI. Fig. 1 N:o 59 Tab. VII. Fig. 2 N:o 9) ramo superiore aliquanto minor, et eandem servans directionem cum nervo sphenopalatino, infra os pterygoideum, inter partem inferiorem bulbi oculi et musculos palati, in adversum ad aperturam posteriorem cavitatis nasi tendit, ubi, infra concham superiorem ulterius procedens, ramulos gignit tenerrimos, qui in membranam mucosam nasi huc pertinentem abeunt.

^{*)} Ita canalem huncce in parte inferiore ossis sphenoidei et partis basilaris ossis occipitis situm, cujus apertura anterior pone os pterygoideum est conspicua, appellare juvat.

In hoc decursu e nervo pterygopalatino sequentes rami prodeunt:

- α') R. R. palatini (Tab. VI. Fig. 1 N:o 61) 2 ramuli qui, e nervo, ubi in inferiore parte orbitae procedit, oriundi, musculos palati perforant et in membranam mucosam papillasque palati abeunt.
- e") R. orbitalis (?) qui, ablegatis ramis palatinis, introrsum in superficie inferiore orbitae infra bulbum oculi tendit, cujus tamen ulteriorem decursum explicare nobis non contigit, quia ramus de quo quaeritur est tenerrimus et mollior quam alii nervi cerebrales, quam ob causam vix dubitaverim hunc ramum indolis esse sympathicae, qui verosimiliter cum nervo infraorbitali vel lacrymali coalescit. Si occasio fuerit nervos cerebrales avium majorum, quam est Corvus Cornix, examinandi, forsan hanc, quaestionem solvere nobis contigit.
- β) R. nasopalatinus Scarpae (Tab. VI. Fig. 1 N:o 60 (Tab. VII. Fig. 2 N:o 10), ejusdem fere magnitudinis cum ramo pterygopalatino, e quo angulo acuto ad canalem osseum in corpore ossis sphenoidei situm discelit. E canali commemorato egressus mox ramulo sympathico (?) tenerrimo, qui canalem proprium ossis sphenoidei permeat, augetur et prorsum ad superficiem internam septi narium porrigitur. Hinc nervus noster ulterius supra internam superficiem rami inferioris nervi oculomotorii et glandulae Harderi sursum, superficiem inferiorem ossis intermaxillaris versus atque ad nervum lateris oppositi magis magisque

appropinquans, procedit, cujus tamen decursum ulteriorem persequi non potuimus.

In hoc decursu eo loco, quo ad superficiem internam glandulae Harderi porrigitur, ramos duos vel tres tenerrimos in glandulam allatam dispergere videtur.

Cap. II.

Absolutis sic quidem disquisitionibus nostris anatomicis nervorum cerebralium, nosmet ad differentiam, quae intercedit nervos cerebrales hominis et Corvi Cornicis, atque ad vim quam exercent physiologicam, breviter explicandam conferimus, qua in materia tractanda ad periphericam nervorum distributionem animum tantum advertimus.

I. Nervus olfactorius Corvi Cornicis, quod ad distributionem periphericam attinet, a nervo eodem hominis non differt, nisi nervi olfactorii decursum ad cavitatem nasalem diversam putaveris, eo ex capite quod non pluribus ramulis, sed ipse per se truncus e cavitate cranii in cavitatem nasi egreditur, ubi demum more solito ramulos dispergit in membranam mucosam labyrinthi nasalis. Eandem habet vim physiologicam, quippe quum nervus sit mere sensualis, qui impressiones odoris tantum excipit et ad cerebrum promovet.

II. Nervus opticus a nervo eodem apud hominem non differt, et eandem habet vim physiologicam, quam nervus sensualis organi visus.

III. Nervus oculomotorius neque quod ad distributionem ejus periphericam in musculis bulbi oculi, nec quod ad vim illius physiologicam attinet, ab eodem nervo apud hominem et mammalia differt. Est enim nervus motorius musculorum bulbi oculi atque iridis in quos surculos dispertitur, ut jam monet Celeberrimus Valentinius*). Differt vero ganglion ciliare Corvi cornicis eo quod, praeter ramum ciliarem nervi ophthalmici, qui sensibilitati iridis sine dubio praeest, etiam ramum motorium accipit e nervo abducente, qualis connexus inter ganglion commemoratum et nervum abducentem apud hominem et mammalia non adest. Sed animum ad id attendentes, quod omnes iridis motus apud hominem et mammalia, monente Valentinio, 40) sunt automatici, et quod teste Celeberrimo Stannio ***) motus iridis avium, a quantitate lucis in iridem vel retinam incidentis non pendentes, voluntarii sunt, ramum huncce nervi abducentis al garglion ciliare motibus voluntariis iridis imperare verosimillimum pulamus.

^{*)} Vide Librum ejus de functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici, ed. Bernæ 1839, pag. 18,

^{**)} l. c. pag. 20.

^{***)} Cfr. Librum ejus, Lehrbuch der vergleich. Anat. inscriptum, quem supra sæpe citavimus, pag. 292.

IV. Nervus trochlearis, nervus motorius musculi obliqui superioris, nihil omnino neque ad distributionem anatomicam nec ad vim physiologicam a nervo eodem hominis et mammalium habet diversum, nisi quod n. n. tentorios, quorum ope nervus trochlearis apud hominem et mammalia commercium habet cum nervo sympathico, in Corvo cornice non observavimus.

V. Nervus trigeminus uti apud hominem atque mammalia, ita apud Corvum Cornicem etiam ex duabus portionibus constat, quarum minor, motoriam exercens vim, in ramum tertium totus abit, major vero, quae sensoria praedita est facultate, fibrillas dispergit in omnes ramos nervi trigemini. Quod vero attinet ad distributionem periphericam ramorum nervi trigemini, mox, e descriptione nostra anatomica, colligere poteris, ramum primum et secundum Corvi Cornicis, quos cum ramis iisdem hominis et mammalium comparaveris, secum invicem quadantenus esse commixtos, quamquam haec commixtio minoris est physiologici momenti, quia rami allati, qui sunt in homine atque mammalibus. eandem exercent vim et hanc quidem sensoriam, id quod jam notissimum vivisectionibus a Valentinio ceterisque institutis, atque observationibus pathologicis satis superque comprobatum est. Sed singulos ramos nervi trigemini comparationis causa jam consideremus.

A) Ramus primus s. ophthalmicus apud Corvum Cornicem acque ac apud hominem et mammalia ramum emittit ciliarem

ad ganglion ciliare, nullos vero nervos ciliares longos, qui sine omni connexu cum ganglio commemorato, ad iridem tendunt. Veque nervum lacrymalem, qui in homine e ramo ophthalmico prodit, at in Corvo ramus est nervi maxillaris superioris, gignit nervus de quo agitur, sed ramum ablegat ad glandulam Harderi, qua caret homo, quae vero in quibusdam mammalium speciebus adest. In Corvo Cornice nervus ophthalmicus in duos ramos primarios discedit, ramum nasalem dico et ethmoidalem, quorum uterque vim exercet mere sensoriam. Adest quidem apud Corvum ramus frontalis, quem supra jam attulimus uti ramum nervi rusalis surculos dispergentem ad bulbum plumarum setacearum supra orificium nasi externum, quae quia magna copia nervorum sunt instructae, sine dubio apud Corvum eximiam facultatem habent impressiones tactus excipiendi et ad cerebrum promovendi. Praeterea nervus nasalis in Corvo, ut etiam in homine atque mammalibus, ramos ablegat ad membranam mucosam nasi, qui nulla facultate odores percipiendi praediti, monente Valentinio, sensoriae facultati membranae mucosae nasalis imperant. Quod denique ad nervum quem nervo ethmoidali aequiparandum putavimus, attinet, hie nervus a nervo codem hominis eximia magnitudine differt, cujus rei causa, nobis judicibus, in eo est quaerenda, quod nervus Corvi, de quo quaeritur, etiam nervis labialibus superioribus, qui apud hominem et mammalia e ramo secundo nervi trigemini prodeunt, et maximam copiam nervorum proebent labiis superioribus, est comparandus. Ramos labiales

superiores *) et nervum ethmoideum apud hominem et mammalia eandem vim sensoriam exercere perpendentibus nobis, satis superque patet nervos illos in Corvo caeterisque avibus, qui labiis sunt destituti, in unum nervum ethmoidalem coalescere. Persuasum igitur nobis habemus, nervum nostrum ethmoidalem fontem esse nervosum, cujus ope rostrum avium organon peculiare tactus evadit, quo quidem aves res externas percipere possunt, quodque iis, labiis et organo tactus digitorum manus carentibus, maxime est necessarium ad cibos rite cognoscendos et eligendos.**)

B) Ramus secundus s. maxillaris superior jam eo a ramo eodem apud hominem differt, quod trunco cum ramo tertio communi a Ganglio Gasseri ortum ducit, qualis conjunctio etiam in multis mammalium speciebus occurrit. Si vero animum ad singulos ramos nervi maxillaris superioris attendimus, magnam invenimus analogiam ramorum nervi ejusdem, qui sunt apud hominem et mammalia. Sic ex. gr. ganglion sphenopalatinum apud Corvum nostrum adest, quamvis minus videatur conformatum, si illud cum eodem ganglio hominis et mammalium comparaveris. Etiam nervus recurrens s. vidianus in Corvo exstat, et quidem majoris est ambitus, quam in homine, quia, ut supra jam in descriptione nostra anatomica monuimus, fibrillas

^{*)} Cfr. Tractatum Rappii qui inscribitur, Ueber die Verrichtungen des funsten Nervenpaars.

^{**)} Organon hocce in ordine Grallarum admodum excultum esse monet Stannius 1, c. pag. 283.

sensorias continet, quae in ramum lingualem n. vagi et hypoglossi atque sphenopalatinum ganglii cervic dis supremi abeunt;
um le etiam clucet, nervum, de quo quaeritur, ramo linguali et
sphenopalatino nervi trigomini, qui est apud hominem, esse aequiparendum, atque igitur ramum lingualem huncce etiam avibus
olatigisso, quamquam singularem servat decursum, quo magnopere
a ramo colem apud hominem et mammalia differt. Quod vero
ad ramum lingualem attinet qui in homine ramus est nervi maxillaris interioris, atque ope Chordae quam vocant tympani.

cum nervo faciali connexus est, nobis etiam adnotandum est, ramum huncre lingualem Corvi cornicis in canali nostro vidiano
cum nervo faciali, esse connexum atque intumescentiam ganglio-

[&]quot;) Chordam illam tympani de qua loquitur Platner in opere, quod inscribitur, Bemerkungen ueber das Quadratenbein und die Paukenhöhle der Vögel pag. 38, ubi hæc leguntur verba auctoris laudati: "Der eigenthümliche angegebene Verlauf des Nerven aber liess mich nicht in Zveisel, dass derselbe die Chorda tympani sei, und dass sich hier in der Classe der Vogel, wo der Zungenast des fünlten Nerven sehlt, die Analogie des Verlaufs bei den Saugethieren dadurch erhalte, dass die Vereinigung mit demselben Aste des Trigeminus erfolgt, welcher bei den Sängethieren den Zungenast abgibt", p. 39, et quam non cum ramo linguali, sed cum ramo alveolari interiore coalescere putat, omni cura adhibita observare mihi non contigit. Observavimns vas quoddam, sine dubio arteriam alveolatem inferiorem, quæ eundem habet decursum, quem Platner Chordæ tympani tribuit, quam ob rem crediderim arteriam nuperrime allatam forsitan esse Chordam tympani, quam commemorat Platnerus, In teenia VII. Lig. 2.0a No. 14 arteriam hance depirgendam curavimus.

formem totius nervi recurrentis (n. lingualis, sphenopalatini et facialis) in Corvo adesse, quam intumescentiam ganglio linguali s. maxillari hominis comparandam existimamus. Quemadmodum in ganglio maxillari fibrae sensoriae e ramo linguali nervi trigemini, motoriae e nervo faciali et organicae e ganglio cervicali supremo repetendae continentur, ita et omnes hae fibrae diversam omnino vim physiologicam exercentes, in intumescentia nostra ganglioformi adsunt. Quam vero vim exerceat ganglion linguale vel maxillare hominis, Physiologiae cultoribus non liquet, sed plurimi tamen illam fovent sententiam, ganglion hocce fontem esse nervosum glandulae submaxillaris, in quo diversae fibrae primitivae ganglii supra commemorati suam colligunt vim, ita ut fibrillae chordae tympani, quae motoriae sunt indolis,*) contractioni ductuum efferentium glandulae allatae imperent, fibrillae vero ganglii organicae secretionem biochemicam glandulae submaxillaris moderentur, quae sententia sine dubio cum natura universa fibrarum illarum diversarum bene congruit. Quia vero ex. gr. in ove ariete, secundum nostras investigationes, ganglion maxillare, quale in homine cernitur, non habet locum, verum ganglion chordae tympani apparet, **) liceat nobis hanc opinionem nostram proferre, ganglion allatum forsan vim ganglii sensualis habere, quo facultas sensoria linguae cum actionibus

^{*)} Cir Valentinium 1. c. pag. 34.

^{**)} Vide tractatum nostrum, Om Cerebralnerverne hos fâret (ovis aries) in Actis Societatis scientiarum Fenniæ Tom. II. insertum pag. 226 in notula.

musculorum faciei, quibus nervus facialis imperat, sit connexa, cujus tamen connexus ulteriorem explicationem in medio relinquimus. Persuasum nebis labemus, connexu physiologico nervum facialem, utpote motibus musculorum faciei imperantem, et plerosque nervos sensuales conciliari, quod in connexum illum anatomicum nervi facialis cum ganglio sphenopalatino, otico, maxillari atque nervo acustico et glossopharynges bene cadit. Quemalmolum enim nervus trigeminus, qui sensoria facultate praeditus est, ramos in omnia organa sensus dispergit illaque nervorum sensoriorum ope inter se conjungit, ita et, nobis judicibus, nervus facialis, qui motoriam exercet vim, organa sensus nervorum motoriorum ope secum invicem connectit. Et quis est, qui connexum inter actionem musculorum faciei, qui voluptatem vel tredium significant, et facultatem impressiones externos, diversis nervis sensualibus proprias, percipiendi, non agnoverit? Causa connexus illius inter nervum trigeminum et nervos mere sensuales in eo nobis videtur quaerenda, quod sensoria facultas in animalibus imperfecte conformatis organon sensus est primarium, e quo sensus diversi, dum incrementis perficitur conformatio, quasi explicantur.

Nervus quoque subcutaneus malae et n. infraorbitalis sunt in Corvi Cornice, nervis iisdem in homine et mammalibus bene congruentes, quamquam r. r. palpebrales et labii superiores nervi infraorbitalis in Corvo cornice desiderantur. Se l praeterea e ra-

mo maxillari superiore n. palpebralis superior et larymalis exeunt, quorum hic apud hominem ramus est nervi ophthalmici, illum vero ramo supratrochleari hominis respondere putamus, quod etiam in defectum rami supratrochlearis nervi ophthalmici apud Corvum cornicem bene quadrat.

Nervus tamen magni momenti, qui apud hominem et omnia mammalia atque pisces uti ramus nervi maxillaris superioris adest, videlicet n. sphenopalatinus, in Corvo Cornice desiderari videtur, sed nobis judicibus nervus recurrens supra allatus fibrillas nervo sphenopalatino proprias etiam continet, quae tamen gauglion cervicale supremum permeantes, in ramum nostrum sphenopalatinum, de quo supra mentionem fecimus, transeunt. Singularem sane decursum habet nervus sphenopalatinus Corvi cornicis, et eo quidem a nervo eodem apud hominem et mammalia differt, quod augetur ramo tenerrimo nervi facialis, quem in descriptione anatomica nostra nervum petrosum superficialem majorem inferiorem appellasse licebit, nisiforte illum nervo petroso superficiali minori hominis respondere existimaveris. Quod vero attinet ad distributionem nervi de quo agitur, uti e descriptione anatomica potes colligere, in ramos pterygopalatinum et nasopalatinum Scarpae discedit, qualis etiam ratio est ramorum nervi sphenopalatini apud hominem et mammalia *). Quod denique

^{*)} Cfr. Tractatum nostrum supra citatum in Actis Societatis Scientiarum Fenniæ pag. 182.

and nervum nestrum nasopulatinum Scarpae attinet, non dubitamus, quin revera nervo eodem apud hominem et mammalia jure sit comparandus, quia in corvo eundem decursum in septo narium servat atque in homine, et nervi utriusque lateris ad se invicem appropinquant, etsi explicare nobis non contigit, utrum revera secum invicem coalescant nec ne. Augetur tamen ramo tenerrimo mollis consistentiae (Tab. VII. Fig. 2 Nto 11), quem ramum ganglii cervicalis supremi esse opinamur, quamquam originem illius nervi e ganglio commemorato non observavimus.

- Orvum seque sique apud hominem et mammalia vim exercent mere sensoriam.
- C) Ut dezique de ramo tertio nervi trigemini, vel nervo cum ramis ejusdem nervi apud hominem et mammalia eam ob rom bene congruit, quod omnes musculi, qui masticationi inserlusem inferius abeat, tamen etiam ramum motorium in musculum mylohyoi leum progiguere. Ramum nostrum submentalem nervi mylohiolis existimomus.
- VI. Nervus abducens, qui nervus motorius est musculi recti oculi externi, apud hominem et mammalia candem habet

vim, sed in Corvo eo tamen differt, quod etiam ramum gignit ciliarem, de quo supra jam mentionem fecimus, ramosque motorios dispergit ad musculos membranae nictitantis, qui hominibus desunt, nullumque habet commercium cum nervo sympathico.*)

VII. Nervus facialis apud Corvum cornicem a nervo eodem hominis eo dissert, quod minoris est ambitus atque, ramis superficialibus majoribus (inferiore et superiore) ablegatis, in canali vidiano tandem porrigitur, ubi totus cum nervo recurrente coalescit et retrorsum in canali allato decurrit ramosque motorios tantum ad musculos digastricum, stylohyoideum et cutaneos cervicis gignit. Plexus anserinus quem vocant, apud Corvum deest, atque ut supra monuimus chordam tympani Platneri detegere non pôtuimus.

Omnes jam Physiologiae cultores consentiunt, nervum facialem apud hominem et mammalia ab origine vim tantum exercere motoriam atque igitur motibus musculorum faciei imperare. In Corvo etiam vi praedita est motoria, sed tantummodo in musculum digastricum et stylohyoideum, quia musculis faciei hominis caret corvus. Num nervus facialis et quidem ramus ejus digastricus surculos etiam dispergat ad musculos cutaneos cervi-

^{*)} Neque E. Weber l. c. conjunctionem nervi sympathici cum pari sexto observavit, quam vero Celeb. Cuvierus locum habere putat.

cis, satis evidenter enucleare non potuimus ob tenuitatem nervorum illorum in Corvo. °)

VIII. Nervus acusticus, nervas mere sensualis organi auditus, nihil omnino, neque ad connexum cum nervo faciali nec al distributionem periphericam ramorum in labyrinthum auris, ab codem nervo hominis atque mammalium in Corvo cornice habet diversum.

IX. Nervus glossopharyngeus in Corvo aeque ac in honiae da dus gangliis, ganglio jugulari s. Mülleri et ganglio petrosa, est insignis; quod autem ad ganglion petrosum attinet, nullus in Corvo adest ramulus tympanicus s. Jacobsonius, qui e queglio commemorato proliens surculos dispergit in cavitatem tympani. At connexum hajus ganglii cum trunco communi nervi recurrentis, et nervi facialis qualem in descriptione nostra anatomica commemoravimus, Corvo cornici et forsan avilus in genere proprium habemus. Connexu vero hocce examinato, in medio omnino relinquimus, utrum fibrillae primitivae, nervo glossopharyngeo propriae, intra vaginum rami interni nervi recurrentis eti un in truncum nervi facialis transeant, nec ne. Apparet etiam connexus intimus nervi glossopharyngei cum ganglio cervicali supremo et nervo vago, ut nervum glossopharyngeum facile ra-

^{*)} Nervus facialis sine dubio etiam apud Corvum ramum emittit ad musculum tensorem tympani, quamquam illum neque ramum ramo auriculari posteriori nervi facialis hominis respondentem observare nobis non contigit.

mum primum e nervo vago, qui e foramine jugulari egreditur, ortum existimare possis, qua in re nervus glossopharyngeus a nervo codem hominis et mammalium valde discrepat. Rami vero, quos e nervo glossopharyngeo prodeuntes attulimus, ramis iisdem nervi glossopharyngei hominis valde congruunt, excepto ramo illius nervi laryngeo superiore, qui, nobis judicibus, si non totus, tamen ad maximam partem fibras continet nervo vago proprias: quod si probaveris, ramum illum nervi glossopharyngei apud Corvum cornicem ramo laryngeo superiori nervi vagi respondere facile existimaveris. Fatendum tamen est, nos saltem non potuisse, surculos, animadvertere ad membranam mucosam internam laryngis pertinentes sed tantummodo quos ad membranam mucosam papillasque fere conicas circa rimam glottidis extendi vidimus.

Si vero animum ad vim, quam exercet nervus glossopharyngeus, advertimus, non possumus quin sententiam a Valentinio prolatam foveamus, nervum commemoratum nervum esse sensualem organi gustus, ganglionque igitur petrosum significationem habere ganglii sensualis organi gustus commemorati, quam sententiam jam, in tractatu nostro de nervis cerebralibus ovis arietis,*) in medium protulimus. Quia rami nervi glossopharyngei non nisi in membrana mucosa atque papillis radicis linguae et faucium disperguntur, hanc linguae partem, quae epidermide cornea caret, facultate impressiones gustus percipiendi instructum

^{*)} Cfr. Acta Societatis Scientiarum Fenniæ Tom. II. pag. 240 in notula.

existimare possumus, ipsam vero apicem linguae, epidermide cornea munitom, organon tectus autumanius, quod ad distributionem periphericam rami lingualis trigemini in hae linguae parte optime quadrat.

Si igitur nervum glossopharyngeum nervum sensualem gustus putaveris, connexus ille ganglii petrosi cum ramo linguali nervi trigemini et nervo vago, de quo supra locuti sumus, in oeconomia avium maximi videbitur momenti; hujus vero rei ulteriorem explicationem persequi in animo non est. Liceat tamen nobis jam opinionem nostram paucis afferre: omne organon sensus eo minus perfecte esse conformatum, quo arctior connexus inter nervum illius sensualem et sensorium vigeat, quae sententia in doctrinam de incrementis diversorum organorum sensuum e facultate sensoria cutis, quam proponunt investigationes comparatae organorum sensuum, optime eadit.

X. Nervus eagus apud Corvum cornicem ganglio jugulari atque plexu ganglioformi, aeque ac apud hominom, est instructus, sed eo est dissimilis, quod in Corvo arctissimus apparet connexus nervi vagi cum nervo glossopharyngeo, hypoglosso atque ramo nostro linguali nervi trigemini, cujus tamen connexus, in oeconomia avium sine dubio gravissimi, causam enucleare heic non vacat. Quod vero ad distributionem periphericam nervi vagi attinet, e descriptione nostra anatomica mox animadvertere poteris, ramos nervi vagi in Corvo Cornice cum ramis nervi

commemorati in homine maxime congruere. Illud tantum moneamus, nosmet nullum ramum nervi vagi ad oesophagum observasse.

XI. Nervus accessorius Villisii in Corvo ab eodem nervo in homine et mammalibus eo dissert, quod minoris sit ambitus. Motoriam vim nervi, de quo agitur, celeb. Bischoff*) egregie jam docuit. Ramus occipitalis nervi vagi, de quo Bischoff**) locutus est, secundum nostras disquisitiones, ramus est rami externi nervi recurrentis e nervo faciali missus qui, cum nervo vago connexus, in m. digastricum abit.

XII. Nervus hypoglossus in Corvo cornice arctissime cum nervo vago connexus est, ut illum pro ramo nervi vagi habere possis, quo connexu a nervo eodem hominis valde discrepat. Fibrillae vero, nervo hypoglosso propriae, in ramum laryngolingualem nervi vagi abeunt, unde in ramum lingualem, et quidem ad maximam partem in ramum ejus laryngeum superiorem, disperguntur. Nervum hypoglossum motoriam exercere vim, inter omnes physiologos jam convenit, unde facile colligere potes, ramos musculares rami lingualis commemorati atque nervum nostrum laryngeum superiorem a nervo hypoglosso esse derivandos. Ramum autem, quem nuperrime attigimus, ramo descendenti nervi hypoglossi hominis aequiparandum existimamus, quam sententiam

^{*)} Cfr. opus ejus supra citatum.

^{**)} Vide tractatum antea citatum pag. 40.

celeb. Stannius ') etiam amplectitur. Animadvertendum insuper est, ramum laryngeum, de quo agitur, quem cum ramis muscularibus rami lingualis comparaveris, in Corvo cornice multo majorem esse quam in homine, cujus rei causam in eo positam putamus, quod musculi linguae proprii in Corvo et avibus universis multo minores sunt quam in homine, ubi loquendi facultati inserviunt, dum musculi laryngis inferioris, qui in avibus admodum sunt magni, ad avium pertinent cantum, cum facultate loquendi hominis comparandum.

^{*)} I. c. pag. 285.

Explicatio tabularum.

TABULA VI.

- Fig. 1. Caput Corvi cornicis praebet in duas partes aequaeles divisum, plerisque nervis cerebralibus sinistri lateris praeparatis.
 - a) Superficies interna maxillae superioris lateris sinistri.
 - b) Superfic. interna maxillae inferioris ejusdem lateris.
 - e) Bulbus oculi sinistri.
 - d) Musculus mylohyoideus.
 - e) Pars ossis occipitis et sphenoidei.
 - f) Musculus rectus capitis anticus major elevatus.
 - g) Rima glottidis.
 - h) Trachea.
 - i) Cornu ossis hyoidei.
 - k) Pars oesophagi.
 - 1) Musculus obliquus oculi superior.
 - m) rectus oculi superior.
 - n) obliquus oculi inferior.
 - o) Glandula Harderi.
 - p) Musculus rectus oculi internus.

- q) Concha superior.
- r) Concha inferior.
- s) Lingua.
- t) A. carotis.
- u) Ampulla auditiva, cochleae hominis et mammalium aequiparanda.
- A) Superficies interna dimidiae partis sinistrae capitis.
- B) Superficies interna dimidiae partis dextrae capitis.
 - 1) Nervus opticus.
 - 2) oculomotorius.
 - 3) R. internus n. oculomotorii.
 - 4) R. ad m. rectum oculi inferiorem.
 - 5) R. — internum.
 - 6) R. ad. m. obliquum oculi inferiorem.
 - 7) R. externus nervi oculomotorii.
 - 8) R. ad m. rectum oculi superiorem.
 - 9) Ganglion ciliare.
- 10) Truncus ciliaris internus.
- 11) — externus.
- 12) Nervus trochlearis.
- 13) trigeminus.
- 14) Ganglion semilunare Gasseri.
- 15) R. ophthalmicus n. trigemini.
- 16) R. ciliaris nervi ophthalmici.
- 17) R. nasalis.

- 18) N. ethmoidalis lateris sinistri.
 - 19) — dextri., et ::
 - 20) R. R. palatini.
 - 21) R. communicans n. ethmoidalis.
 - 22) N. mylohyoideus.
 - 23) R. submentalis n. mylohyoidei.
 - 24) N. ophtalmicus lateris dextri.
 - 25) N. abducens.
 - 26) R. ciliaris n. abducentis.
 - 27) R. ad m. quadratum n. abducentis.
 - 28) N. glossopharyngeus, in latere sinistro ad posteriorem marginem nervi vagi retractus.
 - 29) Ganglion jugulare n. glossopharyngei.
 - 30) R. pharyngeus n. glossopharyngei.
 - 31) R. oesophageus superior.
 - 32) R. pharyngopalatinus.
 - 33) R. lingualis n. glossopharyngei.
 - 34) R. sens. strict. d:o.
 - 35) R. laryngeus superior d:o.
 - 36) N. vagus.
 - 37) Ganglion radicis nervi vagi.
 - 38) Ganglion petrosum n. glossopharyngei.
 - 39) R. recurrens rami 2:di n. trigemini.
 - 40) R. communicans n. vagi c. nervo glossopharyngeo.
 - 41) R. laryngo-lingualis nervi vagi.

- 42) R. lingualis n. vagi e ramo recurrente et n. hypoglosso petitus.
- 43) R. laryngeus superior nervi vagi.
- 44) R. sympathicus ganglii cervicalis supremi ad ganglion radicis nervi vagi.
- 45) R. R. communicantes nervi vagi cum ganglio cervicali supremo.
- 46) R. ad m. rectum capitis anticum majorem nervi hypoglossi.
- 47) R. internus s. cochleae n. acustici.
- 48) Ganglion cervicale supremum.
- 49) N. sphenopalatinus.
- 50) N. facialis.
- 51) N. acusticus.
- 52) N. hypoglossus.
- 53) Ganglion cervicale supremum dextri lateris elevatum.
- 54) Plexus ganglioformis nervi vagi.
- 55) R. communicans ganglii cervicalis supremi cum nervo hypoglosso.
- 56) Funiculus cervicalis n. sympathici.
- 57) R. pharyngeus ganglii cervicalis supremi.
- 58) R. ad m. pyramidalem nervi abducentis.
- 59) R. pterygopalatinus n. sphenopalatini.
- 60) R. nasopalatinus Scarpae d:o.
- 61) R. R. palatini n. pterygopalatini.

Fig. II.

Caput Corvi cornicis in duas partes aequales divisum, cum ramo 2:do & 3:tio nervi trigemini lateris sinistri ab externa parte praeparatis.

- a) Superficies interna haemispherii dextri cerebri.
- b) Medulla spinalis.
- c) Cutis palpebrarum oculi sinistri antrorsum protracta.
- d) Oculus sinister.
- e) Pars ossis occipitis et sphenoidei.
- f) Glandula lacrymalis.
- g) Rostrum superius sinistri lateris.
- h) inferius d:o d:o.
- i) Lingua.
- k) Musculus pterygoideus externus.
- 1) Pars musculi temporalis.
- m) Rete mirabile.
- 1) Nervus trigeminus.
- 2) Ganglion semilunare Gosseri.
- 3) R. recurrens n. maxillaris superioris.
- 4) Intumescentia ganglioformis nervi recurrentis.
- 5) R. internus n. recurrentis s. communicans cum nervo glossopharyngeo et ganglio cervicali supremo.
- 6) Ganglion sphenopalatinum.
- 7) R. ganglii sphenopalatini ad rete mirabile.
- 8) R. subcutaneus malae, an temporalis superficialis?

- 9) P. cutaneus anguli oris posterior.
- 10) R. cutaneus nasi externus.
- 11) N. palpebralis superior.
- 12) N. infraorbitalis.
- 13) N. laerymalis.
- 14) N. cutaneus anguli oris anterior.
- 15) N. subcutaneus nasi inferior.
- 16) N. alveolaris posterior.
- 17) R. maxillaris inferior n. trigenini.
- 18) N. pterygoideus externus.
- 19) N. temporalis anterior.
- 20) N. alveolaris inferior.
- 21) fl. comminus pervi sivedaris inferioris com nervo cutaneo anteriore.
- 22) Ganglion petrosum n. glossopharyngei.
- 23) N. buccinatorius.
- 24) N. pterygoideus internus.
- 25) Trances (communis tomi secundi et territ pervi trigemini.
- 26) R. externus nervi vidiani.

Fig. III.

- a) SuperScient inferier linguae.
- b) Cutis comea superficiei inferioris linguae.
- c) M. stylohyoideus.
- d) Comu ossis hvoidei.

- 'e) Os occipitis.
- f) Rostrum superius.
- g) Rostrum inferius.
- h) M. hyoglossus rectus?
- 1) R. stylohyoideus.
- 2) N. hypoglossus.
- 3) N. vagus.
- 4) Ganglion cervicale supremum.
- 5) N. sphenopalatinus.
- 6) R. lingualis n. vagi lateris sinistri.
- 7) R. — dextri.
- 8) R. terminalis medius r. lingualis.
- 9) R. terminalis lateralis r. lingualis.
- 10) R. hyoglossus rectus r. lingualis. Fig. IV.
- a) Canalis semicircularis superior.
- b) d:o inferior.
- 1) Ganglion semilunare Gasseri.
- 2) Truncus communis rami 2:di & 3:tii nervi trigemini.
- 3) Ramus primus nervi trigemini.
- 4) R. recurrens s. vidianus superior n. maxillaris superioris.
- 5) N. facialis.
- 6) R. petrosus superficialis major n. facialis.
- 7) N. acusticus.

- 8) R. nervi vestibuli ad canalem semicircularem superiorem.
- 9) R. ad canalem semicircularen inferiorem.
- 10) Ganglion geniculum.

TABULA VII.

Fig. I.

- a) Canalis semicircularis superior.
- b) Cornu ossis hyoidei.
- c) Trachea.
- d) Larynx inferior.
- e) Cor dextrorsum retractum.
- f) Carotis.
- g) A. subclavia.
- h) A. anonyma.
- i) Ventriculus muscularis.
- k) Pulmo sinister.
- 1) Superficies sinistra cristae sterni.
- m) Pars furculae elevatae.
- n) Musculus digastricus maxillae.
- o) Oesophagus.
- p) Lingua elevata.
- q) Ventriculus glandularis.
- 1) Truncus commuais rami secundi et tertii nervi trige-
- 2) R. maxillaris superior n. trigemini.


- 3) R. maxillaris inferior n. trigemini.
- 4) R. recurrens n. maxillaris superior.
- 5) N. facialis.
- 6) R. digastricus n. recurrentis.
- 7) R. laryngo-lingualis.
- 8) R. lingualis.
- 9) R. laryngeus superior n. vagi.
- 10) R. externus rami larvngei superioris nervi vagi.
- 11) R. internus dio dio dio.
- 12) R. recurrens, s. laryngeus inferior.
- 13) R. cardiacus.
- 14) R. pulmonalis n. laryngei inferioris.
- 15) R. R. pulmonales.
- 16) R. R. cardiaci inferiores n. vagi.
- 17) R. R. gastrici glandulares.
- 18) R. R. gastrici musculares.
- 19) N. vagus.
- 20) Ganglion cervicale supremum et petrosum glossopharyngei.
- 21) N. pterygo.
- 22) N. glossopharyngeus.
- 23) R. pharyngeus s. strict.
- 24) R. lingualis n. glossopharyngei.
- 25) R. oesophageus d:o.

- 26) R. communicans ganglii cervicalis supremi cum nervo, an R. cardiaeus longus?
- 27) N. hypoglossus.
- 28) R. petrosus superficialis major superior.
- 29) R. petrosus superficialis major inferior s. r. communicans nervi facialis c. n. sphenopalatino.
- 30) N. nasopalatinus Scarpae.
- 31) N. sphenopalatinus.

Fig. II.

- a) Lingua.
- b) Cornu ossis hyoidei.
- c) Septum narium.
- d) Maxilla inferior sinistri lateris persecta.
- e) Concha nasalis.
- f) Canalis semicircularis superior.
- g) Rostrum inferius lateris sinistri.
- h) superius d:o d:o.
- i) Rostrum lateris dextri.
- k) Trachea.
- 1) Ganglion cervicale supremum.
- 2 & 3) Truncus communis nervi recurrentis et n. facialis.
- 4) R. recurrens n. trigemini.
- 5) N. facialis.
- 6) R. petrosus superficialis major inferior s. communicans n. facialis cum nervo sphenopalatino.

- 7) R. tertius n. trigemini.
- 8) R. alveolaris inferior.
- 9) N. pterygopalatinus.
- 10) N. nasopalatinus Scarpae.
- 11) R. ganglii cervicalis supremi? ad n. nasopalatinum Scarpae.
- 12) N. glossopharyngeus.
- 13) R. laryngo lingualis n. vagi.
- 14) Arteria alveolaris inferior?
- 15) N. vagus.
- 16) N. sphenopalatinus.



BIDRAG

TILL BLODKÄRLSYSTEMETS JEMFÖRANDE ANATOMIE,

AF

E. J. BONSDORFF.

HHH.

Portven Systemet hos Gadus Lota Lin.

(Föredr. den 3 Mars 1851.)

Venerne hos Laken utmärka sig, likasom i allmänhet hos fiskarne, jemförelsevis med de högre vertebrerade djuren, icke allenast genom särdeles tunna väggar, så att på åtskilliga ställen, der desamma förlöpa genom organernes parenchym, endast den innersta hinnan synes förekomma*), utan äfven, inom portven systemet, genom sin vidd betydligt öfvervägande den af de motsvarande artererne. Ifrån alla delar af kroppen flyter det venösa

^{*)} Väl anmärker Stannius Lehrb. der vergleich. Anat. der Wirbelthiere Berlin 1846 p. 104 Not 1. att venerne hos siskarne mera framställa sig såsom rännor i organernes parenchym, än såsom, med sjelsständiga hinnor sörsedda, kanaler, men hos laken har jag sunnit dem alia sörsedda med egen hinna.

blindet från aupillar kärlen i rentripetal riktning till hjertat, fle utt genom arteria branchialis, motsyarande arteria pulmonalis has digg ljuren och menniskan, vidare öfvergå i respirations organerne. Ehuru hjertat, sås m icke afgifvande någan arter förande arteriell blod, sålunda framstiller sig såsom medelpunkt för den venksa bladtirculation, förekunnner has Laken, likasom has fiskarne i allminhet, en stark sinus venosos, i hvilken såsom en central recervoir, det venösa bladet samlas från alla delar af krappen för att öfvergå i hjertat. Ehuru vissenligen partven systemet utgör det egentliga föremålet för denna vär framstillning, anse vi oss derföre böra äfven här i korthet vidröra:

Sinus venarum communis (Pl. IX) utgöres af en stark venas hila, hvilhen, sisum en half ring, omgifver oesophagus, och utgöres af en bailus venasus ") på hvardera sidan em ryggraden i h en tronsversellt gien le afdelning deraf, som förenar högge de förstnämnde, och hvilken vi vilja kalla sinus transversus.

A) Bulbus venosus (Pl. IX N:o 1) förekommer på hvarden, siku af ryggraden, vid den ölversta eller himse, indan at ninten. Sis in en sinkare utvilgning ti sjelfva sinus, i hvilken på hvardera sidan vena cava inferior **) samt ofta äfven venæ

^{*)} Vid injection genom sena coarii it bjertat, intrăfiar hār lātt ett extravasat, som utbreder sig likasom en sinus bakom æsopbagus tvārs öfver ryggraden, genom bvilket bulbus senasus pā hvardera sidan synas förerada eth han sama senarum hala en sung making as plag a. Hānganom erhilles lātt en origtig förestäldning om berönde sinus.

^{**)} Fena cardinalis posterior Stannius L. c. pag. 105.

ovarii utgjuta sig. På högra sidan är denna bulbus i allmänhet starkare än på den vänstra.

B) Sinus transversus (Pl. IX N:o 2) sträcker sig på undre sidan af oesophagus, tvärs öfver från den högra bulbus venosus till den vänstra, hvilka den sålunda med hvarandra förenar. Ifrån denna sinus transversus utgjuter sig blodet, genom en i förhållande till den sinus hvarom fråga är, betydligen mindre kanal i hjertats atrium.

Utom några ganska små vener, hvilka taga sitt ursprung från de närbelägna delarne, särdeles pericardium, utgjuta trenne till 4 venstammar sitt innehåll i främre sidan af sinus transversus nemligen: vena jugularis anterior, branchialis cardinalis och abdominalis på högra sidan samt vena hyoideoopercularis på vänstra sidan. I bakre sidan af samma sinus utgjuta sig de 2 venæ hepaticæ.

Portven systemet.

Detta vensystem, som i allmänhet utmärker sig! derigenom att stammen, tvårtemot venernes förhållande i allmänhet, åter utgrenar sig likasom en arter och bildar ett capillar kärlnät, förekommer hos Laken under 2:ne former A) Lefver portven systemet och B) Njur portven systemet.

A. Lefver portven systemet.

Detta vensystem upptager hos Laken, såsom förhållandet med detsamma i allmänhet är hos de vertebrerade djuren, blod

fran Lela digestions apparaten och simblisan, men alldeles icke hvarken från bukens väggar, ovarierne ") eller njurarne. Dessa organers vener öfverga, utan att genom nigra communicationsgrenar stå i sammanhang med lefver portven systemet, i vena cava inferior eller sinus venarum communis. De flesta af de vener som höra till detta portven system förenas till en

Porteen stam (Pl. VIII N:o 1) hvilken, belägen vid vånstra sidan af gallblasan, utgör en ganska kort stam, som uppkommer genom förening af vena intestmains och pp. k. vica. (Pl. VIII N:o 8) af hvilka den förstnämnde är vida starkare.

- A) Vena intestinalis (Pl. VIII Nio 28) begynner med sina grenar från rectum nära ovarierne, utan att jag kunnat observera någon communication emellan desamma och grenar af vena evarii, forlöper framat, langs tarmen och inre randen af mjälten. till undre ytan af appendices pyloricæ, vidare, emellan dessa och ventrikeln samt oesoplagus, till vänstra ändan af gallbläsan, der densamma förenas med vena pylorica till portven stammen. Grenar hvilka utgjuta sig i densamma äro följande:
- a) R. R. intestinales (Pl. VIII N:0 2) finare grenar hvilka uppkomma, dels från rectum, dels från den öhiga sträckningen af tarmen och utgjuta sig i stammen.

^{*)} J. Müller vergl. Anat. d. Myxinoiden dritte Fortsetz. Berl. 1841, anmärker p. 40 såsom en egenhet hos Fiskarne att portven upptager en del af sitt blod från väggarne af den främre delen af kroppen, och vidrörer dessutom en förening emellan systemet för vena cava inferior och portvensystemet, hvilken vi icke funnit hos Laken.

- b) R. R. lienales (Pl. VIII N:0 22) 2 a 3 korta, men i törhållande tjocka, grenar, hvilka samla blodet från mjelten och genast utgjuta sig i stammen.
- c) V. ventriculi posterior, (Pl. VIII N:0 3) den stackaste af de grenar hvilka utgjuta sig i vena intestinalis, sammansättes af en riklig mängd af grenar, hvilka, utmärkte genom ett ganska slingrande förlopp, taga sitt ursprung från bakre ytan af fundus ventriculi, hvarest de äfven communicera med de grenar hvilka gifva ursprung at vena ventriculi anterior, och förlöper inåt för att utgjuta sig i den stam hvarom fråga är.
- d) R. R. rentriculi posteriores minores (Pl. VIII N:o 4) 3 a 4 mindre grenar. som taga sitt ursprung från bakre ytan af ventrikeln och dess portio cardiaca och utgjuta sig. emellan vena ventriculi posterior och vesicae natatoriæ, i stammen.
- e) Vena vesicae natatoriæ, (Pl. VIII N:0 5) en temeligen stark stam. hvilken sammansättes af 5 grenar, af hvilka 4. eller 2 på hvardera sidan. upptaga blod ifrån de så kallade röda kropparne *)

^{*)} Dessa så kallade röda kroppar förekomma hos Laken endast i de 2 främre och utvidgade grenarna af simblåsan och framställa sig, vid något så när lyckad injection, såsom endast ett conglomerat af venösa blodkärl, hvilka bilda små utvidgningar och äro med hvarandra ganska tätt förenade. Den bifogade planschen återgifver icke detta förhållande, utan endast grenarnes förening till en stam der de tränga ut ifrån simblåsan.

dan af densamma. Denna gren upptager finare grenar från hvardera sidan af simblåsan, utan att här, enligt hvad jag kunnat observera, communicera med rr. vesicæ natatoriæ posteriores, hvilka utgjuta sig i vena cava inferior, och hvilka vi långre nedanföre skola afhandla, samt förlöper i medellinien af simblåsan, för att förenas med de ofvan anmärkte 4 främre grenarne, till en gemensam stam. Den sälunda bildade stammen af ifrågavarande ven förlöper sedermera inat för att utgjuta sig i vena intestinalis *).

- f) Vena cardiaca posterior (Pl.VIII N:06) sammansättes af fina grenar hvilka. communicerande med ursprungsgrenarne af vena cardiaca anterior, och den främsta af rr. ventriculi posteriores minores, komma från bakre ytan af den nedersta delen æsophagus och utgjuta sig i vena intestinalis as).
- g) V. oesophagea, (Pl. VIII N:o 7) ungefär lika stark med den föregående med hvilken den äfven communicerar, förlöper inåt för att utgjuta sig i stammen ****).

Stundom utgjuter sig denna ven i vena ventriculi posterior, och hafva vi för öfrigt märkt att, beträffande de vener som tillhöra detta portveu system, desamma ganska mycket variera i afscende å de grenar med hvilka de förenas.

^{**)} Utgjuter zig stundom i vena vesicae natatoriae eller ventriculi anterior, eller i den af dem både bildade stammen.

^{***)} Utgjuter sig stundom i vena vesicae natatoriae

- B) Vena pylorica (Pl. VIII N:0 8) utgör en ganska kort stam, som bildas genom förening af v. appendicalis och ventriculi anterior. Denna stam förlöper snedt under vena intestinalis framåt mot lefvern, och förenas, förr än den uppnår densamma, med vena intestinalis till Portven, såsom redan ofvanföre blifvit anmärkt. Följande grenar utgjuta sig i ofvan anmärkta vena pylorica.
- a) Vena appendicalis (Pl. VIII N:0 9) utgör en ganska kort stam, hvilken sammansättes af vena appendicalis sinistra och dextra hvilka, genom en ofta ganska stark communication, med hvarandra anastomosera på undre sidan af pylorus, och här äfven upptaga fina grenar från ventrikeln. Bägge förlöpa längs basen af appendices pyloricæ och upptaga rami appendicales (Pl. VIII N:0 13) hvilka uppkomma från spetsen af de särskilda appendices, och förlöpa genom mesenterium, en på hvardera sidan af hvarje appendix, men vid basen af densamma förenas dels med hvarandra dels med en närbelägen gren till en stam, som utgjuter sig i vena appendicalis dextra eller sinistra. Stammen af v. appendicalis förlöper snedt öfver pylorus ventriculi, hvarest den snart förenas med vena ventriculi auterior till vena pylorica.
- α) Vena appendicalis dextra (Pl. VIII N:o 10) upptager blod från omkring 20 appendices, hvilka utgöra den venstra hälften af desamma, och förlöper mer och mer tilltagande i styrka öfver den främre ytan af pylorus ventriculi, hvarest den upptager sina

grenar så väl från ventrikelu som från tarmen, och förenas snart till en stam med den följande.

- 3) Vena appendicalis sinistra (Pl. VIII N:o 11) är mindre än den föregaende, med hvilken den för öfrigt har samma förlopp, men upptager rami appendicales fran omkring 14 appendices, som utgöra den vänstra höllten af desamma. Sjelfva stammen af i fråga varande ven förlöper på den bakre ytan af pylorus, der den upptager dylika mindre grenar som den foregående från ventrikeln och tarmen och förenas, ofvanom pylorus, med den föregående. Sålunda bildas af dessa båda venae appendicales en venös kärl krans omkring pylorus, som vi vilja kalla circulus venosus pyloricus.
- b) Vena ventriculi anterior (Pl. VIII N:o 12) sammansättes af grenar hvilka, communicerande med grenar af vena ventriculi anterior och superior, taga sitt ursprung från bakre ytan af ventrikeln och förlöpa framat och at höger, emellan ventrikeln och den vänstra hälften af appendices pylarica, for att forenas i en stam med vena appendicalis.

Den af ofvan beskrefne arterer bildade portven-stammen (Pl. VIII N:o 1) upptager 2 å 3 fina, från nedre delen af oesophagus kommande, venæ oesophageæ superiores (Pl. VIII N:o 14) stundom äfven den långs öfre ytan af gallblasan förlöpande vena cystica (Pl. VIII N:o 15) och delar sig. förr än den tränger in i lefvern, i trenne hufvudsakliga ganska starka grenar: r. dexter, medius och sinister.

- a) R. dexter (Pl. VIII N:o 16) är ganska stark och upptager, vanligast kort efter det den skiljt sig från potvenstammen, vena cystica (Pl. VIII N:o 15) samt delar sig derpå i 2 grenar, af hvilka den ena förlöper långs undre randen af högra lefver loben, den andra deremot intränger i högra loben af lefvern, der den vidare utgrenar sig.
- b) R. medius, (Pl. VIII N:o 17) den starkaste af dem alla, tränger framåt till midten af lefvern, långs hvilkens undre yta den vidare förlöper och intränger derefter, uti lefvern.
- c) R. sinister, (Pl. VIII N:o 18) den mindsta af portvens trenne grenar, förlöper åt vänstra loben af lefvern, men upptager, förr än den uppnår lefvern, 2 a 3 fina venæ oesophageæ (Pl. VIII N:o 19) och delar sig derpå i 2:ne grenar, af hvilka den vänstra intränger i den hithörande delen af lefvern, men den andra, såsom en
- R. communicans cum vena ventriculi superiore, (Pl. VIII N:o 20) förenas till en stam med vena ventriculi superior, men upptager dess förinnan 3 venæ appendicales superiores (Pl. VIII N:o 21) och en vena cardiaca superior (Pl. VIII N:o 22).
- c) Vena ventriculi superior (Pl. VIII N:o 27) sammansättes af grenar hvilka communicera med grenar af vena ventriculi anterior samt posterior och förlöper, tilltagande i styrka, långs högra randen och bakre ytan af ventrikeln uppåt lefvern, der den förenas till en stam med den ofvananmärkta R. commu-

nicans. Denna stam förlöper långs undre ytan af vänstra lefver loben, i hvilken den intränger för att vidare utgrena sig *).

Allt det blod som sålunda flyter genom de ofvan beskrifne vener, som höra till lefverns portvensystem **), öfvergår i lefvern i ett capillar kårlsystem, ifrån hvilket blodet åter samlas i tvånne

Vena intestinalis förenar sig icke med vena pylorica till en stam, utan delar sig, då den uppnår lefvern, i 2 grenar, af hvilka den ena tränger i högra loben af lefvern, den andra i midten af densamma.

Vena appendicalis sinistra delar sig, de den uppner lesvern, i trenne grenar, af hvilka den högra förenas med den gemensamma stammen af vena ventriculi posterior och appendicularis dextra; den medlersta intranger i midten af lesvern; den vänstra likaså för sig i den vänstra delen af lesvern.

Vena appendicalis dextra delar sig, då den uppnår lefvern, i 2 grenar, af hvilka den vänstra sänker sig i den vänstra delen af lefvern, den högra förenas med vena ventriculi superior till en stam, som förstärkes genom en ramus communicans från vena appendicalis dextra och, sedan den upptagit 2 smärre venæ æsophageæ, intränger i högra fliken af lefvern. Häraf finner man att de till Portvensystemet hörande venernes ramification betydligt varierar hos olika individer, hvarföre det förefaller mig ganska anmärkningsvärdt, att H. Rathke, Ueber die Leber und das Pfortadersystem der Fische. Meckel Arch. f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1826, hos de af honom undersökta fiskarna, anmärkt att han sett endast små olikheter, churu sällan, bero på Individualiteten.

^{*)} Ostast har lesverns portvensystem, vid mina verkställda undersökningar af detsamma hos olika individer, visat sig såsom den här gisna beskrifningen framställer, dock må här anmärkas att ganska olika utgreningar, af de till portvensystemet hörande venerne, sörekomma, hvarå exempelvis må ansöras söljande hos ett individ anmärkte sörhållande:

Väl anmärker Müller i sitt classiska arbete, Vergleich. Anatomie der Myxinoiden, att venerne från bukväggarne hos Myxinoiderne älven ölvergå

Venæ hepaticæ hvilka utgöra tvänne ganska korta stammar, den högra (Pl. VIII N:o 23) och vänstra (Pl. VIII N:o 24), af hvilka den förra är nästan dubbelt starkare än den sednare. Begge taga sitt ursprung i lefvern från portvensystemets capillar kärlnät, derifrån de öfvergå i större och större grenar, hvilka sluteligen tränga fram från den convexa ytan af lefvern och intränga i den bakre väggen af sinus transversus, som ofvanföre blifvit beskrifven.

B) Njur portvensystemet.

Utom det hos de högre vertebrerade djuren förekommande lefver portvensystemet, förekommer hos Laken äfven ett annat Portvensystem, som uppkommer genom venæ caudalis utgrening i den bakersta och förtjockade ändan af njuren; och som vi derföre velat kalla Njur portvensystemet *) se Pl. IX hvilken

i lefverns portven system, äfvensom Rathke l. c. att venerne från genitalia hos Myxinoiderne Cypriner, Cobites Blennius, Perca Osmerus öfvergå i detta portven system; att detta icke är förhållandet hos Gadus Lota, derom har jag genom flerfaldiga injectioner öfvertygat mig.

^{*)} Detta portven system har först blifvit anmärkt af Professor Jacobsson i Köpenhamn, de systemate venoso peculiari in permultis animalibus observato, Isis 1822 Sid. 114 och sedermera af Nicolai, Untersuchungen über den Verlauf und die Vertheilung der Venen bey einigen Vögeln, Amphibien und Fischen, besonders die Venen der Nieren betreffend, Isis 1826 p. 404 om hvars existens den så högt förtjente Prof. Stannius, i Rostock l. c. p. 107, likväl ieke kunnat öfvertyga sig hos Gadus Cyprinus m. fl. af honom undersökte fiskar, hvarföre den utmärkte forskaren tills vidare med Meckel och Cuvier betviflar dess förekommande. Genom verkställde

natur troget framställer detta system. Fullt öfvertygade derom att portvensystemet i allmänhet, till sin physiologiska betydelse, bör anses sasom ett accessoriskt respirations system."), genom hvilket blodmassan afbördar sig vissa ämnen, som äro onyttiga tör den materiella metamaphosen, anse vi oss böra framställa den förmodan att. i samma förhallande som respirationsorganerne äro mindre utvecklade hos de lägre vertebrerade djuren, ätven ett portvensystem förekommer som utgrenar sig i muren. Iv för att likasom complettera resultatet af den respiratoriska verksamheten. Invilket icke tillfyllest kan vinnas genom de organer som vanligen spela denna, för den organiska verksamheten så vigtiga, role. Detta system utgöres, säsom ofvanför blifvit anmärkt, af:

Vena caudalis (Pl. VIII N:03) theoper under arteria caudalis, i en ben canal som förekommer under pars caudalis at ryggraden, och bildas af caudal vertebrernes processus spinosi inferiores. Upptagande fina venet från stjertfenan och stjertens muskler samt hud, förlöper den framat, tilltagande i tjocklek, till

injectioner, saval genom wener evarii mit, som genom vena caudalus hafva vi fultkomligen bivertygat oss. om dess forekommande, sasom vår utmärkte tecknare M. v. Wright å den bilogade planschen natur troget framställt.

^{*,} Så förekommer lefvern, i 1019. å lande ganska stor, has deur som lefva i vatten, hos embryoner, m. fl. likasom lefvern hos monnisker pathologiskt forekommer forstorad hos sådana personer som genom diæt och yttre förhållanden, vålla hinder för den respiratoriska verksamheten.

ee, Ett sidant forekommer derfore t. ex. hos grodorne genom venæ nizez utgrening i njuren.

den främre öppningen af berörde beneanal i bukcaviteten och utgrenar sig här i 3 till 4 korta grenar, hvilka genast intränga i den här belägna tjocka bakersta delen af njuren, i hvilken de vidare utgrena sig, så att de i denna del af njuren bilda ett capillar kärlnät, hvarifrån blodet åter samlas uti mer och mer i styrka tilltagande grenar. Dessa återförande vener öppna sig på alla sidor i en hufvudstam, som, förlöper genom midten af berörde körtel. Bägge dessa hufvudstammar förenas sluteligen med hvarandra uti en gemensam sinuös utvidgning, som vi vilja kalla alveus communis venarum cavarum inferiorum, hvilken utgör det gemensama ursprunget för de på hvardera sidan om ryggraden förlöpande venæ cavæ inferiores.

Alveus communis venarum cavarum inferiorum, belägen emellan den bakersta delen af njuren och undre ytan af ryggraden, framför den här belägna delen af aorta, och af conformig skapnad, med spetsen bakåt vänd och inskjutande i njuren. Denna spets aftager ju längre den tränger in i njuren mer och mer i styrka och upptager från alla sidor, på sätt ofvanföre blifvit framställdt, grenar, hvilka, tagande sitt ursprung från det af vena caudalis bildade capillar kärlsystemet i njuren *), utgjuta sig i

^{*)} Vid injection genom vena ovarii har injections massan icke trängt genom detta capillar kärl system i vena caudalis, men tränger tvärt om, vid injection genom vena caudalis, ehuru med någon svärighet, i venæ cavæ inferiores.

densamma. Då jag i microscopet undersökt väggarne af denna alveus, har jag vål sett fibrer, men är sjelf osåker om desamma verkeligen åro muskelfibrer. Genom försök att galvaniskt reta densamma, har jag likvål icke kunnat framkalla någon contraction.

Isran denna alveus communis utgă:

Venæ caræ inferiores *) (Pl. IX N:o 5 & 6) 2 till antalet, en på hvardera sidan om ryggraden, af hvilka den högra (N o 5) är betydligt starkare än den vänstra (N:o 6). Bägge förlöpa, på sin sida om ryggraden utom peritoneum, utan att med hvarandra communicera **) längs inre randen af njuren, ittän hvilken de, under hela sitt förlopp, upptaga talrika tillförande kärl och utgjuta sig sluteligen i balbus venosus på hvardera sidan af den gemensama sinus venosus, och upptager här ännu betydligt antal grenar från den främsta delen af njuren.

^{*)} Baer har ansett dessa orātt jemföras med vena cava posterior s. inferior, en āsigt i hvilken vi icke kunna instāmma, sā mycket mindre som vi anse vena caudalis hos Laken motsvara de bāda venæ iliacæ communes, hvilka, hos menniskan och däggdjuren, förenas med hvarandra till vena cava inferior, och blodet från denna, ehuru genom ett portven system, utgjuter sig i ifrågavarande vener, hvilka hos Laken upptaga samma grenar som hos däggdjuren, såsom venæ renales, lumbales och ovarii, så anser äfven Lucobsson l. c. pag. 115 desamma.

^{**)} Stannius 1. c. pag. 109 anmärker väl: att desamma alltid med hvarandra communicera genom tvärgrenar, men vi hafva icke kunnat iakttaga detta hos Laken, utan äro de blodkärl, hvilka visserligen förlöpa tvärs öfver hvarje verteber åt vänster, fina grenar, från aorta till den vänstra njuren.

Grenar hvilka, på hværdera sidan om ryggraden, utgjuta sitt innehåll i ofvan beskrifne venæ cavæ inferiores äro:

- a) Venæ hæmorrhaideles externæ, 4 a 5 fina grenar, hvilka uppkomma från muskel-substansen omkring anal-öppningen och, förlöpande genom den bakersta delen af njuren, utan att utgrena sig, utgjuta sig i alveus communis venarum cavarum inferiorum, eller i vena cava på sin sida.
- b) Venæ vesicæ natatoriæ posteriores, på hvardera sidan 5 till antalet, hvilka upptaga blod från den bakersta delen af simblåsan och, förlöpande rakt inåt, utgjuta sig i vena cava inferior på sin sida. De finaste utgreningarne af dessa vener å simblåsan communicera icke med de fina grenar, hvilka utgöra ursprunget för den bakre gren af vena vesicæ aëreæ, hvilken ofvanföre blifvit beskrifven såsom öfvergående i portven systemet.
- c) Venæ renales (Pl. IX N:o 7) főrekomma på hvardera sidan till ett ganska betydligt antal, och utgöra korta grenar, hvilka, tagande sitt ursprung från njurarnes capillar kärl, samlas i särskilda stammar och långs hela sträckningen af njuren på hvardera sidan, förlöpa rakt inåt för att utgjuta sig i vena cava inferior på sin sida.
- d) Venæ lumbales (Pl. IX N:0 8), till antalet ganska mycket varierande, upptaga blod från musklerne och huden på sidan af kroppen, och förlöpa, på inre sidan af bukmusklerne, till interstititierne af de falska refbenen. Här för-

löpa de å inre ytan af muskellagret, stundom längs bakre randen af ett retben, stundom åter midt emellan 2 närbelägna refben, genom njursubstansen, utan att i densamma utgrena sig, och utgjuta sig på hvardera sidan i vena cava inferior °).

e) Venæ ovarii (Pl. IX N:0 9 & 10) förekomma 2 till antalet eller en på hvardera sidan, af hvilka likvål den högra år omkr. 3 gånger starkare än den vänstra. Dessa sammansättas af grenar hvilka, till antalet ganska många och af i forhillande ganska betydliga dimensioner, förlöpa på ytan af ovarierne, men äfven från det inre af desamma upptaga grenar, hvilka i olika directioner förlöpa genom ovariernes substans.

De å ovariernes yta förlöpande venerne åro likvål de förnamsta, och kunna urskiljas såsom tvänne venösa nåt: ett framre och ett bakre, hvilka bägge likvål, å den yttre convexa randen af hvardera ovarium, synas med hvarandra förenas. Det framre venösa nåtet förlöper på den framre convexa ytan af ovarierne inåt, det bakre nåtet deremot på den bakre eller mot ryggraden

^{*)} Att dessa venæ lumbales icke såsom portvener utgrena sig i njuren på sin sida, derom har jag, genom verkställda injectioner af enskilda vener bland desamma, tillräckligt öfvertygat mig, likasom derigenom att, om man genom vena ovarit injicièrar venæ cavæ inferiores, injections massan från dessa intränger i venæ lumbales. Vi hafva speciellt velat undersöka detta förhållande, emedan Nicolai (l. c. pag. 412) anmärker att dessa vener, hos Gadus Lota vid yttre randen af njuren, dela sig i flere grenar, hvilka sänka sig djupare i njurarnes substans, hvarest de vidare utgrena sig, utan att hafva någon gemenskap med vena renalis revehens. Vid dessa injectioner hafva vi användt qvicksilfver.

belägna ytan af ovarierne. Blodet från bägge dessa venösa nät utgjuter sig å hvardera sidans ovarium i en gemensam stam, hvilken, af ganska betydlig dimension, begynner i den vinkel under hvilken de båda ovarierne, i bakre ändan med hvarandra förenas. Här är stammen af vena ovarii på hvardera sidan förenad med den andra och förlöper, på hvardera sidan, långs inre randen af ovarium, upptagande under detta förlopp grenar så väl från det främre som bakre venösa nätet, ända till den främre eller öfre ändan af ovarium, hvarefter den, emellan de 2 blad som sammansätta ovarii mesenterium (Mesovarium?) förlöper inåt, för att utgjuta sitt innehåll i vena cava på hvar sin sida, den högra vid 10:de, den vänstra vid 12:te vertebern *).

På samma sätt förhålla sig venæ testium hos hannen.

^{*)} Sådant är det vanliga förhållandet, men ofta utgjuta sig venæ ovarii icke i venæ cavæ inferiores, utan i sinus venarum communis såsom Pl. IX utvisar.

FÖRKLARING

öfver

de bisogade Planscherne.

Pi. VIII föreställer tarmkanalen och lesvern från undre sidan, för att framställa lesver portven systemet.

- a) Rectum.
- b) Intestinum tenue.
- c) Superficies posterior ventriculi.
- d) Oesophagus.
- e) Superficies interna partis vesicæ natatoriæ.
- f) Superficies posterior appendic. pyloric.
- g) Lien.
- h) Vesica fellea.
- i) Superficies inferior hepatis.
- k) Ovaria.
- 1) Lobus sinister hepatis.
- m) dio dexter dio.
- 1) Truncus venæ portæ.
- 2) R. R. intestinales venæ intestinalis.
- 3) V. Ventriculi posterior.

- 4) R. R. ventriculi posteriores minores.
- 5) V. vesicæ natatoriæ.
- 6) V. cardiaca posterior.
- 7) V. oesophagea.
- 8) V. pylorica.
- 9) V. appendicalis.
- 10) V. appendicalis dextra.
- 11) V. d:o sinistra.
- 12) V. ventriculi anterior.
- 13) R. R. appendicales.
- 14) V. V. oesophageæ superiores.
- 15) V. cystica.
- 16) R. dexter venæ portæ.
- 17) R. medius dio dio.
- 18) R. sinister dio dio.
- 19) R. R. oesophagei.
- 20) R. communicans rami sinistri cum vena ventriculi superiore.
- 21) V. V. appendicales superiores.
- 22) V. cardiaca superior.
- 23) V. hepatica sinistra.
- 24) dio dio dextra.
- 27) Vena ventriculi superior.
 - Pl. IX framställer njurarnes portven system.
 - 1) Bulbus sinus venarum communis.

- 2) Sinus transversus venarum communis.
- 3) Vena caudalis.
- 4) R. R. pinnales et musculares venæ caudalis.
- 5) V. cava inferior dextra.
- 6) dio dio sinistra.
- 7) V. V. renales.
- 8) V. V. lumbales.
- 9) V. ovarii dextra.
- 10) dio dio sinistra.

SYMBOLE

AD ANATOMIAM COMPARATAM NERVORUM ANIMALIUM VERTEBRATORUM,

AUCTORE

E. J. BONSDORFF.

III.

Nervi cerebrales Gruis cinereæ Linn.

(Societ. exhib. d. 3 Febr. 1851).

- I. Nervus olfactorius nihil omnino præbet a nervo eodem corvi cornicis diversum, qualis etiam est ratio
 - II. Nervi optici.
- III. Nervus oculomotorius in basi cranii prorsum ad foramen opticum tendit, unde orbitam intrans, inter nervum opticum et n. abducentem infra originem musculi recti oculi superioris situs, mox in ramum externum vel superiorem et internum vel inferiorem dirimitur.
- A) R. externus s. superior sursum, inter nervum trochlearem et ramum ophthalmicum nervi trigemini, ad musculum

rectum oculi superiorem tendit, ramosque ablegat ad musculum allatum pertinentes.

B) R. internus s. inferior, ad superficiem inferiorem nervi optici porrectus, musculum rectum oculi inferiorem prope originem musculi allati penetrat, et. ramulis ad musculum rectum oculi interiorem ablegatis, in adversum inter glandulam Harderi et musculum rectum oculi inferiorem procedit ramulosque gignit ad musculum rectum inferiorem et internum, atque obliquum inferiorem oculi pertinentes.

Ganglion ciliare haud exiguæ magnitudinis et oblongo ovatum, in ipso angulo, quo ramus superior et inferior nervi oculomotorii a se invicem discedunt, et ad superficiem externam nervi optici situm, ramulos ciliares gignit eodem modo iridem petentes atque in corvo cornice. Excepta radice brevi e nervo oculomotorio progenita radices habet ganglion nostrum duas, quarum altera e nervo abducente, altera vero e ramo ophthalmico nervi trigemini nascitur, de quibus vide infra, ubi utriusque nervi mentionem facimus.

- IV. N. trochlearis in Grue nihil omnino, neque quod ad magnitudinem nec quod ad decursum attinet, a nervo eodem corvi cornicis differt.
- V. N. trigeminus, quod attinet ad portiones illas, quæ diversum exercent vim physiologicam, nihil omnino a nervo codem corvi cornicis differt sed, si illum cum nervo trigemino

corvi ad magnitudinem comparaveris, facile nervum trigeminum et quidem portionem illius sensitivam in Grue cinerea majorem esse agnoveris. E. ganglio semilunari Gasseri more solito tres nascuntur rami, scilicet ramus ophthalmicus, maxillaris superior et inferior.

A) R. primus s. ophthalmicus, (Tab. X. Fig. 1 N:o 2) ramo eodem corvi cornicis aliquanto major, eundem servat decursum usque ad apicem rostri superioris.

Sequentes rami e nervo ophthalmico nascuntur:

- a) R. ad glandulam frontalem (Tab. X Fig. 1 N:o 3) ab externo margine nervi, ubi orbitam intrat, oriundus extrorsum et in adversum ad superficiem superiorem bulbi oculi usque ad marginem internum glandulæ frontalis porrigitur, ubi tandem cum ramo interno nervi palpebralis superioris rami secundi nervi trigemini totus quantus coalescit, surculosque ablegat tenerrimos ad glandulam, cujus mentionem fecimus, et cutem pertinentes.
- b) R. ciliaris primus (Tab. X Fig. 1 N:0 4) brevissimus, qui, e margine interno nervi oriundus introrsum porrectus totus quantus in ganglion ciliare abit.
- c) R. ciliaris 2:dus, ramo præcedente minor, eandem habet originem et decursum et in extremitatem posteriorem ganglii ciliaris abit *).

^{*)} Ramum huncee interdum cum nervo oculomotorio ubi in duos ramos discedit coalescere observavimus.

d) R. R. supratrochleares (Tab. X Fig. 1 N:o 5), duo rami tenerrimi, e nervo, ubi infra partem anteriorem musculi obliqui superioris procedit, oriundus, in adversum et extrorsum usque ad angulum internum fissuræ palpebrarum porriguntur, ubi surculos ablegant tenerrimos ad membranam nictitantem et cutem palpebræ pertinentes.

In hoc decursu nervus, de quo loquimur,

- a) duos vel tres ramos gignit tenerrimos, qui mox in ganglion ethmoidale abeunt.
- e) R. nasalis superior (Tab. X Fig. 1 N:o 6) præcedente major et e nervo, ubi is supra concham superiorem nasi decurrit, ortum ducens, extrorsum et in adversum, juxta marginem externum ossis intermaxillaris superioris, porrectus, surculos ahlegat tenerrimos ad cutem externam supra orificium externum nasi pertinentes.
- b) N. ethmoidalis, (Tab. X Fig. 1 N:o 7) continuationem proponens rami ophthalmici nervi trigemini, prorsum et introrsum, in superficie interna conchæ superioris, ad nervum eundem lateris oppositi appropinquat, et ad marginem posteriorem et inferiorem septi narium, ubi ope telæ cellulosæ cum nervo eodem lateris oppositi est conjunctus, deorsum ad foramen incisivum procedit. Foramine hoc perforato, ad cavitatem oris pervenit, ubi, a membrana pulposa rostri superioris tantum tectus, tandem canalem osseum rostri ejusdem intrat et in duos ramos, ejusdem fere magnitudinis, dirimitur:

- a) R. superior (Tab. X Fig. 1 N:0 8) canalem osseum intrat et ad apicem rostri superioris porrigitur.
- β) R. inferior, (Tab. X Fig. 1 N:0 9) a membrana pulposa tectus, in adversum, inter superficiem inferiorem rostri superioris et lamellam corneam, usque ad apicem rostri superioris protenditur, ramosque ablegat reticulares rostri *). Utrum rami terminales allati nervi ethmoidalis in apice rostri secum invicem vel cum ramis iisdem lateris oppositi coalescant nec ne in medio relinquimus, quum nobis non fuerit occasio hanc rem, quamvis magni quidem anatomici et physiologici argumenti, enodandi.
- B) R. secundus s. maxillaris superior, (Tab. X Fig. 2 N:o 2) a posteriore margine Ganglii Gasseri oriundus **), et ramo præcedente minor, in adversum procedit atque mox in plures ramos discedit, qui quidem eodem fere loco e nervo nascuntur. Sequentes rami e nervo nostro prodeunt:
- a) R. recurrens (Tab. X Fig. 2 N:0 3) haud exiguæ magnitudinis et angulo obtuso e nervo oriundus, rete mirabile e carotide cerebrali conformatum, penetrat, et in canali osseo eodem modo retrorsum decurrit atque in corvo cornice. Ubi in canali osseo allato decurrit, cum nervo faciali coalescit, atque, paullo

^{*)} N. N. ethmoidales utriusque lateris, ubi in palato procedunt, nullum inter se habeut commercium neque in Grue nec in corvo uti disquisitiones nostræ nuperrime institutæ nosmet docuerunt.

^{**)} In corvo unacum ramo maxillari inferiore e Ganglio Gasseri nascitur.

antequam canalem allatum relinquit. in plexum gangle y mornintumescit (Tab. X. Fig. 2 N:o 8). E foramine egressus in ramum internam et externam dirimitur, quorum hic, ad maximum saltem partem, fibrillas continet quæ nervo faciali, ille vero fi rillas quæ ramo recurrenti, de quo loquimur, sunt tribuendæ.

Rami quos gignit nervus noster sunt sequentes:

- a) Chorda tympani (Tab. X Fig. 2 N:0 6) e margine externo plexus gauglioformis nas itur et in alversum in superficie interna membranæ tympani supra columellam parrigitur ubi, surculo tenervimo al musculum columellæ allegato, ad marginem interiorem membranæ tympani protenditur. Ulteriorem vero hujus nervi decursum persequi nobis non contigit.
- β) R. internus, (Tab. X Fig. 2 N:0 7) ejusdem fere magnitudinis cum ramo externo, mon in dues rames discella qui in nervum vagum, glossopharyngeum et ganglion cervicale supremum abeunt.
- 3) R. communicanscum ganglis cervicali supremo et nervo glossopharyngeo (Tab. X Fig. 2 N: 99) max cum murgine superiore et anteriore ganglii cervicalis supremi coalescit, ubi fibrillas ablegat quæ partim in ganglion allatum et truncum

²⁾ Quamvis connexum hajus nervi cum ramo tertio rervi trigemeri detegere non potuerimus, tamen nobis persvasum habemus, ramum buncce cum chorda tympani hominis atque mammahum eme aquiparandom, la corva cornice ramum huncce non observavimus vide tractat nostr. c. pag. 514.

nervi glossopharyngei abeunt partim vero, et quidem ad maximam partem, inter ganglion nuperrime commemoratum et nervum glossopharyngeum porrectæ, antrorsum flectuntur et in nervum nostrum sphenopalatinum abeunt, de quo vide, quæ infra dicuntur ubi ganglii cervicalis supremi mentionem facimus.

- β') R. communicans cum nervo vago (Teb. X Fig. 1 N:o 34) ad marginem externam ganglii cervicalis supremi, quocum etiam est conjunctus, porrigitur et in truncum nervi vagi, paullo antequam in plexum ganglioformem intumescit, abit. Fibrillarum vero decursum intra vaginam nervi vagi enucleare nobis non contigit.
- γ) R. externus, (Tab. X Fig. 2 N:o 10) brevissimus, mox in duos dirimitur ramos, ex quibus ramus internus in musculum digastricum abit, externus vero in ramum stylohyoideum et cutaneum colli discedit.
- γ') R. digastricus (Tab. X Fig. 2 N:o 11) brevissimus, qui mox in musculum digastricum abit.
- γ^*) R. stylo hyoideus (Tab. X Fig. 2 N:o 12) ramo sequente aliquanto minor, in adversum procedit et totus quantus in musculum stylohyoideum abit.
- 7") R. cutaneus colli, (Tab. X Fig. 2 N:o 13) ramo præcedente major, deorsum in superficie interna musculi cutanei colli porrigitur, ramulosque ablegat qui, ad musculum allatum

pertinentes, cum ramis cutaneis nervi cervicalis secundi et tertii sunt connexi. °)

- b) N. palpebralis superior, (Tab. X Fig. 2 N.o 14) haud exiguæ magnitudinis, sursum et in adversum, inter musculum temporalem et pterygoideum, porrectus, in tres vel quatuor ramos discedit, qui quidem, ramo communicante, e ganglio sphenopalatino progenito, augentur, et denuo coalescunt. Nervus, de quo loquimur, in superficie superi ore glandulæ lacrymalis procedit, cum ramo communicante rami glandulæ frontalis, e ramo primo nervi trigemini petito, conjungitur et tandem in duos dirimitur ramos, quorum ramus externus in cutem palpebræ superioris abit, internus vero cum ramo glandulæ frontalis, de quo supra mentionem fecimus, coalescit et in glandulam frontalem abit.
- c) R. lacrymalis (Tab. X Fig. 2 N:o 15) trunco communi cum ramo præcedente e ganglio semilunari Gasseri nascitur et, in adversum porrectus, ramo communicante e ganglio sphenopalatino augetur. Mox vero in duos ramos dirimitur quorum alter in glandulam lacrymalem atque palpebram inferiorem abit, alter vero cum nervo infraorbitali coalescit.
- α) R. communicans cum nervo infraorbitali (Tab. X Fig. 2 N:0 17) haud exiguæ magnitudinis deorsum et antrorsum

^{*)} Etsi ramum huncee in corvo cornice, in Tractatu nostro de nervis cerebralibus corvi observavimus, disquisitiones nostræ postea institutæ nobis persuaserunt, ramum cutaneum colli etiam in corvo adesse.

in superficie inferiore bulbi oculi procedit et cum nervo infraorbitali coalescit.

- d) N. infraorbitalis, (Tab. X Fig. 2 N:o 16) ramorum nervi maxillaris superioris longe maximus, continuationem proponit rami trigemini de quo quæritur. Inter musculum temporalem et pterygoideum internum porrectus in adversum, partem inferiorem versus bulbi oculi, ubi ramo communicante nervi lacrymalis augetur, tendit atque in tres ramos dispescitur:
- α) N. palpebralem inferiorem (Tab. X Fig. 2 N:o 18) qui, e superiore margine nervi oriundus, mox in cutem palpebræ inferioris ad angulum internum oculi abit.
- β) N. alveolarem anteriorem, (Tab. X Fig. 2 N:o 19) qui, in adversum infra bulbum oculi ad sinum maxillarem procedit, ubi ramulos emittit ad marginem rostri superioris pertinentes.
- γ) N. cutaneum anguli oris (Tab. X Fig. 2 N:o 20) qui, e margine inferiore nervi nostri, ubi ramus præcedens ad sinum maxillarem tendit, oriundus, deorsum rostrum inferius versus usque ad sinum nuperrime allatum porrigitur ramulosque gignit ad membranam mucosam anguli oris et sinus allati pertinentes.

Ganglion sphenopalatinum (Tab. X Fig. 2 N:o 5') etiam in Grue cinerea obvenit, quamvis minus evolutum quam ganglion hocce in Corvo cornice observavimus. Ganglion sphenopalatinum, sanc minimum, intumescentiam proponit subrotundam

lutei vel flavescentis coloris, et in ipso angulo, quo ramus recurrens a ramo secundo nervi trigemini discedit, sitam. E ganglio nostro rami nascuntur tenerrimi, qui rubicundo vel flavescente colore insignes, in ramos nervi maxillaris superioris, scilicet in nervum palpebralem superiorem, lacrymalem, et infraorbitalem, de quibus supra locuti sumus, abeunt.

c) R. tertius s. maxillaris inferior, (Tab. X Fig. 2 N:o 21) omnium ramorum nervi trigemini sine dubio maximus, atque inter ramum secundum et primum e Ganglio semilunari Gasseri oriundus, portionem motoriam nervi trigemini totam quantam excipit. Ramus, de quo quæritur, in adversum paullumque deorsum, inter musculum temporalem et pterygoideum internum, ad aperturam posteriorem canalis alveolaris inferioris progreditur, ubi ulterius in canali allato situs usque ad apicem rostri inferioris porrigitur.

Rami sequentes e ramo maxillari nascuntur:

- a) N. temporalis, (Tab. X Fig. 2 N:o 22) haud exiguæ magnitudinis et e margine posteriore nervi oriundus, extrorsum porrigitur et mox surculos ablegat ad musculum temporalem pertinentes.
- b) N. pterygoideus, (Tab. X Fig. 2 N:o 23) ramo præcedente aliquanto major in adversum et deorsum, inter musculos pterygoideos, protenditur ramosque gignit ad utrumque musculum pterygoideum pertinentes:

- a) R. pterygoideus internus, qui, ramo sequente multo minor, mox in musculum pterygoideum internum abit.
- 3) R. pterygoideus externus continuationem proponit nervi. de quo loquimur, et totus quantus in musculum pterygoideum externum abit.
- c) N. mentalis, (Tab. X Fig. 2 N:o 24) ramis præcedentibus multo minor, e margine externo nervi, ubi canalem alveolarem inferiorem intrat, oriundus, extrorsum, per foramen peculiare maxillæ inferioris, paullo infra condylum maxillæ, canalem, quam mentalem appellare juvat, intrat et ad superficiem externam musculi temporalis pergit. Hinc rectà in adversum, usque ad laminam corneam rostri inferioris, porrigitur, ramulosque ablegat ad laminam corneam rostri inferioris.
- d) N. mylohyoideus, (Tab. X Fig. 1 N:o 12.) ab inferiore margine nervi alveolaris, ubi in canali alveolari procedit, oriundus, canalem mylohyoideum intrat et tandem, e canali allato egressus. ramulos ablegat. qui ad musculum mylohyoideum pertinent.
- R. R. Reticulares et dentales, Tab. X Fig. 1 N:o 14) surculi tenerrimi, diversæ quidem magnitudinis, e margine superiore nervi, ubi in canali alveolari maxillæ inferioris procedit, nascuntur et in marginem superiorem atque substantiam spongiosam rostri inferioris abeunt.

Quod jam attinet ad differentiam nervi trigemini in Grue cinerea et Corvo cornice, paucis illam heic attingere juvat.

Quamquam nervus ouhthalmicus in utraque avium, de quibus agitur, exceptis ramis minoribus, qui e nervo allato prodeunt, fere totus quantus in nervum ethinoi blem abit, ramum huncce itemque nervum alveolarem inferiorem in Grue majorem esse quam in Corvo, observavimus, quo ex capite etiam jure concludere possumus, rostrum Gruis, utpote organon tactus. magis esse evolutum quam Corvi cornicis. Caret Grus ramis ad bulbum plumarum rigidarum supra orificium nasi pertinentibus. hi vero in Corvo adsunt, unde satis elucet plumas allatas in corvo organon proponere tactus, quo caret Grus. Connexus ille nervi optholmici cum ramo interno nervi recurrentis et ganglio cervicali supremo atque ganglio nostro ethmoidali, quem in Grue observavimus, in Corvo, secundum disquisitiones nostras. non idest, hujus vero rei vim physiologicam heiu disserere non vacat. De catero quod ad ramos e nervo maxillari superiore et inferiore prodeuntes attinet, ex disquisitionibus nostris hac in re factio, satis superque elucet differentiam minoris quidem momenti inter Corvum cornicem et Gruem cineream interesse, qua in re nobis tantummodo animadverten lum est, nosmet, ramum subcutaneum mala, qui in Corvo adest, in Grue non cheervasse, ramum vero mentalem nervi alveolaris inferioris, qui in Grue adest, in Gorvo non obvenire, quod nobis judicibus optime quadrit cum restro Gruis cinerex utpote organo tactus magis evouto quam in Corvo allato.

- VI. Nervus abducens canalem osseum proprium ossis sphenoidei permeat, et ad foramen opticum procedit, ubi membranam fibrosam, ad externam partem nervi oculomotorii et optici, penetrat, et ope telæ cellulosæ cum nervo oculomotorio conjunctus, orbitam intrat. In orbita, inter nervum oculomotorium et originem musculi recti oculi externi, situs prorsum ad partem externam orbitæ progreditur et totus quantus in musculum rectum oculi externum abit. Nervus in orbita procedens sequentes gignit ramos:
- a) R. pyramidalem, qui, inter nervum opticum et musculum rectum oculi inferiorem porrectus, ad musculum pyramidalem membranæ nictitantis abit.
- b) R. quadratum qui, præcedente brevior, extrorsum et in adversum porrectus, in musculum quadratum membranæ nictitantis pergit.
- c) R. ciliarem, sane tenerrimum, qui antrorsum procedit mox vero in duos discedit ramulos, quorum alter in ganglion ciliare, alter vero in truncum ciliarem internum ganglii ciliaris abit.
- VII. Nervus facialis (Tab. X Fig. 1 N:o 15) in meatu auditorio interno eodem modo decurrit atque cum nervo acustico idem habet commercium, ut in Corvo cornice. Ubi canalem Fallopii intrat in ganglion geniculum (Tab. X Fig. 1 N:o 17) intumescit, et deorsum atque extrorsum flectitur ramum versus re-

currentem nervi maxillaris superioris, quocum etiam coalescit ut ab illo vix possit separari. Fibrillæ nerveæ, vero nervi facialis, intra vaginam nervi recurrentis pergentes, tandem in ramum externum nervi allati abeunt.

Rami, qui e nervo faciali nascuntur sunt

- a) R. petrosus superficialis major, (Tab. X Fig. 1 N:o 15) haud exiguæ magnitudinis et e ganglio geniculo oriundus, deorsum et in adversum porrectus in nervum sphenopalatinum abit, quocum totus quantus coalescit.
- b) Chorda tympani (Tab. X Fig. 2 N:0 6) de quo vide supra pag. 596.
- cus et cutaneus calli (Tab. X Fig. 2 N:o 12) r. digastricus et cutaneus calli (Tab. X Fig. 1 N:o 20 Fig. 2 N:o 13) de quibus vide supra pag. 597.
- VIII. Nervus acusticus (Tab. X Fig. 1 N:o 16) neque que l'ad decursum nec ad ramificationem a nervo codem Corvi cornicis differt.
- IX. Nervus glossopharyngeus (Tab. X Fig. I. Nio 22.) Quod ad radices, e medulla oblongata prodeuntes attinet, nibiq omnino a nervo eodem Corvi cornicis habet diversum, sed eo tamen differt, quod ganglion Mülleri nervi nostri in foramine jugulari nervi vagi coalescit, ubi ganglia, quorum mentionem fecimus, membrana fibrosa, cum periosteo ossis occipitis connexa, arctissime circumdantur, ut ganglion jugulare nervi glossopharyn-

gei, ab eodem ganglio nervi vagi vix ac ne vix quidem separare possis.

Sed antequam aperturam; externam canalis jugularis assecutus est nervus glossopharyngeus, jam antrorsum e nervo vago discedit atque canalem osseum nervo nostro proprium permeat. E cavitate cranii egressus, ad marginem superiorem ganglii cervicalis supremi porrigitur, ubi cum ganglio allato atque ramo interno nervi recurrentis est connexus, atque, ut nobis saltem visum est, quadantenus iutumescit. ") Hinc, ad marginem anteriorem ganglii cervicalis supremi, in superficie externa carotidis cerebralis, deorsum usque ad locum quo in ramos dispescitur carotis communis, tendit quo loco nervus noster ramo communicante, (Tab. X Fig. I. N:o 24) e nervo vago prodeunte, augetur atque in ganglion petrosum intumescit, ramosque gignit duos, ramum auteriorem et posteriorem s. descendentem, quos infra explicabimus.

Ganglion petrosum nervi glossopharyngei, (Tab. X Fig. I. N:o 23) ganglio eodem Corvi cornicis majus, et inter partem superiorem carotidis communis, ubi in quatuor ramos dirimitur, atque truncum nervi vagi situm, **) formam habet ablongoovatam vel quadantenus quadrangularem atque colore eximio rubicundo

^{°)} Utrum intumescentia hæcce revera sit gangliosæ indolis, nec ne, in medio relinquimus.

^{**)} Si ganglion hocce ab interna parte præparaveris in conspectum non venit, nisi, elevatis carotide communi et vena jugulari interna.

est imbutum. E ganglio hocce ramus anterior et pesterior mascuntur, qui quidem alter ab alteru discedant, aque ramo communicante, qui e funiculo cervicali critur nervi symputhici, assequam bic in ganglion cervicale supremum abit, augentur. Ganglion de quo loquimur, multum habet commercium cum ganglio radicis nervi vagi, quod in Garvo cervice chservavimus. Antequam in ramos, de quibus supra jam locuti sumus, dirimitur nervus glossopharyngeus, nullos ramos emittit, uti nostræ saltem disquistiones mbis persvaserunt. Rami nervi glossopharyngei sant sequentes:

- A.) R. anterior, (Tab. X Fig. L No 25) ejusdem fere magnitudinis cum rama pasteriore sa descendente, e parte inferiore et angulo anteriore ganglii petrosi oriundas, antronsum inter articulationem maxillæ inferioris et carnu ssis hyuidei ilenitur, ubi, latior factus, in tres ramos discedit:
- a) R. communicans cum ramo descendente, (Tab. X Fig. I. No. 27) ramorum rami anterioris fere minimus, retrorsum, supra comu ossis hyridei musualisque cornus allui tegentes ad marginem posteriorem cornus assis hyridel allu uni max cum ramo descendente coalescit.
- b) R. ceratoglossus, (Tab. X Fig. I. No 28) e margine anteriore nervi triundus, in adversum portigitus asque la muscu-lum ceratoglossum abit.
- e) R. laryngo lingualis (Tab. X Fig. L No. 29) continuationem proponit rami americas an glossopheryngel, et antror-

gem superiorem assecutus est nervus, de quo agitur, in ramum lingualem et laryngeum superiorem, qui ejusdem fere sunt mag-. nitudinis, discedit.

- a) R. lingualis (Tab. X Fig. I. N:o 30) antrorsum, juxta ramum ossis hyoidei et marginem internam tracheæ et laryngis superioris, ubi ramo communicante nervi hypoglossi (Tab. X Fig. I. N:o 40) augetur, usque ad basin linguæ protenditur. Hinc sursum, dorsum linguæ versus ulterius tendit, ramulosque dispergit tenerrimos ad papillas linguæ pertinentes. In hoc decursu ramulum pharyngeum ablegat.
- α') R. pharyngeus superior, (Tab. X Fig. I. N:o 31) tenerrimus, qui, e nervo, ubi ad ramum ossis hyoidei decurrit, oriundus, mox sursum, ad partem superiorem pharyngis, porrigitur atque, nullis ramis ad musculos huc pertinentes ablegatis. ramulos in membranam mucosam et quidem, uti nostræ disquisitiones docuerunt, ad plicas longitudinales membranæ mucosæ pharyngis dispergit.
- β) R. laryngeus superior, (Tab. X Fig. I. N:o 32) ejusdem fere est magnitudinis cum ramo linguali, e quo angulo acuto digressus, ad laryngem superiorem porrigitur, ramulosque ablegat tenerrimos, qui in membranam mucosam laryngis abeunt, sed etiam ramulum longissimum qui, ad marginem externam laryngis, in adversum, superficiem versus inferiorem linguæ, protenditur, ubi surculos ablegat.

B) R. posterior s. descendens s. asophageus, (Tab. X I.g. 1. No. 20) is all engine magnitudinis, ab angulo posteriore marginis inferioris ganglii petrosi oriundus, deorsum ad supernoiem internam rami assis hydidel, ut i ramo communicante rami unteri as agetur. Edique sa supernoiem internam nervi hypothesis, us pre ad res plugum protenditur. Hinc. inter venam jugutrem internam et nes plugum, deorsum de urrit ramulasque ablegat tenerrimos qui, ut nobis saltem visum est, tam ad stratum massaultre, quam ed membranam musosam osophagi pertinent.

Quod jam attinet ad differentiam, quæ nervum glossopharyngeum Gruis cineræ et Corvi cornicis intercedit, jam nobis minoriverter dam est, nervum glossopharyngeum Gruis cineræ, in ipso foramine jugulari, arctiorem habere connexum cum in Corvo cornice observavimus. Sed ulterior ejus decursus non est adeo cum nervo vago conjunctus, ut in Corvo cornice. Quo ex capite nervum, de quo agitur, revera in Grue cinerea nervum peculiarem, a nervo vago diversum, poteris existimare, quum e contrario nervum nostrum in Corvo cornice facile pro ramo nervi vagi habeas. Adest etiam in Grue cinerea ganglion petrosum in corvo cornice, intumescentiam proponens totius nervi, quæ de catero neque cum ganglio cervicali supremo nec cum n. recurrente rami secundi nervi trigemini et trunco

nervi vagi talem habet connexum, qualem in Corvo cornice vidimus.

Hac in dispositione ganglii allati differentiam, magni quidem physiologici momenti, agnoscimus ganglii petrosi nervi glossopharyngei apud Corvum cornicem et apud Gruem cineream. Etenim in Corvo cornice ganglion, de quo loquimur, partem esse ganglii cervicalis supremi, statuere poteris; sed ganglion petrosum Gruis cinereæ a ganglio cervicali supremo distinctum et diversum sese præbet, vel ut sic dicam intumescentiam ostendit peculiarem et nervo glossopharyngeo propriam, qualis etiam in homine adest, unde ganglion petrosum revera centrum habere licet, e quo distributio peripherica nervi glossopharyngei quasi nascitur. Si itaque ganglion petrosum glossopharyngei ganglion organi gustus existimaveris, e dispositione anatomica ganglii allati, nobis judicibus, jure meritoque concluditur, organon gustus Gruis cinereæ magis esse evolutum, quam idem est organon in Corvo cornice. Quod denique attinet ad distributionem periphericam et magnitudinem ramorum nervi glossopharyngei apud Gruem cineream, nulla omnino exstat differentia inter illam et Corvum cornicem, uti e descriptione nostra anatomica potes colligere.

Id tantum nobis animadvertendum est, ramum oesophageum rami posterioris nervi glossopharyngei apud Gruem eximia præditum esse magnitudine, si illum cum ramo eodem Corvi cornicis comparaveris, ramosque ablegare ad membranam mucosam pertinentes, quos in Corvo observare nobis non contigit. Confinet vero ramus, cujus mentionem facimus, ad maximam saltem partem fibrillas primitivas, quæ e nervo vago derivandæ, per ramum communicantem nervi vagi ad ganglion petrosum. atque hinc in ramum posteriorem vel descendentem nervi glossopharyngei abeunt, atque sensibilitate oesophagi, nervo vago propræ, imperant.

N. cagus (Tab. X. Fig. 1 N:o 33) eundem servat decursum apud Gruem cineream atque in Corvo cornice, sed eo inprimis differt, quod plexus ganglioformis nervi vagi, ad posteriorem marginem ganglii cervicalis supremi situs, magis est evolutus, ut plexum allatum re vera ganglio æquiparandum esse appareat.

Pierro proglioformi intumesoration proponit oblongo ovatam totius nervi, massamque continet nerveam rubicundi coloris, qua, cpe microscopii examinata, numerosos globulos gangliosos cum fibrillis nerveis primitivis commixtos præbet.

Antequam in plexum, de quo locuti sumus, intumescit nervus noster, ramo communicante nervi recurrentis rami secundi nervi trigemini augetur.

R. communicans nervum recurrentem cum nervo cago (Tab. X Fig. 1 Nao 34), e nervo recurrente, ubi canalem osseum relinquit, oriundus, deorsum ad marginem posteriorem ganglii cervicalis supremi porrectus, totus quantus in truncum nervi vagi

intra vaginam nervi vagi satis enucleare nobis non contigerit, verosimile tamen putamus, fibrillas hasce intra vaginam nervi vagi ad eum ramum procedere, qui cum ganglio petroso nervi glossopharyngei, est communicans, atque inde ganglion petrosum permeantes, in ramum anteriorem nervi glossopharyngei abire. Quod si res ita se habet, fibrillæ allatæ rami communicantis ramo linguali nervi trigemini hominis et mammalium æquiparandæ sunt. Quæ si ita sint, ramum lingualem nervi trigemini Gruis cinereæ singularem et a ramo eodem Corvi cornicis diversum habere decursum, nemo est qui non intelligat.

Rami sequentes e nervo vago nascuntur:

- A) *R. occipitalis* (Tab. X Fig. 1 N:0 36) qui, e margine posteriore nervi vagi oriundus, extrorsum porrectus in musculum splenium capitis abit *).
- B) R. communicans cum ganglio cervicali supremo (Tab. X Fig. 1 N:0 35) brevissimus, qui, e margine anteriore nervi vagi, ubi ad marginem posteriorem ganglii cervicalis supremi tendit, oriundus, mox in ganglion allatum abit **).
- C) R. communicans cum ganglio petroso nervi glossopharyngeo, (Tab. X Fig. 1 N:o 24) haud exiguæ magnitudinis,

^{*)} Utrum fibrillæ nerveæ, ad hunc ramum pertinentes, re vera e nervo accessorio Villisii, vel nervo faciali sint derivandæ nec ne, enucleare non potnimus.

^{**)} Pro certo statuere non audemus ramum hunc communicantem e nervo vago nasci, vel e ganglio cervicali supremo ortum ducere.

et ab anteriore margine plexus ganglioformis oriundus, in marginem posteriorem ganglii petrosi totus quantus abit, cujus fibrillæ primitivæ, minore ex parte in ramum anteriorem, ex maxima vero parte in ramum posteriorem nervi glossopharyngei, protenduntur.

Ad inferiorem partem plexus ganglioformis truncus nervi vagi vagina communi cum nervo hypoglosso circumdatur, ita tamen ut nullas fibrillas primitivas e nervo vago natas in nervum hypoglossum abire observaverimus, sed e contrario aliquot fibrillas, quæ, e nervo hypoglosso oriundæ, in truncum nervi vagi abeunt *).

XI. N. accessorius Villisii in Grue sicut in Corvo omnium nervorum cerebralium longe minimus, e medulla spinali oriundus, more solito ad foramen jugulare protenditur, ubi, membrana fibrosa penetrata, mox cum ganglio radicis nervi vagi ita coalescit, ut ulteriorem decursum fibrillarum, quæ n. accessorio sunt propriæ, etsi omni cura adhibita, explicare nobis non contigerit.

XII. N. hypoglossus, (Tab. X Fig. 1 N:0 37) in Grue cinerea ejusdem fere magnitudinis ac in Corvo cornice, e medulla oblongata oriundus, per foramen condyloideum anterius e cavitate cerebri egreditur. E foramine nuperrime allato egressus, mox

^{*)} Ulteriorem decursum nervi vagi ad cavitatem pectoris et ventriculum inquirendi nobis non suit occasio.

ramo adscendente nervi cervicalis primi ramoque communicante (Tab. X Fig. 1 N:o 41) ganglii cervicalis supremi augetur, et, deorsum juxta marginem posteriorem ganglii cervicalis supremi ad marginem posteriorem nervi vagi paullo infra plexum ejus ganglioformem, descendit ubi vagina cum nervo vago communi circumdatur. Hinc *) ulterius deorsum juxta superficiem inferiorem rami ossis hyoidei et juxta externam partem rami posterioris nervi glossopharyngei, usque ad oesophagum porrigitur et in ramum anteriorem s. lingualem atque ramum posteriorem s. laryngeum superiorem dirimitur. Sequentes rami e nervo hypoglosso nascuntur:

- A) R. communicans cum nervo vago, brevissimus, qui, e margine anteriore nervi hypoglossi, ubi vaginam nervi vagi intrat, oriundus, mox in nervum vagum abit. Ut nobis saltem visum est, ramus, de quo mentionem fecimus, fibrillas continet e n. hypoglosso ortas, sed pro certo tamen statuere non possumus, ramum huncce tantummodo fibrillas nervo hypoglosso proprias, vel etiam fibrillas e nervo vago petitas, continere.
- B) R. lingualis, (Tab. X Fig. 1 N:0 38) angulo acuto e ramo sequente discedens, juxta laryngem superiorem in adversum ad ramum ossis hyoidei porrigitur, ubi ramo communicante

^{*)} Truncum nervi hypoglossi in descriptione nostra nervorum cerebralium Corvi Conicis uti ramum laryngolingualem n. vagi designavimus.

tenerrimo (Tab. X Fig. 1 N:o 40) cum ramo linguali nervi glossopharyngei conjungitur, ramosque ablegat ad musculos linguæ pertinentes.

C) R. laryngeus (Tab. X Fig. 1 N:o 39) deorsum ad tracheam procedit, ubi ulterius juxta musculum sternotrachealem ad laryngem inferiorem descendit.

Pars cephalica nervi sympathici.

Ganglion cervicale supremum, haud exiguæ magnitudinis. et cjusdem fere formæ, atque in Corvo cornice funiculo sympathico cervicali ope rami, (Tab. X Fig. 1 N:o 42) in vagina carotidis porrecti, est connexum. E ganglio cervicali, quod cum nervis supra allatis conjungitur, plures prodeunt rami qui, brevissimi quidem, mox in nervum recurrentem, glossopharyngeum, vagum et hypoglossum (Tab. X Fig. 1 N:o 41) abeunt. Nascitur vero e ganglio, de quo loquimur, ramus magni sane momenti, quem, in tractatu nostro de nervis cerebralibus Corvi cornicis, uti nervum sphenopalatinum designavimus.

Nervus sphenopalatinus (Tab. X Fig. 1 N:o 44) fibrillas continet quæ, ad maximam partem ramo recurrenti nervi maxillaris superioris sunt tribuendæ. Nervus, de quo agitur, inter marginem anteriorem ganglii cervicalis supremi et nervum glossopharyngeum, quibuscum arctissime est connexus, porrigitur et fibrillis, quæ e ganglio cervicali supremo nascuntur, augetur. In ca-

nali osseo ossis sphenoidei porrectus, ad aperturam anteriorem canalis, cujus mentionem fecimus, in ramum profundum nervi vidiani et nasopalatinum Scarpæ discedit, quorum ille cum ramo petroso superficiali majore coalescit, e qua conjunctione nervus pterygopalatinus formatur, hic vero usque ad ramum ophthalmicum nervi trigemini procedit, ubi in ganglion, quod ethmoidalis nomine designatum volumus, intumescit.

- a) R. profundus nervi Vidiani, (Tab. X Fig. 1 N:o 45) sane tenerrimus et brevissimus, mox in ramum petrosum superficialem majorem nervi facialis abit, quocum totus quantus coalescit, unde nervus quem nervo pterygopalatino hominis atque mammalium æquiparandum autumamus.
- N. pterygopalatinus, (Tab. X Fig. 1 N:o 49) inter musculum pterygoideum externum et internum, infra bulbum oculi in adversum concham inferiorem versus procedit, ubi surculos dispergit tenerrissimos ad membranam mucosam sinus maxillaris pertinentes.

Rami qui e nervo pterygopalatino nascuntur sunt:

a) R. R. palatini, (Tab. X Fig. 1 N:o 50) duo rami qui, e nervo, ubi infra concham inferiorem procedit, oriundi, deorsum porrecti musculum pterygoidum internum perforant et in membranam mucosam palati abeunt.

b) N. nasopalatinus Scarpæ (Tab. X Fig. 1 N:0 48)°) ramo præcedente multo major et continuationem proponens nervi sphenopalatini, sursum bulbum oculi versus adscendit. Hinc infra nervum opticum, inter glandulam Harderi et musculum rectum oculi internum, usque ad ramum ophthalmicum nervi trigemini procedit ubi in ganglion, quod ethmoidalis nomine volumus significatum intumescit.

^{*)} Decursum hujus nervi, quem in Gorvo cornice non enucleavimus, (Vide tractat, nostrum de nervis cerebralibus Corvi cornicis pag. 542) jam ex disquisitionibus nostris in Grue cinerea extra omnem dubitationis aleam positum contendimus, sed quamquam nobis persuasum est, nervum, de quo quæritur, nervo nasopalatino Scarpæ hominis esse æquiparandum. ganglion tamen nostrum ethmoidale ganglio incisivo hominis et mammalium respondere dubitamus, eo quidem ex capite quod in utroque latere ganglion hocce adest neque nobis fuit occasio quæstionem instituendi hac in re gravissimi sane momenti, sint ne ganglia ethmoidalia utriusque lateris secum invicem connexa. Nervum nostrum nasopalatinum Scarpæ Celeberrimus Schlemmius (in opere, quod inscribitur: Observationes neurologicæ Berol. 1834 pag. 18, in Meleagride Gallopavone uti ramum recurrentem s. vidianum descripsit. Putat vero Schlemmius nervum huncce ramum esse nervi ophthalmici, qui, ut verba auctoris celeberrimi sonant, "postquam a primo ramo trigemini secessit, retro versus juxta interiorem glandulæ Harderianæ marginem recurrit, a vidiano alterius lateris tantummodo septo orbitarum segregatus: pone orbitam sub cranii basi per canalem osseum; qui juxta externum latus tubæ Eustachii osseæ exstat, retrorsum atque sursum usque ad cavum tympani meat, et in nervum facialem, qua hujus genu formatur, immittitur." Rami palatini huju. nervi mentionem fecit etiam Schlemmius I. c. Hunc nervum nasopalatinum Scarpæ nostrum esse, quis est, qui non intelligat.

Ganglion ethmoidale (Tab. X Fig. 1 N:o 46) ad marginem inferiorem nervi ophthalmici situm, lutescentis vel rubicum-di coloris, formæ ovatæ vel irregulariter quadrangularis et haud exiguæ magnitudinis, qualem in tabula potes intueri, sequentes gignit surculos tenerrimos.

- a) R. ad nervum ophthalmicum, (Tab. X Fig. 1 N:o 51) qui, e margine superiore ganglii nostri oriundus, mox in marginem inferiorem nervi ophthalmici abit *).
- b) R. orbitalem anteriorem, (Tab. X Fig. 1 N:o 47) qui, in superficie anteriore glandulæ Harderi et ad marginem anteriorem musculi obliqui inferioris porrectus, in parietem anteriorem orbitæ procedit, ramulosque, ut nobis saltem visum est, dispergit ad membranam fibrosam quæ bulbum oculi cingit.
- c) R. ad glandulam frontalem, qui, omnium ramorum, qui e ganglio ethmoidali nascuntur, sine dubio maximus, infra nervum ophthalmicum parietem anteriorem et superiorem orbitæ versus porrectus, ramulos in ductum efferentem glandulæ frontalis dispergit.

Præter ramos, quos e ganglio nostro progenitos, supra descripsimus, ganglion, de quo quæritur, ramos excipit e ramis supratrochlearibus nervi ophthalmici, quorum mentionem supra pag. 594 fecimus.

^{*)} Ex nostris disquisitionibus nervus, de quo quæritur ope rami tenerrimi tantum cum nervo ophthalmico est connexus.

Quod denique ad rationem attinet, quæ partem cephalicum nervi sympathici Corvi cornicis et Gruis cinereæ intercedit. attinet, lemo non attingiams, quin nervum nee palement e accessivament persvasum nobis habemus, nervum nasopalatinum Corvi cornicis, eandem præbere dispositionem anatomicam, quam in Grue cinerea observavimus.

Explicatio tabulæ.

Fig. 1. Pars dextra capitis Gruis cinereæ.

- a) Concha superior.
- b) d:o media.
- c) Sinus maxillaris.
- d) Septum nasi.
- e) Membrana pulposa palati.
- f) Glandula Harderi.
- g) Musculus pterygoid. intern. elevatus.
- h) Musculus mylohyoideus elevatus.
- i) Lingua.
- k) Larynx.
- 1) Trachea.
- m) Oesophagus.
- n) Musculus cutaneus colli.
- o) Canalis spinalis.
- p) Pars musculi pterygoid. extern. elevat.
- q) Nervus opticus.
- r) Os hyoideum cum musculo ceratoglosso.
- 1) Pars Ganglii semilunaris Gasseri.
- 2) R. ophthalmicus nervi trigemini.
- 3) R. ad glandulam frontalem n. ophthalmici.

4) R. ciliaris primus vel radix longa gangl. ciliar.

d:o.

- 5) R. R. supratrochleares. n. ophthalmici.
- 6) R. nasalis superior
- 7) N. ethmoidalis d:o.
- 8) R. superior n. ethmoidalis.
- 9) R. inferior d:o.
- 10) R. recurrens nervi maxillaris superioris.
- 11) R. maxillaris inferior nervi trigemini.
- 12) R. mylohoideus n. maxillar. inferioris.
- 13) R. alveolaris inferior d:o d:o.
- 14) R. R. reticulares et dentales n. alveolaris inferioris.
- 15) N. facialis.
- 16) N. acusticus.
- 17) Ganglion geniculum nervi facialis.
- 18) N. petrosus superficialis major. d:o.
- 19) R. stylohyoideus d:o.
- 20) R. cutaneus colli d:o.
- 21) Ganglion cervicale supremum.
- 22) N. glossopharyngeus.
- 23) Ganglion, petrosum n. glossopharyngei.
- 24) R. communicans nervi vagi cum ganglio petroso.
- 25) R. anterior n. glossopharyngei.
- 26) R. posterior d:o.
- 27) R. communicans rami anterioris et posterioris nervi glossopharyngei.

- 28) R. ceratoglossus n. glossopharyngei.
- 29) R. laryngolingualis n. d:o.
- 30) R. lingualis d:o d:o.
- 31) R. pharyngeus superior n. d:o.
- 32) R. laryngeus superior n. d:o.
- 33) N. vagus.
- 34) R. communicans nervi recurrentis cum nervo vago.
- 35) R. communicans ganglii cervicalis supremi cum nervo vago.
- 36) R. occipitalis n. vagi (?).
- 37) N. hypoglossus.
- 38) R. lingualis n. hypoglossi.
- 39) R. laryngeus d:o.
- 40) R. communicans inter ramum lingualem n. hypoglossi et glossopharyngei.
- 41) R. communicans ganglii cervicalis supremi cum n. hypoglosso.
- 42) R. sympathicus cervical. ad gangl. cervicale suprem.
- 43) R. externus nervi recurrentis.
- 44) N. sphenopalatinus.
- 45) R. profundus n. vidiani.
- 46) Ganglion ethmoidale.
- 47) R. orbital. anter. gangl. ethmoid.
- 48) N. nasopalatinus Scarpæ.
- 49) N. pterygopalatinus.

- 50) R. R. palatini n. pterygopalatini.
- 51) R. ganglii ethmoidalis ad n. ophthalmicum.

Fig. II. Pars sinistra ejusdem capitis.

- a) Oculus.
- b) Glandula lacrymalis.
- c) Superfic. interna palpebræ interioris.
- d) Pars musculi temporalis absciss, et elevat.
- e) Os quadratum.
- f) Condvlus maxillæ interioris.
- g) Lamina cornea maxill. infer. elevata.
- h) Musculus cutaneus colli.
- i) Musculus pterygoideus internus.
- k) Glandula frontalis.
- 1) Trachea.
- m) Oesophagus.
- n) Musculus digastricus.
- a) Sinus maxillaris.
- p) Carotis.
- 1) Nervus trigeminus.
- 2) R. maxillaris superior n. trigemini.
- 3) R. recurrens n. maxillar. super.
- 4) N. facialis.
- 5) Ganglion sphenopalatinum.
- 6) Chorda tympani.

- 7) R. internus nervi recurrentis.
- 8) Intumescentia ganglioform. n. recurrentis.
- 9) R. communicans n. recurrentis cum ganglio cervical. suprem. et glossopharyngeo.
- 10) R. externus n. recurrentis.
- 11) R. digastricus d:o.
- 12) R. stylohyoideus d:o.
- 13) R. cutaneus colli d:o.
- 14) R. palpebralis super. n. maxillar. super.
- 15) R. lacrymalis d:o d:o.
- 16) R. infraorbitalis d:o d:o.
- 17) R. communicans n. lacrymalis cum nervo infraorbitali
- 18) R. palpebralis inferior nervi infraorbitalis.
- 19) R. alveolaris anterior d:o d:o.
- 20) R. cutaneus anguli oris d:o d:o.
- 21) R. maxillaris inferior n. trigemini.
- 22) R. temporalis n. maxillar. inferioris.
- 23) R. pterygoideus d:o d:o.
- 24) R. mentalis.
- 25) N. glossopharyngeus.
- 26) Ganglion petrosum n. glossopharyng.
- 27) R. communicans n. vagi cum gangl. petroso.
- 28) R. anterior n. glossopharyngei.
- 29) R. posterior d.o.

- 30) R. communicans rami anterioris et posterioris nervi glossopharyngei.
- 31) R. lingualis n. glossopharyngei.
- 32) N. vagus.
- 33) N. hypoglossus.
- 34) R. lingualis n. hypoglossi.
- 35) R. laryngeus d:o.
- 36) R. d:o n. glossopharyngei.
- 37) N. cervicalis tertius.

DE FRAMSTEG,

SOM

KUNSKAPEN OM JORDMAGNETISMEN GJORT, I SYNNERHET UNDER DE SEDNASTE DECENNIERNA.

Föredr. på Finska Vetenskaps-Societetens årsdag den 29 April 1851,

AF

HENR. GUST. BORENIUS.

000

När vi foretaga oss undersökningen af någon företeelse inom den egentliga fysikens område, så sker sådant lättast genom anställda experimenter. Fenomenet framkallas nemligen under mångahanda varierande omständigheter, för att salunda skilja det tillfälliga ifrån det väsendtliga, afgöra hvilka som äro de verkande orsakerna, och utröna hvad som utgör villkoret för dessas verksamhet. Men dessa medel stå oss lika litet till buds, när vår forskning sysselsätter sig med verldskroppar i allmänhet, som när fenomener, hörande antingen till meteorologin eller till jordmagnetismen, utgöra föremålet för densamma. Här äro alla förhållanden af naturen fastställda, och företeelserna kunna af oss hvarken efter

behag framkallas, eller förändras, eller underkastas några förut gifna villkor. De mångahanda olika omståndigheter, under hvilka de vid vår jord förekommande naturfenomener uppstå, stället hvarest den verkande kraften oftast befinner sig, atmosferens högre regioner. Iikasom jordens djupa schakter äro undandragna för forskarens omedelbara undersökning, och det återstår honom endast, att ifrån sin engång för alltid anvista ståndpunkt med uppmärksamt öga följa fenomenets förlopp, och att ur det, som naturen sjelfinant erbjuder, genom sammanställande af de väsendtligaste momenterna, sluta till de orsaker, af hvilka fenomenet blifvit framkalladt.

Alla de hinder, som kunna försvara en vetenskaps hastiga framsteg, finnas salunda i rikt mått förenade vid forskningar, rörande dessa tvenne kunskapsgrenar, meteorologin och läran em jordmagnetismen. Då desamma likvål, så i praktiskt som vetenskapligt afseende äro af icke ringa betydenhet, så hafva de isynnerhet i nyaste tider blifvit omfattade med det lifligaste intresse, och derigenom framkallat nya, kraftiga hjelpmedel och verksamma methoder.

Vid en närmare jemförelse emellan de meteorologiska och de magnetiska fenomenerna kunna vi icke undgå att anmärka, att. osktadt den emellan båda i flere afseenden rådande likheten, de sednare likvål åfven till några omståndigheter betydligt skilja sig ifrån de förra. Ty om också oscillationer uti atmosferens medeltillstånd hånnas på en stor del af jorden, om starka vindar

inom kort tid genomlöpa hundradetal af mil och ovanligt höga eller låga barometerstånd nästan liktidigt inträffa på orter, som äro betydligt aflägsna från hvarandra, så är man likväl alltid i stånd att uppgifva, inom hvilken tid dessa förändringar progressivt skridit framåt ifrån en ort till en annan. Helt annorlunda är förhållandet med de magnetiska fenomenerna. Vi se här en ny art af förändringar, som inträffa så godt som liktidigt öfver hela Europa. Under sin dagliga regelbundna gång visar nålen hos oss med ens någon momentan förändring, och nästan i samma tidsmoment visar sig samma förändring, med större eller mindre intensitet, på de öfriga magnetiska observatorierna, ifrån Göttingen ända till Petersburg, och ifrån Petersburg till Katherinenburg och Nertschinsk. Ännu mera märkbar framträder skillnaden emellan de meteorologiska och de magnetiska företeelserne uti en annan omståndighet. Eliuru temperaturen, barometerhöjden, nederbörden, vindarnes riktning och styrka kunna variera år från år, så äro likväl de årliga medelqvantiteterna af dem icke särdeles olika. Några års observationer äro tillräckliga, för att med temmeligen stor säkerhet bestämma desamma. Några sekulära förändringar hafva i detta afseende icke blifvit observerade; gifves det sådana, så äro de säkert mycket små, åtminstone betydligt mindre, an de arliga periodiska variationerna. Huru annorlunda ar deremot förhållandet med jordmagnetismen. Att i anseende till denna sekulära föråndringar finnas, var längesedan bekant, innan ännu de dagliga eller arliga variationerna blifvit observerade; de sednare

äro i jemförelse med de förra så små, att de för att varseblifvas behöfva mycket fina och känsliga instrumenter, då deremot de sekulära variationerna låta något så när bestämma sig äfven med mindre noggranna apparater.

Hvad som likväl i hög grad försvårar den sednare undersökningen, är längden af den period, inom hvilken dessa förändringar för sig gå. Vi hafva att bestämma variationer, som ega rum under århundradens lopp, och likväl hafva först under några få decennier noggranns iskttagelser olver magnetindens viktning blifvit gjorda. Väl var magneten och dess attraktiva och repulsiva kraft mot jernet redan känd hos Grekerne och Romarne; men derntöfver gick likväl de gamlas kännedom icke, och egenskapen hos en fritt sväfvande magnet, att antaga en bestämd riktning efter väderstrecken, var för dem alldeles obekant. Det är troligt, att magnetens användning såsom kompass kommit till Europa ifrån Chinesarne, hos hvilka densamma påstås hafva varit känd redan långt före början af vår tidräkning. Afven voro de äldsta kompasser hos Venetianarne inrättade på samma sätt som hos Chinesarne, sålunda nemligen, att man lät simma en magnet på en korkbit. Tiden, när denna upptäckt blifvit i Europa bekant, känner man icke med säkerhet. Are Frode, författaren af Islands Landnamobok, eller berättelsen om Islands upptäckt, förtäljer), att Floke Vilgerdarson, en namnkunnig viking, omkring 868 utgick ilian Rogaland i Norrige, for att soka Gardarsholm eller Is-

^{*)} Part. 1 Cap. Il pag. 7.

land. Han tog med sig tre korpar, som skulle tjena till vägvisare; och för att inviga dem till detta värf, föranstaltade han i Smörsund, der skeppet låg segelfärdigt, ett stort offer; ty, säger författaren, då hade de sjöfarande uti de nordliga länderna ingen leidarsten. Det Isländska ordet leid svarar emot det svenska led eller riktning, och med leidarsten förstås således otvifvelaktigt en sten, som utviste, uti hvilken riktning fartyget borde styra, således en magnet. Författaren till ofvanstående, Are Frode, var efter Snorro Sturlesons uppgift född 1068; således är troligt, att landnamoboken blifvit författad mot slutet af 11 seklet. Då var således kompassen i Norrige icke mera obekant, och den vanliga uppgiften, enligt hvilken dess uppfinning tillskrifves en Neapolitanare Flavio Gioga från Amalfi, som lefde i början af 1300 talet, måste således vara oriktig. Ur benämningen leidarsten kunna vi för öfrigt sluta, att man i Norrige i 11 seklet såsom kompass endast nyttjade den naturliga magnetstenen, enligt all sannolikhet på samma sätt, som hos Chinesarne. Flere nationer göra för öfrigt anspråk på åran, att hafva gjort någon förbättring vid denna för sjöfarten och handeln så vigtiga uppfinning. Italienarne berömma sig af att hafva hafva uppfunnit densamma; Engelsmännen att hafva gifvit åt sjökompassen den nu brukliga upphängningen, sålunda att densamma sväfvar f ritt öfver en spets; Holländarne, att allraförst hafva infört det ännu brukliga begyama sättet att beteckna väderstrecken uppå densamma, och Fransmännen - att åtminstone hafva tillagt en lilja, för att

dymedelst beteckna det norra strecket. Likväl beskrifver sig kompassens fullkomligare inrättning först ifrån en sednare tid, sedan sjöfarten, genom Amerikas upptäckt och genom upptäckten af en ny sjöväg till Ostindien, erhållit en större utsträckning. Mycket bidrog dertill äfven upptäckten af den under namn af kompassens missvisning bekanta egenskapen, eller af magnetens deklination. Emedan man nemligen ansåg deklinationen för en viss ort vara oföränderlig, så hyste man hoppet, att medelst densamma på sjön kunna bestämma ortens longitud. Det är obekant, hvem som allraförst varseblifvit denna egenskap hos magneten. Enligt uppgift skulle Columbus den 14 Sept. 1492 hafva gjort en deklinations-bestämning, och upptäckten af sjelfva fenomenet är säkert redan mycket äldre.

Hvad magnetens inklination beträffar, så omtalas densamma allraförst uti ett bref af en Mechanikus i Nürnberg, Georg Hartman, namnkunnig på sin tid genom förfärdigande af astrolabier, horologier och andra mathematiska instrumenter. Denne stod nemligen sedan år 1541 med Hertigen Albrecht af Preussen uti en brefvexling, som någon gång öfvergår till dagens politiska händelser, men till största delen likväl är af vetenskapligt innehåll. Af särdeles intresse är ett bref af den 4 Mars 1544, som innehåller en detaljerad beskrifning öfver åtskilliga magnetiska upptäckter, som Hartman i Nürnberg året förut hade förevisat Konung Ferdinand af Böhmen, brodren till Karl V. Han beskrifver der för det första magnetens deklination, som då ännu i hela Europa var östa

lig, på följande sätt: Noch ist an dem Magnetstein dieses gross sich zu verwundern, dass die Nadeln, damit verstrichen, nicht gerade laufen der Mitternacht zu, sondern wenden sich ab von der rechten Mittag- oder Mitternachtslinie, und kehren sich gegen den Aufgang zu; in etlichen Ländern um 6 Grad, wie ich solches selbst gefunden und gesucht habe, zu der Zeit zu Rom, da Ew. fürstliche Gnaden Markgraf Gumbrecht und seine fürstliche Gnaden Bruder bei einander zu Rom waren. Aber hier zu Nürnberg finde ich, dass solcher Ausschlag ist 10 Grade, und an anderen Orten mehr oder minder.

Ehuru denna upptäckt redan var äldre, och Hartman icke heller sjelf tillskrifver sig densamma, så är detta stället uti brefvet likväl af intresse, emedan det innehåller den äldsta kända uppgift öfver deklinationen i Rom och uti Nürnberg. Vidare beskrifver han magnetens inklination, och uppger derjemte, att denna upptäckt är af honom sjelf. Zu dem andern, säger han, so finde ich auch diess an dem Magneten, dass er sich nicht allein wendet von der Mitternacht und lenket sich gegen den Aufgang, um 9 Grad mehr oder minder, wie ich es gemeldet habe; sondern er zeigt auch unter sich. Diess ist also zu beweisen. Ich mache eine Nadel, ein Finger lang, die nur fleissig wagerecht oder wasserwagerecht auf einem spitzigen Stift steht, also dass solche nirgends sich zu der Erde neige, sondern an beiden Orten gleich in der Wage stehe. So ich aber der Oerter eins be-

streiche, sei gleich, welches Ort sei, so bleibt die Nadel nicht mehr wagerecht stehen, sondern fällt unter sich etwa um 9 Grad, mehr oder minder. Ursach, warum diess geschieht, habe ich Königl. Majestät nicht wissen anzuzeigen. Äfven uti ett annat bref omtalar han inklinationen, jemte nagra andra "artige Geheimnisse des Magnets," säsom han uttrycker sig, och han tillägger: die ich alle durch mich selbst gesucht und gefunden habe, lustig und artig zu wissen und zu sehen. Dessa öfriga upptäckter, som icke stä uti någon närmare beröring med jordmagnetismen, utan endast anga den magnetiska kraften i allminhet, förbigar jag vid detta tillfälle. ")

Hartman finner inklinationen i Nürnberg 9 grader, i stället för några och sjuttio grader, såsom den då lärer hafva varit. Man kan således egentligen icke såga, att han gjort en inklinationsbestämning; men upptäckten af sjelfva fenomenet tillhör honom icke dess mindre. Vanligen tillskrifves densamma en Engelsman Robert Norman, som år 1576, således 33 år sednare, skulle hafva forfärdigat ett inklinatorium. Men sasom Hansteen visar, äro äfven Normans mätningar mycket oriktiga; och i allmänhet för man icke tillägga de qvantitativa bestämningarne en alltförstor vigt, ty då skulle de flesta upptäckter måsta frånkännas män, som likväl hafva de mest grundade anspråk på desamma. Hvad som särskildt angår inklinationen, så borde man

^{*)} Ofvan anförda tvenne bref finnas utförligare upptagna uti Repertorium der Physik von Heinr. Wilh. Dove. Bd. II. pag. 129-133.

troligen gå tillbaka ända till Bordas tid, eller till slutet af förra seklet, ty äfven Musschenbroeks bestämningar uti hans berömda dissertation de magnete äro icke riktiga, och till och med förekommer der ännu den felaktiga uppgiften, såsom skulle inklinationen vara beroende af magnetnålens längd, och att han funnit den 59 grader, då nålen var 2 fot lång, men 72 grader, då densamma hade en längd af $3\frac{1}{2}$ fot, och han drar deraf den likaledes oriktiga slutledningen, att alla inklinationsbestämningar, vid hvilka nålens längd icke är uppgifven, icke äro af någon synnerlig nytta.

I allmänhet kan den anmärkningen göras, att bland alla grenar af naturkunskaperne jordmagnetismen var den, som under det sistförflutna och ännu under början af det innevarande seklet gjorde de minsta framsteg. Väl företog Euler, utgående ifrån den åsigt, att jordens magnetiska fenomener borde kunna förklaras genom antagande af tvenne poler, utvecklingen af en utförlig theori öfver jordmagnetismen, hvilken, såsom han sjelf yttrar sig, "est sans doute une des plus épineuses matières, qu'on ait traité jusqu'ici;" men efter de svåraste och djupsinnigaste mathematiska undersökningar fann han, att det gafs fenomener, som ådagalade otillräckligheten af hans förklaringssätt. Byggande på en så stor forskares auctoritet, läto nu de öfriga afskräcka sig genom de svårigheter, som denne förefunnit; der han förgäfves arbetat, ansåg hvar och en sin möda förspilld, och man lät derföre saken bero dervid. Derigenom hände, att antalet af dem, som syssel-

satte sig med dessa fenomener, var vida mindre, än vid andra mindre invecklade foreteelser uti naturen. Hansteen, hvilken allraförst åter foretog en grundlig och utforlig undersokning uti dessa ämnen, och som äfven sedermera verksamt bidragit att skingra de töcken, som holjde denna vetenskapsgren, beklagar sig med råtta öfver den likgiltighet, med hvilken densamma af den tidens forskare åsidosattes. Uti sitt 1819 på Tyska språket utgifna arbete: Untersuchungen über den Magnetismus der Erde, uttrycket han sig hårom på följande sått:

"Europas Mathematiker haben seit Kepplers und Newtons Zeiten sammtlich die Augen gen Himmel gekehrt, um die Planeten in ihren feinsten Bewegungen und gegenseitigen Storungen zu verfolgen; es wäre zu wünschen, dass sie jetzt eine Zeitlang den Blick hind in den Mittelpunkt der Erde senken mochten. denn auch allda sind Merkwürdigkeiten zu schauen. Es spricht die Erde mittelst der stummen Sprache der Magnetnadel die Bewegungen in ihrem Innern aus, und verständen wir des Polarlichtes Flammenschrift recht zu deuten, so würde sie für uns nicht weniger lehrreich sein. Die Verbindung des Polarlichtes mit den magnetischen Kräften der Erde liegt dermassen am Tage, dass niemand, welcher beide Erscheinungen zur Genüge kennt. dieselbe zu leugnen vermag. Der Zuzummenhang der Meteorologie mit dem Polarlichte, folglich mit den magnetischen Kräften, springt in die Augen; eben so merkwürdig ist die Gleichheit zwischen Humboldt's isothermischen Linien und den magnetischen

Neigungslinien. Wer hat noch die Kälte Sibiriens. Grönlands und des Feuerlandes zu erklären vermocht? wer die sonderbaren Veränderungen der Polarklimate, oder Cooks Bemerkungen über die ungleichen Abstände der Eisflächen im stillen Meere und in dem Atlantischen? Vielleicht möchte ein tieferes Studium der magnetischen Kräfte der Erde über diese dunklen Gegenstände das gehörige Licht verbreiten. Wenn die Regierungen der mächtigsten Nationen sich vereinigen wollten, Beobachtungen anstellen zu lassen, und die Mathematiker, diese zu bearbeiten, dann würden wahrscheinlich in einigen Jahrzehenden der Erde bisher unerklärbare magnetische Erscheinungen einem eben so sichern Calcul unterworfen werden können, als die Bewegung der Himmelskörper."

Denna af Hansteen yttrade önskan gick snart i fullbordan. De mäktigaste sjöfarande nationer hafva utrustat expeditioner, hvilka det skulle äligga, att hufvudsakligen vända sin uppmärksamhet at detta håll; resande hafva samlat observationer på en mängd orter af fasta landet; astronomer hafva fullkomnat observations-methoderne, och regeringarne hafva framför allt med ospard kostnad genom en kedja af korresponderande observatorier, hvilken redan omfattar hela jordkretsen, träffat lika storartade som verksamma medel till befrämjande af forskningen uti de magnetiska fenomenerna. Men hvad som äfven i ganska väsendtlig mån bidragit till uppnående af detta ändamål är, att vår tids djupsinnige forskare Gauss, hvilken genom sina arbeten uti de mathematiska ve-

tenskaperna i så hög grad gjort sig förtjent om desamma, under de tvenne sednaste decennierna nästan uteslutande egnat sina krafter och sin verksamhet åt forskningar rörande jordmagnetismen.

v. Humboldt, som alltsedan begynnelsen af innevarande sekel gjort sig sårdeles förtjent om denna vetenskapsgren, dels genom en mångd af observationer, samlade under hans vidsträckta resor, men isymnerhet genom den af honom upptäckta lag om den magnetiska kraftens tilltagande ifran eqvatorn at polerna, i stållet för att den förut ansågs vara lika på hela jordytan, hade derigenom ådagalagt, att den magnetiska intensiteten eger samma, om icke större anspråk på naturforskarenas förenade verksamhet, som de tvenne förut kända elementerna, deklinationen och inklinationen; ty om äfven deklinationen uti sin omedelbara användning på sjöfart kan anses vara af större vigt än intensiteten, så har deremot den sednare företrädesvis visat sig vara det magnetiska elementet, som uti en framtid för jordmagnetismens theori lofvar de mest fruktbärande resultater.

Arago hade 1823 låtit uppföra uti observatorii trädgård i Paris en liten paviljong, egnad uteslutande för magnetiska observationer, och på hans uppfordran hade Kupffer låtit inrätta en dylik i Kasan. De observationer, som nu under åren 1825 och 1826 anställdes i Paris och Kasan, tycktes visa en ganska stor öfverensstämmelse sig emellan. Men man hade gjort observationerna, utan att komma öfverens om dag och timme, och sålunda kunde man endast slumpvis upptäcka öfverensstämmelsen och

liktidigheten uti nålarnes rörelse. v. Humboldt, som 1828 äfven lätit uppföra en mindre, jernfri byggnad i Berlin, föreslog nu, att man på förhand borde komma öfverens om vissa dagar under året, då man skulle observera deklinationsnalens gång från timme till timme, tvenne dagar å rad. Samma förslag gjorde v. Humboldt 1829 under sin vistelse i Petersburg å nyo Vetenskaps-Akademien derstädes, och det sattes äfven genast i verkställighet. De korresponderande observationerna, som i följd deraf redan året derpå företogos i Petersburg, Kasan och Nikolajeff, och något sednare i Sitka och Peking, visade nu påtagligen liktidigheten i magnetnålarnes oregelbundna rörelser.

Året 1832 uppställdes de efter nya principer konstruerade magnetiska instrumenterna uti astronomiska observatorium i Göttingen, och härmed öppnar sig uti jordmagnetismens historia en ny epok, som, jemförd med de förra tiderne, lika mycket utmärker sig genom instrumenternas stora noggrannhet och säkerhet, och iakttagelsernas systematiska inrättning, som genom ett gemensamt sammanverkande bland skilda länders naturforskare. Redan det följande året publicerade Gauss sin berömda afhandling: "Intensitas vis magneticæ terrestris, ad mensuram absolutam revocata," innehållande en ny, mera fullkomnad method för bestämmande af intensitetens absoluta värde. Liktidigt uppgaf han en method, att observera deklinationens absoluta värde, äfvensom dess variationer med en noggrannhet, som man ända dittills icke ansåg vara möjlig vid andra än astronomiska bestämningar, och

det dröjde icke länge, innan dessa förbättrade instrumenter och methoder äfven vid de öfriga observatorierna infördes. Det nya magnetiska observatorium i Göttingen var 1834 färdigt, och kort derefter forenade sig flere naturforskare, hvilkas antal efterhanden allt mer och mer ökades, till anställande af liktidiga observationer. Sålunda uppkommo observatorierna i Berlin, Breda, Breslau, Hannover, Heidelberg, Leipzig, Mailand, Marburg, München, Prag, Köpenhamn, Upsala, och fl. andra orter.

Man hade efter någon tid hunnit öfvertyga sig om nödvåndigheten att följa företeelserne inom mycket kortare tidsintervaller, än som v. Humboldt i början föreslagit. Man kom derföre öfverens, att under observations-terminerne framdeles observera hvar femte minut, i stället för att observationerna förut på de flesta ställen hade egt rum endast en gång i timmen. Men da arbetet derigenom blef ojemförligt mödosammare, isymnerhet på de observationsställen, der endast ett mindre antal observatorer var att tillgå, så beslöt man att minska antalet af terminer ifrån åtta till sex för året, och att under hvar observationstermin observera endast 24 timmar å rad. Men för att observationerna skulle ske liktidigt, ställde man uren uti alla observatorier efter Göttingisk medeltid. Dessa observationer utgåfvos sedan 1836 år från år, under titel: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.

I Ryssland, som genom vidsträcktheten af sitt område mer in nagot annat land är i tillfälle att lemna nyttiga bidrag till

undersökningar af förevarande beskaffenhet, blefvo emellertid tre nya magnetiska och meteorologiska observatorier inrättade, nemligen i Katherinenburg, Barnaul och Nertschinsk; tre andra, bestämda endast för meteorologiska observationer, blefvo uppförda i Slatoust, Bogoslowsk och Lugan, och dessutom ett normal-observatorium i Petersburg till bildande af observatorer, och isynnerhet för att förskaffa dem och deras biträden den till observationers anställande erforderliga praktiska färdigheten. Alla vid de Ryska observatorierna anställda observationer publiceras äfven årligen, under titel: Annuaire magnétique et météorologique, ou récueil d'observations météorologiques et magnétiques faites dans l'étendue de l'empire de Russie. Pa Grefve Rehbinders derom hos Hans Majestät Kejsaren i underdånighet gjorda hemstållan gafs äfven Nådigt bifall till inrättande af ett magnetiskt och meteorologiskt observatorium i Helsingfors, under Nervanders ledning.

Emellertid hade i Göttingen vetenskapen blifvit riktad med en ny observations-method; Gauss hade nemligen uppfunnit ett nytt instrument för bestämmande af den horizontala intensitetens variationer, den så kallade Gaussiska bifilarmagnetometern. Genom detta instrument är man nu i stånd att måta variationerna af den horizontala intensiteten med samma noggrannhet, hvarmed deklinationen och dess variationer bestämmas genom det

forut uppfunn i Gaussisk, instrumentet, eller ilen sikallade Gaussiska unifilarmagnetometern.

Annu hade England icke deltagit uti dessa gemensamma forskningar, som uti en stor del af det öfriga Europa redan omfattades med det lifligaste intresse. v. Humboldt, hvilken så ofta till befråmjande af vetenskapliga företag användt det stora inflytande, som han i Europa åtnjöt, uppfordrade nu den Kongliga Societeten i London genom en skrifvelse till dess President, Hertigen af Sussex, att hos sin regering anhålla om dess medverkan till anstållande af korresponderande magnetiska observationer, hvilka, i följd af de af Gauss gjorda vigtiga upptäckterna, redan lofvade ganska väsendtliga resultater för lösningen af en bland den fysiska geografins vigtigaste frågor. Engelska regeringen biföll äfven till de af Humboldt gjorda förslag med en uti vetenskapernas historia exempellös frikostighet, och innan kort var planen till ett bland de mest storartade vetenskapliga företag uppgjord. Under Airys och Lloyds ledning blefvo i Greenwich och Dublin observatorier invättade. En expedition till sydpolen och uppförandet af magnetiska och meteorologiska observatorier på S:t Helena, på Goda-Hopps-udden, på Van Diemens land och uti Torento i Kanada blesvo anbefallda. Sabine och Lloyd, åt hvilka Engelska regeringen hale antatrott den vetenskapliga ledningen af dessa företag, blefvo anbefallda att resa till Berlin och Göttingen, för att med Humboldt och Gauss närmare rådgöra mig onde foretaget, och Kupfler erhöll likaledes af Ryska regeringen uppdrag att ötvervara konferenserna i Göttingen och erbiuda de Ryska observatoriernas medverkan. Af Kongliga Societeten i London dertill uppfordradt, föranstaltade Ostindiska Kompaniet ytterligare inrättandet af fyra nya observatorier, nemligen i Simla (Himalaya), Madras, Singapore och Bombay, hvilka organiserades på samma sätt och med likadana instrumenter, som de öfriga. Detsamma gället om ett observatorium i Makerstoun, i närheten at Edinburg, som Sir Th. Brisbane lätit uppfora på egen bekostnad, och förse med instrumenter. Dessutom hafva uti de Nordamerikanska Fristaterne i Washington, Philadelphia, Combridge, Boston och Hudson observatorier blifvit inrättade, äfvensom af Fransyska regeringen ett i Algier.

Expeditionen till sydpolen, bestående af fartygen Erebus och Terror, umler beläl at Kapten Jomes Ross, atgick i medlet at September 1830 med nodiga instrumenter och observatorer, hvilka sistnämnde erhållit praktisk undervisning af Lloyd vid magnetiska observatorium i Dublin. Utom nödiga instrumenter för måtningar till sjöss, voro fartygen åfven utrustade med dylika apparater, som de fasta observatorierna, för att, då tillfälle dertill yppades, antingen på isen eller på fasta landet anstålla observatorier.

Vid rådplägningarne i Göttingen, som vidtogo den 15 October 1839, kom man nu definitift öfverens om det åndamålsenligaste sittet för de till/imnade observationernas verkstållande. Man beslöt, att observationerna med de vanliga variations-instrumenterna skulle göras en gång hvarannan timme, men liktidigt och efter Göttingisk medeltid. Dessutom skulle man en gång om månaden bestämma de magnetiska elementernas absoluta värden; äfven skulle man en gång månadtligen observera hvar femte minut, 24 timmar å rad, äfvenledes liktidigt och efter Göttingisk medeltid. Tillika skulle dessutom de vanliga meteorologiska iakttagelserna göras med de dertill förut brukliga instrumenterna.

I Ryssland blefvo nu, dels äldre observatorier fullständigare organiserade, dels nya, såsom observatorierna i Tiflis och Sitka, inrättade. Äfven för vårt magnetiska och meteorologiska observatorium beviljades ett förökadt antal af biträden till verkställande af observationer och preliminära beräkningar, äfvensom större årliga anslag till bestridande af nödiga expenser. *)

Gauss, hvilken under tiden med rastlös ifver fortsatt sina forskningar uti denna del af naturkunskapen, hade nu åter riktat desamma genom ett nytt stort arbete, nemligen en allmän theori öfver jordmagnetismen, en theori, hvilken i lika hög grad öfverträffar alla förut i detta hänseende gjorda försök, som de tvenne af Gauss uppfunna magnetometrarne i noggrannhet och praktisk

^{*)} Det må anmärkas, att uti vårt observatorium uret är ställdt en timme före Göttingisk medeltid, hvarigenom observationerna icke dess mindre lätt kunna jemföras med hvarandra. Genom en besynnerlig tillfällighet är nemligen tidsskillnaden emellan Helsingfors och Göttingen nästan jemnt en timme, eller rätteligen 60' 5".

anvan Harbet atvermiffa alla forut till anstallande at magnetiska observationer anvånda instrumenter. Gauss hade företagit sig att. utgående endast ittin allmint erkinda mathematiska sanningar. med tillhjelp af dessa förena de förhanden varande observationerna till ett system, och att sålunda utveckla en allmån theori. oberoende af nigon forut fattal hypothes om fordelningen af det magnetiska fluidum uti det inre af jordklotet. De första resultatema, till hvilka Gauss salunda, med tillhjeln af de 1935 kanda data, genom användningen af sin method kommit. betraktar han sisom annu atullständiga, och sisom en list tjenande till att lemma en ungefärlig idé om hvad man uti en framtid af denna method har att vonto, sedan tillforlidlige och fullstendiga observationer från alla delar at i alem blitvit lagda till grund for densamma: och likvål utgör denna the ri re lan ett ganska noggrannt uttryck utat jordens nuvarande magnetiska forhöllanden. Jag vill en last antera ett bevis till idagallygande hirat. Gauss hade med tillhjelp at sin theori beraknut liget af den magnetiska sydpolen till 72 35 svellig latitud och 152 30 osilig longitud från Greenwich. ") sidedes ett stille lingt uti sodra oceanens anda dittills d ingen sjotarunde besokte trakter. Den normast helagna ort. der observationer blifvit gjorda, lag vid Polynesiens kust, under 42 53' syillig latitud: siledes på hela 30 graders afstånd derifrån. Kapt. Ross hade vid sin atresa erhållit sig uppdraget, bland

^{*)} Resultate aus den Beob. des magnet. Vereins im Jahre 1838. Leipzig-1839. Pag. 44.

annat, att undersöka, om låget af den magnetiska sydpolen verkligen öfverensståmde med den Gaussiska beräkningen. I motsatt fall borde den uppsökas; kännedomen af dess rätta låge borde i alla fall anses såsom ett af de väsendtliga resultater, som man med tillförsigt kunde vänta af denna expedition. Kapt. Ross fann densamma i närheten af det af Gauss uppgifna stället. Ur observationer, anställda på flera orter i närheten af sydpolen, beräknade han att den låg på det vid samma tillfälle upptäckta Victoria-land, under 75° 6′ sydl. Lat. och 154° 10′ östl. Long. ifrån Greenwich, således endast 2½ grader sydligare, än Gauss beräknat; den obetydliga skillnaden i longitud kommer, för orternes närhets skull till jordpolen, nästan icke i betraktande.

Vi finna häraf att den Gaussiska theorin uppgifvit den magnetiska polens läge med en säkerhet, jemförlig med den, hvarmed den namnkunnige Le Verriers beräkning föranledt upptäckten af den nya planeten Neptunus, en planet, om hvars tillvaro flere astronomer redan förut haft aning. Men ehuru methoden för beräkningen i hufvudsaken öfverensstämmer, emedan man i hvardera fallet ur varseblifna attraktioner har att sluta till de verkande orsakerna, så kan jag likväl, utan att för öfrigt vilja förringa Le Verriers förtjenst, icke undgå att härvid anmärka, 1:0 att hans undersökning angiek en vetenskap, hvars theori sedan Newtons tid till de väsendtligaste momenterna redan var gifven, da deremot den Gaussiska beräkningen kan anses utgöra det första försöket i sitt slag; och 2:0 att de attraktioner, som

ifrån en planet utgå till en annan, för planeternas stora afstånds skull kunna anses och beräknas såsom en enda kraft; uti frågor deremot, som röra jordmagnetismen, har man ett oändligt antal verkande krafter, som utgå ifrån skilda punkter uti jordklotet, och hvilkas sammanlagda verkan modifierar sig olika för hvart skildt ställe på jordytan.

Enligt den ursprungliga planen hade med utgången af 1842 den treariga perioden af magnetiska iakttagelser bordt gå till ända, som, enligt hvad jag ofvanföre nämnt, de Brittiska och Ryska regeringarne låtit utföra på flera punkter af sina vidsträckta besittningar, dels uti Europa, dels i andra verldsdelar. Likvål var det redan under förloppet af denna tid att förutse. att resultaterna endast ofullständigt skulle svara emot det med dem afsedda ändamålet, då nästan öfverallt en del af tiden åtgick till observatoriernas inredning, och en del måhånda äfven till experimenter, för att förvissa sig om de nyss anskaffade instrumenternas användbarhet, men isynnerhet i Ryssland observatoriernas aflägsenhet ifrån Petersburg, och den svara kommunikationen till de aflägsnare stationerna hade till påföljd, att knappt tredjedelen af det åsyftade arbetet kunde medhinnas. I öfvervägande af dessa omståndigheter, kommo nu Ryska och Engelska regeringarne öfverens om observationernas fortsättning på tre års tid, eller till slutet af 1845, efter hvars förlopp tiden ytterligare förlängdes, först till slutet af 1848, och sedermera intill utgången af innevarande år. Äfven hos de öfriga staterna, som deltagit uti företaget, hafva dessa tvenne regeringar utverkat, att intill innevarande tid alla observatorier oafbrutet fortfarit uti sin verksamhet. Hvad särskildt beträffar de Ryska observatorierna, så är det sannolikt, att sådant äfven framdeles kommer att ske. Bland dessa har nemligen observatorium i Tiflis redan nyligen erhållit en mera tidsenlig état, och har tillika blifvit för alltid consolideradt. Angående observatorierna uti Katherinenburg, Barnaul och Nertschinsk har Hans Majestät Kejsaren anbefallt, att äfven dessa tills vidare, likasom förut, skola fortfara uti sin verksamhet. Äfven är allt hopp för handen, att vid desamma, liksom vid de öfriga Ryska observatorierna, en mera tidsenlig organisation kommer att försiggå.

I följd af dessa i flera Europeiska länder sålunda påbegynta och ihärdigt fortsatta sträfvanden för befordrande af vår kunskap om jordmagnetismen, har nu denna del af naturvetenskaperna erhållit en så stor utvidgning, att densamma redan tyckes likasom träda ur den underordnade ställning, som den förut intog bland läroämnen, och i förening med meteorologin utgöra en vetenskap för sig. Antalet af kända facta har under det sistförflutna decennium på ett ganska märkbart sätt tilltagit; likväl måste vi just i följd af dessa, så nyligen först tillkomna data beklaga, att icke redan förut i detta afseende några större företag blifvit utförda. Vid hvart steg framåt lära vi oss närmare känna dessa fenomeners stora omfång; men tillika ölvertyga vi oss, att det först kan vara förbehållet en kommande tid,

att förena alla dessa spridda facta till ett enda harmoniskt helt. De frågor, som vid fenomenernas första varseblifvande företedde sig, angående den magnetiska kraftens egentliga säte och sättet af dess förening med jordklotet, äfvensom angående lagarne, som föranleda dess dels periodiska, dels sekulära förändringar, hafva för det närvarande ännu icke erhållit någon tillfredsställande lösning; och om äfven den nyare tidens talrika upptäckter antyda ett närmare samband emellan jordmagnetismen och flere vid jordytan verkande krafter, isynnerhet värme och elektricitet, så har det likväl ännu icke lyckats, att ur dessa härleda några af de varseblifna magnetiska fenomenerna.

Det är i detta afseende med jordmagnetismen, såsom förhållandet var med astronomin uti dess första början. Man såg stjernor fullända sitt dagliga och årliga lopp; man observerade planeternas besynnerliga banor, hvilka, oaktadt den skenbara oregelbundenheten, likväl alltid inom vissa tidsperioder intogo sitt förra ställe. Det var sålunda med säkerhet antydt, att någon lag låg till grund för alla dessa förändringar; men utsigten, att någonsin kunna utleta densamma ur så invecklade fenomener, tycktes för alltid vara undandold för den menskliga forskningen. Magnetnålens gång erbjuder, liksom stjernornas, en regelbunden följd af dagliga och årliga perioder, och derjemte mångfaldiga skenbara oregelbundenheter, som utan tvifvel äfven bero på bestömda lagar. Samma inrättningar och methoder, genom hvilka

astronomin under sekler smaningom upparbetat sig till sin nuvarande ståndpunkt, leda åfven med lika såkerhet till kånnedom af andra fenomener uti naturen. De åro sålunda fullkomligen egnade att utforska jordens magnetiska forhallanden, och skola hår, såsom uti astronomin, med tiden leda till lika såkra, om också, enligt sakens natur, icke till lika enkla resultater.


Också hafva vi allt skäl att hoppas, att den tid icke mera är alltför aflägsen, då vi äfven äro i besittning af dessa nya kunskaper. År från år har upptäckternas gång blifvit snabbare; genom forenade krafter hafva hinder, som forut funnos till, blifvit undamföj la, och verksamma, allt mer forokade lijelpmedel utvidga lika mycket kunskapernas sfer, som de förkorta den till forskningen behoffiga tiden. En sadan foråndring af fordna forhållanden har icke kunnat åstadkommas genom en stegrad verksamhet hos de enskilde individerne; den har endast derigenom blifvit möjlig, att vidsträcktare forskningar ifrån den enskilde ofvergatt till allmänna inrättningar och till offentliga uti storre omtang tilltagna foretag. Och medan den vetenskapliga forskningen eljest ofta försvåras derigenom, att på skilda orter skilda methoder blifvit använda, så finna vi här - vid de magnetiska inrättningarna — öfverallt samma instrumenter, öfverallt samma observationssätt och liktidiga observationer. De skilda observatorierna utgöra liksom spridda delar af ett enda stort system, som liksom ett nät omsluter den verldskropp, ur hvars sköte de magnetiska krafterna framtråda till dagen - jordklotet.

Att en närmare kännedom om jordmagnetismen äfven har ett stort praktiskt intresse, är obestridligt, ehuru det, så länge en vetenskap annu icke hunnit utöfver sin begynnelse-period, icke är möjligt att förutse all den nytta, som densamma uti en framtid, uti dess mera utbildade tillstånd, kommer att medföra. Hvem kunde väl vid de första forskningarna uti optiken förutse upptäckten af daguerreotypin, eller af astronomiska och terrestra tuber? Hvem vid de första försöken med luftarters och ångors expansiva kraft ana, att dessa uti en framtid skulle sätta de största lokomotiver i rörelse? Hvem vid de första experimenterna med elektriciteten, att densamma med tiden skulle blifva ett hjelpmedel, för att med en hastighet, liknande blixtens, ifrån och till de aflägsnaste orter erhålla och lemna meddelanden? Lika litet kunna vi ännu förutse, hvilken vidsträckt användbarhet en nogare kännedom af meteorologin möjligen uti en framtid kommer att ega; och att jordmagnetismen och meteorologin stå uti ganska nära förening med hvarandra, kan man för det närvarande redan anse såsom säkert, och detta hafva äfven de härvarande observationer ådagalagt. Sedan nemligen magnetometrarne kommit uti någon starkare rörelse, så undergår ofta barometerståndet, äfvensom vindarnes riktning och styrka en märkbar förändring. Likvål ske dessa förändringar ofta först flere timmar sednare, och ibland först då magnetometrarne åter hunnit antaga sin förra lugna rörelse. Det är sålunda icke osannolikt, att vi i meteorologiskt afseende redan hafva att vänta vigtiga resultater ur de magnetiska forskningarna, innan ännu theorin fullständigt hinner utvecklas. Att molnet bebådar regn, visste man ju äfven, långt förr än detsamma till sin inre natur och beskaffenhet var kändt; och långt förr, innan himlakropparnes gravitationslagar ännu voro kända, beräknade man redan sol- och månförmörkelser.

Ofvanföre är redan anmärkt, angående likheten emellan Humboldts isothermer, och de under namn af isogoniska, isokliniska och isodynamiska kända magnetiska linierna. Här erbjuder sig sjelfmant den vigtiga fragan: är med en sekulär förändring af de magnetiska liniernas låge äfven en motsvarande förändring uti isothermerne att förvänta, och hafva vi i följd deraf uti en framtid att frukta en försämring uti vara klimatiska förhallanden, eller kunna vi hoppas att de skola förbättra sig? Äfven till dessa fragors lösning behöfs icke någon fullständig theoretisk insigt, utan endast så länge fortsatta iakttagelser, att förändringarna kunna blifva märkbara.

Att det för sjöfararen, likasom för bergsmannen och geodeten, måste vara af stort intresse, att känna huru stora förändringar ett bland de nödigaste instrumenter för deras förrättningar nödvändigt är underkastadt, är lätt att inse; vore det också endast för att veta, huru stort förtroende de kunna hysa till detsamma. Dessutom är det ju en billig fordran, att vi vid våra forskningar, som omfatta hela verldsrymden, icke helt och hållet öfverse den lilla planet, som vi bebo, och de naturfenomener, hvilka der förete sig. Naturforskaren finner ett eget behag uti

uppletandet och erkännandet af de lagar, som naturföreteelserna, så i smått som i stort, följa; erkännandet af enhet och harmoni uti det skenbart oregelbundna har för honom redan sitt värde och sitt ändamål uti sig sjelft. Men äfven för en större allmänhet skall det säkert icke sakna intresse, om den en dag uti dessa nu så gåtlika förändringar inser samma oändliga vishet, som vi nu beundra, likaså uti blommans och fjärilns fägring, som uti verldssystemets konstrika och harmoniska byggnad.



NÅGRA HISTORISKA UNDERRÄTTELSER

OM

BOKTRYCKERIET I FINLAND,

AF

FREDR. WILH. PIPPING.

TREDJE STYCKET.

(Meddeladt Vetensk. Societ. d. 24 Apr. 1846.)

Rörande vården och förvaltningen af Åbo Universitets Boktryckeri efter Peter Hansons död, finnes ingen åtgärd vara af lärosätets styrelse vidtagen, förrän d. 4 Aug. 1679, då, uppå begäran af hans enka, att verket måtte med det första "öfversees och Inventeras," Consistorium Academicum härtill bestämde följande dagen samt utsåg den ene af Inspectores Typographiæ, Professoren Jacob Flachsenius, att tillika med Professoren Falander, som åtog sig att härvid träda i den på en resa till Stockholm stadde andre Inspectors, Professoren Laurbecchii ställe, "sigh på trycket infinna och alla Styler med dhes tilbehör låta öfversee, opväga och grannel. annotera." Att detta äfven blifvit fullgjordt, ehuru en dag sednare, ses af Consistorii Protocoll för

d. Sonh 9 Junii 1692, hvarest "den anteckning, som utaf nagre af Professoribus har ved Academien A.o 1679 d. 6 Augusti uppranal blilvit" omt das, Avensom samma Document formodeligen menas med "det gamble Inventarium", hvilket, enligt Protocollet för d. 8 Decemb. 1686, borde för jemförelses skull tagas till hands vid nu skeende inventering; och att vid förstberörde tillfälle allt befunnits i vederbörligt skick, torde få slutas deraf, att ingen annärkning om annat förhallande i Protocollerne för samma tid influtit. Likvál kan icke någon synnerlig vigt läggas på denne del af frag n. de forråttningens egentliga än lamal möjligen varit blott att utrong hvad som fanns att lefverera den person i hånder, på hvars ansvar vården om Tryckeriet derefter komme att hvila. N gon tid forut hade nimligen Boktryckare Gesällen Johan Wald till Universitetets Canceller öfversändt en skriftelig anhållan att varda förhulpen till den genom Hansons fråntalle to lig blifne ligenheten, hvartill han vore at Consistorium Ac lemitum, genom formoleligen lange sedan framkommen skillvelse, recommenderad och sa mycket säkrare hoppades framför någon annan komma i gunstig åtanke, som han, hvilken för två är tillbaka blifvit af nyssnämnde Universitets-Boktryckare ifrån Stockholm förskrifven samt alltsedan, till sin Mästares och andras goda noje, arbetat vid och sluteligen ensam förestått ifrågavarande Boktryckeri, under vodelden nistlöreguende höst")

^{*)} l andra stycket af denna afhandling, sid. 710, har Läsaren funnit de af vådelden i Åbo 1678 ödelagde gärdarnes antal uppgifvet till etthundrade

varit om detsammas bergande mera angelägen, än om sina kläder och andra tillhörigheter, på hvilka han ock derföre lidit stor skada; hvarjemte han nu förband sig att tillse, om Försynen så ville, att den hådangångnes enka igen kunde blifva vid samma

lyratiotre. Detta tal maste dock nu rattas, genom tillägg af ettlinndrade, sedan jag, som vid sagde styckes författande följt Biskopen i åbo Stift Johan Gezelii d. ä. Minne, esterat, vid genomognande af Gabr. Wallenii En kort Underrättelse om Vad-Eldars ursprung, tryckt 1681, ifrån hvilken det, som i förstnämnde arbete, sid. 228, säges om ifrågavarande olyckshändelse, synes vara hemtadt, kommit till inseende deraf, att härvid skrif- eller tryckfel på en siffra otvisvelaktigt ägt rum. Wallenius berättar nämligen om samma eldsvåda med följande ord: "Anno 1678 den 23 Septembris, tå en häfftigh Wådeld upkom uthi sal. Philip Bielckous Gard, och sasom tå en starck Storm war, Elden icke utbsläckias kunde, togh then således ölwerhanden, och i hast kringslögh, at på Fyra Tijmars tijdh stodh i Brandheele then Delen aft Staden emellan Kyrckian och Torget, nembligen gambla och nyja Kyrckiogatorne, item, hele den Tracten ilran Radstugun upp till Fäägatu Tollporten, at månge Huus och Booställen affbrände och i Aska lagde bleswo; nembligen uthi Kyrckioqwarteret (8, i Malajarlwi Qwarteret 175, gorandes tilhopa 243, Gårdar: Tå den gode Guden lijkwal forskonte Kyrckian, Academien och dess Bibliothek, hwilka nthi Eldzlågan, lijka som en Semicirkel eller halff Måna inhwesde woro: Jämwäl Hafratzhuset, Rådstuswan, och alle Köpmans Bodar wijdh Torget, som doch icke stodo i ringa Fahra." Lika många gårdar, så ölverhusvud, som i hvardera af stadens ofvannämnde Qvarter, skola ock vara uppgilne uti en isrån trycket utkommen Bön och Tacksägelse, på Svenska och Finska språken, försattad, såsom orden vid slutet: Scrib. Aboæ 19 Sept. Anno 1679. E. S. Q. G. A. Paster. anlyda, af dåvarande Kyrkoherden i Abo Domkyrko Församlingar, Förste Theologiæ Professoren och Domprosten Svenonius, för att årligen i Domkyrkan på olycksdagen uppläsas, enligt den anteckning härom, som finTryckeri forsörjd. Denna Supplik remitterades af Grefve Baxur till Consistorium medelst det förut, i andra stycket sid. 732, åberopade brefvet af d. 22 Julii 1679, hvaruti förmåles, att Hans Excellence för sin del så mycket heldre unnade och efterlät sökanden berörde lägenhet, som han förklarat sig vilja försörja enkan, hvarigenom så hon, som hennes barn 3), kunde blifva

nes gjord af framl. Lectorn Magister Keckman, uti ett af honom med åtskilliga tillägg riktadt exemplar af den Forteckning å härtills vetterligen tryckta Finska Skrifter, som han utarbetat och genom tryck 1821 utgaß, hvilket exemplar jag i aßeende å Forteckningens ytterligare tillökning och fortsättande nu har om händer. Till vidare upplysning om Universitets Boktryckeriets och dess föreståndares förlyst vid samma brand' må nu ock anföras hvad härom, af tillfällig anledning, influtit i en skrifvelse ifrån Consistorium Academicum till Landshöldingen i Länet 1689, rörande ett annat ämne, nämligen af Universitets-Staten sökt befrielse ifrån några allmanna utskylder för flera föregående år, med följande ord, utdragne isian det i Registraturet befinteliga Conceptet: "- - Booktryckaren, hvilken - uthi 678 âhrs vådeld, då en stor deel af Acad.s tryckerij fürbrändes, en stor skada uppå sitt huns och annan des ägendom uthstå måste". Likväl bör anmärkas, att denna uppgift, hvad Academiens andel i Tryckeriet vidkommer, af förut, jemväl i andra stycket, närmare utvecklade anledningar, icke kan anses för annat än öfverdrifven.

*) Bekräftelse deruppå, att Hanson efterlemnat slera än ett barn, såsom orden i ofvanbemälde Cancellersbref gifva anledning att förmoda, har jag numera sunnit så väl uti ett i Universitetets Registratur sörvaradt Concept till lutyg om välsörhållande såmt Recommendation, af Rector och Senatus, för Sonen Johan Hansonius, dateradt d. 26 Julii 1689 och inne-hållande, att han sedan sadrens frånsälle vistats hos sin moder och stjussfader, Boktryckaren Johan Wall, och ösvat sig i Boktryckeri konsten, samt för att deruti vinna större särdighet nu ärnade sig till fremmande

behållne, allenast Consistorium icke hade något emot personen, utan pröfvade honom duglig samt således, efter förmodan och så framt han på det sätt han sig om enkan förklarat, ville fullborda sitt löfte, skulle åt honom uppdraga Boktryckare tjensten, med billigt afseende jemväl på hans förlust vid Tryckeriets conserverande. Om någon Recommendation ifrån Consistorium nämnes väl icke uttryckligen i detta Cancellers bref, ej heller finnes i Universitetets öfriga handlingar spår till en sådan, likasom ock upplysning saknas, huruvida samma bref framkommit och blifvit föredraget förrån ofvannämnde beslut om Inventeringen fattades, hvilket dock är föga troligt, i anseende till den mellanliggande tidens korthet; men då Universitetets Lokal-Styrelse utan tvifvel hade sig Petitionen eller sökandens önskan be-

orter, som ock uti Åbo stads Mantals Förteckningar, i hvilka icke allenast nyssnämnde son Johan ännu for året 1691 är ibland Boktryckaren Walls husfolk upptagen, utan äfven för d. 1 Maji 1694 en Dotter Lisbetha förekommer. Om den förre har jag mig intet vidare bekant, men den sednare synes icke långt efter sistnämnde tid hafva trädt i gifte med Bokbindaren i Åbo Christian Gottfried Reiman, såsom slutas kan af en Likpredikan, med Titel: Menniskiornas allmänne Usellheet och Jämmer, Wijst Wid Then, Fordom Threborne och Wal Achtade, Nu mehra, hous Gud Salige, Herr CHRISTIAN GOTTERIED REIWANS, Hederlige Jordefard; I Abo Doom Kyrckia den 3 Martii, 1710. Uti en Kort och Enfaldig Lijk-Sermon Wid Grafwen, Effter astundan Af ANDREA BANGE Adj. Min. Temp. Cath. Ab. Tryckt hoos Johan Wall. 4:0. Här säges namligen, att Reiman, som var född i Leipzig och vid sin död d. 26 Febr. 1710, endast 35 år och 10 månader gammal, 1695 kommit till Åbo och i sitt första gilte, med Elisabeth Hansonia, haft fyra barn samt 1705, ester bennes dod, ingått nytt äktenskap, med en Margaretha Dreyer.

kant, äfvensom att densamma på stället icke möttes af något hinder, är det så mycket mera sannolikt att Tryckeriet nu blef formeligen ofverlemnalt till samme man, att på eget ansvar forvaltas, som derefter blott ett slags Supplement till den tillika anställda Inventeringen synes hafva kommit i fråga, vid det han följande året utnämndes till Universitetets Boktryckare, sedan Consistorium d. 17 Januarii, då det "taltes om Typographi Fullmacht," beslutit, att "förän han får den underskrefven, skola Stylarne Taxeras."

Huruvida harmed Stilarnes varde, i deras dåvarande skick, åsyftades, eller ock fastställelse af en viss Taxa för Boktryckaren, alteller deras olikhet, ma lemnas ortgjordt; men hvad Fullmagtens utfärdande vidkommer bör anmärkas, att uti ett vid Universitetets Rakenskaper för år 1685, såsom Verification, med afseende å en deruppå tecknad och qvitterad anordning, fogadt Memorial, som Professor Svenonius, i egenskap af Rector, d. 23 Octob, namnde ar aflatit till Inspectores Aerarii, berörde Fullmagt visserligen omtalas såsom d. 7 Febr. 1680 gifven af dåvarande Rector, Professoren Johan Flachsenius, men att tvifvelsmål om riktigheten af detta Datum likvål äger rum, då i Consistorii Protocoll för d. 11 i samma månad följande ord läsas: "Inkallades Acad. Typographus Mr Johan Wald hvilken torchöltz hans embetes plicht, jembwahl och ett concept till den Fullmacht han på sin tienst skall halva. Da löfvæle Johan Wald moderera och lindta Taxetingen när någon af Professorerne later tryckia ett opus, nembl. att han trycker ett heelt Riis pin Arck, föruthan ordinarie belöning. I dhed öfrige varande, tillfred- medh dhedh project H:r Rector Magnif. för honom haf er uthkastat och uthfäste han at vilia tryckia Intimationer för Professorernes Barn, Hustrur och andra dheres egge, som genom döden torde afgå, och Lijkfärden skall anstallas. Dedicationer skall han icke emottaga, medh mindre due arg af nagon Professore öfversedde. Men öfver allting skall han upfylla den condition han för dhetta undergådt hafver, och ächta Enckian fast han föruth fulmachten bekommer." Att denne Fullmagts fjerde Punkt innehållit följande föreskrift: "Skall han achta trycket granneligen, hålla det reent och medh Acad. penningar köpa hvad som till dess Reparation och förbättring kunde behöffvas," finnes i öfrigt så vål af ett Transsumt deraf, förvaradt ibland den förut, i första stycket sid. 559 Not. **) nämnde samling af handlingar, som ock af nyss aberopade Memorial af Svenonius; och torde af den fullkonliga likhet, som hår företer sig med hvad som blifvit Hanson i samma afseende, enligt andra stycket sid. 706, ålagdt, tillräcklig inledning finnas till att antaga, det dennes Fullmagt jemvål i ófrige hufvudsakliga delar nu tjenat till föresyn vid efterträdarens förseelde med bevis om sin utnämning. Likväl lära derjemte några illägg och mindre betydande skiljaktigheter ägt rum, såsom slubs kan, ibland annat, af ofvanberörde förbindelse att trycka Intimationer af mycket mera enskild beskaffenhet, an de, om hvilka, enligt Cosistorii Protocoll för d. 10 October 1660, en uppkommen frågg, hvruvida dåvarande Boktryckaren vore "plichtig at nyckia intimatione introductorias Professorum, såsom och dhem som ang i Promonoment. för sin ordinarie löön," ansågs bero på utredning en hvad som i tre afseende vore med hans företrädare aftaladt och sak les muste frakvas knat bestämning i öfverenskommelsen med honom sjelf, oller i hans Fullmagt.

Under första åren af den sammel malagne Boktryckarens tienstetid finner man hans namn gemention, ej mindre af honom sjelf, än af andra, tecknadt så, som här ofvanföre, eller ock Waldh, samt på Latin Waldius, men sedermera, nästan uteslutande Wall och Wallius. Möjligen härrörde det förra skrifsättet antingen af vanan dervid, ifrån Peter Walds tid, eller ock ifrån önskan, att vid den af honom grundlagde Inråttning ännu bibehalla hans minne. Atminstone är ingen skyldskap emellan honom och den nye föreståndaren för densamme känd; men väl synes det troligt, att den sednare tillhört den Svenska slägt, med namnet Wall, af hvilken en äldre medlem funnits, som åfven haft dopnamnet Johan, samt ägt en son benämnd Lars, hvilken jemväl idkat Boktryckeri konsten och kan hafva vant Abo Universitets Boktryckarens fader, som, efter hvad sonens ofta förekommande namnteckning Johan Larsson gifva tillkanna, också hetat Lars. Af allt detta följer afven, att let sednare af ofvanbemålde skrifsått måste anses för råttare. Om Lars Johansson eller Lorentz Hansson Wall förmäla Alrander, i Historiola Artis Typographica in Suecia, pagg. 4, 35 och

44, samt Lengren, i Kort Berättelse om Bok-Tryckeriets begynnelse och fortgång, sidd. 9 och 11, att han, såsom Factor förestått det namnkunniga Keyserska Tryckeriet i Stockholm, efter dess grundläggares död och intill dess dennes son, Henric Keyser den andre i ordningen, uppnått den ålder, att han kunde emottaga detsamma, äfvensom sedermera, ifrån 1687, något öfver ett års tid förvaltat den då aflidne Johan Georg Eberdts Officin dersammastädes, efter det han under mellantiden varit sysselsatt vid det såkallade Kongliga Tryckeriet, under det Privilegierne derå innehades af Nicolaus Wankif, och sluteligen, försedd med Stilar, dem han ifrån alla dessa Tryckerier erhållit i stället för lön, eller kanske såsom särskild belöning för gjorda tjenster, anlagt ett eget, af hvilket, efter hans år 1694 inträffade död, Kongl. Antiquitets Archivi förste Boktryckare Olof Enæus blef ägare.

Hvad nu vår Johan Larsson Walls förvaltning af Åbo Universitets Boktryckeri och detta verks tillstånd derunder angår, så finnes han icke förrän fyra eller fem år efter befattningens tillträdande hafva anlitat vederbörande om dervid nödiga bidrag af allmänna medel; hvaraf och då icke heller förut på ungefärligen lika lång tid under hans företrädare någon utbetalning af sådane medel ågt rum, så mycket heldre tyckes få slutas, att Wall hvarken försummat den honom anförtrodde egendomens vård, eller sparat egna, för dess underhållande i brukbart skick erforderliga omkostnader, som till uppsättning och tryckning af ett och annat ibland de ifrån detta Tryckeri under ofvannämnde

år utkomna arbeten ofelbart erfordrades större förråd af allt hvad som till ett vål försedt Tryckeri hörer, än Contractet med Universitetet förntsatte. Också utföll sedermera, då atgårder ifrån Lårosåtets sida till anskaffande af de oumbårligaste förnödenheter icke kunde un lvikas, betalningen dervid altid med stor svårighet och långsamhet. Så anmäldes väl redan i början af år 1684,

^{*)} Jemte några styckevis utgifna större Akademiska arbeten, hvilka under ifrågavarande år blefvo till betydlig del fortsatta, samt jemväl fulländade och derfore med sitt allmänna Titelblad då försedde, såsom: Svenonii Apologeticus Dei, quod non sit causa muli, 1681, 8:0, och Dan, Achrelii Contemplationum mundi Libri Tres, 1682, 4:0, kunna här nämnas: Joh. Flachsenii Relation och Betänkiande om then stoore Cometen, som här ifrån d. 11 Dec. 1680 til 9 Febr. 1081 i 61 dagar sedder är, tryckt 1681. och samme författares Synopsis Mechanica, 1682, samt Catalogus Plantarum quæ prope Aboam tam in excultis, quam incultis locis huc usque invento sunt, In gratiam Philo-Botanicorum auctior editus, Accessere prætereà usitationa Svetica atq: Finnonica nomina, cum brevi virtutum recensione. Collecta Ab Elia Til-Landz Doct, et Prof. Med. Publ. Mense Maij M. DC. LXXXIII. tillika med Jeones Novæ in usum selectæ, Et Catalogo Plantarum Promiscue appensæ, tr. 1683, alla in 8:0. Mera afseende fortjenar dock den Psalmbok, som WALL synes halva omkring samma tid upplagt, emedan uti Consistorii Academici Protocoll för d. 28 Febr. 1681, då han ibland andra hördes, till vinnande af utredning rörande ett parti papper, för hvars försäljning till Akademie Bokbindaren Lietzen, utan vederbörlig anmålan eller redovisning, Biskop Gezelius d. ä. hade angilvit sin Pappersmakare, finnes antecknadt hurusom WALL under edelig förpliktelse uppgifvit, att han "till sin oplagde Psalmbok' åtskilliga resor bekommit föga mindre än tio Ris papper af Lietzen, hvilken berättat sig hafva haft detsamma en lång tid liggande hos sig. På hvilket språk denna Psalmbok må halva varit författad, är mig alldeles obekant, och ingenstädes har jag funnit någon annan uppgift eller ens den minsta anvisning om denna upplaga; men derföre har det ock synts

att Typographus beklagat sig deröfver, att Typographiæ Press vore så utnött, att den icke länge mera kunde begagnas, hvilket förhållande icke heller bör väcka någon förundran, då troligen ingen annan Press någonsin vid Inrättningen funnits, än den. som af Peter Wald hemtades ifrån Sverige och kanske icke ens då var ny; men ehuru fråga för det första icke var om annat än reparation, nödgades Consistorium dock, i anseende till Fisci medellöshet, antaga en enskild mans, Matheseos Professoren Johan Flachsenii, anbud att förskjuta den nödiga kostnaden. såvida han nu ville "låta et helt opus gå uth på trycket," och när det sedan, icke långt derefter, visat sig, att ändamålet likväl icke kunde vinnas, utan att alldeles ny Press anskaffades, blef så väl med verkställigheten häraf, som med slutligviden om betalningen, för hvilken Flachsenius ock tyckes hafva, med anledning af nyssberörde åtagande, gått i förskott, så länge fördröjdt, att hvarken Pressen kunde fås färdig förrän om hösten 1686, eller den sista af de ur Fiscus i mindre poster efterhand utgående afbetalningarne på dess värde skedde förrän d. 14 September samma år, då summan, utgörande 100 Dal. 10 ö. 16 p. Silfv. mynt, finnes vara af bemälde Professor till fullo qvitterad.

mig vara så mycket mera skäl att genom förberörde antecknings offentliggörande fästa andras uppmärksamhet på frågan derom. Skulle den tilläfventyrs, innan tryckningen hunnit fulländas, eller några exemplar utgifvas, hafva blifvit lågornas rof vid den stora brand, hvaraf Åbo stad nyssnämnde år till ganska stor del härjades?

Sedan Boktryckaren d. 8 December nyssnämnde år till Consistorium Academicum inlemnat "en upsats på Acadæ Stylen och hans egen som han der till kiöpt," blefvo Inspectores Typographiæ o h Akademie Secreteraren genast anmolade att inventera detta inköp jemte den nya Pressen "confererandes det gamble Inventarium med det som nu upprättas, at man må veta huru myckit af Stylen Acad. tillkommer"; men först d. 2 nästfoljande April inberattade desse Committerade, att de "Lesedt den nya Prässen med des tillhörige trä- och Järnwärke hafvandes dhe befunnit såsom den inlefwererade up atzen uthwij ar," och då dessa, ur Protocollet för sistnämnde dag hemtade, ord icke närmare an de ofvanför aberopade utmärka föremålet för Revisionen, hvad Stilarne beträffar, stadnar man i ovisshet, huruvida den må hafva blifvit sträckt ens till de sednast anskalfade. Af hvilket slag desse varit upplyses dock till någon del så vål af Svenonii ofvanbem'dde Memorial, dat. d. 23 Octob. 1685, med derå technad anordning på 120 Dal. Kopp.mynt, dem Wall d. 4 nästföljande November qvitterat, som ock af ett d. 1 Julii året derefter af den sistnämnde undertecknadt Ovittence på ytterligare bekomne 66 Dal. samma mynt; ty här sägas begge summorne vara betalning för två Centner Stilar, kallade i det förra Mittel antiqua, i det sednare Mittel Cursiv, svarande nästan emot hvad för två ark erfordrades, hvilka på beställning af Akademien förstnämnde ar genom Skepparen Krüger eller Kröger afven samme ar ifrån Lübeck ankommit. Derjemte finnes haraf,

att ehuru det anbud Professor Flachsenius gjort, att försträcka Universitetet de för Tryckeriet nödiga medel, af ag äf en inköp af Siffer-Stil, hade sagde anbuds antagande lika litet i detta afseende någon paföljd, som bemälde Professors föresats att utgifva ett arbete, för hvars skull sådan Stil i synnerhet kunde behöfvas. De ur Consistorii Protocoll for d. 30 Januarii 1684 ofvanfore upprepade ord träffa nämligen icke inn på någon annan af Johan Flachsenii skrifter, an möjligen den "Svenska Trigonometria och Astronomia," som han enligt hvad Cancellerens, Riksrådet Grefve Bengt Oxenstiernas bref af d. 2 Maji 1682 till Consistorium Academicum utvisar, på affidne Grefve Brahes "godtfinnande förfärdigat" och ville låta trycka, för hvilket ändamål han ock allaredan "låtit sticka och uthskåra någre figurer i trää" *); men detta arbete har, mig veterligen, aldrig utkommit tvifvelsutan förnämligast af den orsak, att Universitetet icke hade någon besparing, hvarmed förlagskostnad en kunnat bestridas, på sätt af Canceller nu föreskrefs.

På lika sätt blef en annan af Universitets Boktryckeriets betydligaste brister, ehuru redan ifrån början af Walls tjenste-

^{*)} Förmodeligen menas samma Figurer älven med följande ord om Flachsenii esterträdare, Professor Magnus Steen, hvilka läsasi Consistorii
Protocoll för d. 30 Octob. 1694: "Professor Matheseos påminte vid detta
tillfälle att de figurer skulle förvaras vähl i ett särdeles rum, som Doct
Theol. Joh. Flachsenius låtit förfärdiga och nu anbjuder dem isrå sigh
emedan han dem med Acad. medel förfärdigat. Resol. de skola inventeras och lesvereras till Bibliothequet."

tid flerfaldiga gånger bragt i fråga att afhjelpas, ånnu i mera än ett Decennium derefter ouppfylld. Hebreiska Stilar hade nämligen der aldrig funnits, utan man nödgades, om något synnerligt behof föreföll, såsom t. ex. då ett eller annat Hebreiskt ord, som utgjorde ämne för en afhandling, ansågs böra åtminstone på Titelbladet deraf tryckas med Hebreiska bokstäfver, fastån Latinska nyttjades till allt hvad som i contexten behöfde på Hebreiska språket uttryckas, hjelpa sig med för tillfället enkom skurna figurer, eller gjutna stemplar af sådana ord i sin helhet; hvilket förhållande flera den tiden utkomna Disputationer ögonskenligen röja. Huruledes Consistorii uppmärksamhet numera var fästad på denna brist, ådagalägga Protocollerne för d. 5 Novemb. 1680. d. 14 Julii 1681 och d. 27 Junii 1682 nogsamt, äfvensom en i Registraturet förekommande Promemoria, hörande sannolikt till förstkerörde dag, angående några angelägenheter, hvilka genom Procancelleren, Biskop Gezelius d. a., som då var i Stockholm, vid Riksdagen, skulle hos den nyligen aflidne Grefve Branus blifvande efterträdare i Cancellers embetet till det bästa recommenderas, då Lärosätets behof förmodades nu, efter återvunnen fred, kunna hos regeringen vinna mera afseende, än allmänna ställningen hittills medgifvit. Dylikt uppdrag erhöll jemväl sonen, davarande Theologiae Professoren Johan Gezelius d. y., vid sin resa till Sverige om sommaren följande året, sedan Consistorium i skrifvelse af d. 26 nästföregående Martii till den samma år d. 19 Januarii utnämnde nye Cancelleren, Grefve

ONENSTIERNA, afgifvit en berättelse om Universitetets tillstånd och i hvilka delar det förnämligast vore i behof af denne sin Styresmans medverkan till vinnande af önskelig förbättring, hvarvid äfven saknaden af Hebreiska Stilar i Boktryckeriet ibland andra hinder för verksamheten inom Lärosätet uttryckeligen råknades. Men verkan af allt detta utchlef, oaktadt flere fornyade påminnelser, länge, och när omsider den Kongliga Resolutionen på omförmälde Petitioner, gifven d. 18 Febr. 1684, utföll, i hvars tredje punkt Boktryckeriets trångmål framför allt syntes hafva blifvit behjertadt, såsom i det följande skall ådagaläggas, kunde deraf dock snart sagdt ingen fördel för detsamma i sjelfva verket påräknas. Under mellantiden hade väl äfven d. 2 Maji 1683 davarande Rector, Professoren Jacob Flachsenius, proponerat "om icke det vore nyttigt och Acad. hederligit, att man till Acad. Tryck skulle förskaffa Hebreiska bookstäfver, emedan i Fisco kunde vara än i förråd några medell der till," hvaruppå Consistorium fattade det beslut, att nagon i Stockholm skulle anmodas om bestyr härmed, eller ock, i händelse framgång icke vunnes på denna väg, "nomine publico" borde "härom skrifvas till Academiam Rostochiensem:" men håraf visade sig sedermera ingen påföljd och icke heller finnes något annat steg till ändamålet vara taget, förrån år 1692. Otvifvelaktigt är väl, att riktiga Hebreiska Typer blifvit nyttjade till några dessförinnan ifrån Universitets Tryckeriet, enligt Titelbladen, utkomne arbeten, såsom t. ex. Trihæresium Ebræorum, sive de tribus Sectis ve-

terum Judworum, Phariswis seil. Saducwis ac Hesswis, Dissert. Philolog. - - sub umbone - - M. Davidis Lund, - - ad censuram delata a Severino Riisberg, ad d. 28 Sept. A. 1689, samt en samling af skrifter på flera språk, så i bunden som obunden stil, utgifven på Universitetets vägnar med anledning af oftanämnde Biskop Gezelii d. ä:s likbegängelse d. 24 Junii 1699, under Titel: Pia Justa, pientissimis manibus Viri, - - Johannis G. Gezelii, - - Dioeceseos Aboënsis — — Episcopi — — Regiæque Universitatis Pro-Cancellarii: - - Quæ Academia Aboënsis Ipso Exequiarum die, videlixet 24 Junii, vergentis Anni M. DC. XC. - - persolvit. Men att sådane Typer varit blott för dessa tillfällen lånade ifran Gezelianska Tryckeriet, eller och endast Titelbladen i sjelfva verket blifvit tryckte på det Akademiska, är så mycket mera sannolikt, som Hebreiska Stilar åter saknas uti en två månader sednare än den ofvannämnda, äfven under Professor Lunds præsidium, utgifven och hos Watt tryckt Disputation De Phylacteriis Judworum, Resp. Jerem. Wallenio. 9) Hartill kommer, att Consistorii Protocoller for d. 8 Junii 1692 samt d.

^{*)} Såsom bevis att Universitets Boktryckeriets långvariga brist på Hebreiska Stilar åtminstone år 1690 ändteligen varit athulpen, är i Biskopen Gezelii d. ä. Minne, sid. 129, en af Joh. Flachsenius sagde år utgilven Synodal Disputation anförd; men af misstag. Ty det arbete, som härmed troligen menas, har icke utgått ifrån berörde Tryckeri, utan itrån det af nyssnämnde Biskop anlagda, såsom äfven i en af Bilagorne till Minnet, sidd. 315 och 316, rätteligen är uppgilvet.

14, 19, 27 och 28 Juni 1693, äfvensom Statsböckerne för samma tid, utvisa, att sedan Wall vid början af sommaren förstnämnde år, efter erhållet tillstånd, med en Skeppare Eric Claësson till Lübeck öfversändt någon Universitetet tillhörig gammal "tertia cursiv och halfparten af tertia antiqua" Stil, vågande, enligt vid Inventeringen d. 6 Aug. 1679 gjord anteckning, tillhopa 7 % 12 m., för att omgjutas till "Hebreiska, Syriska och Arabiska bokstäfver," ankommo på samme Skeppares farkost, efter ett års förlopp, icke allenast Hebreiska stilar af 1 a 11 m. vigt, utan ock ny Svensk Mittel, uppgående antingen ensam eller tillsammans med de förstnämnde till 10 % 14 m. Hvilketdera må menas, synes icke af anteckningarne hårom, och om Syriska samt Arabiska Stilar finnes icke något vidare nämndt. I arbetslön fordrades, troligen inalles, 9 Rth. 8 Lübska Schilling, i afbetalning hvarå 9 Riksd. af Fisci medel beviljades, sedan Wall, som blifvit till Consistorium uppkallad för att upplysa huru det borde förstås, att det nya Stilpartiet i vigt mycket öfversteg det till utbyte försända, förklarat sin afsigt vara, att antingen med gammal Stil eller med penningar betala öfverskottet. Icke dess mindre äro nyssnämnde 9 Riksd. af honom d. 1 Julii 1693 qvitterade endast såsom betalning för Hebreisk Stil. *)

^{*)} Prol, sannolikt ibland de äldsta, af ofvanherörde Hebreiska Stil kunna ses i Solennitas Doctoralis; anno Jubilwo, in memoriam Concilii Upsaliensis ante seculum habiti, a Sacra Majestate indicto; Indultu Mandatoque Regio, in Academia Regia Aboensi instituta, et decentibus cere-

Till huru mångfaldig oreda en sådan handel, på en gång för Universitetets och Boktryckarens räkning, måste leda, om icke hvarderas anpart deri vederbörligen bokfördes, var så mycket lättare att inse, som gränsen emellan hvarderas skyldighet att sörja för Tryckeriets behof ännu aldrig blifvit utstakad. Häruti lärer ock orsaken böra sökas dertill, att Rector Magnificus d. 28 Junii 1693, då nyssnämnde utbetalning var i fråga, åtog sig att med Secreteraren innan kort uti "Academiens Typographie efter gambla inventeringen en ransakning anställa," likasom Consistorium äfven vid flera tillfällen derefter, genom Boktryckarens tillhållande att bestämdt uppgifva hvartill de penningar behöldes, som han begärde, samt att sedan med vederbörliga räkningar verificera deras användande, visade sig hafva kommit till inseende af angelägenheten att bättre än tillförene hafva reda på Universitetets andel i allt hvad som uti dess Boktryckeri fanns. Denna omtanke var ock nu så mycket nödvändigare, som omständigheterna årligen fordrade allt större och större inskränkning af Lärosåtets utgifter för berörde Inrättning, under det dess behof af nya bidrag till förstärkning af de förra förråderne måste tillika med desses ålder tilltaga. Huru högt den af sagde omständigheter

moniis ac ritibus peracta: cum Sacro Sanctæ Theologiæ Licentiatus, Dn. M. Johan. Flachsenius, St. Theol. Professor Ordinar. etc. nomine Admodum Reverendæ Facultatis Theologicæ, in Aboënsi Templo Cathedrali, et festivá Panegyri, Ejusdem Facultatis Doctor renunciaretur 3. Calend. Jun. A. Ch. Cid. 19C. XCIII. A Petho Laurbecchio, St. Theol. Doct. & Professore Ordinario, tunc Pro-Decano.

uppkomna förlägenheten sluteligen stigtt, bevisa Consistorii Academici skrifvelser af d. 7 Aug. och 11 Sept. 1711, till dåvarande Cancelleren, Kongl. Rådet och Presidenten i Svea Hofrätt, Grefve GABRIEL FALKENBERG, i hvilka angelägenheten för Universitetet att blifva bibehållet vid förmonen att få begagna den del af Boktryckeriet, eller stilarne och annat tillbehör, som då redan aflidne Wall i lifstiden ägt, framställes såsom ett ibland skälen till Consistorii önskan, att till eftertrådare åt honom få en man, som ville försörja sterbhuset. För Boktryckaren, på andra sidan, ligger häruti ett så mycket mera hedrande vittnesbörd, ju hårdare de prof voro, på hvilka hans förmåga att underhålla verket sattes genom samma allmänna olyckor, som vid slutet af sjuttonde och början af adertonde århundradet allt mera och mera inskränkte Lärosätets utvägar till sin försörjning, äfven med det oumbärligaste. De i hela landet åren 1695, 1696 och 1697 inträffade svåra missvexterna tvungo många af de till Universitetet skattskyldige jordlägenheters bebrukare, som kunnat med lifvet undslippa hungersnöden, så ringa desses antal ock i sig sjelf var, att öfvergifva hus och hem. Andre åter, som qvarstadnat, blefvo innan kort offer för härjande sjukdomar, hvilka den föregående landsplågan, såsom vanligen, alstrat. Sålunda hade i Universitetets öfre Fögderi 12 Hemman, utgörande tillsammans 63 Mantal, samt i det nedre 5, med 21 Mantal, redan 1696 rakat i odesmål, och i det förstnämnde steg ödeshemmanens antal följande

faret ånda till $5S_{\frac{1}{2}}$, skattlagde till $32_{\frac{1}{6}}$ Mantal $^{\circ}$). Härigenom hopades naturligtvis för vår W_{ALL} , likasom för samtelige tjenste-

^{*)} Se Universitetets Statshocker for de namnde aren och Oratio, qua --ALUXANDRI Primi - in Camenas Aboenses lautissima beneficia -- celebravit Andr. Joh. Lagus, pag. 100. ()m det beklagliga tillstånd, i hvilket vårt fädernesland i allmänhet under ifrågavarande olycksperiod var försatt, vinnas många upplysningar i Synopsis Chronologiæ Finnonica Rythmica, eli Ajan-Tieto, à Laurentio Petri Ab. jonga on lisannyt C. R. (Car. Rein) och den Ajan-Tieto, som finnes tryckt framför de flesta upplagor af Finska Psalmboken, samt Carl Fredr. Mennanders på Kongl. Vetenskaps Academiens vägnar d. 19 Decemb. 1755 hallna Aminnelse-Tal öfver Theol, Professor Prim. Domprosten Doct. Gabr. Lauraeus, sid. 10, Tankar om sattet att forekomma den Missväxt, som förorsakas af väta i Sanings-tiden, af Joh. Leche, i Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar for ar 1764, Vol. XXV, sidd. 67, 68, Tidningar utgi/ne af et Sällskap i Abo, for år 1784, sidd. 380, 381, och för 1785, sid. 38. Blandade Afhandlingar, såsom et Bihang til de af ei Sällskap i Abo utgifne Tidningar, för år 1785, sidd. 52, 53. Abo Tidningar for 1793, Nine 38 -40, 42, 48, Beskrifning öfver Aland, af Fredr. Wilb. Radloff, sidd. 217, 218, samt Disputationerne, utgilna under Pet. Kalms inseende, af Ephr. Hoeckert, 1753, Beskrifning öfver Sjö-Staden Nystad, sid. 7, al Jac. Chydenius, 1754, Om Gamle Carleby, sid. 10, al Er, Cajanus, 1755, Beskrifning öfver Cronoby Sokn, sid. 14, af Christoph. Herkepaeus, 1756, Beskrifning öfver Hauho Soln, sid. 10, och af Carl Bergman, 1760, Beskrifning öfver Sjö-Staden Ebenas, sid. 39, af Hans Henr. Aspegren och Gabr. G. Aspegren, 1766, Bestrifning ofver Pedersore Sohn, 2:a Del., sid. 86, under Joh. Bilmarks præsidium, af Sv. Mellenius, 1772, Historisk Afhandling om Sjö-Staden Raumo, Sednare Delen, sid, 24, och under Joh. Fredr. Wallenii, 1814, af Fredr. Korsström, Diss. Historiam descriptionemque Paroeciæ Mandyharju sistens, P. II. pagg. 18, 19. Ilvartill, såsom sednare, men innan detta Stycke till Trycket lemnades, utkommen, kan läggas Wasa Tidning 1847, N:o 16. Likväl omfatta de i dessa och

man vid Universitetet, svärigheterna att utfå afven sin aflöning, annu mera än någonsin förut, jemte det Statsverkets, genom det

andra allmännare kända tryckta skrifter förekommande underrättelser endast några delar af landet, och äro icke heller i allt hvad desse angår så fullständige och noggranne, att icke många önskningar om bristernes fyllande ur hittills obegagnade källor skulle hos Historiens vänner återstå. Derföre och då folkmängdens minskning genom dödsfall otvifvelaktigt är ett ibland de mest talande bevisen på vidden af Finlands förödelse genom de landsplågor, af hvilka det under berörde tid hemsöktes, tror jag mig icke böra underlåta att här upptaga hvad jag haft tillfälle att derom särskildt inhemta. Beträffande således först landets gamla hufvudstad Abo, för hvilken, med undantag af Slotts-Församlingen derstädes, de dödes antal icke är uppgilvet i den "Förtekning öfver de i den hårda tiden, emellan Festum Michaelis 1696 och Festum Johannis Baptistæ 1697. döde blifne i Åbo Stift," som finnes intagen i N:o 40 af ofvannämnde Abo Tidningar for 1793, utvisa Domkyrkans i Kejserl, Senatens for Finland Archiv förvarade, med till Länets Landsböcker hörande Verificatiotioner sammanbundne, Räkningar ifrån och med Maji månad 1696 intill samma månad 1698, icke allenast detta antals stigande och fallande under sagde tid, genom uppgisten sör hvarje dag på de begrasne, utan ock i huru mer eller mindre medellös belägenhet större delen af dem aflidit, genom sådane på flere ställen tillagde anteckningar, som ses af det följande. Förstnämnde år begrofvos: i Maji månad 20 personer, i Junii 24 samt dessutom 1 Tiggare, i Julii 26, i Augusti 14, i September 7, i October 19, i November 14 och i December 12. År 1697: i Januarii 6, i Februarii 12 andre och 8 Tiggare, i Martii 13 andre och 11 Tiggare, i April 38, för hvilka betalning erlagts, 31 Fattige och 47 Tiggare, i Maji 60 med betalning och 105 Tiggare, i Junii 89 för betalning och 49 Fattige, i Julii 63 al förstnämnde slag, 7 af det andra och 19 Tiggare, i Augusti 50 för hvilka algilter blifvit uppburne och 29 Fattige, i September 34 al förstnämnde klass och 2 af den sednare, i October 18 personer, i November 13 och i December 10. År 1698: i Januarii 11, i Februari fo, i Martii 14 för betalning och 12 Fattige, samt i April 7 af det förra slaget och 4

nåstan tillika med det nya århundradet började kriget öfver all måtta

af det sednare, Med benämningen Tiggare, som i berörde Räkningar omvexlar med Tiggerskor och deras Barn, menas troligen ifrån landsorterne ankomne bettlande personer, så vida älven antalet af dem är störst under de månader, då tillfälle till försörjning genom arbete å jorden gemenligen aldramest saknas, hvaremot ordet Fattige, i stället för hvilket Utfattige några gångor forekommer, tyckes åsysta Stade- eller Domkyrko-församlingarnes egna, i alldeles utblottadt tillstånd aflidne medlemmar. Till hvilken höjd älven ibland stadens egenteliga innevånare bristen och nöden stigit, skönjes också deraf, att stundom fyra eller fem personer af samma famille på en gång burits till grafven. - Förhållandet i Nylandska städerne samt de socknar af Nylands och Tavastelms Lan, hvilka icke horde till Abo Stilt, finnes icke heller forut specifikt uppgilvet; hvarfore ett rum här synes med fullt skäl kunna lemnas åt esterfoljande underrättelser harom, hemtade dels ur Helsingfors församlings Kyrkoböcker, dels ock ifrån Kronologdarnes i nyssnämnde Län, till dess Höfding, jemlikt d. 22 Sept. 1697 meddelade Ordres, afgilna, i October månad samma år daterade, betänkanden rörande tjenligaste utvägarne att få de genom missväxterne, hungersnöden och sjukdomar, hvaraf så väl befolkningen omkommit, som ock boskapen störtat, i ödesmål råkade ei mindre Skatte- än Kronohemmanen med åboer försedde och återupptagne. Med dessa betänkanden, som nu finnas i Kejserl. Senatens for Finland Archiv, följa nemligen Specificationer, särskildt för hvarje Harad och Socken, på, ibland annat, hemmansåboer, som dels genom döden, at hunger och sjukdom, algått, dels ock för fattigdom och brist nödgats ölvergifva hus och hem, äfvensom på antalet af alla personer, hvilka, en igt Presterskapets uppgilter under nästförflutne året, blitvit af döden bortryckte, samt en "Kortli opsattz oppå Närskrifne döda uthi Helsingforz Stadh Ato 97," undertecknad d. 16 Octob. sagde år af denna stads då varande Kyrkoherde, Prosten Magister Andreas Matthiae Ignatius. Vid jemförelse af dessa handlingar med de utdrag ur Ölversten Adolf Magnus Klingspors Dagbok, som läsas i Abo Tidningar för 1793 N:o 42, finner man ögonskenligen, att samma handlingar utgjort kallan till anteckningarne i nämnde Dagbok rörande förevarande ämne,

stegrade behof uteslöto hoppet om ersättning för den brist i hvad

med hvilket Klingspor hade så mycket flera anledningar att sysselsätta sig, som han, då olvanberörde betänkanden till Läne Styrelsen inkommo, uppå förordnande af d. 24 Sept. samma år 1697, i egenskap at Vice Landshöftling förestod densamma, efter det Öfversten Friberre Georg Johan Maidel, hvilken, under det Landshöldingen Friherre Abraham Cronhjort var af uppdrag på annan ort hindrad, dittills innehaft Vice Landshöldinge Embetet, erhållit kallelse till Riksdagen i Stockholm. -Hvad således nu Helsingfors stad vidkommer, innehåller ofvannämnde uppsats om derstädes aflidnes an'al, följande ord: "Af Stadzens egne Invånare som liggia i Kyrckgården 87 Lijk. Af Landzbygden Gångfolck och Tiggare, som äro jemwähl i Kyrckgården begrafne 53 L. Uthom Staden på ett förordnat grafställe på Kampen, främmande Gånglolck och Tiggare 400 Lijk. S:a 540." Tämmeligen nära härmed instämma ock de anteckningar jag i Kyrkoböckerne funnit, inskränkta, såsom det tyckes, till de i stadens Kyrkogård jordade, hvilkas antal här uppgår till 152, och at hvilka 21 äro kallade kyrkofattige samt en husfattig. Huru ovanligt stor dödligheten nu var ibland stadens invånare, märkes vid jemförelse med folkmängden, af hvilken, enligt Mantals Förteckningen för 1694, den enda som jag kunnat öfverkomma för något af åren näst före det nu ifrågavarande, icke flere än 776 personer då voro till den älder komne, att de borde här upptagas, äsvensom deras, att de begraines antal de nästföregående sju åren icke ntgjort mera än 65 under 1690, 94 år 1691. 101 år 1692, 78 år 1693, 87 år 1694, 68 år 1695 och 77 år 1696. Af allmännare syftning aro de upplysningar, som rörande detta ämne förekomma uli en at Henric Forsius, under Prof. Pet. Kalms inseende år 1757 utgilven Disputation, med Titel: Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfver Stapel-Staden Helsingfors uti Nyland, sednare Delen. sid, 76, vid hvilket arbetes åberopande dock det dernti förekommande misstag, ibland flere andra, bör anmärkas, som angår ofvannämnde Ignatius, hvilken i Disputationens forra Del, som är skrifven på Latin och utkom 1755, pag. 41 berättas hafva 1702 blifvit Kyrkoherde i Helsingfors. Detta misstag är al utgilvaren sålunda rättadt, uti dess i Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo, 1772, N:o 30 och 31 inforda Korta Histodetta Lärosäte enligt Stat tillkom, som redan länge af åtskillige anledningar varit i stigande, men nu vuxit till en förvånande

riska underrättelse om Trivial-Scholan i Helsingfors, att Ignatius här uppgilves hafva till 1689 varit denna Scholæ Rector, och sedermera Kyrkoherde och Prost i Helsingfors, Häraf får dock icke annat slutas, än att Pastoratet of Ignatius tillträddes nämnde år; ty att Fullmagten deruppå varit gifven d, 28 Maji 1688, ses af ett ibland Verificationerna till Nylands och Tavastehus Läns Landsbok för år 1691 befintligt Transsumt deraf. Beträffande sedan de öfrige orterne i detta Län, uppgifves i oftanämnde handlingar specifikt, ibland annat, huru många ödeshemmanen voro i hvart och ett af de till detsamma den tiden hörande sju Härader, samt följande antal af med döden algångne invånare, nämligen: För Bårgo Lähn: i Helsing Sochn 439, Sibbo Sochn 533, Tuusby Sochn 346, Nurmjersvi 333, Bårgo Sochn 2294, Askola 176, Puckila 134, Mänsälä 345, Pärno Sochn 815, Mörskom 216 och Lappträsk 181, Summa 5822, uppkommen genom selaktig Addition, som i sörenämnde utdrag ur Öfverste Klingspors Dagbok icke är rättad, i stället för 5812. För Raseborgs Lähns Ostre dehl eller Häradh: i Espo Sochn 535, Kyrkslätt Soehn 340, Siundo Soehn 479, Loijo Soehn 883, Wichtis Soehn 365 och Läppis Sochn 338, Summa 2940. För Rassborgs Lähns Wästre dehl: i Thenala Sochn 346, i Kisko bohl 136, Poijo Sochn 237, Eknäs Stad 90, Jugo med Fagervik 576, Karis med Svartå 613, och Karis Loijo Sochn 275. Summa 2273. För Öfre Hållola Häradh: Hållola Moder Kyrckia med dess underliggiande anexer 1906, Orimattila Sochn 540, Jtimä Sochn 670 och Syssmä Sochn 320, Summa 3436. För Nedie Hållola Häradh: i Hauho pastorat 1266, Lampis dito 1165, Padasjoki dito 469, Culumais dito 364, Längelmä dito 14, Einäs fierdingh 188, Wuona pastorat samt Rängo 553, Janackala pastorat, af dem som lyda under nedre Hållola Häradlı 751 och Mänssälä pastorat 24, Summa 4794. För Ölre Säxmäkie Häradh; i Kullsiala Sochn 124, Pällkäne Sochn 506, Sahalax Sochn 332, Längellmä Sochn 543, Kenrus Sochn 99, Jämbsä Sochn 680, Laukas Sochn 322, Sari Jerswi Sochn 290, Witasari Sochn 426 och Rautalambi Sochn 438, Summa 3980, eller med rättelse af ett Additionsiel, 3960. Samt för höjd. *) Oftare än tillförene påminte han fördenskull ock under ifrågavarande tid sina förmän om Boktryckeriets tarfvor, men måste tillika merendels vidkännas någon afprutning, i afseende antingen på qualitet eller quantitet, af det som beviljades, eller ock åtnöjas med löften om framtida hjelp, hvilken dock icke sällan, till och med då ganska obetydliga utgifter voro i fråga, så länge uteblef, att icke allenast han, eller de som för verkställde reparationer hade något att fordra, blott småningom och sent fingo den betalning, som bordt med det skyndsammaste utfalla, utan ock allt arbete vid Tryckeriet, i anseende till dess usla skick, var nära att upphöra. Detta förhållande är synbart ibland annat deraf, att ehuru Inspectores Typographiæ, som enligt Consistorii d. 22 Oktober 1701 fattade beslut, då Boktryckaren, med an-

Nedre Säxmäkie Häradh: i Somero Sochn 751, Tammela 632, Jochiois 601, Urdiala 384, Akas 496, Säxmäkie 895, Kalfwola 461 och Hattula 783, Summa 5003. Om de i Nedre Hollola och Öfre Säxmäki Härader aflidne personerne är särskildt antecknadt, att ibland här ofvanför uppgifne antalet 259 i det förra och 372 i det sednare varit fremmande eller vagerande fattige. Om Tavastehus stad saknas uppgift, ehuru sannolikt är, att den redan den tiden, till hvilken allt detta hörer, utgjorde eget Pastorat. Hvad åter Borgå stad vidkommer, har man så mycket mera skäl att anse den vara inbegripen i uppgiften om socknen med samma namn, som äfven i detta fall och i anseende dertill att stadens folkmängd icke var större, än som deraf kan slutas, att i dess Mantals Längd för 1694 icke flera än 754 personer finnas upptagne, det förefaller mycket tvifvelaktigt huru ofvannämnde stora antal af i socknen aflidne bör rätteligen förstås.

^{*)} Se slere af Noterne till förut nämnda Oration af And. Joh. Lagus.

hållan om medel till Reparation af några söndriga stycken, inlemnat en Specifikation af dessa, besett Tryckeriet, sedermera d. 6 Nov. till Protocollet refererade, att de befunnit det mesta af hvad han uppgifvit mycket nödvändigt behöfvas och "Bokstäfverne så alldeles vara förnötte, att allenast en Complett Styl" vore "öfrig, den han till aftryckandet" kunde "bruka, de öfrige heelt incomplette och gamble," äfvensom WALL d. 27 Apr. 1704 gjort ansökning om någon ny Stil, hvaruppå nyssnämnde Inspectores, som tillika voro Inspectores Aerarii, åter anmodades att "inquirera" om den uppgifne defecten; finnes dock ingenting under den tid af sex och ett halft år, som denne Boktryckare ännu efter sistnämnde dag lefde, vara gjordt till fyllande af sagde defect. Likaledes var vål d. 11 Maji 1704 utredt, att Digeln, gjord af träd, sönderspruckit och i dess ställe en ny af Malm vore nödig; men emedan Klockgjutaren begärt för en sådan 100 Dal. Kopp. mynt, stadnade man d. 18 Octob. i det beslut, att den nya, som skulle anskaftas, borde blifva af Ek. Pa Boktryckarens anmålan d. 2 Dec. samma år, att Tryckeriet behölde någon förbåttring, hvartill, enligt företedd Förteckning, erfordrades 30 Daler, afven Kopp, mynt, om hvilkas utbekommande "med det forderligaste" han tillika anhöll, emedan han icke kunde "något aftrycka," så länge det, som han dervid mest hade af nöden, vore "alldeles förderfyadt," resolverades ock att de specificerade felen straxt skulle afhjelpas och betalningen derför utgifvas; men icke dess mindre blefvo endast 10 Daler d. 13 Jan.

följande året och de återstående 20 icke förrän d. 3 nästföljande Novemb. utanordnade. Beslutet om Ekdigeln åter gick annu mycket sednare, eller först 1707, i verkställighet, då 20 Dal., samma mynt som nåstnämnde summor, d. 3 Apr. beviljades, så väl till detta behof, som till "Panna i Prässen, Column-Låda och Bräde," hvilka stycken, såsom gamla och utnötta, numera voro obrukbara. Derefter finnes icke heller till Tryckeriets öfriga förnödenheter mera än 18 Daler Kopparmynt, dem WALL d. 6 Jul. 1708 quitterat, vara utgifne. Året deruppå, d. 17 Nov., sökte han väl ännu till någon Reparations kostnads bestridande, utverka sig 12 Dal., hvilka ock lofvades honom, "så snart i Rectoris Cassa något skulle infalla"; men detta löfte tyckes aldrig hafva blifvit uppfyldt. Vid sådant förhållande och då utom de vid nämnde tillfällen utanordnade summor, icke mera än 14 Dal. Silfv. mynt och 44 Dal. Kopp. mynt synas vara af Universitetet för dess Boktryckeri, under denne föreståndares långa tjenstetid använde, kan man icke, utan obillighet, lägga honom till last, att detta verk, nämligen hvad Lärosätets andel beträffar, vid hans afgång var mycket förfallet, såsom efterträdaren inför Consistorium d. 25 Octob. 1711 klagade och på andra sidan tyckes hafva blifvit erkändt, så väl vid detta tillfälle, som ock genom ofvannämnde skrifvelser till Cancelleren, af d. 7 Aug. och 11 Sept. samma år.

Jag har i det föregående vidrört en Kongl. Resolution, gifven d. 18 Febr. 1684, såsom åsyftande isynnerhet någon hjelp

for Universitets Boktryckeriet, och emedan dess davarande förvaltare, vid ett af de tillfällen, då han under sina sednaste år, namligen d. 5 Okt. 1704, hos Consistorium anholl om medel till denna Inrattnings upphjelpande, till stod derfore aberopat, ibland annat, samma Resolution, kan jag sa mycket mindre underlåta att här utveckla orsakerne dertill, att den både nu och under den forflutna tiden af tjugu ar, saknat allt afseende, som detta förhallande annars af flere anledningar maste icke allenast förefalla hvar och en obegripligt, utan ock kasta skugga på dem, som icke ställt sig högsta magtens pabud till efterrättelse. Protocollet for n'istnammele dag innehåller icke något mera hårom, ån att Rector da producerat nagra afskrifter, insinuerade al Johan WALL, "med begåran att han måtte handhafvas vid det Boktryckiaren eller Typographien i de förra tider blifvit understodd med; men kunde dock härutinnan icke villfaras." Frågan, af hurudan natur det här asyftade aldre understödet varit, vinner likval erforderligt ljus utur omformålde afskrifter, så framt de varit desamma, som ånnu finnas i behåll ibland den af mig redan ett pår gangor och sednist i detta Stycke sid. 659 aberopade samling, sasom med största sannolikhet slutas kan, ibland annat deral, att deras enlighet med Originalerne är af WALL intygad. Dessa afskrifter innehalla 1:0 det Transsumpt af Typographi Fullmachts 4:de punct", som jag på nyssnämnde stålle infort, 2:0 det i denna afhandlings första Stycke sid. 559 aftryckte Cancellersbref, dateradt d. 21 Julii 1648, och 3:0 "Transsumpt

af Kongl. Maij.tz Nådiga Resolution uppå samptel. Professorernes vid Åbo Acad. underdånigste insinuerade Supplique, gifven Kongöhr d. 18 Febr. 1684, punct: 3," så lydande: "Kongl. Maij.t hafver och af serdeles nåder i anseende till den stora skadan som Academien i sista eldsvådan tagit på sitt tryckerij, förskont och befrijat Academien för de observationer som af Stats Contoret äro gjorde på bibeltryck tunnan, hvilken af de Academien tillslagne tijonde herbergen ährligen uthfaller och bestiger ifrån ähr 1674 till 1682 inclusive till Sjuttijo Två Tunnor Spannmåhl. hvilket wart Stats Contor och flere wederbörande hafve sigh hörsamligen att efterrätta." Universitetets nödställda belägenhet vid det Boktryckaren på grund af det ofvanstående sökte hjelp för det verk, som han förvaltade, äfvensom de af mig i andra Stycket, sid. 708, anförde anledningarne för Consistorium Academicum att anse nyssberörde Cancellersbref såsom icke mera efter Pet. Walds afgång gällande, göra all förklaring af ej mindre detta brefs an Fullmagtens lemnande utan afseende, öfverflödig; men annat är förhållandet med det tredje Dokumentet, som atminstone vid första påseendet, tyckes icke hafva kunnat medgifva något afslag på ansökningen. Vid nårmare skärskådande af detsamma finnes dock, att ingen annan tillämpning deraf med skäl kunde göras, än att Kronans, eller Bibel-tryck Fondens. fordran hos Universitetet af ofvannämnde spanmålsbelopp, komme att afskrifvas, hvarigenom likvål icke ens den formon annorlunda ån i högst obetydlig grad tillskyndades Universitets Boktryckeriet.

att dess behof möjligen kunde så mycket låttare fyllas, ju mindre Lärosätet vore med skulder belastadt, enär sa manga andra anspråk på gemensam del i Statsanslaget för sagde behof tillika måste tillfredsstållas. Att Regeringen åsyftat någon annan och större förmon för Inråttningen, tyckes väl böra tagas för afgjordt, äfven om man anser Bibel-tryck tunnans vanliga benämning af Tryckeri spanmal icke hafva kunnat på högre ort föranleda till misstag om denna spanmåls verkeliga beståmmelse, hvarvid Universitets Boktryckeriets nytta alldeles icke var afsedd, och kanske ville man, att atminstone den ifrån Universitetets löningshemman eller tionde anslag utgående Bibel-tryck tunnan skulle tillfalla Lärosätets Tryckeri; men da härom icke var uttryckeligen förordnadt, sasom ock detta, hvad den förflutna tiden vidkommer, i sjelfva verket icke varit någon-befrielse för. Universitetet ifrån Stats Contorets anmärkningar, utan endast den anmärkta fordrans öfverflyttning på Tryckeriet, kan man så mycket mindre undra deröfver, att nästan all kraft och verkan af ifrågavarande punct i den Kongl. Resolutionen uteblef, som det är uppenbart, att densamma genom flerehanda misstag blifvit inskränkt till hvad Tryckeriet angick, ehuru icke dess behof af hjelp nu var större, ån de öfriga Akademiska Inrättningarnes och derföre icke heller blifvit af Consistorium enkom framstäldt, eller annorlunda nämndt, än i sammanhang med andra, ifrån Universitetets iråkade olyckor af flere slag och tryckande brist på hjelpemedel hemtade skål att begåra tillökning i Statsanslagen för detsamma i allmänhet.

Mest anmärkningsvärdt ibland omförmålde misstag är det, som röjes i uppgiften om anledningen till nådebevisningen; ty nyligen hade Universitets Tryckeriet då icke lidit någon skada af eld och brand, äfvensom icke heller någon af de eldsvådor, som sedan 1678 öfvergått Åbo stad, sträckt sig till detsamma. År 1684 förstördes väl en del af gårdarne vid yttersta ändan af Tavastgatan i berörde stad; men om ock denna olyckshåndelse inträffat tidigare än ifrågavarande Kongl. Resolution utfärdades, hvilket är mig obekant, synes det dock så mycket mindre sannolikt, att den beviljade förskoningen ifrån betalning af långt förut anmärkta Rester skulle hafva blifvit häraf föranledd och så hastigt derefter, att knappt någon anmälan om förloppet dervid ännu hunnit till högre ort inkomma, som en sådan anmälan svårligen kan hafva varit åtföljd af någon anhållan om delaktighet för Universitetet i det för de brandskadade tilläfventyrs erforderliga understöd, enär ingen då inträffad förlust för Lärosätet finnes omordad i de uppgifter och anteckningar, som vi hafve ifrån och om den tiden. Icke mycket olika är förhållandet i de delar, som här komma i öfvervägande, med den vådeld, som d. 29 Maji 1681 ödelade största delen af Åbo stad, emedan icke heller då någon af dervarande Högskola tillhöriga Inrättningar blef vidare drabbad, än att Bibliothekets öfre tak, som var alldeles nytt, afbrann tillika med Kyrkotornet, eller Klockstapeln, hvarmed det varit sammanfästadt. I Consistorii Academici d. 2 nästföljande Junii uppsatte skrifvelse till Canceller om olyckan, säges ock uttryckligen,

att "sielfva dhe Academiske auditorierne som vore nårmast den ableles albrände härlige Doomkyrkien, doch i alt blefve oskuble. jamval Typographia Academica, hunset das Aerarium stod, sampt Grandium" "). Da nu hartill kommer, att Consisterium under de nastförut framfarne aren tidt och ofta van It sig till Oliverheten med underdaniga ansokningar om nagon ersättning tor de betvdeliga forluster, som Universitetet och dess Personal af atskilliga orsaker under langte tids forlopp fatt vidkannes, vill det synes, såsom vore ordet sista i oftanämnde Kongl. Resolution, utan iakttagande af flera års skillnad i tid, hemtadt ur någon af de äldre ibland sagile insokninger, i hvilken någon nåstlorut tim d eldsvada varit omtabal. Alla dessa boneskritter hvib de nimligen hulvudsakligast upper den grund, att de iche allen at hetydeliga Rante- och Tion le-Rester astalkenimit en alltfor kanbor minskming i parakmale inhomster, utan ook eldens framfart aren 1050 och 1078 påkallat utomordentliga omkostnader och svar skuldsattning, isynnerhet af Fiscus, eller den Fond, hvilken ensam var bestamd till underhall for sa val Bibliothehet och Boktrycheriet. som alla byggnaderne, utom mycket annat, vore det åfven för naminde Infattning it of sandeles stor vigt, att Universitetet erhölle nagot skadestand, jemte betalning for sina has httsverket innestående fordringar, ibland hvilka ock fem sjettedelar annu råknodes of de 600 Doler Sillvermynt, om hvilkes uthetalning till

^{*)} Asven om denna olyckshändelse innehåller Gabr. Wallenii sörnt citerade arbete stera omständeliga upplysningar.

liqviderande af den summa, som Consistorium nödgats emot ränta upplåna till Universitets husens dels iståndsättande, dels nybyggnad, efter branden 1656, Riks Skattmästaren och samtelige Kammar-Råd allaredan medelst Kongl. Brefvet af d. 1 Julii 1665 erhållit befallning att foga anstalt. Hvad Akademiska personers enskilda förluster vidkommer, blefvo äfven de vid flera af berörde tillfällen bevekligen framställde, och detta med så mycket giltigare skäl, ju ömmare behjertande samma personers rättmätiga anspråk, att åtminstone utfå hvad dem tillkom af Universitetet eller Statsverket, nu påkallade, såsom t. ex. då, enligt uppgiften i ofvannämnde skrifvelse om 1681 års brand, Pro-Cancellers, Rectors och åtta Professorers samt Quæstors hus och gårdar blifvit i aska lagde, jemte det mycken deras lősa egendom gått förlorad. Af hvilket allt och ehuru hvarken slera än en Supplik äro åberopade, eller innehållet af någon sådan finnes upprepadt i öfverskriften å Kongl. Resolutionen, gifven d. 18 Febr. 1684, likasom icke heller några motiver äro anförde till dess tvänne första puncter, af hvilka den ena föreskrifver närmare utredning, huruvida icke Akademien hade i Hemmansräntor mycket mera, än dess betjente enligt Stat i lön tillkomme och om således någon brist verkeligen funnes, samt den andra angår Professorerne och Enkor efter dem beviljad förskoning för Mantals- och Bakugns-penningars erläggande, alldeles såsom vid Akademien i Upsala, det tyckes vara temmeligen klart, att denna Resolution är att betraktas såsom en på gemensam grund bygd Decision af berörde äldre frager och böneskrifter at ellmännere syftning, samt an dess langvariga Emirifiande utgjert förnämsta ersäken till den här aumärkta eriktiga utydanningen af siken i liskilliga delar.

Aterga vi nu, med blicken fastad på Universitets Boktryckarens Afriga skyldigherer, umm ibe blintils berndande, till frågan. huru Wall fullgjort allt hvad han borde, förekommer ingen annan mhafaing till tvitvelsmill himms he heshuren i Consist vit Protocoll för d. 28 Julii 1688, att han skulle tillsägas beslita sig om Trycket "at det seer battre och reenare ut," och för d. 27 Febr. följande året, då Wall "förmantes at han upsätter försvarlige columner, och icke så små, som hårtill skedt år; der hoos tilsåijes han at vara billig, och i öfrigt råtta sig efter des Fullmacht och taxan, eliest der han skrijder of. lärer der på fölia behing ormali m." Till inskehnling i om Omer om mannens pallittighet syrus dock dessa heslut like litet kunna verka, som de femiell un ler hans tild. Illes mi Brut, sonn line Brue de planinnelserne rim noggrunnt laktingande af Oliv studganden, angliende granskning at vissa till tryckning anmålda obeten, hvarjemte aya fi reskrifter i samma sytming tilla mm. Likas m tillfarene saknade nimligen dessa författningar icke allian efterlefnad svatarligen andast sterf in, att de leke vom ung tydlige och bestimde: hvarföre och då exempel af deras förbiseende ofta gåfvos af dem. hvilkas anpart uti esterlesnads skyldigheten var större än Boktryckarens, det sunnerligen under de blandade förhillanden, ifrånhvilka de hade sitt ursprung, icke bhe vácka nágos fórundran,

om han icke i hvarje fall förmått inse hvad honom ålåg. För att ådagalägga detta, bifogas här utdrag af hvad Consistorii Academici Protocoller harom under Walls tid innehålla, med öfvertygelse, att icke allenast den större eller mindre betydelse och vigt saken hvarje gång haft, sålunda skall tydligare skönjas, utan ock någon upplysning till Universitetets Historia för samma tid i en eller annan af dess öfriga delar derjemte kan spridas. finnes antecknadt för 1682 d. 2 Novemb.: "Renoverades det een gångh tillförennd slutit ähr, att Booktryckarena eij skola understå sigh trycka någon dedication uthan den af Magnif. Rectore och Decano ell. något annat det icke af någon Professore censureradt och underskrif.t vore." För 1688 d. 28 Julii: "Booktryckaren skall tilsäijas at han inga skrifter emottager med mindre de äro öfversedde af Decano eller någon Professore," d. 1 Sept. "Discurerades om dhe åthskilliga Skriffter som här både på Svenska och Latijn blifva tryckte medh många fehl, och slöts att inga andra skola blifva aftryckte än dhe som af Professorerne äro öfversedde och underskrefne. Jempte detta klagade och Prof. Poes. sigh däröfver att så många vitieuse Skriffter uthi ligata oratione uthkomma, betygandes sigh icke vara orsaken der till, effter han som den där nyligen Professionen anträdt, icke här tills sådant kunnat förekomma och dess uthan den ovanan här vore inriitat, att ock dhe Skriffter, som icke undergådt någhon Professoris censur blifva aftryckte," samt d. 21 Nov. §. 12: "Bibliothecarius H. Gabriel Wallenius, för det han öfversedt en Gratulation och låtit

den orättad komma på trycket, skal citeras in och tiltalas," åfvensom 6. 13: "Såsom medelst det at en och annan effter sitt godtyckio understår sig låta uthgå på trycket, sitt arbete, så af verser, som eliest des utan, hvarvid esomoftast finnes åtskillige fauter, hålst uti oratione latina ligata: alt fördenskull slijk irring til at förekomma, förbiudes här med Academiæ Typographus alfvarl, det han inga andras än Professorum skriffter til at aftrycka emottager, med mindre de åro af Rectore, Decano eller någon Professore öfversedde. Warda altså Magistri, Studiosi och flere andre förbudne, låta af egit bevåg något tryckia utan Professorum censur och öfverseende; och det i anledning af i. 1. de Typographia et Bibliopolio. Der til med skal och yara förbudit at låta tryckia Svenska Gratulationer under något Latiniskt arbete." Vidare innehåller Protocollet för d. 27 Januarii 1693: "H.r Profess. Poëseos Mag. Torsten Rudeen besvärade sig, att här wijdh Academien tryckes många Svenska Verser fast oförsvarlige, icke vetandes hvem som dem har öfversedt, badh fördenskull att Senat. Academ. på något behörigt sätt, tächtes sådhant hemma och förekomma: och resolverades här å, att bägge Booktryckiarne här i Stadhen, både Mest.r Iohan Wall sampt Iohan Winter, skohla blifya opkallade, och tillsagde, att de wijdh ett ansenligit wijte, som Senat: Academ: föreläggia will, icke skohla taga emot några Svenske ell. Latinske verser, att tryckias, dem bem.te Profess: Rudeen icke har tillförene Censurerat och gillat"; ") för d. 22 April: "Hvadh eliest

^{*)} Då Consistorium Academicum icke hade inseende ösver det Tryckeri, som

vidhkommer att tijdh effter annan förspörjes, dett många skriffter illa eller aldeles ocorrigerade tryckta blifva, så skall der öfver noga hand hållas, isynnerheet emedhan nu blefvo upnämnde tvenne Studenters verser, dem Prof. Tolpo sades nyligen hafya öf.sedt, uti hvilka och grofva errata skola finnas; resolverades fördenskull att H. Rector Magnif. nomine publico, förmanar ber. de Prof. Tolpo, att han hädanester, medh sådhant som hans Profession ej egendtel. angår, sigh intet befatta ville"; och för d. 17 November: "Prof. Eloqu. Mag. Alander begiärte dett Consistorium ville än ånyo tilhålla Booktryckiaren Wallen att intet låta genom Trycket utgå någon Epistel, den icke af honom Prof. Elogu, vore öfversedd, efftersom bem.te Booktryckiare det förra Consistorii förbodh nyligen öfv.trädt, och en Epistel, som temmelig gemen vara skall, vedh H. Prof. Tolpos disputation aftryckt; här å resolverades, att Booktryckiaren vedh laga wijte skulle påläggas sig ifrån sådane förseenden att afhålla." *)

Winter förestod, nämligen det af Biskop Gezelius d. ä. grundlagde, kunde denna Resolution, äfvensom det förut upprepade beslutet af d. 2 Nov. 1682, hvad deri angår flere än Universitetets egen Boktryckare, icke syfta på andra än de fall, då Akademiska skrifter möjligen komme att i omförmälde andra Tryckeri läggas under pressen.

^{*)} Blott tvänne under Simon Tolpos eller Tålpos inseende år 1693 utkomna Disputationer äro kända, den ena in 4:0, ventilerad d. 11 April och den andra, som är in 8:0, d. 26, eller, såsom en handskrifven ändring i det exemplar jag har för ögonen synes utvisa, d. 28 Junii. Den förra, med Titel: Discursus Gnostologicus, Cognoscibile philosophicum præcisivum, adumbrans, är pro gradu philos. utgifven af Eric Indrenius och på La-

· Icke heller tyckes det förtjena mycket alseende, att WALL. likasom de fleste andre Boktryckure, mill år 1707, di en alfvarlig Pamannels, och Atvarning i Immet af Kongl. Cantellie Collegium till alla, som i Rihet antingen siellve lyde eller forestodo andras Boktryckerier, under d. 10 Febr. gen in trychet utfårdades, uraktlitit hvad som genom åtskilliga tid efter annan utgangn, Kengl, Phriattningar och Pahud, ibland hvilka isynnerhet de af d. 15 Julii 1662, d. 14 Aug. 1663, d. 2 Nov. 1667; d. 12 Nov. 1674 och d. 5 Julii 1684 böra nämnas, blifvit stadgadt, se hast med föreliggande af 100 Dal. Silivermynds böter. angliende skyldigheten att af alla skrifter, af hva! namn och innehåll som heldst, så snart de blifvit färdige ifrån trycket och fore nagot slags ut lelning, inlemna ett exemplo till Kongl. Majas Archivum och ett till Kung). Bibliotheker, isynnerhet da hans n'irmaste forman hyarken finnas hatva ligt honom sodint till last, eller får egen del under en ling tids i ringgi listat stårre

tinsk prosa dedicerad till en stor mängd gynnare och anhörige, äfvensom försedd med Latinska Gratulationer på vers, af Professorerne Tolpo, Wanochius och Rudeen. Adjuncten Gabr. Thauvonius samt Studeranderne Eric Resinius, Paul. Naysander, Pet. Arctopolitanus och Greg. Arctopolitanus. Vid den sednare, kallad: Disputatio Metaphysica, de aptitudinali propriorum separatione, af Jacob Forsterus, anträffas, jemte två Latinska Dedicationer, den ena i obunden, den andra i bunden stil, Gratulations verser på samma språk så vil af Professorerne Tolpo och Wanochius, som ock af Studeranderne Ernest Gestrinius, Theod. Junbäck och And. G. Chydenius. samt på Grekiska af Studeranden Henric Seidelius.

uppmärksamhet på sagde Författningar, än som i andra Stycket, sid. 725, är visadt, ehuru ej mindre Akademie Cancellererne. Biskoparne och Consistorierne, än Kongl. Cancelliet, tätt sig ålagdt att hålla hand öfver verkställigheten.

Berörde Pâminnelse innefattade jemval fóreskrift, att uppa alla Böcker och Tractater, som sedan 1662 blifvit tryckte, skulle de, som vore ägare af Tryckerierne, ifrån hvilka de utkommit, utan dröjsmål och aldrasist inom tre månader ifrån författningens datum till Kongl. Archivum inlemna en noggrann Förteckning, jemte de saknade två exemplaren, samt, hvad de verk vidkomme, som hos dem icke mera vore till fangs, namngifva författarene och af desse införskaffa de exemplar, som nu fordrades, äfvensom att alla Boktryckare framdeles borde ofördröjeligen till Archivum, enligt sednare Förordning inlefverera utom det, hvarom förut föreskrifvet var. ännu fyra andra exemplar, hvilka komme att till Akademierne i Riket utdelas. Framför de öfriga förtjenar sistnämnde föreskrift här uppmärksamhet, och det af dubbel anledning, då nu för första gången så väl skyldigheten att till bemälde läroverk gratis lemna exemplar af allt tryck âlades Boktryckerierne i gemen. som ock rättigheten att bekomma allt sådant uttryckeligen utsträcktes till alla Sveriges Universiteter. Genom Kongl. Resolutionen. gifven i Upsala d. 2 Julii 1692, var väl förordnadt, att till dervarande Universitets Bibliothek borde ett exemplar lefvereras af alla Böcker och Tractater, som komme att tryckas i Stockholm. Upsala, Westerås och Strengnäs, och sju år sednare blef Universitetet i Lund delaktigt af samma formon: men om Abo s'arskildt finnes ingen Fortattning i nogotdera af omtermilde afseenden, afvensom velerhörande derstides synas hafva försummat att göra hvad på dem ankom, för att utverka den jemlikhet hörutinnan emellan Sveriges samteliga Högskolor, sam hilligheten onekeligen fordrade. Nu. da Cancellie Callegii Pummuelie och Kongl. Maj.ts deruti aberopa le Studga och Forcenhing Om alla Nyskre'fne Warkz Censurerande, - - Item Stadfastelse på förra Kongl. Förordningar om dhet samma, så och Exemplars inletvererande til Kengl. Archivum och Billitheket aff alt thet som tryckt warder. Sampt Booktryckiarenes Straif som hur endt bryta Dat. Stockh im 5 July 1084, tillika med ett sårskildt bref ifran Cancellie Collegium och ett annat itran Archivi Secreteraren Elias Palmachiald. A hvilka det sednare inneholl, att Postmästaren i Abo skulle emottaga de exemplar at derstides upplagde skrifter, som komme att letvereras, d. 3 April 1707 blifvit i Consistorio Academico uppliste, communicerades de genast med Boktryckaren Want, på det "han alt sadant matte stalla sig till hørsam efterråttelse", och tillades. att den äskale Förteckningen borde upptaga alla Böcker och Tractater, som upplagts på Akademiens Tryckeri, sedan han blef dess forestandare, samt att han hos vederforande skulle gora forfrag in, om jemvål alla Disputationer. Avensom Graulationer och Grafskrifter skulle hegripus under de almada skritterne, men imellertid, till dess nårmare visshet hårem kunde vinnes, innehålla de föreskrifne sex exemplaren af allt hvad han härefter komme att trycka. Hurudant svar häruppå följt, vet jag icke. Protocollet för d. 27 nästföljande Maji upplyser endast, att Wall väl hade förbemälde Förteckning uppsatt, men inga exemplar af deri upptagne böcker att öfversändas, hvarföre han ock begärde "assistence" att få dem af "Herrar Auctoribus eller deras arfvingar"; vid hvilket förhållande han ansågs icke kunna göra annat, än skicka öfver det han hade, "refererandes sig ej kunnat få det öfriga om händer."

I nära sammanhang med allt detta stå de åtgärder, som vid det Finska Universitetet vidtogos, då, med anledning af Presteståndets hemställan på Riksdagen år 1686, en Censor librorum för hela Riket blifvit vid Kongl. Cancelliet tillförordnad. Härom upplysa handlingarne, att icke allenast Cancellie Collegium, i skrifvelse af d. 16 Aug. 1688 °), meddelat Consistorium Academicum underrättelse om Kongl. Maj:ts förordnande i ämnet och att Nicolaus Rubens blifvit till befattningen i Nåder kallad, utan ock denne man vändt sig till samma Consistorium med ett bref, som väl icke numera finnes i behåll, men till hvars innehåll kan slutas af Protocollerne för d. 6 och 9 Febr. 1689, jemförde med Cancellie Collegii Instruction för honom, gifven d. 7 Juli föregående året. °°) Andra och tionde puncterne i denna

^{*)} Lika lydande med den till Biskoparne och Superintendenterne aflåtna skrifvelse, som läses i Gozelii d. ä. Minne, sidd. 91, 92.

^{**)} Tryckt i Uplysningar i Swenska Historien, Tredje Delen, sid. 105 och folj.

Instruction utvisa nämligen att, emedan den nya befattningen skulle bestå fornåmligast i noga aktgilvande deruppa, att icke nagre skadelige och förargelige böcker matte antingen af Boktorare till Landet inforas, eller af Boltryckarene derstådes upgliggas och tryckas, samt da det, jemlikt äldre Forfattningar, Myen alag Biskoparne och Consistorierne, isvunerhet utom Stockholm, att hafva uppsigt öfver sådane personer, Censor borde tråda i flitig correspondance med bemålde embetsmin och myndigheter. på det de ock måtte sig emellan öfverlägga om tjenligaste sätt och medel att hämma införsel och uppläggande af ofvanbemilde slags bocker, afvensom underratta hvarandra ej mindre om hvad som på hvarje om blifvit med tillstånd tryckt, ån om de skrilter. hvilkas utgifvande man funnit betänkligt att tillets, hvorjenne honom tillkom att "infordra Register of alla Buktryckare, alla 6 Månader, på alt det de uplagt." I det förra af nyssnämnde Protocoller ater lases: "H. Nicolai Rubenii Freet anguende Tryckeri uplästes, och skal Booktryckaren tilsäijas at upsättia ett sådant Register, som der i förmåles. Som och at de hvar siette månad uppsättia alt hvad de trycka eller hafva i förslag at trycka. Så skal och hvar i sin facultet upsättia de böcker som man tycker förbiudas skulle. Til den quæstion om det medlet är Sufficient til at hemma förbudne böcker, som finnes uti 667 års placat, svarades at det synes vara Sufficient nog, utan om något wijte skulle tilliggies på Bookforaren, at de hafva richtige Cataloges. Sed in han Consistorium framdeles, om man nagot kunde wij bre

hafva at påminna, sådant gifva tilkänna." Samt i det sednare: "Bibliothecarius och Typographus tilsåijes at effterkomma det som Kongl. Cantzelijets och H. Rubens breef innehåller." Jemte det närmare förklaring sålunda vinnes rörande beskaffenheten af de skyldigheter, om hvilkas uppfyllande Universitets Boktryckaren i Åbo nu skulle erhålla tillsägelse, anträffe vi hår, sasom det tyckes, äsven ursprunget till de genom sednare Författningar ytterligare och med nogare bestämningar påbjudne halfårs Förteckningar, hvilka borde atfölja de exemplar af alla under näst förut förflutne sex månader tryckta böcker och skrifter, som Finlands Boktryckare, ifrån nämnde tid och så länge detta land lydde under Sverige, lika med alle öfrige Boktryckare i Konungariket, voro pligtige att insånda till Riks Archivet, för att sedan derifrån på föreskrifvet sätt till vederbörande utdelas. Af dem, som icke tryckt något större antal skrifter under ett års lopp, afgafs dock ofta endast en för hela det aret gällande Förteckning, på lika sätt som alla innehafvare af Boktryckerier i vårt land numera, jemlikt Kejserl. Censur-Öfverstyrelsens bref af d. 11 Decemb. 1835, äga att fullgöra samma skyldighet.

Huru den, kort förrän Wall tillträdde förvaltningen af Universitets Boktryckeriet, för dess behof inrättade Figurstickare befattningen, under hans tid icke allenast erhöll ny innehafvare, utan ock till sin natur undergick förändring, hör äfven till detta Tryckeris Historia för samma tid. Dessförinnan hade Medel-

plan, i en skrift, som d. 21 Januari 1687 i Consistorio upplästes, begärt att blifva antagen till Stilgjutare vid Universitetet, jemte det han fortfore att vara dess Figurstickare; ") men huruvida denna begäran, på hvilken för tillfället resolverades blott att Consistorium icke ville deröfver utlåta sig, innan han visat prof af sin färdighet att gjuta stilar, sedermera må hafva ledt till önskad påföljd, är så mycket mera tvifvel underkastadt, som handlingarne icke innehålla något vidare om saken, och Supplikanten icke långt derefter flyttade ifrån orten. I Åbo stads mantalslängd, daterad d. 7 Febr. 1689, qvarstår denne man visserligen ännu, tillika med sin hustru; men af Universitetet finnes han icke hafva hvarken begärt eller åtnjutit något på sitt vanliga underhall sednare an d. 7 Mart. 1688, då en Rest deruppå, af en Torms Sporm 0, blor till honom utanorda ol, soh flera skil, hvilka icke har hafya lämpelig plats, göra det sannolikt, att han redan under loppet af sistnämnde år begifvit sig till Wiborg, såsom blifvande föreståndare för det Boktryckeri, hvarå dervarande Gymnasium d. 16 Apr. samma år erhållit Privilegium. 39) Om efterträdare åt Medelplan synes likvål iche någon fråga vid Universitetet hafva uppstått förrån omkring tre år sednare, då Rector d. 21 Aug. 1691 för Consistorium berättade, att Professor Wanochius, som nyligen ifrån Stockholm återkommit, hemtat

^{*)} Dagens Protocoll finnes aftryckt i Gezelii d. ä. Minne, sidd. 130, 131.

[&]quot;") Kongl. Resolutionen härom är, efter en bevittnad afskrift, införd i Borgå Gymnassi Historia, af Magn. Jac. Alopaeus, sid. 54.

med sig en ung karl, som tjent på Tryckeri och sökte blifva Academie Figurstickare, förmålande derjemte att det vore Cancellerens vilja, att han dertill skulle antagas; men emedan Consistorium förmente en tjensteman enkom för ifrågavarande ändamål icke behöfvas eller kunna underhållas, utan sökanden böra, om han på vanligt sätt toge tjenst vid Universitets Boktryckeriet, få särskild betalning för det arbete med figurstickande, som tillika kunde erfordras, samt bemälde Professor icke heller var tillstädes, tog ärendet då anstånd. Härvid förblef det äfven i flera års tid beroende och afgjordes sluteligen d. 30 Octob. 1694 på det sätt, att den Figurstickare, som nu antogs och utan tvifvel var den förut omtalade personen, icke hade att med visshet påräkna annat än Universitetets försvar, lika med öfrige för dess behof antagne handtverkare, såsom ses af följande ord i dagens Protocoll: "Discurrerades om Gustaf Erichsson Hagner, som till figur Stickare Embetet begärar komma i Medelplans ställe, hvars insinuerade Supplique blef opläsen. Altså resolverades att Gustaf Erichsson Hagner blijr antagen under Academiæ hägn och försvar, helst effter Hans Excellence Cancellarius åth Hr Professor Theolog. Wanochio låtit förstå, att han vill haa en figur Stickare wed Academien." Ännu närmare upplyses detsamma, jemte åtskilliga andra delar af saken, genom följande ibland Protocollerne förvarade Concept till Constitutorial, i form af Protocolls Utdrag, för den antagne: "Ex Protocollo Senatus Academici. Anno 1694 d. 30 Octobr. blef enhålleligen Resolverat, att såsom

vel denne Kongl. Academiens Tryckeni undvandigt heledves en figur Stickare och hår för tijden ingen är, som uti sådant måhl kan vara denne Kongl. Academien til tienst. Och såsom Konstrijk Gustaf Erichsson Hagner sig der till anbudit, som en tijd varit hår i Staden och vijst proff till sådant handtwärk; betygandes och Professor Mathes. Mag. Magnus Steen att han honom with a gra figurers withstick under betient, opinis under a b der al profi mi Senatu: Alter blitver bin till Araplissimi Senatus wijdare godtsimnande der till antagen och i krafft af detta till samma tienst confirmeres och insätties. Hans plicht skal vara, flitigt att opwachta effter H.r Rectoris och sampt. Hhr Professorum ordres uti det af honom i hans tienst fordras, altijd så lagandes att han sine Förman med höffligheet och skyldig lydno går tillhanda, och hafver han der emot att athniuta de privilegier, som Kongl. Maij:t denne Academien till sådane handtwärckares försvar Allernådigst confirmerat hafver. Actum ut supra."

Om Boktryckare beställningen vore att anses för så värdig, att innehafvaren deraf kunde alltfort tillåtas taga plats i samma Kyrkobänk, som hans företrädare begagnat), tyckes nu åter hafva blifvit satt i fråga, då, sedan Consistorium Ecclesiasticum anmodat Rector Magnificus att förehålla Boktryckaren och Fogden, det de icke borde gå i den bänken, der Akademie Secreteraren och Adjuncterne plägade gå, Consistorium Academicum, oansedt de förstnämnde beropat sig på gammal häfd, d. 23

^{*)} Jemior Forsta Stycket, sid. 730.

Aug. 1688 resolverade, att efter det icke länge varit vanligt, att desse personer haft berörde plats i Kyrkan, och det syntes anständigt, att Secreteraren och de andre hade särskild bänk, skulle både Boktryckaren och Fogden tillsägas att gå i den nästföljande, så att Lector och Conrector Scholæ samt Notarius Consistorii Ecclesiastici finge stå tillsammans med Secreteraren och Adjuncterne. Beslutet återtogs likväl snart, på de grunder, som Protocollet for d. 1 nästfölj. Sept. utvisar, hvarest säges: "När Rector Magnif. föredrogh det Booktryckaren Wald högeliga bedit att han icke måtte drifvas uthur den Bäncken, i hvilken han så länge stådt hade och andre Booktryckare för honom, holtes för rådligit att han gåar i den vanliga Bäncken, effter den Bänckdeelningen som skedt är, är oviss och lärer blifva förändrat."

Berättelsen om Johan Walls bemödande att hålla Boktryckeriet i så godt skick, som Universitetets ringa bidrag dertill och omståndigheterna i öfrigt medgåfvo, är ofvanföre sträckt till omkring ett år före hans död, som inträffade 1710, sannolikt i sednare hälften af November, emedan begrafningen skedde d. 22 i denne månad, såsom ses af Åbo Domkyrko Räkning för året, ibland Verificationerne till Lånets, i Kejserl. Senatens för Finland Archiv förvarade Landsbok. Att han fallit offer för den farsot, som ifrån början af Augusti intill samma års slut och i några orter inpå det följande grufveligen härjade detta land, *)

^{*)} I förut åberopade, Finska Psalmboken åtföljande, Ajan-Tieto berättas härom med dessa ord: "W. 1710 Oli syxyllä cauhia rutto Ruotzin Wal-

forekommer lafvenledes sannolikt, vid ofvervägande icke allenast af doalsfallets liktidighet med sjukdomens håltigaste framfart i sta-

dacunnasa, nijn että Turun Caupungista cuoli 2000 ihmistä. Lijeui myös Udesa Caupungisa, Raumalla, Biornboris ja pitkin Suomen maan randa. Stockholmis cuoli ylitze 20000, Rigasa, Rälwelis, Pernosa, ja myös wähisä Caupungeisa Ruotzin maalla, se sama tauti julmasti tappoi." Troligen står dock här ordet Caupungista i stället för Caupungisa, emedan antalet af dem, som till mantalsskrifning i Åbo stad blifvit vid sådan förrättning ifrågavarande år, enligt vederbörligt intyg derom af d. 5 Martii, anmälde, finnes icke halva stigit högre än till 2748 personer och i Domkyrko Råkningen icke förekomma anteckningar om flere liks begrafning, än för October månad 73, November 126 och December 95, hvarester sjukligheten i denna stad synes hasva i det närmaste upphört, då i Januarii manad 'foljande året 22 blifvit begrafne och i februarii endast 2, samt sedermera i allmänhet icke flere, än att dödligheten kan antagas för normal i förhållande till folkmängden. Gäller frågan deremot icke stadens invånare allena, utan äfven alla andra, som då under vistelse derstädes blisvit af döden bortryckte, tyckes ofvanstående uppgist om de aslidnes myckenhet, om ock i rundt tal något för högt tilltagen, så mycket mera få anses för nära nog pålitlig, som det är bekant, att fruktan, dels för den i sydöstra delarne af Finland, älvensom i alla Östersjö-provinserne, nagot tidigare utbrustna farsoten, dels ock for de ifran samma sida allt längre och längre fortgående krigsrörelserne, då redan ur hus och hem förjagat en ganska stor mängd af berörde landsorters inbyggare, hvilka hoppades i de vestligare belägna trakterna af vårt land och sjöstäderne, förnämligast Abo, finna, om icke en säkrare fristad, åtminstone lättare tillfälle att, om ytterligare behof påträngde, komma öfver till Sverige, hvarförinnan likväl ganska många ibland dem upphunnos af förstnämnde siende till deras helsa och lif. Af dessa kommo de fleste, jemte många at stadens egentliga invånare, isynnerhet de fattigare, till hvila utanför densamma, på en dertill, ester det utrymme på Kyrkogården sunnits brista för likens afskiljande, på sätt omsorgen att hindra smittans spridande ansetts krälva, enkom utsedd begrafningsplats; men alla här jordade aro

den, utan ock af enkans i Consistorii Academici Protocoll d. 5 Decemb. antecknade, ovanlig dödlighet antydande, begäran att

ifrån Domkyrko räkenskaperne uteslutne, sannolikt af den orsak, atticke någon redovisning, hvad dem angick, ålegat Sysslomannen, såsom äfven deraf kan slutas, att för andra här upptagne finnes utsatt om de fått lägerställe inne i Kyrkan, eller på Kyrkogården, jemväl då, i sednare fallet, den så kallade fattigmullen begagnades och således ingen betalning kom i fråga. Till bekräftelse af den sannolikhet, som stödjer sig på allt detta, leder ock det af framl. Rådmannen Nathanaël Indrén försattade Sammandrag af Åbo Magistrats Protocoller für åren 1710 och 1711, som är infördt i Tidningar utgifne af et Sällskap i åbo, 1778, sidd. 29-32, äfvensom hvad Professor Joh. Jac. Tengström ansört i Gezelii den yngres Minne, sidd. 153-155; och torde, såsom ett tillägg rörande den i sistnämnde arbete omordade svårigheten att finna Prestmän, hugade att skänka de af farsoten angripne Religionens tröst, här förtjena nämnas, att i Kyrko-räkningen förekommer ibland de i December månad 1710 aflidne, en "Pest-Predikant, Erich Lethalensis." Angaende denna farsots framfart i andra delar af Finland anträffas många, mera och mindre specisika, underrättelser uti åtskilliga vid Åbo Universitet utkomna Historiska och Topografiska Disputationer, ibland hvilka de här förut, sid. 672. åberopade isynnerhet böra nämnas, jemte Dissertatio Academica, Historiam Borgoæ, urbis Nylandiæ, leviter adumbrans; cujus Partem posteriorem Præside Henr. Gabr. Porthan, p. e.s. Magn. Alopaeus, 1795, pag. 41. Till fyllande af hvad som ur dessa och andra skrifter kan hemtas, tror jag mig hafva skäl att här lemna rum för följande anteckning af Kapellanen i Helsingfors Magister Magnus Auricola i stadsförsamlingens eller Kyrkans Historiebok: "Anno 1710 i begynnelsen af Augusti Månadh begynte dhen Pestilentialiske Siukdomen här i staden grassera, och continuerade till begynnelsen af December Månad samme åhr, så att i samma sooth aflede härstädes 1185 Personer med främmande neml. af hvilka en stoor deel på Kampen äre begrafne," älvensom för den ur samma Kyrkobok hemtade utredning, att i denna stads Kyrka och Kyrkogård hade under de sju första månaderne af berörde sjukdomsOctonomus Templi Catheliolis mlitte af Consistorium forsikras, at af mannens innestiende fon to hvad Domkyrkan, i håndelse af vid re dialstall i huset, for grafställe och klocker tillkomme. Så framt orden, hvarmed i Consistorii Protocoll för d. 11 Sept. 1706 innehållet uppgitves af en Supplik, i hvilken Watt, anhällit, illet hans San Daniel Wall, soom en postulerad.) Bok-

år blott 75 lik, eller i medeltal för hvarje af dem 102, blifvit begrafne, men deremot i Augusti 27, i September 32, i October 307, i November 252 och under de två första dagarne af December 8, hvarefter anteckningar af samma slag för återstoden af månaden saknas, troligen förnämligast af den anledning, att älven Kyrkoherden, förnt omordade Prosten Inatius, diafled. For det aret voro 727 af stadens invanare mantalsskrifne, men för det följande endast 387. Likaså hade Borgå stad till mantalsskrifning for 1710 uppgilne 465 invånare, men icke flere än 355 for 1711. I anseende till sammanhanget med hvad Finland angår, tillåter jag mig ock att här gifva anvisning på de upplysningar om ifrågavarande smittosamma sjukdoms uppkomst och fortgång i allmänhet, som vinnas i Loenboms Svenska Archivum, Tom. 1, sid. 122, Beiträge zur Geschichte der Ehstländischen Ritter- und Domschule, von Alex. Plate, Reval 1840, s. 30, Beskrifning om Runo i Liffland, af Fredr. Joach. Ek man, Tavastehus 1847, sidd. 202, 203, och Sjögrens Ethnografische Expedition nach Livland und Kurland, i S:t Petersburgische Zeitung 1848, Nio 32, oaktadt de tvänne sistnämnde skrifterne, såsom deras tryckningsår utvisa, sednare kommit till min kunskap än det öfriga af detta mitt arbete meddelades Finska Vetenskaps-Societeten.

^{*)} I hvilken mening detta ord här är nyttjadt, finnes af Kongl. Förordningen och Reglementet för Boktryckerierna i Riket, af d. 12 Aug. 1752. Art. VI §. 1 och Art. VII §. 5. jemförde med följande Definition i Joh. Georg Krünitz's ökonomisch-technologische Encyclopædie, 116:r Theil s. 277: "Postulieren, 1) bey den Buchdruckern als ein Neutrum mit dem Hülfworte haben, Gesell werden, seyerlich zum Gesellen gemacht werden."

tryckiare Gesäll, motte utaf Consistorio blifva ansedd med Vice Typographi Character, på det, så framt honom Joh. Wall, såsom en âldrig och kraftlös Man, något vidkomme, des änkia då hade att hugna sig af sin endaste sons befordring till des Faders succession," fa tagas till grund för bedömandet af frågan huru gammal den sistnämnde vid sitt franfälle var. blef han icke för tidigt af döden öfverraskad; men möjligen är i dem någon öfverdrift inlagd, med beräkning på så mycket lättare bifall till ansökningen. Härtill tyckes Consistorium icke heller hafva varit obenäget, ehuru Daniel Wall, som nu blef inkallad och på tillfrågan om han vore försedd med intyg om sin "kunnighet i Booktryckiare konsten, samt om sin stadighet och forhållande," afgaf nekande svar, fördenskull ålades att förskaffa sig sådant af Kongl. Boktryckaren Johan Henric Werner, hos hvilken han sade sig hafva, sedan han först i Åbo hos sin fader lärt tryckare konsten, tjent både i Stockholm och vid det Tryckeri, som Werner hade i Upsala, "der han ock postulerat, som des gratulationer utwijste." Denna Resolution lofvade han afven gerna efterkomma; men när detta sedan blifvit fullgjordt, finnes icke antecknadt. Imellertid inhemtas af Conceptet till ett bref, som Consistorium d. 8 Julii 1707, då någre af de Magistrar, som icke hunnit före sin nyss för sig gangne Promotion lata "till sielfva elaboration aftryckia" sina gradual Disputationer, besvårat sig deröfver, att de nödgats uppskjuta sin afresa ifrån orten, i

anseende dertill, att Academie Boktryckaren, "för des svaga krafter," icke förmått vederbörligen betjena dem med sagde Disputationers "oplägg- och aftryckiande" låtit till sonen afgå, att han, på sin faders förslag, blifvit antagen att vara denne "till hielp och stadigt för handen," hvarföre han ock borde med det första som ske kunde förfoga sig hem, "sin skyldighet i thy måhl att fullgiöra." I en skrifvelse af d. 9 Maji 1711, ifrån Consistorium till Universitetets Canceller, säges äfven, att Daniel Wall redan i sin brecs tilstid varit af Consistorio "till tryckerijtz understödiande kallad." Det uppdrag den unge mannen sålunda erhållit, blef dock aldrig af honom emottaget, troligen af den orsak, att andra utsigter till fortkomst icke långt derefter öppnat sig för honom, som 1700 fick sig eget Boktryckeri i Jönköping, efter att hafva gift sig med förre innehafvarens, aflidne Boktryckaren Peter Hultmans, dotter. ")

Utom bemälde Daniel, hvilken 1711 dukade under för ofvannämnde farsot, som i några af Sveriges inre landskap icke forrån roljande aret upphorde. lärer Johan Wall haft tva söner, vid namn Lars och Anders, såsom torde få slutas deraf, att tvänne ynglingar, Laurentius och Andreas Wallius, hvilka år 1698 blifvit på en gång vid Universitetet i Åbo inskrifne, i dess Matrikel kallats Aboënses, något som fordom oftast brukades mindre med afseende på skeende intråde i den vid lärosätet stu-

^{*)} Jemf. Alnander, pag. 87 och Lengren, sid. 16. 100). På sednare stället bör dock namnet Petter rättas till Daniel.

derande Abo Nation, an på den ankommandes födelse- eller hemort. äfvensom, hvad Lars beträffar, särskildt deraf, att på Titelbladet för en under Professor Isaac Pihlmanns præsidium d. 13 Maji 1703 försvarad Disputation Super בקרים i. e. Pastoribus Seu re pastoritia veterum, ex occasione Gen. 47. v. 3, 4. efter Respondentens, Laur. Walls, namn står: J. F. Aboënsis, och ännu ytterligare deraf, att ibland Gratulationerne till Studeranden Petrus Thuronius, Joh. Fil. Satac. Finl., som under Professor Simon Tolpos præsidium 1699 pro exercitio utgifvit en Disputation De principio et eo, cujus est principium, forekomma några Svenska verser, undertecknade af Laur. Jo. Wallius, Ab., med förklaring, att han dermed yttrade sin skyldighet emot sin Cousin. Orden Joh. Fil. syfta nämligen på Kyrkoherden i Kangasala Johannes Thuronius, eller, såsom han äfven kallade sig, Waenerus, hvilken troligen var broder till Boktryckaren Walls hustru, Elisabeth Thuronius. Vid Lars Walls eget ofvanberörde kunskapsprof finnas likaledes flere lyckönsknings skrifter, efter tidens sed, fogade, ibland hvilka en är af nyssnämnde Professor, Tolpo, då Theologiæ Professor, som deruti säger sig känna, att Respondenten vinnlade sig om theologiska kunskapsstycken. Att den andre sonen, Anders, snart öfvergifvit studierne och gått i krigstjenst, antyder ett svarsbref af d. 8 Januarii 1701 ifrån Consistorium Academicum till Landshöfdingen i Länet, hvilken i skrifvelse af d. 31 nästföreg. Decemb. begärt, att en Student Samuel Wallius, som icke inblitvir inskritven, matte tillholles at instilla sig till tiensigering, och nu underrättades, att denne icke på lång tid varit vid Universitetet, men deremot en annan Student, vid namn Anders Waller, burnfold i Alea hvilken "Itven begitvir sig under Militie Staten," nyingen, beledsag det at sina for Mra, antrolt sin Marche ifrån orten. Begge dessa söner måtte icke långt efter den tid, till hvilken allt detta hörer, gått ur verlden, emedan Danad i otvannamade. In nam rasande, Supplik halles sin moders endaste son.

Om tilen da rubrens vill Bohryckere beställningens erhallende gilna löbe, at ikke sin företade es enka, blitvit upptyldt, har irg icke nagon närmtre upplysning, an att han, Elizab th Thac and ic i Alm stals Mantals Lingd, dater il d. 17 Febr. 1681, upptagen såsom Walls hustru. Dock bör härvid anmärkas, att nåstföregående årets Mantals Längd icke kunnat af mig påfinnas. Åtminstone vid medlet af 1713 lefde hon ännu.

Sedan någre af Joh. Wall, under första åren af hans tienstetid. Gyakte inheren illured in Hitvit uppgittee, skolt mit konnedanföre åtskilliga sednare utkomna nämnas, hvilka synas förettidesvis, at nægan inhelming, förfenn uppmint, simher. Detes

^{*)} Parnassus Regum Sveciæ; Exhibens Breviter & succincté Sveo-Gothorum Regum potissimu gesta et molimina a primo Sveciæ Rege Ad Carolum Undecimum Usque, Regem hodie regnantem: ex optimis accuratissimisq. Historicorum Svecicorum scriptis, Heroico-Carmine exstructus,

Historiska underrättelser om Boktryckeriet i Finland. 707

antal väcker visserligen icke något fördelaktigt begrepp om ifrågavarande Tryckeris fruktsamhet; men kastas en blick tillbaka

et in publicum productus, Labore & sumptibus Serenissimæ Regiæ Majestatis Alumni Matthiae Martinii, Tavast-Finnonis. Aboæ, Exc. A. 1686. 4:0.

Gabrielis Wallenii Uthläggning öfver Söndagz-Evangelierne, Ifrån Heliga Treefaldigheetz Söndagh til Adventet. Tryckt 1686. 4:0.

Danielis Achrelii Oratoria, sive Manuductionum ad Romanam Eloquentiam Libellus. Ex diffusis ambagibus, in hanc brevem formam collectus, ut nihil desideres eorum, quæ inventionis naturam, dispositionis leges, elocutionis partes, vel actionis præcepta spectant. 1687. 8:0.

Militis Christiani Triumphus, Se on Christuxen Hengellisen Sotamiehen Cruunu Christillises Ruumijn-Saarnas, Cosca Muinnen Cunniallinen, jalost oppenut, ja hywäs arwos pidettäpä, nyt Jumalan tykönä autuas Herr Magnus Wallaeus, Messukylän ja Teiskolan uscollinen Sieluin Paimen ja KirckoHerra, Merkilliseldä, Wapasucuisten, Cunniallisten ja Jumalisten Wierasten, nijn myös oman Seuracunnan jäsenitten joucolda, saatettin hänen Lepo-Cammions Messukylän Kircos 26 Sept. A. 1686. Lyhykäisest ja yxikertaisest selitetty á Johanne Thuronio, Past, et Præp. Cangasalensi. 1689. 4:0.

Scientiarum Magnes, Recitatus publice Anno 1690, Die 25 Novembris, Cum Regis Optimi Natalem: Et pari ardore primum suum Celebraret Jubilæum Academia Aboensis. (Al Dan. Achrelius.) 8:0.

Sylloge Systematum Theologicorum, mundi ante et post diluviani ad hæc nostra tempora, Ad ductum Beati Doct. Calovii collecta, publicè proposita & in gratiam Studiosæ Juventutis Academiæ Aboënsis, una cum Epitome LL. omnium Theologicorum Definitionibus ibi maximam partem Königianis retentis, Typis deniq' evulgata. Per M. Johannem Flachsenium, In dicta Acad. Aboënsi Mathem. Profess. Ord. & SS. Theol. Prof. Extraordinarium. 1690. S:0.

Disquisitiones practicæ, qua Thesin, Antithesin & Axiomata, ita exhibitæ, Ut Præter Exempla, tum Sacra, tum Profana, queis utrobique

på förut omförmålda förhallanden och svårigheten att derunder täfla med ett annat, som var i bästa skick och innehade en i flere afseenden mycket mera gynnsam ställning, för att icke tala om det tredje, som under samma tid här i landet uppstod, anträffas utan tvifvel manga bevis på snart sagdt omöjeligheten att med det Akademiska astadkomma någonting af större betydenhet.

adserta illustrantur, multæ etiam controversiæ, hinc inde immanantes, pro re nata enodentur: Ab Andr. Wanochio, In Reg. Acad. Aboensi, Philos. Pract. & Hist. Prof. Disputationibus XXXVI. In usum Studiosæ Juventutis evulgatæ, Anno saluiis M.DC.XCI. 8:0.

Verborum Latini Sermonis Differentiw, In Memoriale Schediasma contractw, per Danielem Achrelium. 1692. 8:0.

B. Doct. Johannis Gezelii Episcopi & Pro-Cancellarii Acad. Aboënsis, Synopsis Logica, XVII. Disputationibus publice proposita, Et ad multorum vota Notis & Exemplis sufficienter illustrata & in lucem edita, Curá & Studio M. Simonis Talpo, Met. & Log. Prof. Ord. P. P. 1695. 8:0.

Almanach, På Åhret esster wår Frälsares och Saliggörares Nåderijke Födelse hijt til IV erlden 1700. Hwilket är esster den gambla Stylen ett Skått-åhr, men för Diei Intercalaris eller Skått-Dagens vthlämnande ett gemeent åhr, Stält til Polens högd 61. gr. 13. m. Af Laurent, Tammelin, Math. Prof. 16:0.

I. N. J. Harmoniæ Evangelicæ Compendium: In qvo, Actorum & Historiæ Christi Tituli & Indices, Textusque Citationes, convenienti digestione, modo, B. Doctoribus, D. Chemnitio & D. Calovio familiari, consignantur. In usum vero, Studiosæ Juventutis Academiæ, In Academia florentissima Aboënsi, Scriptum & expositum Typisq. evulgatum & Johanne Flachsenio, S. S. Theol. Doct, & Profess. Primario. 1701. 8:0.

FJERDE STYCKET.

(Meddeladt Vetensk. Societ. d. 21 Octob. 1850.)

På hvad sätt Åbo Universitets Boktryckeri må hafva blifvit handhafdt under föreståndare ledigheten efter Walls död och medan hans enka, hvars hos Rector Magnificus gjorda anhållan om nådår, d. 12 Apr. 1711 af Consistorium bifölls, till följd häraf var i åtnjutande af lönen, inhemtas icke af de handlingar jag haft att tillgå. Det enda, som af dessa handlingar kan skönjas, är, att jemte det nämnde enka då åtog sig att underhålla verket och skaffa sig en Gesäll, lofvade hon i bref till sin son, förut omförmälde Daniel Wall, fråga honom, om han ville emottaga detta Tryckeri, och att han härtill samtyckt, i svarsbref, som ankommit d. 9 Maji samma år, hvarmed Consistorium ock fann sig så mycket mera belåtet, som denne unge Wall redan i sin faders lifstid kommit i gynnsam åtanke, på sätt som jemväl förbemäldt är. Men då döden, i spåren på samma, på Svenska sidan ännu längre tid än i Finland härjande farsot, *) som lärer bortryckt fadren, jemyäl, sannolikt icke långt efter berörde svarsbrefs afgång, till intet gjorde sonens deruti gifna löfte, att under sommaren komma till Åbo, samt andre sökande till Universitets Boktryckare tjensten, så väl dessförinnan, som snart derefter, infunnit sig, tyckes frågan om Tryckeriets skötande på sterbhusets vägnar, annorlunda än genom dess förra arbetare, hafva så mycket snarare förfallit, som all litterär verksamhet vid Univer-

^{*)} Se Svenska Archivum 1. c.

sitetet litven liktidigt afstulint. Visserligen mit: Casisionium i en skrifvelse till Cancelleren, daterad d. 17 Julii 1711, såsom utsäkt för sitt dröjsmal med afversambundet at Le tims Cauligen för det nya läseåret, jemte anmälan om Rectorats ombytet, som skett redan d. 17 nästföreg. Junii, bristen "på sådant folk, som något på trycket förrätta" kunde; men i ett annat bref till denne styresman, af d. 11 nästföljande October, afmålas den olyckliga belägenhet, i hvilken så Lärarene vid Universitetet, som den Studerande ungdomen, redan länge varit försatte, med så mörka färger, att man måste undra deröfver, att icke alla, som hörde till detta Lärosåte, öfvergifvit detsamma, snarare än öfver saknaden hos de qvarvarande af lust och drift i sitt kall. Och kunde väl då tryckpressen ofta anlitas?

Sedan kriget med Ryssland blifvit förflyttadt på Finsk botten och alltmera i den mon dess åskor närmat sig landets hufvudstad, hade icke allenast fruktan för de fiendtliga härame. utan ock de ansträngningar, besvår, omkostnader och uppoffringar af många slag, som försvaret öfverallt och ovedersågligen kråfde, i den grad tilltagit, att många derföre heldre öfvergifvit hus och hem, ehuru endast af tiggare stafven understödde, än de velat blottställa sig för de qvarblifvandes öde, att framsläpa ett i alla händelser uselt lif. Genom många och stora krigsgårder, som i flera års tid fortfarit, var Finland nu så utblottadt, att ganska få af dess söner i landsorterne hade ens de oumbärligaste medel för sitt uppehålle vid Universitetet, hvaraf åfven mången

yngling funnit sig föranlåten att genom frivilligt intråde i krigstjenst söka en anståndigare bergning. In de kunde piräkna, som måste underkasta sig de tåta utskrifningarne af manskap, vid hvilka knappt de, som med utmärkt tilt vinnlagt sig om studier, skonades. De öfrige Studenterne blefvo ock under allt detta, jemte en del af Akademie betjente, errolerade såsom uppbriksmanskap och åtskilliga gångar betallde att sysselsåtta sig med vapenöfningar somt hålla sig färdige att tåga ut 1). åfvensom en

¹⁾ Genom en allman Kungorelse, gifven i Abo d. 23 Nov. 1710 pabjod General Gouverneuren och Commendeuren en Chef i Finland, Grefve Carl Nieroht, att samtelige landets innevånare, så väl af Ridderskapet och Adeln samt Presteståndet, som ock af Borgerskap och Allmoge, ingen undantagen, ifrån Landshöldingarne samt Kongl. Holrättens ledamöter och betjening, afvensom Akademiska Societeten samt Biskoparnes och Presternes tjenstehjon, intill den ringaste, af hvad stånd och vilkor som heldst. skulle hålla sig personligen och allt sitt husfolk af mankönet fullt färdige att på först ankommande Ordres bryta upp och marchera till den ort, hvarest största beholvet kunde fordra, för att göra fienden motstånd. och komme visse, pålitelige män att utses, som i hvarje stad och socken skulle i rullorne inskrifva allt manfolk, samt sedan fördela det i vissa Compagnier. Hvar och en borde ock ofelbart vara försedd med erforderliga gevär och mondering, så goda, som i förhållande till behofvet af hastig hjelp möjeligen åstadkommas kunde, samt med två månaders proviant. Huru litet sådant lät förena sig med Akademiska Privilegierne, erinrades väl sedan åtskilliga gångor af Consistorium hos vederbörande men svaret blef alltid, att den öfverhängande faran och allmänga nöden icke medgåfvo något afseende härå. På ett sådant vädjande till den kansla, hvaraf hvarje rättskaffens medborgare måste anses vara lifvad, stödjer sig, ibland andra, Kongl Senatens svarsbrefaf d. 3 Sept. 1712, hvarest sa-

del redan utmarcherat, da ofvannämnde bref skrefs. För dessa orsaker, såges hår, hade Professores stundom haft blott en, eller tva, Auditorer, stundom alldeles ingen, och följakteligen någon gang ingen lection kunnat ske, "Nu till att förtiga den svåra farsoten, som för ett ahr sedan skingrade alla ifrån hvarannan, och de fåå qvare så innestängde i deras kamrar, att de ock för hvarannars asyyn skyy maste." Den brist på skriftställare verksamhet, som af sådane förhållanden alstrades, var således otvifvelaktigt mera, an saknaden af kunnige arbetare på Universitets Tryckeriet, orsak dertill, att under tiden ifrån det hufvudpersonen dervid fallit undan och intill dess hans plats blifvit återbesatt, hvarken någon enda Disputation, eller andra Akademiska skrifter, så vidt bekant är, vid Lärosätet utkommo, än ofvannämnde Lections Catalog och två Programmer, nämligen det, som till likaledes här förut omförmålde Rectorats ombyte utgafs af då aftrådande Rector, Professoren Gabriel Justenius, d. 16 Junii 1711, och eltertradarens, Professoren Israël J. Nesselii inbjudning af d. 1 nästfoljande Julii, till Professoren Ingemund Bröms' Introduction. ")

ges, att Studenterne ej borde undandraga sig att låta "enroullera sig och bruka sig till understöd vid försvarsverket af Staden och dess Avenuer i Skiären, i fall fienden skulle der försökia något angrepp med Galeyor och Skärbotar."

^{*)} Ibland skrifter af annat slag, för hvilkas aftryckande Universitets Boktryckeriet under ifrågavarande tid blifvit anlitadt, synas följande tvänne allmänna påbud så mycket mera förtjena att här uppgilvas, som de äro

Jag yttrade nyss, att andre sökande till den lediga Universitets Boktryckare tjensten, än Daniel Wall, dels förrän förslaget om hans antagande uppkommit, dels ock snart derefter, infunnit sig. Redan d. 22 Mart. 1711 företeddes nämligen i Consistorio Academico någre af Universitetets Procanceller, Biskopen Doctor Johan Gezelius den yngre, som då vistades i Stockholm, insända Documenter, hörande till Kongl. Boktryckaren i Storfurstendömet Finland, Henric Christopher Merckells ansökning, att få blifva Åbo Universitets Boktryckare och tillösa sig dess Tryckeri, hvartill ock Procancelleren så väl då, som flere gångor derefter, recommenderade denne man, hvilken sedan några år förvaltade det af Biskopens fader i Åbo anlagda

att anses för synnerliga Rariteter, icke allenast med afseende å detta Tryckeris ringa verksamhet under föreståndare tjenstens ledighet, utan ock såsom hörande till de få undantag, som finnas, ifrån den rättighet Gezeliska Boktryckeriet, eller dess förvaltare, Kongl. Boktryckaren Merckell, då hade att trycka Regeringens och Läne Styrelsens Kungörelser på Finska språket, men hvars utölning nu, då sagde Tryckeri var flyttadt till Stockholm, torde hasva mött något hinder deras, att den var förenad med skyldigheten att besörja slike påbuds öfversättning ifrån Svenskan, nämligen: Cuningall:sen Maij:tin PLACATI, Neljästä Yhteisestä, Paasto-Parannus- ja Rucous Päiwästä, Jotca coco Ruotzin Waldacunnasa, Suures Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Cruunun omisa ja alla olewaisisa Ruhtinan maisa, Maacunnisa ja Herrain Lääneisa, Juhlallisest pidettämän ja pyhitettämän pitä sisällolewaisna Wuonna 1711. Annettu Benderin tykönä sinä 4. Tammi Cuusa, samana Wuona, och Cuningall:sen Maij:tin Armollisin PLACATI, Yhteisen Cansan Restantiein eli sisälleseisowaistein pääl epanoin myöden eli andexi andamisesta, Annettu Benderin tykönä sinä cahdexandena päiwänä Tammicuusa Wuonna 1711.

och sonen nu tillhöriga samt i Stockholm varande Tryckeri. De af sökanden föreslagne grunder för öfverenskommelsen om saken, finnas icke upptecknade, men ansagos af Consistorium for oantaglige, äfvensom "han Merckell eljest dryg att fås vid," hvarföre Consistorium ville "med honom ej hafva att skaffa," utan i skrifvelse af d. 9 nästföljande Maji, till Procancelleren hemställde, om icke, da de vilkor, som Merckell pastod, voro "mycket obillige, Consist.o oanständige, men mäst den Studerande medellösa Ungdomen ogörlige att undergå" samt Consistorium icke heller af sig sjelf understode sig att ingå någon handel om Kongl. Academiens Tryckeri, sasom varande "ett publicum", Daniel Walls begåran. derest han ville gå inn på samma vilkor, som hans fader, kunde, afven for hans alderstigne moders välfärds skull, villfaras, heldst Merckell ock medgifvit honom företrädet. I hufvudsaken lika besked fick Merckell sjelf, da han öfverkommit till Abo och till Consistorium, vid den 11 i sistnämnde månad erhållet företrade, ingaf en skriftelig Recommendation af Procancelleren. Nu tillades väl, att om unge Wall icke vore nöjd med samma vilkor, som fadren, kunde med Merckell vidare accorderas; men då derjemte förklarades, att ingen komme att antagas, som icke vore belaten med de ditintills vanliga priserne, upphörde sannolikt hela denna underhandling. Atminstone utgjorde den icke något hinder för Consistorium att fästa uppmärksamhet vid en annan sökande, som kort derefter anmälde sig.

I en ansökningsskrift, som d. 10 Junii föredrogs i Consistorio, hade nämligen Factoren Anders Björckman, vid det Tryckeri, som nyss affidne Boktryckaren Henric Keyser, den tredje af samma namn och vrke, som far och farfar hatt, etter desse artt och se lermera flyttat itran Upsala till Stockholm"), anhallit om Recommendation hos Universitetets Canceller, an Uliva antagen till Boktryckare vid detta Lärosate, med samma vilker, som de forre Boktryckarene, och anmildes sedermera af Björckmans Ombud. Bokbindaren i Abo Lorentz Höijer, att han, pa at denne väckt förslag, munteligen försäkrat sig vilja, i händelse han erhölle tjensten, forsorja aflidne Walls sterbhus; hvariore och de det förnummits, att han vore skicklig till beställningen. samt sistnomnde afsigt oppnade for Universitetet så mycket no 1vandigare utväg att an vidare få begagna Watas enskilla lel i Tryckeriet, med allt dess tillbehor, som allt detta var blandadt med Universitetets tillhorigheter, och han derjemte kunde genast blitva med hus och annan nodtorft förseld, hvilket eljest, efter staden d. 16 Maji samma år olvergangen brand 40), svärligen och

^{*)} Jlr. Alnander, pagg. 37, 38, 51, 52. Lengren, sidd. 9, 12.

^{***)} Enligt Ajan-Tieto blefvo vid detta olyckstillfälle 135 gårdar på den såkallade lilla sidan, eller i den vester om Aurajoki helägna delen af staden, samt 16 påstora sidan, vid Biskops gatan, lågornas rof, och en skrifvelse
af d. 29 i samma månad, ifrånUniversitetets Consistorium till dessCancellerupplyser, att någre ibland dessa gårdar tillhört Akademiska personer af hvilka de fleste derjemte förlorat böcker, instrumenter, husgeråd och allt uppehälle, nämligen Professorerne Hahu, Tammelin och Alanus, Secreteraren och Vice Secreteraren, Glasmästaren, Murmästaren och en af Vakt-

sikert icke utan Liroverhets oligenhet kunde erhallas, Consistorium I de i skrifteligt sv.: till Björckman förklarade sin benågenhet att på de uppgifna vilkoren ombetro honom Tryckeriet, så snort han lemnat full vissket om sitt uppsat rorande sterbhuset, hy refter man only ville shafts honom behorig fullmagt probestillningen, till hvars emottagande han de kunde, ju forr dess heldre, förfoga sig till Abo, och sedan han, i bref af d. 28 Julii. fuitvit en fors'han om berorde uppsat, i skrifvelse till Cancelleren, at al. 7 Augusti, uppfyllde sitt löfte angående fullmagten. Derjemte och churu sidant förefaller sa mycket mera oväntadt. som förklaringar å ömse sidor föregått, att icke andra än de till form gillande Contract horande vilkor skulle komma i fraga, anhöll Consistorium nu, att Björckman måtte förunnas någre formitter, utom den), som vid Akademien funnos att tillgå, alldenstund han eljest sverligen kunde subsistera med den i ganska ringa proportion till hela l\u00e4men nu inflytande del deraf, s'irdeles då i de svåra tiderne hvarken Docentes eller Discentes kunde halva rid att uppligga och lita trycka nagra verk och langa Dispaterioner. Likvil och de Cameller icke funnit golt att häruppa meddelt nig a Resdution, innan Protanceller, som atervåndt till Abo, forein berörde anhallan till Stockholm framkom, blifvit deröf-

karlaine, samt att aft. Smedens för Kronoutskylder hypothekerade hus och quarlätenskap tillika uppbrunnit. Att äfven Procancelleren Doctor Joh. Gezelius den yngre, då samma brand sträckte sig till så väl en honom tillhörig gård, som Biskops gården, dervid förlorade en del af sin lösegendom och sitt bokförråd, är dessutom bekant-

ver hörd, samt denne sedan föreslagit, att om conditionerne skulle "expressius" skrifvas till Björckman, med försäkran om fullmagt, sedan han först kommit till Åbo och fullgjort sitt löfte, hvilket förslag Consistorium ock antog, framför det af Rector tillika uppkastade, men för mera äfventyrligt ansedda, att fullmagten väl kunde utverkas, om sökanden derjemte antyddes, att den ej skulle gälla, så framt han ej ville försörja sterbhuset, blef ofvanbemälde begäran om särskilda förmoner utesluten ifrån den skrifvelse, medelst hvilken Consistorium d. 11 September å nyo, på förut anförde skäl och emedan vid nu begynnande Läse-Termin, om icke mycket, dock något nödvändigt, arbete komme att på Tryckeriet förefalla, anhöll om slut i saken. Men i denna skrifvelse nämndes icke heller något om nyssberörde förbehåll, hvarom Consistorium samma dag kommit öfverens; hvaraf ock synes hafva händt, att derom ingenting influtit i sjelfva fullmagten, som af Canceller icke långt derefter gafs. Huru denna fullmagt må hafva lydt, är väl icke bekant; men i Cancellers brefvet af d. 3 nästföljande October, hvarmedelst Consistorium underrättas, att den nu var Björckman meddelad, finnes i afseende å vilkoren icke annat yttradt, än att han komme att till godo njuta de förmoner, som Kongl. Constitutionerne och Förordningarne samt vanlige Praxis det embetet vid Akademien tillade, och snart visade det sig äfven i sjelfva verket, att all närmare bestämning af hans skyldigheter och rättigheter ännu återstod.

Innan jag går vidare i frågan hårom, bör angående Universitetets högste styresmans deltagande i Boktryckare tjenstens besåttande erinras, att detta tyckes hafva härrört af bristande kännedom eller glömska af tillgangen vid de förre Boktryckarenes antagande; ty i Consistorii Protocoll för d. 7 Aug. 1711, då det "taltes nagot om Fullmachten af Consistorio" skulle "extraderas eller ifrån Canceller förvåntas," finnes icke något annat skål för valet af sistnämnde Alternativ uppgifvet, än att som i skrifvelsen till bemälde Herre af d. 17 nästföreg. Julii blifvit yttradt, att ifrågavarande sökanden skulle hos hans Excellence recommenderas till fullmagts undfående, komme dervid att förblifva och altså begäran om utfärdandet nu att afgå.

Ankommen till Åbo, anmälde Anders Björckman sig d. 25 October inför Consistorium, som då, i anseende dertill, att Inspectores Typographiæ, Professorerne Bröm's och Hahn, voro af sjuklighet förhindrade, utsåg Professorerne Ross och Tammelin att på någon för dem läglig dag inventera Tryckeriet honom i händer, och emedan han, med klagan att det vore mycket förfallet, begärde medel till dess reparation, samt "accord med Consistorio och taxa på dess arbete, tillsades" det honom. Den 18 nåstfoljande November beslöts ock, att en sådan förslagsvis uppsatt taxa skulle communiceras Björckman och sedan i ett fulltaligare sammantråde granskas, da äfven den, begärde reparationen komme under öfverläggning, och då d. 25 i samma månad hans deremot ingifne "accords skrift" företeddes, blef dylikt

beslut fattadt, med tillägg dock, att imellertid skulle Inspectores Aerarii conferera med honom. Detta oaktadt och ehuru hvarken om betalningen för Universitetets arbete, eller om förbindelsen i afseende å Walls sterbhus någon tvekan numera bordt äga rum. förflöto ännu fyra månader, innan frågorne om dessa tvänne hufvudsakliga vilkor för den nye Boktryckarens antagande blefvo bragte derhän, att man kunde anse dem för afgjorde, på sätt, som följande ord i Consistorii Protocoll för d. 29 Martii 1712 utvisa: "Inkallades Boktryckaren Björckman och frågades om han vill fullgöra sine löften med Walls Sterbhuus, och om han vill blifva vid typographien: hvar på han gaf till svars: sig ej kunna väl resolvera sig för än han får vist contract med Academien. hvar på honom tillsades en viss taxa, något större än Sahl. Walls, men likväl ei så hög som han prætenderar. Sedan utlet han sig vidare: det han vål vill fullgöra sin lofven; emedan han den ei kan ändra."

Hvad åter Tryckeriets Inventering vidkommer, anmäldes väl d. 18 Novemb. 1711, att den då redan gått för sig och lades tillika den dervid "fattade anteckningen" ad Acta; men då detta Document icke mera är i behåll, kan man nu om det tillstånd, hvaruti verket befunnits, icke döma af annat, än den nye föreståndarens ofvanbemälde klagan, att det var mycket förfallet och af hans tid efter annan i Consistorii Protocoller å nyo antecknade begäran om medel till dess reparation. Behofvet häraf synes också

all feles is ke hafva varit tvifvelsmal underkastadt, utan vällades de manga uppskof, ei mindre med bitallet härtill, än med betalningen for det, som blitvit verkstäldt, om hvilka samma Protocoller och endra handlingar tala, uppenbarligen nu, sisom ofta tillförene, af brist på penningar, heldst den erforderliga utgiften icke öfversteg 45 Dalei Kopp, mynt, hvilken ringa summa är den enda omkostnal, som Universitetet, enligt Statsböckerne for 1711, 1712 och 1713, under dessa är haft att för sitt Tryckeri vidkännas. Häraf törde äfven kunna slutas, att om ny Digel till Pressen nu blifvit unskaflad, sedan Consistorium d. 29 Martii 1712 härtill lemnat tillstånd, var den säkert icke af fastare och dyrbarare ämne, än den förra, år 1707 inköpta.

Orsakerne till omförmålde penningebrist äro förut till någon del antydde; men deras hämmande inflytande uppa Universitetets drätselverk framlyser klarare än någonsin förut, då man
betraktar det förhållande emellan inkomst källornes tillstånd och
utgitts Stoten, som nåkenskaperne for 1712 forete. Ibland de forstnande vora de till Universitetets underhall anslagne Hemman
dhid fornindigast poråkunde; men at dessa, till antalet 337½, lago
nu 45 i öde, nämligen 39 i Öfre Fögderiet och 6 i det Nedre,
eller i Wesilax socken 7, i Tyrvis 1, i Karku 8, i Mouhijärvi
½, i Kyro 19½, i Ikalis 3, i Letala, Nykyrka, Töfsala och Lundo
hvardera 1 och i Wirmo 2, af tillsammans 18½ Mantal, under
bet 22 uppa sämtetrihet uppbagne, med 10½ Mantal, ännu icke
skattade något och många andra funnos vara i största behof af

betydlig förmedling, utom dem, som redan under de föregående åren kommit i åtnjutande af sådan förmon. Af de öfrige Hemmanen, som ännu stodo för full skatt, förmådde ock ganska få vederbörligen afbörda sig densamma, utan de fleste asamkade sig hvarje år betydliga Rester. Till följd håraf hade bristen i Universitetets anslag, som då, i penningar beräknadt, var 8468 Daler, 14 öre, 62 p. Silfvermynt, årligen blifvit förökad och uppgingo de utestående fordringarne vid slutet af sagde år 1712 till icke mindre an 19,759 Dal. 4 ö. 934 p. Sasom rättvisan fordrade, blef allt hvad som inflöt, till vederbörande utdeladt i enlighet med förhållandet emellan berörde hela anslag och den aflöning, eller det underhåll, som hvar och en tillkom, och på lika sätt räknades en hvar till godo dess andel i omförmälde Rester. Sålunda hade Fiscus Academiæ, eller den Fond, ur hvilken Tryckeriets behof, jemte många andra, såsom förbemåldt är, borde fyllas, enligt Balancen i räkenskaperne till 1713, att fordra 1125 Dal. 31 ö. 211 p. och var den således i saknad af års anslaget, utgörande 200 Dal., för inemot 5\frac{2}{3} år. Af lika anledning hade assidne Boktryckaren Walls sterbhus da annu att så 288 Dal. 27 ö. 173 p. eller nära tre gångor års lönen, och för Björckman, som nu första året åtnjöt lön, utestodo deruppå 17 Dal. 28 öre, d. v. s. mera än en sjettedel.

I huru stor förlägenhet den sistnämnde äfven härigenom var försatt, är lätt att inse, och bör man derföre icke lägga honom något till last, om, då en Promotion i Philosophiska Faculteten skulle firas kort efter det han till forvaltning emottog Universitetets Tryckeri, namligen den, som sedan af Professor Tammelin forråttades d. 15 Febr. 1712, detta Tryckeris brister verkeligen varit orsak dertill, att icke mindre ån fjerdedels antalet af de Disputationer, som desstorinnan borde utgifvas, blef annorstådes lagdt under pressen. Detta skedde atminstone med foljande fyra Gradual Disputationer: De aquis supracoclestibus försvarad under Professor Hahns inseende d. 19 Dec. 1711, af Mich. Simonis Polyiander, De Paschate Christi ultimo, under Professor Nesselii, d. 7 Febr. 1712, af Sam. Forsenius, Diss. qua de Saturno, an rex fuerit Aboriginum, disquiritur, under Præsidium af Professor And. Prysz. d. S. af Petr. Ignatius, och De Chior Bemaroth Hatzobeoth Exod. XXXIIX: v. 8. under Professor Munsters Præsidium, d. 13 i samma månad, af Gabr. Erichsson, hvilka alla åro tryckta af Merckell uti forbemålde Gezeliska, nu till Abo aterflyttade Tryckeri. Likvál far detta icke ovilkorligen tillskrifvas sagde orsak, enär äfven forut icke sällan händt, att forfattare till dylika lardom-prof vindt sig till nyssnämnde andra Tryckeri, isynnerhet da, i anseende till den for utgilvandet aterstaende tidens korthet. tryckningen i ingen händelse kunnat på det Akademiska medhinnas. Deremot togs det sistnämnde så vål före, som efter Promotionen, under Brokekrass egenteliga tjenstetid så litet i anspråk for L'iros'itets obriga behol, att han for dess råkning knappt larer hafva lagt hand vid andra skrifter, utom Promotors, d. 28 Ja-

nuarii 1712 utgifne inbjudning till ofvannämnde Promotionsact, an de Programmer, som af Professor Nesselius, i egenskap af Universitetets Rector, utgafvos, d. 8 Nov. 1711 till Parentationen öfver affidne Theologiæ Professoren Simon Tolpo, genom ett minnestal af Extraordin. Theol. Professoren Tigerstedt, d. 9 Dec. samma ar till Extraordin. Theol. Professoren Joh. Gezelii. Joh. Fil. Joh. Nep. Introduction, d. 25 Jan. 1712 till afhörande af Philosophiæ Candidaten Eric Asplunds Oration på Konung Carl d. XII:s namnsdag d. 28 i samma månad, d. 31 Maji till Linguarum Orientalium Professoren Abrah. Alani Introduction till tredje Theologiæ Professionen, och d. 13 Junii till Rectors ombytet, samt det, hvarigenom Professoren Prysz, hvilken då tillträdde Rectors embetet, d. 25 Januarii 1713 inbjöd till firande återigen af Konungens namnsdag, medelst en metrisk Oration af Philosophiæ Magistern Lars Odelin. Ehurn obetydligt värde dessa små skrifter äga, hafva de dock af den anledning synts här förtjena uppmärksamhet, att de utgöra, jemte de vid Universitetet åren 1711 och 1712 utkomna Disputationer, hvilkas antal, då ofvannämnda fyra hos Merckell tryckta undantagas, sannolikt icke öfverstiger tolf, och två Almanachor, den ena på Svenska, för 1712, den andra på Finska, för 1713, begge af dåvarande Professoren Laur. Tammelin, de enda kända alster af den Akademiska bokpressen under den tid densamma stod under Björckmans vård. Hela antalets ringhet åter finner sin förklaring i berörde tids korthet, ej mindre än i det uppgifna

forhallandet med Tryckeriets forrader. Omkring midsommaren 1713 gick n'amligen den re lan flere gangor forut, isynnerhet ifransamma tid 1710, ifragakomna flyttningen af Universitetets redbaraste egendom ilran Abo till Stockholm i verkställighet, da forstnamide stads integrande of den utan uppehall antagande Ryska Arméen forutsigs icke kunna länge uteblifva, och emedan Tryckeriet icke blef i Sverige, efter öfverkomsten, satt i gång, eller mionlumbi an delvis, sasom lan till nagon annan Officia, begagnadt, har man så mycket mindre skål att anse Björckman hafva varit i utöfning af sin tjenst vid Universitetet i Abo långre än till ungefärligen medlet af Maji manad 1713, som, enligt Conceptet till en skrifvelse af d. 22 i denne månad, ifrån Consistorium Academicum till Cancelleren, all bemålde egendom da, under afvaktan af Regeringens bifall till ölversåndningen, lag inpackad och Biörckman, efter att hafva, såsom det tyckes, åtföljt Tryckeriet, eller sarskildt vid samma tid ölverrest), loljande aret åtog sig förvaltningen af Kongl. Boktryckaren Joh. Henr. Werners Tryckeri uti Upsala 44), samt sedermera, innan det forstnämnde aterforsattes i verksamhet, fick sig eget Boktryckeri uti Stockholm.

Imellertid betraktade Biörckman sig ännu länge derefter sasom det Finska Universitetets Boktryckare, och visserligen med

^{*} I Universitetets Archiv sinnes ett Concept till resepass, dateradt d. 25 Junii 1713, sor Boktryckaren And. Bionekman, sinnad att sor någon sin angelägenhets skull begisva sig till Stockholm; men ösverkorsadt.

^{**)} Alnander, pag. 92.

fullt skäl för hela den tid af nio år, under hvilken omständigheterne icke tilläto Tryckeriets sättande i gång; men sedan detta verk, som redan till Restaurations festen behöfdes i Åbo, blifvit dit tillbaka transporteradt och han likväl undandragit sig att derstädes å nyo bosätta sig, borde billigtvis hans rättighet till tjensten och dermed följande förmoner upphöra. Icke dess mindre finnes, ibland annat, af många ifrån denne mans Tryckeri uti Stockholm under de följande åren utkomna arbeten, att han intill sin död, som lärer hafva inträffat 1728, kallat sig Kongl. Academie Boktryckare i Åbo, fastån en annan längesedan blifvit härtill antagen, och utan att, så vidt bekant år, Björckman haft någon tillåtelse att bibehålla benåmningen såsom en Titel. Att han äfven önskat få, oaktadt franvarande, till namnet fortfara med förvaltningen af Universitets Tryckeriet i Åbo, skönjes nogsamt af brefvexlingen rörande hans återflyttning till denna stad.

Härvid bör främst märkas, att redan innan en månad efter fredsslutet med Ryssland förflutit, sökte förbemälde Boktryckare Merckell skrifteligen hos Consistorium, som då ännu hade sina sammanträden i Stockholm, att få, med bibehållande af sitt eget Tryckeri, *) förestå Universitetets, hvars Stilar han ville inlösa, emot förbindelse att skaffa nya i stället, och då Björckman häröfver hördes, erbjöd han sitt Tryckeri till Universitetets tjenst och att likaledes tillösa sig dess gamla, som han äfven nu be-

^{*)} Enligt Biskop Gezelii d. äldres Minne, sid. 128, skall hans son. Biskop Gezelius den yngre, åt Merckell 1715 försålt sitt Tryckeri.

rättade vara mycket förfallet. *) Men ehuru stora de omkostnader erkändes komma att blifva, som sistnämnde verks försättande i fullgodt skick ofelbart fordrade, kom likvål hvarken det ena eller andra anbudets antagande i fråga, då man för det första kunde komma till rätta med hvad man hade, och Universitetets nye Procanceller, Biskopen Doctor Herman Witte, åtog sig att förskjuta de för iståndsättandet nödvändigaste medel; hvarföre ock Björckman blott skulle erhålla tillsägelse att förfoga sig till Abo. Dessförinnan hade äfven Consistorium, i skrifvelse af d. 16 Apr. 1722, till Kongl. Rådet och Presidenten i Svea Hofrått Grefve Carl Gyllenstjerna, som nu var Universitetets Canceller, anhållit om medverkan hos Hans Kongl. Maj:t dertill, att nagot fartyg allernadigst matte förunnas till Akademie Bibliothekets, Tryckeriets och Archivets transporterande till nyssnämnde stad, äfvensom att det rum, som till äfventyrs blefve på fartyget öfrigt, kunde "till hjelp för Academiens ledamöters personers öfverflyttande allernådigst opplåtas," hvilket ock i så matto bifölls, som ses af ett d. 3 nästföljande Julii gifvet öppet bref, hvarmedelst bemälde Grefve gör vetterligt, att såsom Professoren Prysz, Akademie Secreteraren Kepplerus och Vice Bibliothekarien Arosius nu voro sinnade att begifva sig ifrån Stockholm till "sin ort i Finland siöledes uppå en Crono galiot, hafvandes jämvähl med sig den Kongl. Academiens Bibliotheque, Tryckerij och Archivum att öfverföra," thy lemnades dem nu

^{*)} Consistorii Protocoll for d. 28 Sept. 1721 och d. 22 Maji 1722.

detta till bevis och vittnesbörd, och anmodades alla, som vederborde, att låta "förenämnde personer med deras hustrur, barn och anhörige samt saker och bagage fritt och obehindradt passera." Om Boktryckaren Björckman haft någon befattning med Tryckeriet vid den tiden då det inskeppades, vore vål någon anledning att betviffa, emedan i ett Cancellers bref till Consistorium. af d. 13 Aug. samma år, förmåles, att Universitetets Boktryckare, hvilken "man ännu icke funnit på," icke kunnat få sådan antvdan, som någre andre af dess i Sverige tills vidare qvarblifne tjenstemän erhållit, att begifva sig på resa till Åbo; men då straxt efter de anförda orden följer, "emedan man ännu icke kommit att få veta des namn eller hvarest han har sitt tillhåld," torde häraf dock icke någon vidsträcktare slutföljd kunna dragas. an att Björckman och hans vistelse ort endast för Cancelleren voro okände, och möjeligen äfven, att han för tillfället icke var i Stockholm, ehuru troligen då redan derstådes bosatt. För Consistorium var det säkert bekant, att han vistades der, och af flere omständigheter, som sedermera företedde sig, under skriftvexlingen rörande Universitets Tryckeriet tillhörige Stilar, som nu i Stockholm quarblifvit, framlyser klart, att Björcknan der haft åtminstone någon del af detta Tryckeri om hånder, fastån icke med visshet kan sägas, om det helt och hållet stått i hans vård. Ifrån honom ankom ock, liktidigt med berörde Cancellers bref, en skrifvelse, som vid Consistorii Session i Åbo d. 20 i samma

månad upplästes och hyari han, med uppgift om ett och annat, som behöfdes till Tryckeriet, innan det kunde blifva brukbart, anhöll icke allenast om någon hjelp till dess underhållande, utan ock om respenningar. Honom syarades, i bref af samma dag, att han ägde skaffa hvad som, enligt berörde uppgift, nödvändigt borde i Stockholm uppköpas, och hos Procancellers Svårson, Assessoren Lagerstolpe, lyfta dertill erforderliga medel; men hvad resehjelpen vidkomme, hade icke heller andre af Akademie Staten undfått någon sådan, hvilka ändock nödgats förfoga sig till tjensteorten, hvarföre äfven Björckman antyddes att ju förr dess heldre skynda sig öfver, för att "inrätta" Tryckeriet, för hvilket tjenligt rum redan vore utsedt och af hvilket snart gjordes behof vid Universitetets Restauration. För öfrigt ville man på allt görligt sätt understödja honom, hvarföre ock aftaladt var med Landshöfdingen i Länet, att allt hvad som ifrån Lands Cancelliet utgafves till tryckning, skulle hallas Universitets Boktryckaren tillhanda, och detsamma hoppades man af Hofrätten.

Det som redan af Björckmans dröjande i Sverige och af hans dåvarande ställning derstådes, hvarom nedanföre skall vidare talas, kunde väntas, nämligen att han icke hade någon afsigt att till Finland återvända, visade sig derefter snart patagligen, då ifran Directeuren för Boktryckerierne i Riket, Joh. Henr. Werner, ett bref af d. 17 Sept. ankom, innehållande en på Boktryckeri Societetens vägnar meddelad underrättelse, hurusom bemälde Akademie Boktryckare öfverenskommit med hår förut

omtalade Kongl. Boktryckare Henr. Christoph. Merckell. att afstå sin vid Akademien innehafde tjenst till denne, som åtagit sig att jemte sitt eget Tryckeri uti Abo förestå Universitetets, och till den ändan ville ditsända en af sine betjenter ännu samma höst, samt följande vår sjelf med hela sitt Tryckeri inställa sig dersammastädes. Att Werner och Boktryckeri Societeten sålunda utan vederbörlig anmodan tagit sig bestyr i denna sak, hvaruti Consistorium Academicum ingalunda var skyldigt att rätta sig efter dem, upptogs såsom ett intrång i Consistorii rättigheter, öfver hvilket det vore befogadt att besvåra sig, och förtrytelsen deröfver, äfvensom öfver Björckman, som oförsvarligen öfverlåtit sin befattning åt en annan, hvilken "antagit det, som ej stod i hans frihet," gaf sig luft efter berörde brefs uppläsning d. 5 Octob. med sådane ord till Protocollet, som dessa: "man borde genom Canceller skaffa dem minnesbeta för det de icke allenast så gjort, utan ock ställt Academien i saknad, att man är förachtad, deras egenvillighet må af Canceller dem betagas, af Merckells dyrhet har man förtret att förvänta," m. m. Likväl blef icke något beslut i lika vidd fattadt, eller i samma ordalag Cancelleren och Björckman meddeladt. Det till den sednare uppsatte bref af samma dag är inskränkt till en enkel förklaring af det missnöje, hvarmed man inhemtat underrättelsen om den afhandling han, utan communication med Consistorium, ingått med Merckell, under det Consistorium så mycket mindre föreställt sig annat, än att han skulle skyndsammast begifva sig på

resa till Universitets staden, som han icke allenast under flykten undfått så stor del af sin lön, som kunnat utfalla, utan ock redan i sistförflutne Augusti månad erhållit anvisning uppå och lyftat så stor summa penningar, som han sjelf till Tryckeriets nödvändiga behof begärt. Oförmodadt nog fick ock den härtill lagde alfvarliga befallningen att han borde genast, utan ringaste dröjsmål, antingen sjelf förfoga sig till orten, eller ock i sitt ställe ditskicka nagon annan försvarlig karl, af hvilken Akademien kunde betjena sig då straxt, vid instundande Inauguration, sin egen synnerliga mildring genom sistnämnde Alternativ, änskönt det gållde blott tills vidare samt under vilkor af Björckmans ansvar och borgen. Likaså innehöll Consistorii skrifyelse till Universitetets Canceller, med anledning af berörde beslut, icke annat, än en berättelse om sakens förlopp och framställning af de olägenheter, som Boktryckarens uteblifvande hade med sig, till följd hvaraf ock anhölls, att Hans Excellence täcktes af sin höga embetsmyndighet álágga mannen att fullgöra hvad honom nu pá förbemálde sätt föreskrifvits.

I svarsbref af d. 29 October tillkännagaf Cancelleren, att han då nyligen förehaft Björckman och förehallit honom sa väl angelägenheten af hans närvaro vid Universitetet, som huru illa han handlat genom uraktlätenheten af sina förbindelser emot detsamma; hvarvid Björckman, med förmälan, att han allaredan afskickat till lärosätets tjenst en "Capabel" person, nämligen Boktryckare Gesällen Eric Flodström, hvilken han försäkrat

skola "uti alla måhl vara svars god och göra vederbörande fullkomligt nöje," andragit huruledes det förefölle honom, som nedsatt sig i Stockholm och der såge sin utkomst, betänkeligt att nu mera, sedan "Cantzliboktryckaren Merckell förskaffat sig Kongl. Privilegium på annat tryckerij, som i Stiftet och landsorten" *) gåfves, med sitt hushåll flytta till en ort, hvarest tyå Boktryckare icke kunde hafva nog sysselsättning och han icke kunde "väl nära och försörja" sig med det lilla, som vid Universitetet vore att göra. Med afseende härå ville ock Canceller förmoda, att man till en början kunde betjena sig af nämnde Gesäll, till dess man finge se hvartill han dugde och derefter taga vidare mått och steg, för att antingen behålla honom vid lärosätet, eller hålla sig till Björckman. Ungefärligen detsamma, som ofvan anfördt är, yttrade äfven Björckman i bref af d. 22 i samma månad till Universitetets Procanceller, jemte anmålan, att han med Flodström afsändt allt hvad som var för Tryckeriets behof anskaffadt. I egentelig borgen för bemälde Gesäll finnes han likväl icke hafva trädt och tvifvelaktigt förekommer det jemväl, om han för öfrigt i denna sak gått öppet till väga. Ty tillika med nyss omförmålde skrifvelser upplåstes i Consistorio Academico d. 6 Nov. ett bref ifrån Kongl. Boktryckaren Merckell, som deri berättar, att han, med anledning af Björckmans förberörde öfverdragelse af sin befattning med Universitets Tryckeriet, till att förvalta detsamma, intill dess Merckell sjelf nästa

^{*)} Hvad härmed förstås, kommer att i följande Stycke utredas.

var kunde infinna sig på stället, öfversändt samme Flodström, hvilken ock nu, inkallad och tillfrågad ifrån hvem han blifvit skickad, svarade att detta vore gjordt af Merckell, hos hvilken han tjenat och som gifvit honom respenningar; men till Brönckman hade han gifvit Quittance pa Tryckeriets medsände tillhörigheter. Imellertid var nu på flera sätt af den sistnämnde visadt, att han resignerat, och blef Consistorium derföre äfven genast betänkt uppå antagande af efterträdare åt honom.

Härvid och då Anders Björckman nu i sjelfva verket upphörde att vara Abo Universitets Boktryckare och tillika Finsk medborgare, tror jag mig så mycket heldre böra till de få föregaende uppgifter om honom, af hvilka nagot kan slutas om hans enskilda lefnads skiften, l'igga hvad jag vidare hårom känner, sa ringa det ock är, som hans sedermera i Sverige fortsatta utöfning af sitt yrke icke kan egenteligen räknas att höra till mitt ämne. Endast genom den underrättelse, som Kongl. Bibliothekarien och Riddaren Arwidsson benäget meddelat mig, att ibland Kongliga Bibliothekets i Stockholm samlingar af tillfällighets verser, skall finnas en Lyck-Önskan på Gesällen Anders Nilsson Björck-MANS postulats-dag, 1703, har jag mig bekant, hvilket dopnamn denne vår Björckmans fader haft och när hans egna lärgår slutats. Af Alnanders (pag. 37) och Lengrens (sid. 9, Nio 20) oftanämnde arbeten inhemtas åter, att han efter Mich. Laurelius blifvit agare af det Tryckeri, som Joh. Georg Eberdt ar 1672 i Stockholm anlagt samt Joh. Billingsley sedan efter

denne årft, och att Laurelius dött d. 9 Junii 1719 utvisar en Grafskrift öfver honom, af Olof Lindsteen; *) hvarföre och då skrifter finnas, som omkring ett år derefter blifvit hos den aflidnes enka tryckte, man icke får antaga att nämnde Tryckeri förrän vid samma tid öfvergått till Björckman, hvilken sedan intill sin död innehade det.

Angående fullgörandet af Björckmans åtagande, då han tillträdde Boktryckare beställningen vid Universitetet i Åbo, att försörja företrädarens sterbhus, upplysa nedannämnde tvänne Grafskrifter. (**) jemförde med Åbo stads Mantals Förteckningar, i hvilka en dotter ** *Walls husfolk*, uti hans gård, belägen i Kloster quarteret, under N:o 16, och för 1712 såsom derstädes quarboende, att det var genom giftermål med enkans dotter, i första

^{*)} Försattaren, som var Hautboist vid Kongl. Gardet och äsven kallade sig Stud. Mus., sysselsatte flitigt tryckpressarne med sina Graf- och Bröllopps-skrifter.

^{***)} Den enas Titel lyder: Sorge-Klagan Öfwer Then Ähreborne och Dygdälskande Matronans Margarethe Hansonie Hastiga Bortgång, Som skedde i Upsala Åhr 1718 den 28 Septembr. Yttrad af Nicolao Kullman. Tryckt i Upsala hos J. H. Werner, Kongl. M:tz och Ups. Acad. Boktr. Den andras: Ähro-Minne Öfwer Then i lifstiden Ähreborna och Dygdälskande Matronan Hust. Margaretha Hansonia, Boktryckaren Herr Anders Biöremans Kärälskeliga Maka, Hvilcken satigt afled den 28 Septemb. klockan 11 om natten, och den 3 October till sitt Lägerställe beledsagades. Lämnat Af Jonas Tidholm. Upsala tryckt hos J. Henr. IVerner, Kongl. Boktryckare.

gittet med Paran Hassos, som detta atagande gick i follborden. Att han, då detta skedde, var enkling, torde få slutas af den sednare ibland berörde Gradskritter, i hvilken ne bastænde verser ") förekomma, undertecknade af Andreas A. Björkman, såsom son, och att denne icke var det enda vid Margaretha Hansau, doch efterlemnade barnet, foljer derat, att den aflidna är i det foregående af samma skrift inford säsom sagande tarväl åt sina barn. Derefter måtte mannen hafva ingått nytt åktenskap, emedan på flera skrifter, som utkommit under åren nåst efter hans död, till och med åtminstone 1732, finnes utsatt, att de blifvit tryckte hos Kongl. Academie Boktryckaren i åbo Anders Biorcemans onka. Enligt Lengren's uppgitt, sid. 11 Nio 38, blef hon å nyo gift med Boktryckaren Peter Joransson Nyström.

^{*)} Thet är wäl sant I war min Mor, men ei den Moder, Som mig til wärlden födt, doch war I mig så goder, At man kan näplig tro, Er like sinnas lär; Som så ens annars kan, som sina hålla kär.

FEMTE STYCKET.

(Meddeladt Vetensk. Societ. d. 3 Febr. 1851.)

Efter det Boktryckaren Björckman på förut omförmåldt sått uttryckligen tillkännagifvit sin afsigt att i Stockholm qvårstadna, uppkom genast i Consistorio Academico fråga om den persons formeliga utnämning till hans efterträdare, som blifvit utskickad endast för att i hans eller Boktryckaren Merckells namn tills vidare förestå Universitets Boktryckeriet i Åbo. Redan d. 6 Nov. 1722, då Consistorium erhöll del af så vål Cancellers som begge nyss nåmnde Boktryckarenes skrifvelser i åmnet, proponerades af Ordföranden, Professoren And. Prysz, såsom Pro-Rector, "om icke Flodström kunde antagas till Academie Boktryckare och hos Canceller dertill föreslås," hvilket ock beslöts, med endast det förbehåll, att han först skulle genom tryckningen af Programmet till den snart instundande högtidligheten vid Universitetets Restauration, efter det långvariga kriget och flykten till Sverige, göra sitt prof, innan han finge "Ampl. Senatus Acad. fullmacht," och utan att något sådant förslag blifvit Cancellers pröfning underkastadt, resolverades d. 8 nästföljande December bestämdt, att han skulle antagas. Till handlingarne för denna dag bör fördenskull följande Concept till fullmagt för honom troligtvis räknas: "Fullmacht för Boktryckaren. Rector och Samtel. Professorer vid Kongl. Acad:n i Åbo Giöre witterligit att såsom medelst Anders Biörkmans frivillige afträdande, Boktryckare tiänsten här wid Academien är worden ledig och till successionen hos Consistorium Academicum uti consideration kommen Boktryckare Konstförwanten Ahreborne och wal förfahrne Eric Flodström som icke allenast hafver godt loford för des skickelighet, utan och nu reda här wid tryckerijet aflagt der af nöijachtige prof. altså warder han Eric Flodström i kraft häraf antagen och förordnad att wara Boktryckare wid denne Kongl. Acad:n och Anders Biörkmans ställe: aliggiandes honom der wid wäl och förswarl, skiöta tryckerijet samt hålla det altid i godt skick och tillbörlig ordning, och som han bör wijsa sine förman den heder och lydna som dem tillkommer, så aligger honom jämväl emot billigt prijs betiena hvar och en som wid trycket honom kommer at anlijta, och i öfrigit sin plicht och skyldighet så i acht taga, som han det wid påfordran will och kan answara. Hvaremot han hafver att atniuta den lohn som på academiska staten den beställningen tillägges. Detta dem som wederbör, till und- och efterrättelse. Datum Abo d. A:o 1722." Dessutom finnes val ett bref-concept, dat. d. 9 Januar, 1723, hvari Consistorium formaler, att sedan den till Abo ölverkomne Boktryckare Gesällen eller Konstförvandten Ente FLODSTRÓM sá vál vid Akademiens Restauration, som sedermera. visat prof af sin skicklighet och till vederbörandes nöje "upprättat och stält i skick" dess Boktryckeri, hade Consistorium blifvit foranlatet att antaga honom till Boktryckare vid Akademien, och sasom Consistorium ej bordt underlata att detta Hans Excellence

Akademie Cancelleren i ödmjukhet "berätta", så vore äfven dess ödmjuka "förmodan", att Hans Excellence "det nådigt anse och approbera" torde; men om ock afsigten med de anförda orden varit, at utverka Cancellers bifall, blef brefvet dock så mycket mindre af honom ansedt för annat, än en underrättelse om hvad i saken var definitift tillgjordt, som icke någon sådan stadfästelse härå följde.

Till en så hastig åtgärd att besätta Boktryckare tjensten, bidrog troligen Consistorii ovilja emot Merckell och önskan att utestänga honom ifrån all befattning med Universitetet, icke litet. Detta ser man, utom af det redan förut omförmälda, äfven af Protocollet för d. 6 Nov. 1722, hvarest säges, att sedan Flodström lemnat den upplysning, att han af sin förre husbonde Merckell blifvit skickad till Åbo och med respenningar försedd, förständigades honom, att han "på den Condition" ej kunde blifva antagen, och frågades om han ville blifva "K. Academiens Boktryckare och intet någon dependent af Merckell." Härtill svarade Flodström, såsom förutses kunde, ja, och tillade, att Merckells mening icke vore att komma öfver till Åbo, utan att der hålla i sitt ställe en Factor. Men altför snart fick Consistorium sedan många anledningar att ångra detta sitt förhastade förfarande.

Mycket senfärdigare än sakens natur i alla händelser och isynnerhet vid en alltför litet bepröfvad mans antagande till förvaltare af en egendom, om hvars tillstånd ingen tillförlitlig kunskap fans, fordrade, vidtogos deremot åtgärder till Boktryckeriets

Inventering, Den skyndsamhet, hvarmed arbetet på Programmerne fill Restaurations högtiden och flere nyligen utnämnde Professorers Introductioner samt Lections Catalogen maste begynnas, tillat vål icke sådan Inventering innan Fronström fick verket om hander; men icke heller derefter företogs nagot på Consistorii sida förrån omkring ett och ett halft är forflutit och Boktryckaren, redan två gångor, sjelfmant derom anhållit, jemte det han anmilde at-killigt annat, som fordrade någon åtgård. *) Sedan da andteligen Professorerne Prysz, sasom Bibliothekarie, och Dan. Justenius d. 18 Maji 1724 blifvit till förrättningsmän utsedde, företeddes vid Consistorii sammanträde d. 17 nästföljande Junii ett af dem författadt Inventarium, af hvilket en vidimerad afskrift borde Boktryckaren meddelas. Langsamheten härutinnan förefaller sa mycket mera oväntad, som Consistorium i öfrigt ådagalade ganska verksamma omsorger ej mindre om Tryckeriets conservation, an om förbättring af dess förvaltares snafva vilkor. Hårom vittnar först och främst det som gjordes, för att förse begge med rum. For detta behof stog sig Professoren Joh. Haartman, straxt efter FLODSTROVS ankomst till Abo, att upplata nagra rum, dem han ville öfvertala en annan, at hvilken de redan voro uthyrde, att afstå, åtnöjande sig med 100 Dal. Kopparmynt i hyra, churu han af andra kunde fa 120 Daler, och eltergaf andock sedan, för FLODSTROMS torftighets skull, hans an-

¹⁾ Consistorii Protocoll d. 30 Mart. 1723 och 12 Maji 1724.

del i hyressumman, då bortflyttningen måste ske förrän ett år förflutit. Att Boktryckaren ensam borde ansvara för hela hushyran, var väl ock ifrån början förutsatt; men sedermera, då Flobströn flera gångor anhållit om hjelp dertill och Consistorium funnit så mycket mera skäligt, att Universitetet vidkåndes hyran för det rum, hvilket Tryckeriet upptog, som han ej kunde riktigt utfå sin lön och eljest hade mycket litet att förtjena, hvaraf hände, att den ene af hans husvärdar efter den andre hos Universitetet gjorde anspråk på betalningen af allt hvad dem tillkom; blef det icke allenast vanligt, att desse fordringsägare beviljades anvisning på hvad som af lönen kunde vara hos Quæstor att lyftas, utan stadnade äfven hvarje år hälften af hyran för den lokal. som af Flodström begagnades både för Tryckeriet och eget behof, Universitetet till last. Derjemte och då de nåstan årligen återkommande flyttningarne ifrån en gård till en annan, jemte faran af Tryckeriets logering i mindre väl försedda enskilda hus, väckt vederbörandes uppmärksamhet på angelägenheten af att förekomma håraf hårrörande olägenheter, gjordes flera försök att få säkrare och i alla afseenden lämpeligare plats för detsamma. Så öppnades d. 20 Maji 1723, då Flodström redan bordt, till följd af Professor Haartmans uppsägning på ett sätt, som gifver anledning att förmoda stort missnöje med hyresgästen *), hafva flyttat ifrån Professorens gård, men ännu icke kunnat skaffa sig an-

^{*)} Consist. Protoc. d. 9 April 1723.

dra rum, brefvexling med Biskopen i Wexio Doctor David Lund, sasom gift med en af Biskopen Doct. Joh. Gezelii den vngres döttrar, angående inköp eller förhvrande, på billiga vilkor, af det sakallade Angermanska huset, ett litet vid lilla Kyrkogatan beläget stenhus, som tillhörde sistnämnde Biskops arfvingar och kanhanda var detsamma, i hvilket hans eget Boktryckeri, enligt hvad i hans Minne af Professor J. J. Tengstrom. sidd. 155, 156, upplyses, förut hade statt. Likasa och när härmed intet kunnat uträttas, men behofvet af lämpelig lokal for Abo-Universitets Tryckeri blifvit genom förening dermed af det upphafda Pernauska Universitetets tryckeri förrad betydligen förökadt. var man 1726 betänkt uppå att genom reparation af ett gammalt, uti kyrkogårds muren, bredvid Akademien, belåget stenhus, hvarest Skolan fordom haft rum, och till hvars användande för öfningarne i Fäktkonsten Kongl. Majestät medelst Resolution af d. 12 Octob. 1694 redan samtyckt, så framt det kunde för Domkyrkan umbäras, utan att häruppa någon verkstillighet följt, bereda Boktryckaren tillika med Tryckeriet nödigt utrymme och begyämlighet. Men icke heller denna plan lyckades, emedan en del af vederborande, hvilkas bifall till husets upplatande begårdes. ansågo Domkyrkan både för tiden sjelf behöfva detsamma och i alla handelser kunna parakna nagon inkomst genom dess uthyrande åt andra.

Hvad åter Boktryckaren ensam vidkommer, blef bemödandet att på sått, hvarom redan Bjorcknan erhallit löfte, för-

hjelpa Flodström till någon arbetsförtjenst af de öfriga embetsverken i Åbo, och framför andra Länestyrelsen, så mycket lättare kront med framgång, som Universitets Tryckeriet annu nagra år efter dess återflyttning till Finland var det enda, som derstädes fans. Häruti läg nämligen anledningen dertill, att Landshöfdingen. General Majoren Friherre Otto Reinhold Üxkull på ena sidan begårde, såsom en förmon, att få anlita detta Trvckeri för Lands Cancelliets behof, och Consistorium på andra sidan hoppades genom bifall hartill förskaffa Flodström icke allenast den inkomst, som hans arbete hvarje gång, då det behöfdes. kunde inbringa, utan ock den Kronolon, som för sådant arbete bestods. Hårom anhöll Consistorium uttryckligen i skrifyelser till bemälde Landshöfding, af den 18 Maji 1724 och 30 Septemb. 1725, och fick Floretröu tills vidare befattning med ifrågakomne tryckning, emot åtnjutande af den i Lanets Stat för sådant behof uppförde årliga lön, ifrån och med 1725, i kraft at Landshöfdingens d. 15 Maji samma år gifna förordnande, ehuru detta icke kom till Consistorii kunskap förrån d. 9 nåstföljande October, då Landshöfdingens svarsbref på förenåmnde skrifvelser upplästes.

Emedan en närmare utredning af förhållandet med omförmålde Kronolön, än hvartill anledning förut förekommit, kan sprida något ljus så vål öfver någre af Universitets Tryckeriets produkter under den förflutna tiden, som ock öfver vissa delar af Finska Litteratur-Historien i allmänhet, erinras här nu

för det första, att af Regeringens allmänna påbud ganska få före ingangen af det adertonde arhundradets tredje Decennium bletvo i Sverige på Finska öfversatte och tryckte. För dem af Finlands inbyggare, som icke voro i Svenska språket hemmastadde, tillfredsstålldes dessforinnan behofvet af genom trycket meddelad tillförlitlig kunskap om ålven dem, stundom på det närmaste, rörande forordnanden endast i vissa fall, genom landets egna myndigheters anstalt. Salunda gjordes af Domkapitlet i Abo. om icke redan tidigare, atminstone 1645 *), början med Bonedags- och andra lika beskaffade Placaters kringsåndande till Finska församlingar i tryckt Finsk öfversättning, och omkring tio ar derefter finnes Landshöfdingen i Abo och Björneborgs Lan hafva begynt att icke allenast vidtaga dylik atgård betråffande sadane ôfverhetliga pabud, hvilkas kungôrande ankom endast pa civila magtens försorg, utan ock lata blott omtrycka atskilliga i Sverige på Svenska spraket tryckta Författningar, af hvilka mycket ringare antal exemplar, an behofvet fordrade, till Abo ankommit. Betalningen for tryck och papper erlades i dessa och andra dv-

^{*)} Af Biskop Rothovii d. 23 Octob. 1645 daterade Circulaire till Prester-skapet i Åbo Stift, infördt i Samling af Domkapitlets i Åbo Circulār-Bref i/rån år 1564—1700. Supplement. 1:a Del. sidd. 117—119, ses, att Oeconomus Templi Cathedralis låtit "transferera" och trycka Il. Kongl. Mai.ts Placat om den allmänna Tacksägelse-dag, som komme att d. 7 nästföljande November firas för den med Danmark nyss afslutade freden, och att 3 Daler Sillvermynt borde derför af hvarje socken, enligt Domkapitlets beslut, erlaggas.

lika fall efter räkning och om öfversättningen på Finska, så ofta ieke någon tjensteman vid det embetsverk, som var i fråga, kunde dermed sysselsättas, anlitade man än den ene, än den andre, som kunde åtaga sig arbetet, utan bestämd vedergällning. Den törste, som man känner, ibland desse öfversättare, var Poëseos Professoren Eric Justander, hvilken, såsom ses af ett d. 3 Novemb. 1666 dateradt bref), ifran honom till Riks-Drotzen och Cancelleren för Abo Universitet Grefve Pehr Brahe, då i tio år på Finska ofversatt alla de Kongliga Placater, Ordningar och Stadgar, som i dessa år utgått. Icke förrän nyssnämnde år undfick han likväl någon ersättning för denna sin möda, i det att Läne-styrelsen d. 9 Julii derför, med åberopande af General-Gouverneuren, Riksrådet Baron Herman Flemings skritvelse at d. 26 Maji samma ar, till Justander utanordnade 100 Daler Silfvermynt. I en skrifvelse daterad Abo Slott d. 13 Febr. 1668, till Landshöfdingen Harald Oxe, säger och bemälde General-Gouverneur sig hafva "nödvennigst mast i förleden ahr 1667 bruka Professoren Arevvrdige och Vällärde Mag. Er i cum Justandrum att på Finska Språket transferera dhe för samma ahr ankomne Kongl. Placater och ordningar, medh hvadh mehra, som hafver varit nödigt uti General Gouvernamentet att låta uthga och publiceras," och funnit godt för detta arbete bevilja honom

^{*)} Handlingar, Till upplysning i Finlands Kyrko-Historie. 5:r Hästet, sid. 79.

20 D der 5 levermynt, bylka Alven kort derefter utinordnades. Sjelf har Professor Justander vid slutet af åtminstone tvänne sismimule or tryakta Kungliga Planater uppgilvit sig sasum deras ôfversättare, efter Flemings förordnande; men emedan han, såsom samma år till Kyrkoherde i Wirmo utnämnd, innan kort difflyttade, in det ostkert om hans bemilde Translators belattning sedermera tantarit. Med atversattnings at letet vid Line-styrelsen var derester, åtminstone någon tid, Prosessoren Martin Miltopæus sysselsatt, hvilken d. 5 Novemb. 1670 fördenskull erhöll at Alning pa V Daler Sillvermynt, Afvens m Consistorii Ecclesiastici Notarierne Olof och Josef Lauræus sedan för öfversättning till Finskan, åren 1677 till och med 1684 uppburo bemining ther fileds ingilize rikninger. Deretter ater erfordrades icke sådan anstalt vidare, utan ålag det den, som tryckte ifrågavarande påbud, att på sin bekostnad låta öfversätta dem, jemlikt Known Majas "Resolution upper Bishoppens i Aboo, Ehrewyrdige och Höglährde Doctoris Johannis Gezelij dhen aldres unde Paniest insimueralle suppilique. Gifven Stockholms Slott den 17 Octobris 1684," hvars tredje punkt lyder: "Booktryckiaren s on Kongl. Malitiz Bhindagz och andre Planter på Finska later m neuter . The solan trycker, will kongl. Majon till ahrligh Lohn-Vine innew ande dherothi unnesluit. Sextijo Daler Shllvermynt bestadt hafwa, latandes och till föllie dheraf nu dess ordre till Stats Contoiret afgaa."

Intill år 1674 skedde tryckningen på Universitets Boktryckeriet, men sedermera oatbrutet på det af otvann'imnde Biskop anlagda intill dess det 1713 flyttades till Stockholm. Detta Tryckeris fördel var således utan tvifvel afsedd vid berörde Resolutions utverkande, hvilket äfven deraf skonjes, att dess foreståndare, Johan Winter, finnes i tionde punkten af Kongl. Resolutionen på samme Biskops underdåniga Supplicationer, gifven d. 25 Octob. 1688*), uttryckligen nämnd, såsom den der skulle på nåstkommande årets Stat upptagas till åtnjutande af den förut bestädda lönen; men härat följer dock så mycket mindre att denna lön borde anses för ett med samma Tryckeri för all tid förenadt anslag, som den icke år i förstnämnda Resolution tillagd någon viss hvarken Officin eller person. Sådane enskilda äsigter och considerationer, som föranledt nyss omförmälde flyttning af författnings trycket ifrån Universitetets till Gezeliska Boktryckeriet, maste det alltsa tillskrifvas, att uti de af Landshofdingen Lorentz Creutz d. 3 Septemb. 1685 utfärdade Ordres, om ifragavarande lons utbetalning for första gången, såges. att Hans Kongl. Maj.t formedelst Dess Resolution af d. 17 October 1684 beviljat "Booktryckaren Mester Johan Winter till Ahrlig Löhn och underholdli 60 D. Solfv.mt, som afsätter och trycker så på Svenska som Finska språket alla ankommande Kongl. Placater och Patenter, som kunna tijdh på annan ankom-

^{*)} Afhandling om Presterliga Tjenstgörningen och Aflöningen i Åbo Erke-Stift. Del. 1. sid. 60.

ma ifran Hans Kongl. Majat och des Collegier och blifva hår, på hvariehanda sätt afsende omkring heela Stoorfurstendömet Finlandh med Ingermanlandh och Österbottn," afvensom det, att Boktryckaren Henric Christ. Merckell sedan, genom Vice Landsholdingen Lars Brommenstedts anordning af d. 15 Decemb. 1706, sattes i âtujutande af samma lön, på den deri uppgifna grund, att han af oftanämnde Boktryckeris davarande ägare, Biskop Gezelius den yngre, blifvit till Abo förskrifven och nästförlidne vinter på samma Tryckeri antagen i framl. Boktryckaren Winters ställe. Såsom en följd af allt detta tyckes ock den för Merckell, som derefter köpt detta Tryckeri, sedermera at Landshöfdingen Baron Uxkull gifna Resolution, "att blifva conserverad vid sin beställning vid Cancellie Staten", kunna betraktas, hvilken af honom, enligt Consistoria Academici Protocoll for d. 19 Junii 1724, då uppvisades, men icke kunde komma honom till godo, så länge han icke hade nagot Tryckeri uti Abo. hvilket forhallande lärer hafva fortfarit intill ar 1726, da Merckell synes hafya ditskickat hvad till ett sådant verk hörde.

Då detta nya Merckellska Boktryckeri uti Åbo oftare kommer att i det följande nämnas, torde det icke vara ur vägen att här upplysa, huruledes det ifrån sagde år drefs i Merckells namn, samt jemväl, efter hans 1730 inträffade död, för enkans och artvingarnes räkning, genom Factorer, ibland hvilka isynnerhet den förste, Frans Philip Paulssen, som 1737 skall haf-

va blifvit Boktryckare i Carlskrona, *) och hans närmaste eftertradare Olof Hessling, har bora uppgifvas, af den anledning, att man har atskilliga skrifter, på hvilka finnes utsatt, att de äro af endera tryckte i Abo, men icke altid med tillågg, att det skett med Merckells Stilar, eller på Kongl. Boktryckeriet i Finland, såsom annars vanligt var, äfvensom sönerne Johan Christopher Merckell, sedermera Kongl. Gymnasii uti Wexiö Boktryckare, och Jacob, hvilken 1747 efter modren emottog Kongl. Finska Boktryckeriet i Stockholm samt icke manga är derefter blef Universitets Boktryckare i Abo. Ifragavarande Merckellska Tryckeris altid ganska ringa verksamhet led val stundom efter 1736 stora afbrott, troligen i brist af skicklig förvaltare på stället, men synes dock icke hafva alldeles upphört forrån omkring 1745. Bevis häruppa innefattas, ibland annat, deruti, att Universitets Boktryckaren Kempe, enligt vederbörlig anordning af d. 28 Aug. 1741, hvari ett Kongl. Stats-Contoirets bref, dateradt d. 17 Januar. 1738 år åberopadt, uppå ingifven råkning undfatt 7 Daler Silfvermynt i betalning för tryckningen af 1739 och 1740 arens "Markegangs-Listor" eller Taxor, och att Bönedags Placaterne för åren 1746 till och med 1750, på Finska, åro tryckte hos samme man, afvensom uti en till Consistorium Academicum ankommen skrifvelse ifrån Kongl. Cancellie Collegium af d. 25 Septemb. 1741, innehållande begåran om upplysning rörande den årliga lön af 180 Dal. Kopparmynt, som enligt Boktryckaren

^{*)} Lengren l. c. sid. 17 N:o 109. 1737.

Merckells enkas uppgift skulle år 1710 blifvit hennes affidne man tillagd för tryckningen af de på Finska språket öfversatte Kongliga Placater och Förordningar, samt varit på Universitetets Stat uppförd och utgått af Åbo och Björneborgs Läns ordinarie ränta, men af hvilken hon icke kommit i åtnjutande altsedan 1736. Då denna skrifvelse d. 13 Octob. 1741 föredrogs, beslöt Consistorium, som nu icke hade saken sig bekant, att efterses skulle till nästa sammanträde huruvida något derom funnes in Actis antecknadt, och d. 27 i samma månad, på anmälan, att sålunda ingen upplysning vunnits, att i bref till Länets Höfding göra förfragan, huru härmed sig forhölle, samt sluteligen d. 17 nästföljande November, då ännu icke något svar på sagde bref ankommit, att om allt detta underrätta Cancellie Collegium. Sedermera förekommer frågan alldeles icke i Consistorii Protocoller intill medlet af följande året; hvaraf torde få slutas, att den blifvit utredd genom direkt brefvexling emellan nyssbemålde Collegium och Landshöfding. För öfrigt är det så mycket mera sannolikt, att den ifrågakomne lönen blifyit år 1737 indragen, som den då och derefter icke mera finnes vara af Läne-styrelsen utanordnad, och dessutom behofvet af att i Finland låta öfversätta Regeringens pabud ålven allaredan upphort, sedan ständig Finsk Translator i Stockholm blifvit emot årlig lön på Stat antagen, såsom en följd af det förordnande, hvarom talas i 3:e punkten i Kongl. Resolutionen, gifven d. 4 Decemb. 1734, på de besvär, som Biskopen Doctor Dan. Juslenius samt Prosten

Magister Joh. Forskål, på Borgå Stifts Presterskaps vägnar, under då påstående Riksdag insinuerat, tryckt i Handlingar till Upplysning i Finlands Kyrko-Historia, utgifne af Wilh. Gabr. Lagus. Ny följd. Fjerde Häftet. Sidd. 80—86. Kanhända innehöll således äfven Kongl. Stats Contoirets ofvanbemälde bref just häruppå bygd föreskrift, att det trycknings arbete, som af Läne-styrelsens behof i öfrigt kunde påkallas, borde efter räkning betalas.

Återgå vi nu till den tiden, då Henric Christoph. Merckell gjorde sitt anspråk, att ater få uppbåra oftanämnde öfversättare och tryckare lön, gällande, finne vi, att den icke kunde få af Flodström åtnjutas för flera än två eller tre år, och emedan han redan den tiden hade svårt att komma till rätta med hvad han förvärfvade, blef hans ekonomiska ställning derefter så mycket mera försämrad, som han nu icke sällan försummade att fullborda honom anförtrodde arbeten och genom sitt tilltagande begår efter starka drycker beståndigt ådrog sig nya skulder. Fordringsägare anmälde sig tidt och ofta hos Universitetets Rector eller Consistorium, för att af den lön han vid lärosätet hade att åtnjuta få sin betalning, men kunde sällan bekomma något annat, än hushyran, hvilken årligen endast på detta sätt utföll, stundom likväl icke till större del, än för hvilken Consistorium åtagit sig att ansvara, emedan ofta icke mera af lönen innestod, sedan Flodstrom sjelf före den vanliga utdelningstiden efterhand uppburit hvad man tyckte honom i sin fattigdom icke kunna

undvara. Af lika miskundsamhet beviljades honom åfven en och annan Discretion, t. ex. för tryckningen af Programmerne till förut omförmålde Introductioner straxt efter Restaurations festen, samt en my trypliga af Junimentum och Privilegia Studiosurum, eder Student-bret, åtvens mitter den mode han hatt med Permiuska tryckeri tirradets och en stare mangd itt nattikes att beställda Stillars ochhande, hvannan i det följande skall vidare ordas.

Vid nårmare öfvervågande af svårigheten för Flodström att refyr med de smo inkomster han hale att paråkna, kom ock Consissorium Amblemoum, sas mi det synes, iche langt efter hans antigande, pa andre tinkar i atseende på Merokells. Danvale begaran att ta disposition at Universites Bolany keriet, med bibehållande af Flodströn såsom Factor. Protocollet för d. 19 Junii 1724, då de begge hade företräde, innehåller nämligen, att Merchell which fourmer it the the hypre viola 12 Date: Kopparmynt, och att man tyckte det vara nyttigt för den sistnamnde att ingå accord, på det han ej måtte alldeles komma af sig. Men emedan han ej åtnöjde sig med så litet, som han sade aiven en Ge-W plage for noon fundrale 3 P. an. och Merckell icke ville gifva mera än högst 14 Daler, förföll frågan så mycket låttare, som den stod i sammanhang med Merckells nu gjorda förslag, att få emot contant betalning tillhandla sig allt hvad som hörde till Umversneres Trycken'i och i stillet uppslitta ett nytt, for Larosatet nojaktigt; hvaremot dock Consistorium

hyste många betänkligheter. Härom säges i Protocollet för d. 17 Febr. 1725, att Consistorium redan föregående sommar "funnit ej vara för Academien nyttigt att till Merckell aflåta trycket, uthan att Consist. behåller sitt egit tryck, till dess att man kan få effter hand kiöpa något annat bättre till," och äfven nu hölle "eftertänkeligit vara att låta trycket bort, som att Academien, der Merckell antingen skulle döö eller eljest torde wijsa sig på något sätt sedan missnögd eller obillig, då skulle vara alldeles uthan tryck eij heller någre uthwägar vore för handen att kunna så snart å nyo förskaffa ett så kostsamt tryck, föruthan det att Consistor. ej kan drifva Flodström ifrån sin beställning, hvarå

han har Consistorii fullmacht."

Också tyckes det såsom egenteliga klagomål öfver Flodströms förhållande icke då ännu skulle hafva inlupit. Men icke långt derefter förebragtes sådane tidt och ofta, så väl på embetes vägnar af Rectorerne och Faculteternes Decaner, som ock af enskilde, hvilkas arbeten han icke i rättan tid fått färdige, eller emot hvilka han på annat sätt brustit uti ingångna öfverenskommelsers uppfyllande. Såsom en blott af okunnighet om Författningarne och Consistorii äldre föreskrifter, eller glömska att genast efter tryckningen aflägga de exemplar, som borde till Kongl. Riks Archivet och Universitets Bibliotheket aflemnas, härrörande försummelse, kan väl den efterlåtenhet i detta afseende, som ofta förehölls denne Boktryckare, så mycket heldre betraktas, som det

icke var lått att elter flere ars forlopp, innan någon uppmärksamhet hara fastades, anskaffa allt hvad som se lan ankomsten till Abo blifvit of honom tryckt; men att han endast med synbarligen toma undanflykter, sisom t. ex. att arstryck, som han haft samlade, blifvit honom franstulne, och med flere gangor förnvade. men lika ofta brutna. löften att innan kort afgifva åtminstone hvad som sednast ifrån trycket utgått, sokte förhala tiden och undgå råttmåtig nåpst, gilver styrka at misstanken om försumlighet af svarare art och anledning, som uppkommer, de man finner vederhörandes foreställningar harom till Fronstan nästan alltid forenade med forebraelser for hans fylleri. Likasa kun le ingen ursäkt aga rum for den langsamhet och efterlatenhet med arbetet på Tryckeriet, hvaraf uppskof med uågra Akademiska Solenniteter vallades, da dessforinnan erforderliga Disputationer och de vanliga Programmerne icke kunde nog tiligt fis ur Boktryckarens hander. Redan 1726 d. 16 Mart. Magade Philosophiska Facultetens Decanus, att de minga Disputationer, som beholdes fore samma ar skeende Magister Promotion, for Fronstrions försummelse komme att studsa; men svårare voro följderne at hans efterlatenhet tre ar sednare. da den Promotion, som firades d. 25 Junii 1720, ombiligen kunnat forran mycket sednare gå för sig, om icke någre af promovendi låtit trycka sina Gradual Disputationer på Merckellska Tryckeriet och Fromstruks befattning med det Alademiska dessförinnan upphört. De af Philosophish: Facultetens Professorer, som stagit sig att præsidera för sådane Disputationer och Facultetens dåvarande Decanus, Professoren Joh. Haartman, anförde nämligen i nästan hvart enda af Consistorii Academici sammanträden under förra hälften af nyssnämnde år ett eller annat häruppå syftande klagomål öfver Universitets Boktryckaren, såsom, att han altför länge haft hos sig Manuscripterne, utan att begynna sättning och tryckning, vid dessa arbetens verkställande brustit i uppmärksamhet på Correcturet, samt i öfrigt visat ytterlig vårdslöshet och sällan funnes hemma, om icke alldeles öfverlastad af starka drycker, till hvilkas anskaffande han plägade vid Disputationers emottagande fordra på förhand tre Daler, och vore utgifvarene sedan nödsakade att stå hos honom under nätterne, om de skulle få något gjordt, hvarutom han under arbetets fortgång obligerade dem att spendera på honom och, om detta icke skedde, gick ut för att låna sig penningar, som användes, likasom lönen, till bränvin, så att hustru och barn måste svälta. Af sådan orsak hade Studeranden Joh. Fortelius, hvars Exercitii Disputation, Operationes intellectus humani, quatenus sunt objectum Logices, adumbrans, under ofvannämnde Professor Haartmans præsidium försvarades d. 15 Mart. sagde år, vändt sig till Merckellska Boktryckeriet i Abo, hvarest sedermera afven hans och Candidaten Gust. Fabricii Gradual Disputationer finnas vara tryckte, af hvilka den sistnämndes, med Titel: De perverso famæ studio, ventilerades d. 24 Maji, under samme Professors inseende, och den förstnämndes, De operationibus intellectus humani, under

Professoren And. Pryszi, d. 17 Junii. Harill kanna Janu 113gas begge delarne af Joh. Er. Forsmans Disputation, De convenientia inter dogmata Nic. Machiavelli et vitam Oliverii Cromvelli Protect. Angl., hvilka, mahanda för det att ofvanminude Merckellska Tryckeri redon blirat son med dybkt orbete öfverhopadt, blifvit tryckte i Stockholm, på Merckells dervariable Buktey/Keri, a li Clasyon les, den Caro under præsidium af Professoren Hassel, d. 14 Junii, och den sednare d. 19 i samma manad, under Professoren Scarins inseende. Dessutom såges i Consistorii Protocoll för d. 11, likaledes Junii, vid det förslag väcktes om Promotionens anställande d. 20 i samma månad, att sju Disputationer då ånnu stodo tillbaka, till hvilket antal ock de sedermera ventilerade finnas uppgå, då de fyra hit hörande, som, enligt uppgiften på Titelbladen, åro tryckte af FLODSTRÖMS estertradare, laggas till nyssberorde trenne, ester la senamnde dag försvarade.

Under allt detta hade Flodström ganska ofta, redan ifrån 1725. hälvit ej en last casalidt at Priman eller. He men handra vederbörande embetsmån vid Universitetet, utan ock inför Consistorium Academicum, enligt dess beslut, erinrad om så vål sin försumlighet, som sitt oordentliga lefverne och förmanad till båttring, vid åfventyr af alfvarlig nåpst och tjenstens förlust; men om han ock stundom under någon kortare tid, som varit honom till prof förelagd, höll sitt, hvarje gång villigt gifna, löfte att taga sig till vara för ytterligare förseelser, återföll han dock alltid der-

efter i dryckenskaps lasten och sjönk med detsamma allt djupare i det elände, hvaraf den plägar åtföljas. Den 27 Mart. 1728 fattade Consistorium fordenskull det beslut, att hos Universitetets Canceller anhålla om tillstånd att utse en annan Boktryckare; dock zick detsamma icke i verkställighet, emedan man, sisom Protocollet for d. 6 nästföljande April tyckes antyda, fann sig forst bora bade hafva laga bevis och jakttaga formelig rättegangs omlning emot Flodström. Sluteligen, da Universitetets Tryckeri syntes stå i fara, icke allenast for vanvärd, heldst forvaltarens oformaga att behörigen atbörda sig äfven den billigaste hushvra och hans oordentliga lefverne fororsakade verkets ständiga flyttning och till allt sämre och sämre rum, utan ock för förskingring, till fyllande af hans manga behof, fanns tiden vara inne till att lagligen forfara med mannen: och beslåt Consistorium derföre d. 16 November nyssnämnde år, att han skulle inför detsamma i egenskap af domstol tilltalas for allt hvad som derstådes tid efter annan blifvit emot honom anm'ildt och öfverklagadt, och förordnades tillika Universitetets Vice Secreterare Magister Reinhold Liebman. att sasom Actor utföra målet, hvilket komme att företagas d. 29 i samma månad.

Det som bemälde Actor då, efter att hafva för behofvet genomgatt Consistorii Protocoller, lade Flodström till last, var innefattadt i nio punkter, af hvilka fyra rörde positiva, eller "committendo" begångna förbrytelser, och de öfriga det, hvaruti han "omittendo" försett sig. Till de förra voro räknade: 1:0

Fini stroms allom so behanta fulleri, att deruppa intet bevis tarfvides: 2:0 Den djerfhet, olydno och vanvördnad, som han 1725 visit Akalemiens Senior, Eloquentiæ Professoren Prysz, emot hvars forbud han tryckt en gratulationsskrift af en ung Student, vid namn Hacks, och låtit deruti efter forfattarens godtycke inflyta atskilliga ord, hvilka Professoren vid censurerandet icke kunnet gilla: 3:0 Att han olofligen uppburit och sig enskildt till golo anvendt Krono spanmal, under Titel af Tryckeri tunna; och 4:0 Att sisom han puntsatt nigre for beholvet vid ett barnsol. som han hallit, of Assessmen Ingelet lanade silfverskedar, hade man anledning att befare honom halva gjort dylika försök med Alademiens trych. Hvad ater forseelserne af det sednare slaget vickommer, anmarktes bade i allmanhet Fronstroms alltior stora forsumlighet i tjensten och specielt den deruti visade, att han 1:0 icke forfardigat en liten finsk Tractat, som Handelsmannen Schele for tre ar sedan velat uppligga; 2:0 haft Manuscriptet till 1726 irs finska Almanach hos sig en hel månad, utan att trycha ens forsta arket; 3:0 gifvit Decanus Facultatis Philosophica nyssnåmnde är anledning att i Consistorio besvära sig derölver. att tryckningen af de minga Gradual Disputationer, som borde fore In Hisvande Promotion vara färdige, forsummades; 4:0 om hösten 1727, genom det han, såsom orden lydde i Protocollet für d. 7 Nov., "alla dagar gick fuller och drucken." underlatit tryckningen of Programmet rorande Linguarum sacrarum Professoren Daniel Justenii Introduction till tredje Theologice Pro-

fessionen, förorsakat denne Acts uppskjutande till påföljande Läse-Termin; och 5:0 svårligen förbrutit sig emot Kongl. Maj.ts Förordning af år 1684 och Kongl. Cancellie Collegii Påminnelse af år 1707, angående Boktryckares skyldighet att af alla hos dem tryckta skrifter innehålla och aflefverera sex exemplar, vid vite af 100 Daler Silfvermynt för hvarje uteblifven skrift. Hvad som nu gjorde alla dessa förbrytelser ännu svårare, vore det, att Flobsтком för dem nästan otaliga resor blifvit tilltalad och varnad, men icke låtit förmärka den ringaste förbättring, eller, hvad nästnämnde lefverering beträffade, ens efterkommit Consistorii befallning, att låta till dess Sessionsrum uppbära åtminstone de Disputationer, som han samma stund sagt sig hafva i beredskap lagde, fastän äfventyret af tjenstens förlust för sådant underlatande varit honom förelagdt. Liebman underställde fördenskull nu Rectors och Consistorii bepröfvande, huruvida mannen derefter kunde vid sin Boktryckare beställning bibehållas.

På Flodströms anhållan att få skrifteligen afgifva sin förklaring, lemnades honom härtill 8 dagars tid efter inhåndigandet af Protocolls utdrag om hvad nu emot honom anförts, och inkom denna förklaring d. 4 Febr. 1729 samt bemöttes af Liebman d. 22 i samma månad med en skrift, hvilken äfven enligt då afsagd Resolution, skulle communiceras Flodström, som ägde att deröfver inom 14 dagar förklara sig. Sedan detta blifvit på föreskrifven dag, den 8 Mart. fullgjordt och Liebman fått emottaga äfven denna skrifteliga förklaring, i afseende å vidare utlå-

tande, som borde afgifyas paföljande lördag, d. 15 i samma manad, förekom ock målet då; men emedan Flodströms biträde i rättegången, Advocaten Gabriel Valentinsson, som nu första gången åtföljde honom, efter det Liebmans nu ingifne utlatande, eller sakallade "Replique," blifvit uppläst, anförde. att han icke kunde ingå i svaromål, förrän han fått del af sistnämnde skrift, äfvensom af de i Consistorio-förde Protocoller. hvilka Actor bade munteligen och skrifteligen aberopat till styrka for sitt pastaende, hyarjemte han hemställde, huruvida de delar af målet, som rörde enskilda personer, kunde utan föregången laga stämning företagas, resolverade domstolen, sedan parterne alträdt, att bemälde skrift skulle meddelas Flodström till genomläsande till nästpåföljande onsdag, då honom ålåge att utan vidare skriftvexling återlemna densamma, och att han kunde få lösa utdrag af de ifrågakomne Protocollerne, så framt han icke, för att undgå kostnaden dervid, åtnöjdes med att få vid "Conferencen" höra dessa Protocoller sig föreläsas, samt, beträffande omnämnda enskilda mål, att han skulle erhålla behörig stämning, när de komme att företagas. Alldenstund Flodström under den tid rättegången sålunda fortgick, låtit ännu flera förseelser komma sig till last, tillsades ock Actor nu, äfvensom ytterligare d. 2. April, att jemväl derom göra anmärkning vid den sluteliga "Conference", som komme att äga rum d. 12 i samma månad och hvartill Flodström borde genom begge Cursores kallas.

När nu, på sistnämnde dag, efter Actors och Boktryckarens inkallande, den af Professoren Scarin uppsatte berättelse i målet blifvit uppläst och Flodströn, uppå tillfrågan, om han ville höra de af den förstnämnde åberopade ställen i Protocollerne sig föreläsas, endast anhållit att blifva bibehållen vid sin beställning, eller, der sådant icke kunde medgifvas, undfå afsked, hvarjemte han ingaf en skriftelig försäkran om förbättring och sysslans behöriga skötande, hvilken äfven upplästes, anförde Liebman ett och annat, rörande först och främst Boktryckarens vårdslöshet vid arbetet med åtskilliga Disputationer, hvarom Philosophiska Facultetens Decanus isynnerhet och jemväl vederbörande Præsides hade för Consistorium anmält, likväl, såsom det synes, till det mesta af lika obetydlig anledning, som då, oaktadt hvad i Correctur-arken blifvit anmärkt, på Titelbladet för Stud. Isaac Peldans Disputation De diversis Philosophorum methodis in demonstranda existentia Dei, P. 1, for hvilken oftanaminde Professor Haartman d. 14 Dec. 1728 præsiderade. stått EXSITENTIA och felet endast i några få exemplar funnes rättadt. Dernäst anmärkte Actor i afseende å Flodströms lefverne, att han någon dag i sednast förflutne Martii månad till Consistorium uppkommit sa beskänkt, att Consistorium då varit föranlåtet att derföre tilltala honom, hvarjemte dess bedömande underställdes, med hvad säkerhet Akademiens tryck kunde fortfarande anförtros en man, som genom liderlighet blifvit bragt

till så ytterlig tattigdam, att han nyligen, dels for dryckes-, dels ock för matvaror, pantsatt sin rock, hvilken hans husvård, hos hvilken den var i pant, under nyss forflutne Paskhelg haft uppn sig.

Hvad Floostroms ofvannämnde svarsskrifter må hafva innehållit, är obekant; men munteligen anfördes af honom nu, jemte det han pistod sig ingalunda halva pantsatt sin rock, utan Benast langt den at sin vand under pistaende helg, hvarjehanda, som vål lårer till det mesta saknat grund, sasom af vederbörande och genast invåndes, men likvål till en del tyckes hafva kunnat fintjena nigot undseende, om icke erfarenheten redan dessforinnun norsumt alagalagt, att ingen förbättning kunde af honom vantas och tillfället att göra sig af med en så opalitlig tjensteman derföre borde jakttagas, såsom t. ex. då han sade, att författarene sjelfve formsakat drojsmål med Disputationernes tryckning, genom gjorda tilligg och åndringar i Manuscripterne, Correcturets quarlibliande alltfor lange, anstands beviljande o. s. v. likssom och medgilvandet, att oaktadt det icke var honom tillåtet att till tryckning emottaga andra skrifter, se långe han hale Disputationer under han ler, hade han likyal stundom varit sysselsatt med enskildes arbeten af annat slag. På förberörde för-Akran om flabattring, till hvilken Fronström munteligen lade. att han underkastade sig äfventyret att varda, efter Consistorii zolufinnande skild ifrån Boktryckare beställningen, om han icke hölle det löfte, han nu ville gifva, att intill nästa Promotion hvarken inom eller utom hus lata finna sig drucken, fastade Consistorium imellertid vid sådant förhållande icke någon uppmärksamhet utöfver hvad som var nödvändigt, på det Universitetet icke måtte råka i förlägenhet och Tryckeriet komma att förfaras, genom Flodströms förafskedande innan man hade någon annan att sätta i hans ställe. Således och ehuru af allt hvad som blifvit förebragt nogsamt aftogs, att denne man ingalunda kunde få behålla Boktryckare tjensten, ansåg Consistorium sig dock, för Tryckeriets säkerhet och det infallande arbetet med Gradual Disputationerne, nu icke kunna skrida till någon formel Dom, utan stadnade i det beslut, att låta härvid bero, intill dess en annan, hvilken redan genom enskilda bref blifvit uppmanad att komma till orten, kunde anlända och genast emottaga verket; börande imellertid hos Universitetets Canceller med nästa Post anmälas om förhållandet med Flodström och hemställas om ny Boktryckares antagande.

På skrifvelsen härom, som afgick d. 17 April, svarade Riksrådet och Cancellie Presidenten Grefve Arvid Horn, Universitetets då varande Canceller, d. 2 Maji, att det vore honom obekant, huruvida Flodström, som aldrig undfått hans fullmagt, blifvit 1722, såsom Consistorium berättat, till Akademie Boktryckare antagen, särdeles som Björckman, hvilken innehade Cancelleren Grefve Falkenbergs fullmagt på tjensten, då ännu lefde, hvarföre ock den af Consistorium till samma tjenst nu recommenderade redan vore dertill medelst fullmagt af Hans Excellence törordnad, under förmodan, att Consistorium icke skulle under-

lata att forfara med Fronstrion efter hans forseelse och sakens beskaffenhet, samt tillhalla honom att gota behovig redo for den til han forestatt Akademiens Boktryckeri och hvad han derunder haft om hander. Sedan den olycklige mannen salunda blitvit i sjelfva verket entledigad, forfall naturligtvis all fråga om hans skiljan le ifran tjensten genom laga dom och atersto l'endast Tryckeriets afletverering, i alseende a hvilken Consistorium d. 7 Maji, da nyssnámnile svarsbref itran Cancelleren upplistes, beslot att halla saken tyst, intill den nye Boktryckorens ankomst; till foli I hvarat Frodstnon alltså beholl verket om hander, sisom det tyckes till slutet af månaden. Icke långt derefter lårer han ook hafva lemnat landet. Ett i Consistorii Academici Registratur forvarælt Concept till afskedshetyg for honom, år nåmligen dateralt il. 25 Junii och lyder: "Sisom Boktryckaren Konstförfarne Eric Flodström nu är sinnad att sökia sin lycka på en annan ort, sedan Academiæ Boktryckare tiansten som han i någre alirs tid hinstides forestalt, medelst en annan Mans tillforordnande ar besitt vorden; altse lamnes honom till bevis, att han ifrån Kongl. Academiens tiänst nu är fri och ledig samt i så måtto obehindrad att bevaka sitt båsta, ehvarest han det sielf astun In." Uni en i Universitetets Statslok for 1732 intagen Forteckning öfver Avancementer vid detta läroverk efter sednaste tre Isslut och Walstena Krigsmanshus derfore tillkomman le algifter, finnes dessutom vid Flodströms namn antecknadt: "öfvergifvit sin tienst, rest bort till Revel och yet man intet hvarest

han är, hustrun är fattig med många Barn, och föder sig af godt folks gifmildhet." I sin nöd vände hon sig, redan före mannens bortresa, en och annan gång till Consistorium, med anhållan om någon spanmålshjelp, som ock beviljades, först med en tunna förskottsvis och sedermera hvad som af efterhand influtne Rester på lönen för de föregående åren kunde henne tilldelas, enär många fordringsägare tillika yrkade på sin betalning af samma tillgångar. Till vinnande af visshet om alla fordringarnes belopp, begårde Consistorium då att Magistraten i Åbo skulle medelst anslående af ett Proklama kalla samtelige Flodströms Creditorer att d. 20 Jan. 1730 inställa sig i Consistorio; hvilket äfven skedde och befunnos derefter de sålunda anmälda skulderne stiga till 147 Dal. 8 öre Kopparmynt, till betalning hvaraf Räntemästaren uppgaf 180 Daler blifva att tillgå.

Angående denne Boktryckares härkomst, lärotid och förfarenhet i konsten, samt familje förhållanden, är ganska litet bekant. Endast med anledning deraf, att på någre af honom tryckta skrifter, ett *M.* förekommer, efter *E.* eller *Eric*, ehuru i de egenhändiga underskrifter, som jag sett, icke något annat dopnamn än detta *Eric* finnes utsatt, hvilket ock ensamt är af andra i Universitetets handlingar rörande honom nyttjadt, förmodar jag att förstnämnde bokstaf har afseende på hans fader, hvilken torde haft något af de dopnamn, som dermed begynnas. Att han 1718 blifvit Gesäll, inhemtas af några då tryckta, på hans Postulats dag framgifna verser, om hvilka Kongl. Bibliothekarien och Rid-

daren Arwidsson haft den godheten att underrätta mig. För sitt yrke nödig färdighet synes han icke hafva saknat, sasom äfven kan slutas af ett i Consistorii Academiei Protocoll för d. 22 Febr. 1729 antecknadt uttryck af oftanimnde Professor Haartman, hvilken, jemte det han, i egenskap af Philosophiska Facultetens Decanus, besvärade sig ofver Fronstroms forsummelser och oordentliga lelverne, sade "sig hafva forsökt honom, att han innom 24 timmar kan sättia upp ett arck." Hustrun hette Brita Cloverus och stadnade i Åbo, hvarest hon afled d. 3 Junii 1757, i sitt 68:de ålders år.

Större utrymme än en så illa känd man kunnat förtjena, har har blifvit lemnadt at flera Frodströß personligen rorande omståndigheter, förnämligast vid rattegangen emot honom, for att visa, huruledes äfven hans opälitlighet utgjorde ett ibland de många hinder, af hvilka Universitetets verksamhet under flera ar nåst efter dess Restauration fjettrades. I hvad mon vederbörandes bemödanden under samma tid, att undanrödja dem ibland berörde hinder, som härrörde af Boktryckeriets forut irakade obestånd, icke dess mindre vunno någon framgång, följer nu att framställas.

Huru Åbo Universitets Tryckeri redan långt före flyttningen till Stockholm saknat mangt och mycket, till och med af det nödvändigaste, är forut anmärkt, och emedan atminstone stilforrådet till nagon del åfven derstådes blifvit nyttjadt, icke endast af Björckman, utan ock af Merckell, hade det utan tvifvel

ytterligare lidit genom nötning. Den sistnämnde qvarhöll ock hos sig, vid verkets återflyttning till Åbo, Almanachs Stilarne och den så kallade Corpus antiqua, samt visade sig sedan mycket trog att aterlemna dem. Vid företrädet i Consistorio Academico d. 19 Junii 1724 försäkrade han väl, att allt stode till reds, lika godt som tillförene, och att han sjelf ägde båttre Almanachs tryck; men icke dess mindre nödgades Consistorium ännu om sommaren 1725 flere gångor brefvexla med Canceller och Björck-MAN samt Adjuncten Björklund, som då vistades i Stockholm, för att få utredt, så väl om ifrågakomne Stilar ännu voro i brukbart skick, som ock på hvems bekostnad de i sådant fall borde till Åbo transporteras. Saken slutades ändteligen på det sätt, att sedan Canceller, såsom ses af en dess d. 20 Aug. sistnämnde år daterad skrifvelse till Consistorium, låtit tillsäga Merckell att utan dröjsmål lata i Björklunds och Björckmans närvaro inventera berörde Stilar samt sedermera på egen bekostnad öfversända dem till Abo, efterkoms denna föreskrift icke langt derefter så, att sändningen i början af September framkom. Härmed var dock föga mera än det, i anseende till angelägenheten att snart utgifva Almanachen för följande året, för ögonblicket mest trängande behofvet afhulpet. Universitets Tryckeriets brister i allmänhet fordrade många och tillgångarne vida öfverstigande botemedel. Uti en d. 16 Nov. samma är daterad framställning till den Kongl. Commission, som var tillsatt för att taga Finlands genom kriget och derefter följande missvext-år iråkade nöd i öfvervägande och foresla medel till dess afhjelpanda, atföljd af en omständelig utredning af den brist, som Universitetet aren 1722. 1723 och 1724 fått i sina inkomster vidkännas, år ibland annat. tjenande att adagalägga detta läroverks svara belägenhet, Tryckeriets tillstånd med foljande ord beskrifvet: "Afvenledes år vid Kongl. Academien ett sa förfallet Tryckeri, att nu mehra ingen disputation richtigt med de latinska stylarne aftryckas kan, ock icke den minste tractat med de Svanske; til att fortiga de frammande spraken, som Grækiskan, och Hebraiskan, af hvilcka sallitet finnes att det knappt kan nämnas; Men andra Orientaliska, de dock ved ett Kongl. Universitet borde finnas, och jämvähl nu redan en eller annan ging skolat vara no lige, och efter hand till flere dehlar behölvas, hafva vij icke det ringaste utal. De andre tryckeriets tillhörigheter are storre dehlen uthnotte och odugelige. så att och det lilla, som af stylarne kunde oppsåttias, svarligen kan bli aftryckt i brist af nodvåndige värcktyg. Der till med är det for denne Academien icke en ringa svärigheet att dess Tryckeri intet huus ager, uthan maste wij af war lonings strat, som dessutom år til det yttersta forsvagad, betahla derfore ahrlig huushyra. Skulle man nu giòra ett forslag till mehrbem.te Booktryckeris opprättande, som man det til dess nodvändigste dehlar gjordt, men intet til dess fullkomligheet, så forslar til dess reparation intet mindre an 2000 Dal. Silfv. mit, det Consistorium Acad, nu knapt wagar for Ed. Exc. och den hogl. Kongl. ComHistoriska underrättelser om Boktryckeriet i Finland. 767 missionen att nämna och fördenskull uti instrumentet ej heller anfört."

En verkan af denna framställning, hvilken på högsta ort kraftigt understöddes af Universitetets Canceller, den då redan ganska mycket, fastån efteråt ännu mera, i Sveriges allmänna ärenden betydande Grefve Horn, var utan tyifvel den ansenliga föräring, som Universitetet året derefter erhöll, då Consistorium under d. 8 Julii underrättades, att sedan Hans Excellence förnummit, huruledes det under sista krigstiden ifrån Kongl. Akademien i Pernau till Stockholm flyttade Tryckeriet här ännu vore i behåll, och fördenskull hos Kongl. Maj:t i underdånighet anhållit, det täcktes Hans Majestät i Nåder ihugkomma Kongl. Akademien i Abo med detsamma, hade Hans Kongl. Maj:t behagat härtill i Nader samtycka. Tillika föreslogs, att någon af de Professorer, som erhållit tillstånd att under sommarferierne komma till Stockholm, blefve anmodad att derstädes emottaga berörde Tryckeri och besörja dess transporterande till Abo; hvarföre Consistorium genast, i bref till Professor Scarin, anhöll att han. biträdd af Professor Hasselbom, ville emottaga och inventera den dyrbara gåfvan samt med någon Skeppare sluta accord om dess öfverförande. Detta uppdrag blef dock sedermera så vida ändradt, att Tryckeriet, som befanns förut inlagdt i kistor, skulle orubbadt öfversändas, för att sedermera i Abo af Universitets Boktryckaren, i någon annans närvaro, inventeras, och emedan

Procanceller, Biskop Witte, tillfitt dess inlastunde uti en honom tillhörig farkost, på hvilken det i mellet af September anlinde till Leesund i Pargus socken, tre mil ifrån Alto, villkändes Universitetet endast kostnaden for afhemtningen derifran med en ifran staden utsånd bat. I brist af utrymme for detta nya forråd i de rum, som bemålde Boktryckare innehale, blef det åfven lange nog efter framkomsten lemnadt i sina histor, hvilka insattes i Bibliotheket, och derstädes uttogs sedan småningom, ifrån slutet af April manad foljande aret 1727, ett och annat, allt efter hyad beholvet for tillfallet befans erfordra. Härigenam forfall fragan om Inventering alldeles, heldst Stilarne skola varit sa sammanblandade, att deras upptagning icke kunde ske i Vederhörlig ordning och foljakteligen ätven den nya uppställningen meltog lång tid och stor moda; i anseende hvartill och under loppet af samma ar nagra af farut namude gratificationer, utgaran le inalles 12 Dal. Kopp. mynt och en Tunna Spanmal, blelvo Fronström för besväret beviljade.

Af huru stort värde den sålunda erhållna gåfvan i sig sjelf må hafva varit, kan således nu icke dömas; men att Universitetets behof, åtminstone af Stilar, ingalunda Hifvit derigenom fyldt, kan slutas deraf, att icke allenast ett, redan förrän man hade kunskap om denna gafva fattalt, beslut om ett parti gamb, utnötta Stilars försändande till Lübeck, för att utbytas emet nya af lika vigt, sedermera verkställ les, utan och förslag änna 1727 vicktes om något gammalt Stilförräds hortbytande på lika sitt:

hvilket tyckes jemväl hafva gått i verkställighet. Uppgifterne härom och likaså om vigten och beskaffenheten af de nya Stilar, med hvilka Universitetet genom denna byteshandel blef forsedt, äro dock så ofullständiga, att håraf hvarken skonjes, huruvida gammalt gods i storre quantitet, an fore Pernauska Tryckets tillkomst funnits, nu blifvit forvttradt, eller nigot bestamdt begrepp om saken i atskilliga öfriga delar kan bildas. Redan d. 14 Apr. 1725, då Boktryckaren anmält om någon åtgårds vidtagande i alseende å utnötte Stilars användande på ofvanbemålde sått, erhöll han befallning att i Secreterarens n'irvaro uppväga dem. hvarester nva komme att ifrån Lübeck beställas genom Handelsmannen i Abo Johan Reinhart Heldt. Till bestridande af kostnaden för fyra stycken brådlådor, om fem gyarters långd, i hvilka de gamla i sådant afseende skulle inläggas, uppbar Boktryckaren ock d. 5 nåstföljande Junii 3 Daler Kopp, mynt, och att beställningen af de nya afven skett, finnes deraf, att till bemålde Heldt följande åtet utanordnades 30 Riksdaler, beråknade till 75 Dal. Silfy. mynt, om hvilka det uttryckeligen heter, att han atagit sig att genom Handlanden Detlot Siemers i Lübeck remittera dem, i afbetalning på gjutare lonen for derstades till Akademiens Tryckeri beställde Stilar. Men huruvida förstberörde utnötta Stilar då redan voro till Lübeck afskickade, eller tillstventyrs innefattades i det parti, rörande hvilket dylik anstalt vidtogs, sedan Flodström d. 12 Aug. 1727 till Consistorium hemstållt, om icke "all den gamle stylen kunde fórbytas emot nytt tyg uti

Lübeck," kan så mycket mindre ses, som, oaktadt åfven mi, d. 19 i samma månad, då beslut om de obrukbara Stilarnes afsåndande fattades, deras uppvågning föreskrefs, vigten, likasom förra gangen, sedermera icke finnes uppgifven. Anledning förekommer ock till tvifvel, om den första beställningen samt vilkoren dervid varit i alla afseenden nog bestämde. Icke förrän nu finnes nämligen Consistorium hafva af Stilgjutaren, hvars namn var Georg Schmidt, äskat uppgift om så väl arbetslönen, som det pris, han erbjöde för gammalt tyg, öfverskjutande vigten af de hos honom beställde Stilar, till upplysning i hvilket afseende et mindre Universitetets förre Boktryckare Björckman genom bref frågades, hurudane priserne vanligen vore, än den nuvarande afgaf yttrande om de behöflige Stilarnes vigt, ehuru sa obestämdt, atminstone sa vidt det finnes i Protocollerne antecknadt, att sedan han till Protocollet för d. 26 Septemb. 1727 förklarat, hvad Corpus Fractur Stilen vidkomme, att deraf behöfdes "I Centner eller 5 lispund, jemte de öfver ordningen begärte bokstäfver, tillsammans," svarade han d. 7 nästföljande November, på tillfrågan, hurn mycket de beställde Stilarne kunde komma att våga: "Corpus Fractur väger 14 Lil och det öfrige förslagsvis 6 Lil." Troligen var det häraf, som Consistorium föranleddes att d. 27 Januarii 1728 ytterligare besluta, att Flodström borde gifva "ett tydeligare Memorial uppå det som bestålt blifvit och utnämna vid hvar punct Schmidts egne stylprof, så att han det väl kan begripa." Det tyckes således såsom äfven Schmidt skulle hafva

mindre redigt framställt sina vilkor; hvarföre han icke heller ännu undfick hvad han uppgifvit sig hafva att fordra, heldst äfven den längre tid, som förflutit sedan första afbetalningen skedde på ifrågavarande beställning, gjorde ett noggrannt genomgående af flere års räkenskaper nödvändigt, till vinnande af vederbörlig utredning om hvad så väl han, som hvar och en af dem, genom hvilka underhandlingen och varu- samt penninge-remisserne gått, hade fatt lyfta, eller ännu ägde att bekomma. Imellertid upptog Schmidt det af allt detta förorsakade dröjsmålet med slutligviden så illa, att han i bref, som vid Consistorii Session d. 29 Maji sistnämnde år upplästes, förklarade sig vilja sälja bort de för Universitetets räkning gjutna nya Stilarne, så framt han ej straxt finge sin betalning. Consistorium beslöt då att anmoda förut nämnde Handlande Heldt om anskaffande af erforderlig vexel, som pröfvades kunna fås för 635 Daler Kopp. mynt, hvilken summa fördenskull kort derefter utanordnades och af honom lyftades, tillika med de 110 Daler, samma myntsort, som han sjelf, enligt ingifven räkning, hade att fordra för genom Commissionär i Lübeck bestridda umgälder i denna affaire, under förbehåll om ersättning för ännu blifvande Expenser och 3 Procents arfvode. Likväl blefvo Schmidts påståenden ingalunda med detsamma godkände, såsom ses, ibland annat, af följande ord i Protocollet för d. 21 Aug. samma år: "Angående den förmedelst Skriftgiutarens i Lübeck hijtsände differente och otydelige räkningar förorsakade förtreteligheten slöts att Svänska Residenten där uti Lübeck Herman Fock anmodes att ställa den saken till rätta." Huruvida härigenom nagot vunnits, är obekant; men äret derefter, i Maji månad, då nya Stilarne voro till Åbo ankomne, slutades Liqviden dermed, att 78 Lübske mark, som Siemers förskjutit till Schmidt, blefvo enligt den förstnämndes anvisning utanordnade till Handlanden Frans Kock, Gudmundsson, i Åbo, jemte frakt och andra omkostnader, uppgående till 42 Dal. Kopp. mynt, samt 3 Dal. 4 ören, såsom uppgåld på myntet, hvilket allt sammantaget är i räkenskaperne utfördt till 227 Dal. 30 ör. sistnämnde myntslag.

Universitetets utgifter för de ifrån Lübeck requirerade nya Stilarne, utgjorde saledes inalles 1197 Dal. 30 ör. Kopparmynt, en summa, till hvars betäckande ingen tillgång var att paräkna i den Fond, ur hvilken, såsom förut visadt är, alla kostnader för Boktryckeriets underhåll borde bestridas; hvarföre man nödgades tillgripa de medel, som funnos besparade från de föregående åren, under hvilka flera Professioner på en gang stått lediga, ehurn trängande innehafvarenes af de öfrige lärostolarne och andre tjenstemåns vid lärosätet behof af undsättningar ifrån samma källa ock var, enär deras aflöning under samma tid icke kunnat till fullo utgå. Tages nu i beräkning, att en, såsom det tyckes, icke ringa mångd gamla Stilar äfven blifvit till utbyte använd eller omgjuten, kan man icke föreställa sig annat, än att Universitets Tryckeriet ändteligen kort före Floostrooms afgång blifvit på

Historiska underrättelser om Boktryckeriet i Finland. 773

bästa sätt försedt åtminstone med allt hvad som derstädes dageligen behöfdes.

I sammanhang härmed bör äfven visas, huru Consistorium Academicum, under denne Boktryckares tjenstetid, var omtänkt att skaffa lärosätet rättighet att, med alla andras uteslutande. låta trycka de för allmänheten nödigaste böcker, för att sälunda vinna nya medel till Universitets Tryckeriets underhåll. Ibland de Desiderier, som detta Consistorium ville hafva vid Riksdagen år 1723 framställde, ingick nämligen en underdanig anhållan, att Kongl. Maj:t täcktes af gunst och nåd förunna Universitetet, framför någon annan, Privilegium att upplägga sådane böcker, som i Storfurstendömet pröfvades nödige, såsom Catecheser. Psalinböcker och Biblar på Finska språket, med bifogadt förbud, vid confiscation och straff till görande, att annorstådes aftrycka dem, så mycket heldre, som Consistorium kunde försåkra, att sådane böcker då icke komme att blifva så felaktige, som de i Stockholm upplagde, hvarest ingen "accurat Corrector i samma tungomâl så stadigt" kunde finnas att tillgå, befunnits vara, och den Avance, som eljest komme enskild person till godo, kunde bereda både Tryckeriet och Bibliotheket tillgång till ömsesidiga understöd samt således märkeligen befrämja det allmännas nytta. Dessa Desiderier, som till Stockholm afsändes i bref af d. 18 Febr. sagde år till Universitetets Canceller, vägrade dock Procancelleren, Biskopen Doctor Witte, hvilken derstädes bivistade Riksdagen, att underskrifva, af uppgifven orsak, ibland annat, att

han Pormenade bemålde achallan rora en affaire, om hvilken det egenteligen tillkomme Biskapen och Domkapitlet att foranstalta. sasom ock beslut harom blifvit, före hans afresa ifrån Abo, i Kapitlet fattadt, och att Consistorium Academicum icke ägde såkra utvågar till ett så ansenligt förlag, som till företaget fordrales; hy will annu komme, att framli Ine Biskop Gezelii afvingar allaredan for Boktryckaren Merckell utverkat Kongl. Privilegium per slike bocker. Med anledning hard rable Atven Cancelleren, i skrifvelse af d. 18 nästföljande Martii, till ifrågavaran le punkts uteslutin le ift in den un lerdaniga ansôkningen. Vid sistbemålde Consistorii sammantråde d. 26 i samma månad upplystes dock, att man i Consistorio Ecclesiastico kommit öfverens allenast att skaffa berörde tryckning ifrån Merckell och türhehallit sig inseen let ofver densamma, hvarjemte klayades, att en hop Finska bocker blifvit itran Reval Lemligen inforde och spridde thland allmagen i Wilburgs Stift; hvarfore ook de fleste af då nårvarande ledamöter ansågo skål icke förekomma till sakens nedläggande, samt Consistorium, i skrifvelser af samma dag till de begge Styresmännen, icke allenast betygade, att det icke hade for afsigt att bereda någon præjudice, utan ock förklarade. att det vidblefve sin mening, isynnerhet på den grund, att, såsom orden Ivda i brefvet till Cancelleren, "rättigheten af ett sådant privilegii âtniutande blott dependerar af K. M:ts Nåd, som ingen i synnerhet kan jure seijas tillagdt wara, utan hvar af den ena. som mel salant har tillfalle att umga, eij mindre an den an ha

har frijhet att söka sig delachtig göra, hvar vid doch det allmenna bästa om en större benägenhet, än ett enskylt interesse sig i underdånighet altijd kan försäkrad göra, så att om berörde privilegium undangår Boktryckaren Merckell för öfverklagad fehlachtighet uti dess obligations fullgiörande, det samma då för Academiens stora behof skull, bör till dess underhielpande med alt skähl sökas; ty ändoch Hh. Biskopparnes den äldre och yngre Gezelii huus, för nödvändigheten att underhålla tryck till deras Bibels opläggande, det samma ägt, följer doch der af intet, att det under Biskops stolen hördt." Om och huru ansökningen i denna del sedermera må hafva blifvit till högsta magtens afgörande öfverlemnad, känner jag icke, men väl, att Biskop Witte skall vid samma tid i underdånighet anhållit, att såsom hans Antecessorer, Biskoparne i Åbo, haft tillstånd att uti deras egna Tryckerier upplägga åtskilliga andeliga böcker, honom måtte i Nåder tillåtas icke allenast att, sedan det Boktryckaren Merckell meddelade Privilegium tilländagått, trycka de deruti specificerade böcker, utan ock dessförinnan upplägga en Bibel in quarto på Finska språket, uti ett nytt Tryckeri, som Biskopen ärnade införskrifva. Allt detta är nämligen uppgifvet i det Kongl. Privilegiibref, som med nådigt bifall till berörde anhâllan blef d. 9 Julii samma âr 1723 utfärdadt; hvaremot ingen Resolution på Consistorii enahanda hemställan ibland Universitetets handlingar förekommer, eller finnes omtalad.

Hvilka hinder sedermera afhallit Biskopen och Progradleren ifran att inråtta nagot Boktryckeri, han icke med visshet sågas; men sannolikt är, att han, som ditintills altför kort tid vistats i Finland, derefter vunnit öfvertygelse derom, att de svårigheter, hvilka han forut uppgifvit sasom utestingande hoppet om nagon formon for Universitetet af det begånde Privilegium. icke kunde af honom sjelf lättare öfvervinnas, och isvnnerhet, att ett nytt Tryckeri i detta land knappt kunde bära sig, ännu mindre blifva lonunde, atminstone medan Merchells rattighet fortfore, samt fordenskull icke gjort, sasom bekant år, naget fauk af sitt erhållna Privilegium. For ödrigt och da chvanberörde und i Privilegiibrelvet for Biskop Witte antyda, att Merchell skulle haft rättighet att trycka flere i has Privilegium specificerade böcker, synes här böra anmärkas, att dessa ord troligen härröra af något misstag och i sjelfva verket icke åsyfta något annat tillständsbref, än det, som angår blott den såkallade nya Finska Psalmboken, hvilket utfinlades d. 31 Mart. 1722 och. ehuru stäldt på endast tolf års tid, finnes tryckt framför en i Stockholm och Abo, hos Merckells enka, 1747 tryckt uppliga i long 12:0 of denna Psalmbok, samt egenteligen icke innefatter annat, an en Prolongation på namnde tid, jemte Transport på bemålde Boktryckure och hans arfyingar, af den uteslutande råttighet, som Biskopen Joh. Gezelius den gengre på lika sått forut erhallit, forsta gangen, med inskränkning till uppbiger i lang 12:0 och 24:0, d. 12 Dec. 1696, men sedermen d. 23 Junii

Historiska underrättelser om Boktryckeriet i Finland. 777

1700 utsträckt till alla Formater och d. 2 Aug. 1710 förlängd. hvarje gång på tolf år.

Biskop Witte upplesde också icke på långt när den tid. då det på Boktryckaren Merckell och hans arfyingar ställda Privilegium skulle upphöra att gälla, och tyckes snart nog hafya förändrat sin åsigt äfven om olämpeligheten för Universitetet att ingå uppå det företag, som han förut velat hafva sig sjelf förbehållet. Före sin död skall han nåmligen hafva lofvat på detta Läroverk transportera ofvanbemålde Privilegiibref af d. 9 Julii 1723, till fullgörande af hvilket löfte äfven hans enka skrifteligen d. 22 Junii 1728 förklarade denna Transport nu vara att anses såsom verkställd, så framt Hans Kongl. Maj:t täcktes dertill lemna nådigt bifall. Sådan öfverhetlig stadfästelse fann jemvål Consistorium Academicum så mycket mera nödig, som i nämnde Privilegiibref ingen viss tid var utsatt för dess giltighet, efter det Merckells rätt upphörde och saken dessutom i och för sig sjelf berodde af Kongl. Nad; hvarföre skrifvelse, åtföljd af Enkefru Biskopinnans nyssnämnde öfverdragelse-skrift, d. 28 i samma manad till Canceller afgick, med anhållan, att Hans Excellence ville hos Konungen utverka icke allenast Confirmation uppå öfverdragelsen, utan ock tillåtelse för Universitetet, att framgent, med hvar och en annans uteslutande, förblifva i besittning af ifrågavarande rättighet. Till stöd för denna anhållan åberopades i det närmaste lika skäl, som 1723 blifvit för enahanda ändamål anförde, med tillägg, att sedan Åbo Universitets Tryckeri blifvit

med det Pernauska förökadt och jemväl med nva Stilar försedt. vore dess behof af nagon inkomst, hvarmed det kunde stillse underhallas i lika godt skick, storre an forut, hvaruppa ock Biskop Witte förnämligast fästat afseende, da han forklarat sig vilja at Universitetet cedera sitt Privilegium. Att man nu. likasom forberorde gang, framfor allt var angeligen att utestänga agaren af det forra Gezeliska Tryckeriet, Kongl. Bohtryck een Merckell, ifrån den täflan, som ånda ifrån samma Tryckeris anläggning varit for Universitets Tryckeriet sindeles menlig, ses af ett bref, som tillika afgick, ifrån davarande Rector, på Consistorii vagnar, till Professoren Björklund, hvilken da vistades i Stockholm, innehållande begåran, att åfven han ville bevaka denna Universitetets angelägenhet, hvarvid i synnerhet tillses matte, att Merckell ei finge genom nagon ny ansokning om Prolongation for sig, gora Universitetet forfang. Med allt detta utrattades likvil ingenting: tv Regeringens, under Konungens franvaro, d. 1 nastfoljande October meddelade svar på Grefve Hunss underdaniga hemstållan i årendet innehåller, att emedan Konung Cant XII redan år 1705 d. 17 Maji en gång för alla resolverat, det inga förslag skulle antagas, syftande på nya Privilegiers erhallande for att upplägga Biblar. Psaim- eller andra dylika böcker, sedan da redan gifne Privilegier tilländalupit, och då de, som sedermera åren 1722 och 1723 blifvit för Boktryckaren Merckell och Biskopen Witte utfärdade, hade sin grund i davarande bevekliga omståndigheter, enår i Finland, som så nyligen blitvit ilran frammande öfvervälde befriadt, då i förstone ingen tillgång på andeliga böcker funnits, hvartill komme, att sistnämnde Privilegium vore stäldt på Biskopens person allena och icke på hans arfvingar; fördenskull hade det funnits betänkeligt, att bevilja den sökte Confirmationen. Derjemte förklarades, att numera, sedan landet efter några års fredslugn kommit i sitt förra stånd, skulle ofvanberörde Kongliga Resolution på det nogaste iakttagas.

Att visa huru litet tillfredsställande Finlands tillstånd likvål i sjelfva verket var, äfven om man inskränker sig till att betrakta endast medlen till Åbo Universitets Tryckeris tillbörliga underhallande i framtiden, hörer icke till berättelsen om den Period af bemälde Inrättnings Historia, som slutas med Boktryckaren Flodströms afträdande ifrån dess förvaltning; och emedan svårigheterna i samma afseende under hans korta tjenstetid varit ännu större, återstår nu så mycket mindre att tillägga om detta Tryckeris verksamhet under samma tid, som han alltför ofta försummade äfven det, som kunnat med för handen varande medel åstadkommas. Af sådan orsak synes t. ex. det arbete, hvilket Handlanden Schele, såsom förut omförmäldt är, varit sinnad att upplägga, aldrig hafva utkommit, då icke en gång dess Titel finnes uppgifven i Protocollerne, rörande den emot Flodström, mera än tre år efter det han fått Manuscriptet, började Action för alla hans förseelser, och många ibland det ringa antal skrifter, som han tryckt, bära, såsom man säger, syn för saga, om

hans vårdslöshet. Uti dem faller trycksvärtans tunnhet och blekhet framför allt i ögonen, såsom ett bevis tillika på hans af fattigdom förorsakade oförmögenhet att uppfylla sina skyldigheter.

Till uppräknande af de mig bekanta skrifter, som under bemålde Boktryckares tjenstetid utgatt ifrån Universitets Tryckeriet i Åbo, utom Akademiska arbeten och allmänna Påbud af flere slag, hvilkas tryckning alag honom, medan han uppbar den för sadant behof a Lands-Cancellie Staten upptagne lön, skulle visserligen icke stort utrymme erfordras; men de fleste äro små tillfällighets stycken, bröllops- och begrafnings-skrifter, som icke förtjena någon uppmärksamhet, om icke för det att de numera äro ganska sållsynta. Här uppgifyas fördenskull endast *Phædri* Fabularum AEsopiarum, Libri Quinque, Secundum recensionem optimam cum indice Fabularum ad calcem uddito, In usum Scholarum ac Studiosæ, in Patria, pubis denuo editi, Cura atq. sumtibus Christiani Trapp. Aboæ, Impress. E. M. Flodström, Reg. Acad. Typogr. Cio ioccxxir. 8:0 och Articulorum fidei Synopsis Biblica In usum Scholastica Juventutis, sub Imperio Regni Svecice viventis collecta. Eller Trones Artiklar, Korteligen utaf den Helige Bibel författade Af Olavo Laurelio, Biskop i Wüsteraas. Abo, med Christian Trapps bekostnad Tryckt af E. Flodström, K. Acad. Boktr. 1728. 8:0, utom hvilka näppeligen andra arbeten, som egenteligen kunde få namn af böcker, blifvit af ifrågavarande

man tryckte, om icke tilläfventyrs en Grammatica contracta, af hvilken ofvannämnde Trapp, Bokbindare i Åbo och medelst Kongl. Privilegiibref af d. 30 April 1723 berättigad att icke allenast såsom sådan, utan ock såsom Bokförare, uti öppen bod eller boklåda dersammastädes hålla bundne och oinbundne böcker till salu, d. 19 Decemb. 1726, uppå gjord ansökning, erhöll Consistorii Academici samtycke att få låta hos Akademie Boktryckaren upplägga några hundrade exemplar, för Skolornes behof, då det uppgafs vara stor brist på densamma, så i Stockholm, som i Åbo.



REMARQUE

SUR LE PRINCIPE RELATIF À LA THÉORIE DES PARALLÈLES PROPOSÉ P. 351 ET SUIV. DE CE TOME;

PAR

N. G. DE SCHULTÉN.

(Lu le 7 Avril 1851.)

Dans une note insérée au Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg (T. IX, N:o 4, du 21 Sept. 1850), M. Bouniakovsky, Membre de l'Académie, a bien voulu vouer une attention particulière au principe dont il s'agit, en ne l'approuvant cependant pas, puisqu'il lui a paru sujet à des objections sérieuses, exposées, en propres termes, comme il suit:

"Affirmer que le rapport de la surface d'un cercle décrit "du rayon 2r à celle du rayon r est une quantité indépendante

"de r "), c'est exclure, sans que rien n'y autorise, une infinité "de courtes dont les surfaces pourraient fort bien ne pas jouir "de la propriété que l'Auteur trouve si évidente pour le cercle. "En effet, supposons que nous avons une courbe dont le para-"mêtre unique soit r; contruisons la même courbe pour le pa-"ramètre 2r. Aurons nous le droit de dire que le rapport des deux "surfaces de ces courbes, limitées de la même manière, n'exce-"dera pas un nombre donné, quel que soit r: assurément non. "et l'on pourrait présenter une infinité d'exemples du contraire. "Or, on peut se demander, quelle est la raison qui porte à ad-"meure, pour le cercle. la propriété énoncee plus haut, quand "on est certain qu'elle n'a pas lieu pour une infinité de courbes? "Le cercle ne se trouverait-il pas dans le nombre de ces derniè-"res? Ces questions, qui sont autant de doutes, doivent se présenter tout naturellement en abordant la théorie des parallèles. "en tant qu'elle forme le point fondamental de la Géométrie élé-"mentaire. Par cette raison même. l'introduction à cette science. "ou ses élements, doivent être étrangers aux recherches qui con-"cernent la comparaison, même superficielle, des surfaces limi-"tees par des lignes droites ou courbes, comme celle, par exem-"ple, qui entre dans l'énonce du principe de M. Schulten."

^{*)} Je dois faire observer que le principe en question ne porte pas que le rapport même des deux cercles soit indépendant de leurs rayons, ce qui certainement eut été beaucoup plus contestable, mais qu'il l'établit seulement de la limite de ce rapport.

S.

"Pour mettre dans toute leur évidence les observations que "nous venons de faire, nous allons examiner analytiquement les "conséquences auxquelles conduit la proposition admise par l'Au"teur de la note citée, en prenant, au lieu du cercle, une courbe "quelconque."

"Soit r le paramètre de la courbe que l'on considère, etc."

Suivent des développements analytiques, par lesquels M. Bouniakovsky prouve qu'il y a une infinité de formes d'une fonction f, où cette fonction ne satisfait pas à l'inégalité

$$\frac{f(2r)}{r} < K$$
,

K représentant un nombre abstrait aussi grand que l'on veut. mais indépendant de r⁵); et par toutes ces raisons il lui semble impossible d'admettre, pour point de départ dans la théorie des parallèles, le principe en question.

Les objections de M. Bouniakovsky se réduisent, comme on voit. à une seule, savoir celle. qu'il faudra révoquer en doute la propriété en question du cercle, parce qu'il est douteux. et même impossible, qu'elle ait lieu pour toute autre courbe dont l'équation. comme celle du cercle, renfermerait une seule con-

^{*)} Cette vérité analytique, qui certainement est indubitable, se démontre sur-le-champ par la supposition de $f(r) = a^{\frac{r}{2}(r)}$, où a > 1 et $\mathfrak{F}(r)$ désigne une fonction de r telle que $\mathfrak{F}(2r) - \mathfrak{F}(r)$ croît avec r au delà d'une limite quelconque.

stante indéterminée, ou paramètre. Il n'y aurait donc aucune vérité géométrique parfaitement évidente pour le cercle, qui ne devrait l'être en même temps p. ex. pour la parabole, qui se détermine, ainsi que le cercle, par un paramètre unique? Il faudrait p. ex. révoquer en doute que le cercle soit une ligne fermée de toutes parts, parce que la parabole ne jouit pas de cette propriété? Cette remarque seule suffit, ce me semble, pour ôter toute force aux objections détaillées ci-dessus, et me dispense de m'y arrêter davantage.

Ayant entamé ce sujet, je ne dois cependant pas me restreindre à cette considération toute négative. Je vais profiter de l'occasion présente pour soumettre au jugement des géomètres les raisons qui m'ont porté à recommander à leur attention le principe dont il s'agit.

Dans la Géométrie élémentaire on ne considère d'autres lignes que la droite et la périphérie du cercle, ni d'autres surfaces que le plan et les surfaces du cylindre, du cône et de la sphère, et les propriétés tant axiomatiques que démonstrables de ces lignes et de ces surfaces doivent être inférées de leur définitions seules, sans égard aux propriétés d'autres lignes et surfaces quelconques. C'est ainsi que les axiomes fondamentaux relatifs à la coïncidence des droites qui ont deux points communs, à celle des plans qui en ont trois de communs, à la propriété de la droite d'être plus courte que toute autre ligne entre les mêmes points, etc. reposent immédiatement sur les idées primitives de la ligne droite et du

plan, lesquelles suffisent pour admettre, relativement à cette ligne et cette surface, les propriétés en question, à l'exclusion d'autres lignes et surfaces quelconques qui pourraient du reste avoir avec celles-là plus d'une propriété commune. L'évidence ou la nonévidence du principe géométrique proposé, suivant lequel un miltion, un billion, ou autre nombre arbitrairement grand mais déterminé de cercles égaux quelconques doivent se trouver ensemble plus grands qu'un seul cercle décrit d'un rayon double de celui des premiers, ne doit donc pas être jugée par des raisonnements compliqués sur des courbes quelconques qui auraient quelque propriété commune avec la periphérie de cercle, mais d'après la définition seule du cercle, laquelle nous apprend que les dimensions du second cercle sont en tout sens doubles de celles de chacun des premiers. Or, la grandeur d'une figure plane quelconque ne dépendant que de celle de ses dimensions en tout sens, n'a-t-on pas le droit d'admettre que la limitation du rapport des dimensions de deux figures planes en toute direction entraîne celle du rapport même de ces figures, et que, par conséquent, un cercle quelconque, dont les dimensions sont doubles de celles d'un autre cercle, ne saurait être indéfiniment (c'est-à-dire un nombre de fois plus grand qu'un nombre donné quelconque) plus grand que celui-ci? N'a-t-on pas le droit d'avancer qu'un tel principe géométrique est d'une très-grande évidence, qui paraît même comparable à celle de quelques autres axiomes regardés généralement comme incontestables, p. ex. celui que la droite.

définie de la manière d'Euclide (c'est-à-dire ne déviant d'aucun côté entre ses points), est plus courte qu'un arc de cercle compris entre les mêmes limites?

C'est, ce me semble, de ce point de vue que doit être considéré l'axiome dont il s'agit. En s'ecartant de cette voie simple et naturelle pour apprécier l'évidence des principes de la Géométrie, en abandonnant les définitions des lignes et des surfaces anaquelles se rapportent ces principes, pour les juger par leur application à d'autres lignes et surfaces, on priverait non seulement la Géométrie d'un de ses avantages les plus éminents, savoir la clarte, mais on se trouverait bientôt réduit à révoquer en doute les vérités les plus évidentes de cette science, et l'éditice géométrique, miné ainsi dans ses fondements les plus indispensables, s'écroulerait de fond en comble.

Ce qui précède fournit la réponse d'une autre remarque de M. Bouniakovsky, à laquelle je ne m'arrêterais pas, si l'examen de cette observation n'était étroitement lié à celui du principe géométrique en question. M. Bouniakovsky soutient

[&]quot;) Par cela même que les axiomes ne sont pas susceptibles de démonstration rigoureuse, il s'ouvre un champ très-vaste à des opinions diverses sur leur évidence, et, à plus forte raison, sur une comparaison quelconque de cette évidence. Aussi, celle que je viens de me permettre ne saurait elle avoir d'autre sens que celui, qu'en cherchant à se rendre compte de ce dernier axiome on ne trouvera guère moins de difficulté à le mettre à l'abri de toute objection, qu'à établir, par le raisonnement ci-dessus, celui qui est l'objet de cette discussion.

dans la note citée, "qu'en partant d'autres vérités du même genre. tout aussi évidentes en apparence, mais pour le fond également sujettes à contestation, on pourrait démontrer la théorie des parallèles d'une manière encore plus simple" que je ne l'ai fait. Pour prouver cette assertion, M. Bouniakovsky admet que l'on puisse toujours prendre le rayon d'un cercle assez grand, pour que la surface du quart de ce cercle soit plus grande que la figure plane qu'on obtiendrait en répétant un nombre déterminé de fois celle qui serait limitée d'un côté par une droite de longueur constante ayant l'un de ses bouts au centre du cercle, de deux autres côtés par les perpendiculaires sur cette droite, élevées à chacun de ses bouts, et, du quatrième, par l'arc du cercle en question compris entre ces deux perpendiculaires; et, au moyen de ce principe, il démontre en effet le théorème fondamental de la théorie des parallèles plus simplement qu'il n'a été fait p. 352-354 de ce Tome. Cela reconnu, je me permets d'ajouter que, pour le principe lui-même sur lequel s'appuie cette démonstration, je ne saurais être de l'avis de M. Bouniakovsky. J'ose affirmer, que ce principe est en même temps moins simple et moins évident que celui dont il a été question dans ce qui précède. Moins simple, puisque non seulement l'énoncé en est plus compliqué, mais que les notions mêmes, sur lesquelles il repose, le sont aussi, la moindre des figures comparées étant ici une portion de cercle terminée par trois droites et un arc de cercle au lieu d'un cercle entier: moins évident,

puisque la portion de cercle en question n'étant pas symétrique, on ne saurait se rendre compte de la vérité axiomatique de ce principe aussi clairement que de celle de l'autre.

En terminant ces remarques je dois ajouter que, malgré l'évidence du principe souvent cité, je n'ai cependant pas proposé de fonder sur lui la théorie des parallèles dans une exposition systématique des éléments de géométrie. Je partage l'opinion de M. Bouniakovsky que la considération des surfaces de cercles ne semble pas naturelle dans la théorie des parallèles et je souhaiterais que cette théorie pût, dans les systèmes de géométrie, être basée avec le même succès sur quelque autre axiome plus étroitement lié à l'idée primitive de la ligne droite. Tout ce que j'ai cru devoir mettre en avant tant ici, que précé lemment, c'est que le principe dont il s'agit mérite d'être remarqué à cause de son extrême évidence. Je ferai voir une autre tois qu'il pourre de plus être utilement employé dans des recherches ultérieures sur la théorie des parallèles.

NOTE

SUR LA THÉORIE DES PARALLÈLES,

PAR

N. G. DE SCHULTEN.

(Lu le 10 Nov. 1851.)

Les considérations sur la théorie des parallèles exposées ci-dessus p. 351-354 m'ont conduit à deux résultats relatifs à cette théorie, que je croirais nouveaux et dignes d'être connus.

Le premier est celui, que la théorie en question pourrait être développée rigoureusement, si, indépendamment d'elle, on connaissait une limite supérieure du rapport de la périphérie au diamètre dans un cercle quelconque.

Pour le prouver, je fais d'abord observer que la démonstration de l'égalité de la somme des angles d'un triangle quelconque à deux angles droits, qu'a donnée Legendre dans la 19^e proposition du Livre 1^r de la 12^e édition de ses Éléments de Géométrie, bien qu'elle ne remplisse pas le but de l'illustre auteur, établit du moins rigoureusement que

100

La somme des angles d'un triangle quelconque ne surpasse pas deux angles droits *). (1).

De cette vérité résulte cette autre:

Tout angle contenu dans un demi-cercle quelconque ne surpasse pas l'angle droit. (2).

Un angle quelconque contenu dans un demi-cercle est égal à la somme des deux autres angles du triangle dont deux côtés comprennent celui-là, et la base est le diamètre du demi-cercle. L'angle en question est donc égal à la demi-somme des angles de ce triangle, et ne peut, par conséquent, surpasser un angle droit.

Du théorème (2) s'ensuit ultérieurement celui-ci:

Un triangle rectangle quelconque est moindre que le demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypothénuse du triangle. (3).

La vérité de cette proposition devient manifeste, si l'on suppose le demi-cercle décrit sur l'hypothénuse en question comme diamètre, du même côté d'elle que le triangle, puisqu'alors les cathètes du triangle, lesquelles d'après I: 17 des Élém. d'Euclide forment avec le diamètre des angles aigus, commencent, par suite de I: 19 des mêmes Élém., par se trouver en dedans du demi-cercle, et, en vertu de (2), ne sauraient se

^{*)} Cette remarque, que je n'ai pas trouvée dans les commentaires d'ailleurs nombreux de la démonstration citée, paraît néanmoins se présenter si facilement que je ne crois pas nécessaire d'en prouver ici la vérité.

rencontrer hors de lui, d'où résulte évidemment qu'aucun point du triangle ne pourra se trouver en dehors du demi-cercle.

Remarquons encore que de III: 7 des Élém. d'Eucl. se tire sur-le-champ le théorème suivant:

Un segment de cercle quelconque, moindre que le demicercle, est aussi moindre que le demi-cercle dont le diamètre est égal à la base de ce segment. (4).

Des théorèmes (3) et (4) résulte enfin immédiatement celui-ci:

Un secteur de cercle quelconque, moindre que le demicercle, est moindre que la somme des trois demi-cercles décrits sur les côtés du triangle isocèle dont les deux côtés égaux sont limites du secteur. (5).

Soit actuellement d le diamètre d'un cercle quelconque c, p la périphérie de ce cercle et e un entier déterminé et indépendant de d, tel que

Je vais faire voir que la connaissance du nombre e suffit pour démontrer rigoureusement le théorème fondamental de la théorie des parallèles relatif à la rencontre des obliques avec les perpendiculaires.

En effet, en désignant par k la corde de l'arc du cercle c de la longneur $\frac{1}{2c} \cdot p$, on aura

$$k < \frac{1}{2e} \cdot p$$
,

en vertu de cet axiome, d'une vérité incontestée, que la ligne droite est plus courte qu'un arc de cercle quelconque compris entre les mêmes limites.

Or, d'après la propriété du nombre e,

$$\frac{1}{2}d > \frac{1}{2e} \cdot p.$$

Done

$$k < \frac{1}{2}d$$
.

De plus, en représentant par s le secteur du cercle c correspondant à l'arc $\frac{1}{2c}p$, et par c' et c'' les cercles dont les diamètres sont respectivement $\frac{1}{2}d$ et k, nous aurons, en vertu du théorème (5),

$$s < \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c''$$
.

Donc, puisque $k < \frac{1}{2}d$, et par suite $\frac{1}{2}c' < \frac{1}{2}c'$, a plusforte raison

$$c < \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c',$$

 $< \frac{3}{2}c'.$

Or, en vertu de VI: 33 des Elém. d'Euclide.

$$c = 2e.s.$$

Done

$$c < 2e.\frac{3}{2}c',$$
 $< 3e.c'.$

L'entier déterminé 3e jouit donc de la propriété exigée dans le principe proposé p. 351 et suiv. de ce Tome, d'où s'ensuit qu'en remplaçant par cet entier le nombre e employé à l'endroit cité, on démontrerait exactement comme là la proposition fonda-

mentale en question relative à la rencontre de droites de longueur indéfinie.

Le second résultat, dout il a été fait mention au commencement de cette note, est celui, que la question des parallèles pourrait de même se traiter rigoureusement, si, indépendamment d'elle, on connaissait une limite inférieure de la somme des angles d'un triangle quelconque.

La vérité de cette remarque s'établit comme il suit.

Soit l la limite en question et e un nombre entier qui rende c.l plus grand qu'un angle droit. L'angle l étant de grandeur déterminée, le nombre e le sera aussi, bien qu'il puisse se trouver aussi grand qu'on voudra. Soit de plus c un cercle quelconque, c' le cercle dont le diamètre est la moitié de celui de c, s le secteur du cercle c dont l'angle central est $\frac{1}{3}l$, k la corde de l'arc de ce secteur et c'' le cercle dont le diamètre est k.

La somme des angles d'un triangle quelconque étant, par l'hypothèse, plus grande que /, l'angle d'un triangle équilatère quelconque surpassera 3/2. Or k est la corde de l'arc du cercle c relatif à l'angle central 3/2, et le rayon de ce cercle la corde de l'arc du même cercle relatif à un angle central qui appartient au triangle équilatère qui a ce rayon pour côté. Donc le rayon du cercle c sera plus grand que k, et par conséquent

$$c' > c''$$
.

De plus, d'après (5),

$$s < \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c' + \frac{1}{2}c''$$
.

Done

s < 3c'.

Or l'angle droit étant moindre que e./, quatre angles droits seront moindres que 12e.\(\frac{1}{2}\)/, et par conséquent, d'après VI: 33 des El. d'Euclide,

c < 12e.s.

Donc, à plus forte raison,

c < 12e.3c.

< 18e.c'.

Le nombre déterminé 18e jouit donc de la propriété supposée dans le principe géométrique cité plus haut, d'où résulte, ainsi que nous l'avons vu dans le cas précédent, immédiatement la démonstration du théorème fondamental de la théorie des parallèles.

Pour éclaireir ce qui précède par un exemple, supposons qu'indépendamment de la théorie des parallèles on se soit convaincu que le diamètre d'un cercle quelconque, pris 1000 fois, surpasse la périphérie de ce cercle, on que la somme des angles d'un triangle quelconque surpasse l'angle de 1". Cela posé, il sera clair par ce qui précède que la rencontre de deux droites quelconques, dont l'une serait perpendiculaire et l'autre oblique à une troisième droite, se prouverait exactement comme on l'a vu p. 352—354 ci-dessus, en attribuant seulement à la lettre e, dans le premier cas, la valeur de 3000, et, dans le second, celle de 5832018.

Les déductions précédentes conduisent, ainsi qu'on voit, à deux axiomes nouveaux analogues à celui de la page 351 de ce Tome, tous deux très-évidents, lesquels pourraient l'un et l'autre servir de base à la théorie des parallèles. Le premier pourrait s'énoncer ainsi:

Le diamètre et la péripherie d'un cercle étant désignés respectivement par d et p, on aura e.d > p, en prenant pour e un certain entier aussi grand qu'on voudra (p. ex. 1000, 1000¹⁰⁰⁰, etc.), mais d'une valeur déterminée et indépendante du diamètre d.

Le second, qui aurait l'avantage de ne pas faire dépendre la théorie des parallèles de la comparaison de l'arc de cercle et de sa corde, serait celui-ci:

La somme des angles d'un triangle surpasse toujours un certain ungle aussi petit qu'en rudra (p. ex. $\frac{1}{1000}$. etc. de l'angle droit), mais d'une grandeur déterminée et indépendante des côlés du triangle.



NATURALHISTORISKA OBSERVATIONER,

ANSTÄLLDA UNDER SOLFÖRMÖRKELSEN DEN 28 JULII 1851

AF

E. J. BONSDORFF.

(Föredr. den 13 Oct. 1851.)

Då jag sistförflutna sommar befann mig å min egendom Eriksberg i Uskela Socken af Åbo Län, och för tillfället hade besök af Teckningsläraren vid Universitetet Magnus von Wright. äfvensom Herr Julius von Wright vistades å stället, bägge utmärkte genom sitt varma nit för Fäderneslandets Fauna, ansågo vi tillfället till observationer, i sådan syftning som Herrar Professorer C. Sundevall och Wahlberg i Stockholm uti Kongl. Vetenskaps-Academiens öfversigt af dess förhandlingar för innevarande år föreslagit, icke böra lemnas obegagnadt. Resultatet af de anställda observationerna utbedjer jag mig att härmedelst få till Vetenskaps-Societeten öfverlemna, i det hopp att desamma, ehuru ganska få, dock kunna vara af något intresse.

Emedan himmeln hela dagen var fullkomligt klar och solskenet ganska starkt, anställdes redan middagstiden observationer a de naturalhistoriska föremål, hvilka skulle företrädesvis under solförmörkelsen observeras, och anmärktes: att blommorna af alla, till icke obetydligt antal a gardsplanen cultiverade, växter, deribland Convolvulus tricolor, Calendula pluvialis, Campanula Speculum och Eschholtzia, samt den i en närbelägen bäck ymnigt förekommande Nymphaea alba, voro fullkomligt utslagna; att svalorna och öfriga tama och vilda faglar) förhöllo sig säsom vanligt vid väckert väder under sommaren; och att bien dels med särdeles flit släpade hem sina förräder, och för sädant ändamål med liflighet flögo in och ut från kuporna, dels i klasar hängde ned från flusterbrädet. Då jag dessutom större delen af dagen var sysselsatt med insamlande af Diptera, hvilka ganska talrikt förefunnos af famillen Syrphici Fall, a särskilda blommor,

det egentliga boningshuset något aflägset, hönshus med en derinvid belägen afstängd hönsgård, hvarest under hela sommaren den ordning varit införd, att en del af hönsen jemte tuppen om morgonen släpptes ut i hönsgården, hvarest de, åtminstone då vädret var vackert, tillbringade hela dagen sysselsatta med att fänga insecter och larver m. m., dervid den yttre dörren till förstugan i hönshuset hela dagen hölls öppen, för att lemna desamma tillfälle att, vid inträffande oväder, deremot erhålla skydd. Till denna dagliga ordning hörde, under hela sommaren, att hönsen jemte tuppen vid den annalkande solnedgången sjelfmant begåfvo sig, genom den, såsom redan anmärktes, öppna yttre dörren, till hönshuset, der de plägnde invänta sköterskan, som om aftonen insläppte dem i de afskiljda hönshäckarna. Ganska sällan hördes tuppen gala om aftonen

men i synnerhet å den för tillfället blommande Spiraea salicifolia. var jag i tillfälle att observera med hvilken liflighet särskilda arter af ofvananmärkta Dipterfamille såsom: Volucella pellucens Meig. och plumata M., Helophilus pendulus Meig., Syrphus piceus Fall, arbustorum Fall. och floreus Fall., m. fl., utförde sina rörelser. Jag anser mig i detta afseende böra anmärka att nästan alla arter af anmärkta famille i allmänhet äro lifligare i sina rörelser ju varmare luften är och klarare solen skiner, i synnerhet om dermed är förenadt lugnt väder. Sådant var äfven förhållandet den 28 Julii, hvarföre de anmärkta flugorna voro utomordentligt lifliga i sina rörelser, så att desamma, der de befunno sig å blommor af Spiraea salicifolia, blott man förde fingret till närheten af blomman, genast med den största lislighet aflägsnade sig. Ehuru slägten och arter af denna famille hela dagen, så länge solen skiner på de anmärkta blommorna, förefinnas liftigt flygande från den ena blomman till den andra, aftager deras antal sednare på eftermiddagen, så att ett och annat individ kan observeras å sådana blommor som ännu träffas af solljuset, hvarefter äfven dessa försvinna. Jag har derföre icke under hela sommaren kunnat upptäcka något enda individ af denna famille tillbringande natten å dessa eller andra blommor, hvilket deremot ofta var fallet med âtskilliga Hymenoptera, sâsom arter af slägterna Bombus, Crabro m. fl. Utom anmärkta flugor förekommo äfven Trichius fasciatus, Leptura 4-maculata, maculicornis och viridis samt Cetonia aurata och aenea, bland Coleoptera, a blommorna af Spiraea salicifolia,

sasom vanligt med en lindrig rörelse af thorax och mundelarne krypande omkring på dessa blommor. För öfrigt må hår anmärkas, att före solförmörkelsens början luftens temperatur var ganska mild och en fullkomlig vindstilla rådande, så att vattenytan a den närbelägna insjön aldeles icke rörde sig, utan var spegelklar. Da omkring kl. 4 eft. midd. endast ett litet segment af solen var undanskymdt, utan att ännu någon märkbar förminskning af temperaturen eller dagsljuset hade inställt sig, begynnte vattenytan å den närbelägna insjön att krusa sig, hvarefter vinden småningom något tilltog i styrka med den tilltagande fördunklingen af solen. När förmörkelsen hade nått sin höjd, inställde sig en för känseln ganska obehaglig fugtig kyla, hvarutom ett ovanligt dagsljus, antydande en strid emellan ljus och mörker, intrådde, och löfven å de närbelägna björk- och asptråden dallrade på ett eget sätt med en lindrig, hemsk susning. Allt detta gaf naturen ett utomordentligt högtidligt, men dystert, utseende.

Hvad sluteligen de egenteliga observationerna vidkomma, anmärktes följande afvikelser från det vanliga förhållandet:

1:0 Då ett litet segment af solen, som jag skulle pröfva ungefär $\frac{1}{20}$ af solens yta, var fördunklad, observerades att alla blommorna af Convolvulus tricolor och Calendula pluvialis, samt till en stor del af Campanula speculum och Eschholzia, hade slutit sig. Bien flögo ännu ut och in i kuporna, och de anmärkta species af famillen Syrphici voro vål vida mindre lifliga

i sina rörelser än före förmörkelsen, men flögo ännu, utan surrande och långsamt, bort till en närbelägen blomma, då man med fingret vidrörde den på hvilken de befunno sig. Hönsen voro ännu ute i hönsgården, der de plockade på marken och svalorna flögo omkring med vanlig liflighet.

2:0 Då ungefär hälften af solens yta var fördunklad och lusten redan begynnte kännas kylig, begåsvo sig hönsen med tuppen i spetsen in i hönshuset, hvarest de förhöllo sig stilla utom tuppen som, emot sin dagliga vana om aftonen, begynte gala och fortsatte dermed med en synnerlig ifver ända till dess solförmörkelsen var i det närmaste förbi, då den åter, jemte sin hönsskara, förfogade sig ut till hönsgården. Nu hade äfven alla exemplar af Escholzia och Campanula speculum slutit sina blommor, och de ofvananmärkta blommorna af Convolvulus och Calendula pluvialis fortforo att vara fullkomligt slutna. De ofvananmärkta arterna af Syrphici, hvilka till ett betydligt antal funnos à blommorna af Spiraea salicifolia, voro sà betagna, att man kunde röra dem med fingret utan att de lemnade blomman å hvilken de befunno sig, men de kröpo annu omkring. Slägtena Bombus och Crabro bland Hymenoptera hade intagit ett quasi nattqvarter *) å oftanämnda blommor, hvilket var fallet med Tri-

^{*)} Slägterna Bombus och Crabro tillbringa ofta natten å sådana blommor, hvilka utgöras af flera mindre förenade med hvarandra till en klase eller mer och mindre rik blomvippa, och krypa härvid emellan de mindre blomklaserna, der de lägga sig i ro, sålunda att de böja kroppen så att

chius fasciatus. Lepture 4-m culata viridis och macraic ruis, sand Cetonia aurata och aenea.

3:0 Då solförmörkelsen hade framskridit så att blott I af solen återstod, och närmade sig sin culmination, anmärktes alla blommor såsom förut slutna och ofvananmärkta arter af insecter vom à bog grad könslobban si un de icke sjelfmant mode sig fron stället. Då man t. ex. med fingret vidrorde de sorut anmärkta arterna at femillen Syrpkiei, krôpo de alfdeles iche omkring, utur kunde man med fingret föra dem omkring blumman, utan att de gjurde det minste forsåk att undkomma sin förförjere. Blott då man langsamt finde dem met fingret framitt, så att de uppn dde runden af blemmen och skales vom nim att nedfalla på merken, gjorder at desamma nigra anstrångande röreber med littlema att hills sig fast. De ofvancomirkte orterna at Leptura hole krupit in emellan blommorna, såsom förhållandet är vid regnvåder och sent our abuneau och Cennia musta lig mörlig på Mommun. Sårde es anmiriminges indi var ett par at Trichius tascittus, hvilket jag de två föregående dagarna var i tillfälle att observera i copulation). Dessa hade neml. nu, utan att skiljas, krupit in emellan blommorna af Spiraea salicifolia. der de lago likasom i fullkom-

munnen föres met anus. De anmärkta Coleoptererna krypa a ver et till a station of the station of

[&]quot;) Jag har all anledning att tro att det par af Trichius jag under solförmörkelsen var i tillfälle att observera, var samma par.

lig dvala, utan att röra sig. Tog man dem emellan fingrarna, rörde de icke en gång sina stridulations-organer, såsom eljest alltid är fallet då man under vackert väder tager en dylik insect emellan fingrarna. Bien åter kröpo alla i sin kupa, både de som voro sysselsatta med arbete, och de som i form af en klase hängde under flusterbrädet *). Svalorna åter förhöllo sig alldeles såsom vid annalkande åskväder **). De flögo neml. oroligt omkring öfver säfven och hvassen i träsket, samt läto höra sitt vid annalkande fara vanliga läte.

Anmärkningsvärdt var att ett par vildgäss (Anser cinereus), hvilka under sistförflutna vår blifvit tagna såsom små ungar i dundrägt och nu voro i det när maste fullfjädrade samt utmärkta genom en ovanlig grad af tamhet, likasom ankorna och de tama gässen, icke visade det ringaste tecken dertill att de voro af solförmörkelsen på något sätt besvärade.

Då solförmörkelsen var helt och hållet förbi, öppnade sig åter blommorna af de arter hvilka i detta hänseende varit observerade; blefvo de anmärkta arterna af famillen Syrphici mera rörliga, dock icke såsom vanligt vid vackert väder; begynte bien åter att flyga ut och in i kuporna; samt upphörde tuppen att gala. Äfven svalorna förhöllo sig såsom vanligt.

Dessa anförda observationer äro icke många, men, såsom jag vågar påstå, säkra; och må det sluteligen tillåtas mig att i af-

^{*)} Observerades af bröderna von Wright.

^{**)} Observerades af bröderna von Wright.

seende å de observerade insecterna anmärka att dessa genom sina lilliga rörelser utmärkta små djur genom berörda naturphænomen bælvo helt och hallet förändrade till sitt skaplynne, ja hastigt ölverraskade af nattens oförmodade intrådande, så att de teke hunno ölvergifva blommorna å hvilka de om dagen vistades, för att söka sitt vanliga för forskaren undangömda nattläger. Mig föreföll det säsom skulle de, helt oförmodadt af den intråffade soförmörkelsen ölverraskade, blifvit tvungna att bivouaquera på stållet.

HÄRLEDNING

AF EN SATS FÖR BERÄKNINGEN AF EN SFERISK ZON,

AΣ

W. E. NEOVIUS.

Studerande.

(Föredr. den 18 Nov. 1850.)

Om en cirkel, hvars equation år

$$x^2 + y^2 = r^2$$

vrider sig omkring x-axeln, så finnes rotationsytan u emellan gränserna x' och x'' enligt formeln $u=2\pi r(x''-x')$, eller en sferisk zon är lika stor med bugtiga ytan af en rät cylinder, hvars bas är sferens storcirkel och höjd zonens höjd. Införas, genom eqvationerna

$$x'^{2}+y'^{2}=r^{2}$$
, $x''^{2}+y''^{2}=r^{2}$, $x''-x'=h$,

storheterna y', y'' och h i stället för r, hvilken, då zonen betraktas såsom gifven i och för sig, är obekant, så erhålles

$$u = \pi \sqrt{y'^2 + y''^2 - 2y'^2 y''^2 + 2h^2 y'^2 + 2h^2 y''^2 + h^4},$$

eller

$$u = \pi \sqrt{(y' + y'')^2 + h^2} \cdot \sqrt{(y' - y'')^2 + h^2}$$

Radikalerna i denna formel beteckna de största och minsta afstånden emellan periferierna af zonens baser. I sjelfva verket, om y' och y'' oberoende af hvarandra vrida sig omkring x-axeln, så att de göra vinklarna φ' och φ'' med xy-planet; så blir afståndet emellan deras ändpunkter

$$\sqrt{h^2+y'^2+y''^2-2y'y''}\cos(\varphi'-\varphi''),$$

som är störst och lika stor med

$$\sqrt{(y'+y'')^2+h^2}$$

om $q'-q''=180^\circ$, samt minst och lika stor med

$$\sqrt{(y'-y'')^2+h^2}$$

om q'-q''=o. Den anförda formeln för beräkningen af en sferisk zon leder således till följande sats: "En sferisk zon är lika stor med en ellips, hvars halfva större och mindre axel är det största och minsta afståndet emellan periferierna af zonens baser;" och innefattas häruti, såsom speciella fall, tydligen de be-

kanta satserna: "Ytan af ett sferiskt segment är lika stor med en cirkel, hvars' radie är afståndet emellan basens periferi och segmentets kulminationspunkt", samt: "Hela sferens yta är lika stor med den cirkel, hvars radie är sferens diameter."

lfrågavarande sats kan äfven härledas ganska enkelt utur geometriska grunder; men vi anse oss icke böra förlänga denna lilla uppsats med anvisningen härtill.



NOTE

SUR UNE MODIFICATION RÉCEMMENT PROPOSÉE À LA FORMULE BAROMÉTRIQUE DE LAPLACE;

PAR

N. G. DE SCHULTEN.

(Lu le 10 Juin 1850.)

La modification dont il s'agit, communiquée par M. Babinet à l'Académie des sciences de Paris le 18 Mars 1850, a été annoncée comme il suit *).

"La formule de Laplace est

$$z = 18393^{\text{m}} \left(\text{Log } H - \text{Log } h \right) \left(1 + \frac{2(T+t)}{1000} \right)$$

"Pour des hauteurs moindres que 1000 mètres (et même pour des hauteurs beaucoup plus grandes quand on n'a besoin que de résultats approximatifs), on la transforme dans la suivante

$$z = 16000^{\text{m}} \left(\frac{H-h}{H+h}\right) \left(1 + \frac{2(T+t)}{1000}\right)$$

^{*)} Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences T. XXX, p. 309.

"Si, par exemple, on avait

$$II - h = 10^{\text{min}}, II + h = 1500^{\text{mm}}, T + t = 25^{\circ} \text{ C.},$$

on trouverait

$$z = 16000 \cdot \frac{10}{1500} \cdot 1,05 = 112^{\text{m}}.$$

"Pour des hauteurs plus grandes on peut supposer une station intermédiaire."

La formule ingénieuse de M. Babinet, également recommandable par sa commodité pratique et sa forme simple et symétrique, m'ayant paru digne de beaucoup d'attention, j'en ai examiné l'exactitude et cette recherche m'a conduit aux résultats suivants, lesquels, vu la facilité de leur déduction, je vais indiquer sans démonstration.

Le facteur

$$1+\frac{2(T+t)}{1000}$$

qui ne s'écarte jamais beaucoup de l'unité, étant, pour abréger, représenté par f, et les valeurs numériques des formules de Laplace et de M. Babinet pour les mêmes valeurs de H, h, T, t désignées respectivement par L et B, l'excès de B sur L dépendra de B comme il suit:

1° Pour des valeurs de B moindres que 620^{in} , 24f, B-L sera positive et croîtra en même temps que B. Le maximum de B-L relatif à 620^{in} , 24f sera 0^{in} , 62f.

2º Pour des valeurs de B comprises entre $620^{\rm in}$, 24f et $1073^{\rm in}$, 5f, B-L restera positive, mais décroîtra à mesure que B croît et s'évanouira enfin pour $B=1073^{\rm in}$, 5f.

 3° Pour des valeurs de B plus grandes que $1073^{\rm m}$, 5f, B-L sera négative et croîtra comme telle à mesure que B augmente. Les valeurs de B-L relatives à

 $B = 1200^{\text{m}} f$, $1500^{\text{m}} f$, $2000^{\text{m}} f$, $3000^{\text{m}} f$, $4000^{\text{m}} f$, $5000^{\text{m}} f$, etc. seront respectivement

$$-0,5f, -2,2f, -7,5f, -31,4f, -80,5f, -165,2f,$$
 etc.
À $B = 16000$ f répondra $B - L = -\infty$

De ce qui précède résulte que la transformation de M. Babinet peut être employée en toute sûreté pour des hauteurs moindres que 1200 mètres, puisque la faute commise ne surpasse alors, dans aucun cas, 0th, 62f. Pour des hauteurs plus grandes les résultats ci-dessus conduisent encore facilement à l'évaluation, du moins approximative, des erreurs qu'amenerait l'emploi de la formule en question.



BESKRIFNING

PÅ ETT MINERAL, FUNNET I KUUSAMO SOCKEN AF ULEÄBORGS LÄN,

AFGIFVEN AF

AND. FERDIN. THORELD.

(Föredr. den 22 Mars 1852.)

Under letningarne, om sommaren 1850, efter guldförande sandlager inom Kuusamo socken, hörande till Uleåborgs län och Kemi Lappmark, påträffade jag, på mina resor till de ställen som utgjorde föremål för den egenteliga undersökningen, flere bergarter och mineralier af mindre vanlig beskaffenhet och ibland dessa fästades i synnerhet min uppmärksamhet på det mineral, hvars beskrifning jag får till Vetenskaps-Societetens bedömande ödmjukast öfverlemna.

Mineralet förekommer i lösa stenar, med fullkowligt afnötta kanter, på stranden af Yli Kitkajärvi insjö, österom Turjanniemi udde som utskjuter i nämnde insjö, och träffas detsamma ymnigast nedanför den så kallade "Ämmänhauta", i närheten af "Amm'nkivi", hvilka ställen, me l minnen from formtiden '), visas för hvarje förbifarande fråmling.

I fast klyft kunde jag finna hvarken sjelfva mineralet eller bergarten, som är Talkskiffer och hvaruti mineralet sitter, i firm af sin i vaxgula. litet plattale, huller af tre liniers och dertur, ler dlameter, hvilka ivo genomträng la af svarta mikroskopisk glimmerfjäll och vanligen ytterst omgiftna af en morkbrun skorpa eller hinna.

Kristalliniskt; visande tvenne mycket otydliga genomgångar, som formera en spetsig vinkel med hvarandra.

Brottet finsplittrigt.

Glansen vaxlik.

Strecket ljusgrått, med dragning åt gult.

Hårdheten emellan Apatit och Flusspat.

Gravitas Specifica = 2,73-2,74.

Ogenomskinligt; i tunn lamell genomlysande och i tunnaste kant genomskinligt.

För blasrör förhåller det sig på följande sätt:

I kolf kännes en empyreumatisk lukt och afsättes vatten som svagt rodnar lackmuspapper: mörknar på ytan vid lindrig hetta, men återtager sin färg utsatt för en högre temperatur.

På kol och i tång blifver det först hvitt, sväller betydligt och smålter derefter till en med bläsor fullsatt hvit pårla.

Anteckningar om Församlingarne i Kemi Lappmark af And. Joh. Sjögren. Helsingfors. 1828. Pag. 113.

Smålter lått med borax, hvarvid jernets reaktion frambringas; men efter betydlig tillsats af mineralet blifver pårlan trögsmålt samt helt och hållet genomtrångd af olösta delar af detsamma.

Fosforsalt upptager, med lemning af kiselskelett, betydligt mindre af mineralet än borax, innan glaset blifver trögsmålt.

Med Oxalsyrad Nickeloxid erhålles en blå glaspärla vid sammansmältning med borax.

Gifver med litet Soda en trögsmält, grönaktigt gul glaspärla, hvaruti små olösta partier visa sig med hvit färg; med större tillsats af soda fäs pärlan fullkomligt genomskinlig: tillsättes ännu mera soda, blifver pärlan opak; sammansmält med soda på platinableck frambringas svag manganreaktion.

Emedan detta mineral obetydligt angripes af både Svafvel- och Chlorvätesyra, har jag vid tvänne af de analyser, som jag verkställt på detsamma, begagnat Fluorväte-syra och vid tvänne Alkali för decompositionen. Ett fullkomligt rent material för analyserne har ej kunnat erhållas, hvilket i synnerhet var fallet vid dem som gåfvo vägbar Manganhalt och hvartill materialet utgjorde förut kasserade bitar, uppgående i vigt till något öfver en gramme, hvarföre hvardera dessa analyser äfven utfördes på endast litet öfver en half gramme mineralpulver.

Sedan jag forutskickat dessa upplysningar, går jag nu att lemna en kort redogorelse for sittet, hvarpa analyserna uttordes °) samt derefter anföra desamma.

Mineralet pulveriserades möjligast fint och en viss portion deraf tillvägdes. Den tillvägda qvantiteten underlastales stark glodgning under ungefür en half timme, hvorefter densammer åter vägdes och förlusten antogs såsom vattenhalt. Det glödgade pulvret blandales med tre och en half gang sin vigt Kolsvradt Kali-Natron (5 delar Kolsvradt Kali och 4 delar Kolsvradt Natron) och glodgades öfver sprittampa med dubbelt luftilieg nigot ofver en timme. Hela blandningen hale smilt och visale en gronaktig färg. Efter afsvalningen sprutades litet vatten i digeln, som derefter ställdes under några timmar på ett varmt ställe. Massan slogs deretter i en purslinsskal och helten llades med Clorvidesyra. Losningen althefs till tomhet blve: v ttenbal: fuktades derpå med sistnimude syra och ofvergjots med vitten: den ollista kiseljorden togs på filtrum och genomgangna stud vatskan behandlades med Kaustik Ammoniak, hvarvid Jernaid och Lerjord föllo och upptogos på filtrum. Affiltrerade vätskan foreattes med Oxalsyral Ammoniak och ställdes under flere dig it på ett varmt ställe.

Jernoxiden och Lerjorden lossades från filtrum och kokades med Kautiskt Kali i öfverskott. Olösta Jernoxiden togs på

^{*)} Härvid följdes: Ausführliches Handbuch der Analytischen Chemie von Heinrich Rose. Braunschweig. 1951. 21 Band.

filtrum och genomgångna solutionen behandlades först med Chlorvätesyra, tills lerjorden utfallit och återigen blifvit upplöst, sedan tillsattes till densamma Kolsvrad Ammoniak och ställdes derefter på ett varmt ställe. Jernoxiden löstes i Chlorvätesvra, lösningen neutraliserades och fälldes med Bernstenssyrad Ammoniak. Bernstenssyrade Jernoxiden upptogs på filtrum och tvättades med kallt vatten. Derefter togos Oxalsvrade Kalken och Lerjorden på filtra och tvättvattnen från så väl dessa som Bernstenssyrade Jernoxiden slogos tillsamman och afdrefvos till torrhet. Torkade massan glödgades i platinskål, till största delen af Salmiaken atrökt. Massan upplöstes i några droppar Chlorvätesvra och vatten. En liten portion Kiseljord erhölls och togs på filtrum, hvilket äfven iakttogs med en ringa qvantitet kiseljord som erhölls vid jernoxidens upplösning. - Solutionen behandlades i kokning me! Kolsvradt Kali i öfverskott och fällningen. Kolsvrad Talkjord. dragande litet i gratt, till följe af Manganhalt, upptogs på filtrum. — Efter Talkjordens vägning, upplöstes densamma i litet Chlorvätesvra: solutionen neutraliserades med Kaustik Ammoniak och fälldes med Vatesvafladt Svafvel-Ammonium. Svalvel-Mangan togs på filtrum, upplöstes i Chlorvätesvra och fälldes me! Kolsvradt Kali. Filtratet vägdes och afdrogs från den förut erhållna vigten på talkjorden, samt beräknades derefter till Manganoxidul.

För Kalits bestämmande behandlades mineralet i blyskål under inflytande af Fluorvåtegas, som utvecklades förmedelst genom digerering med svafvelsyra som, tillsatt i öfverskott, slutligen bortröktes. Torra massan löstes i vatten (en högst obetydlig portion af mineralet qvarblef olöst, som afdrogs från det
tillvägda): saltsyra, för bildande af salmiak, och Kaustik Ammoniak tillslogos: Jernoxid och Lerjord föllo och upptogos på filtrum. Dessa baser behandlades i öfverensstämmelse med hvad
ofvanföre uppgifvits och tvättvattnen efter dem undersöktes på
tilkjanlanda mangannstillad. hvarat hägst obetydlig gvanitet erhälls.

Med Oxalsyrad Ammoniak fälldes ur lösningen, hvarifrån jernoxiden och lerjorden blifvit afskiljde, Oxalsyrad Kalk, som upplozs: genom ingen sulummen dreis till unrhe: ali Scinicken afröktes. Massan fuktades med några droppar svafvelsyra, hvars öfverskott derefter förjagades. För att erhålla neutrala svafvelsyrade salter, glödgades massan i ångor af Kolsyrad Ammoniak. Dem senkstilldes silmude: i en haprike: phrim bleck, san openet fyllde digelns öfre del, sattes bitar af Kolsyrad Ammoniak: platinablecket ställdes i digeln, som försågs med lock. Tillsättandet af nyssnämnde salt repeterades flere gånger och så länge skillnad uppstod vid vägningen. Derefter upplöstes massan i vatten, hvarvid litet kiseljord stannade olöst, som upptogs och afdrogs från sist erhållne vigten, d. v. s. ifrån svafvelsyrade salternas vigt. Vätskan försattes med Åttiksyrad Baryt och svafvelsyrade baryten affiltrerades. Genomgångna solutionen drefs till

torrhet och glödgades starkt. Massan behandlades derpå med kokhett vatten och det olösta togs på filtrum.

Den genomgångna alkaliska lösningen försattes med Chlorvätesyra och drefs till torrhet: Chlorbundna alkalierna vägdes (endast i den ena analysen) och löstes i litet vatten, hvarefter Platina-Chlorid tillslogs. Ur den citrongula fällningen, som upptogs på filtrum, beräknades Kalihalten och Natronet (i ena analysen). Den erhållna alkaliqvantiteten beräknades derpå till svatvelsyradt alkali och afdrogs såsom sadant från den förut erhållna vigten på svafvelsyrade salter. Återstoden antogs såsom svafvelsyrad talkjord, hvarifrån talkjorden sedermera beräknades.

De tvänne första af de nu anförande analyserna äro utförde efter mineralets decomposition med fluorvätesyra och vid de tvänne sednare är alkali begagnadt för samma ändamål.

Kiseljord =
$$54,99^{\circ}$$
) syre = $28,56$... $(8,35)$... (16)
Lerjord = $21,64$ syre = $10,10$
Jernoxid = $4,09$..., = $1,25$

^{*)} Direkte uttagen från 2:ne analyser, hvilkas vidare utförande blef afbrutet.

^{*)} Direkte uttagen från 2:ne analyser, hvilkas vidare utförande blel afbrutet.

^{†)} Direkte bestämdt.

^{**)} Förlust vid analysen.

Få ofvanintagne analyser som, vid jemförelse med hvarandra, visa ansenliga oscillationer uti mängden af de i mineralets sammansättning ingående ämnen, läggas till grund för uppställandet af en formel för mineralet, kunde densamma måhända närmast uttryckas: 2 $\stackrel{\dot{M}g^3}{K^3}$ $\stackrel{\ddot{\subset}{\subset}}{\ddot{\subset}}$ $\stackrel{\ddot{\subset}{\subset}}{\ddot{\subset}}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\ddot{\subset}}{\subset}$ $\stackrel{\subset}{\subset}$ $\stackrel{\subset}{$

Såvida icke något förut namngifvet och undersökt mineral befunnits hafva sådan sammansättning som ifrågavarande, får jag föreslå att detsamma, med afseende å dess kulformiga utseende, kunde benämnas *Gongylit*, af grekiska ordet *Fogguloo*.

^{*)} Medeltal.



DÉDUCTION

ANALYTIQUE DE QUELQUES THÉORÈMES GÉOMÉ-TRIQES NOUVEAUX RELATIFS À LA THÉORIE DES TROIS CORPS RONDS;

PAR

N. G. DE SCHULTEN.

(Lu le 4 Mars 1850.)

Les théorèmes connus qui déterminent la grandeur des surfaces et des solidités du cylindre, du cône et du secteur sphérique, se prouvent dans la géométrie élémentaire très-rigoureusement par la déduction de résultats contradictoires dans les cas où ces surfaces et ces solidités ne seraient pas égales à certaines figures rectilignes et à certains polyèdres. Or, pour arriver à ces résultats, il faudra démontrer préalablement que certains solides inscrits dans le cylindre, le cône et le secteur sphérique peuvent différer aussi peu que l'on veut de certains solides circonscrits à ces corps, et qu'il en est de même de certaines parties correspondantes de leurs surfaces. Ce sont ces démonstrations préliminaires seules qui peuvent offrir quelques difficultés dans ce sujet.

et la manière plus ou moins heureuse dont un auteur s'en sera acquitté détermine le succès avec lequel il aura traité cette partie importante de la géométrie. C'est de ce point de vue que j'ai cru devoir faire connaître les théorèmes suivants, qui m'ont paru très-appropriés un but en question, en ce qu'ils tournissent des limites simples et très-facilement construites des différences des figures inscrites et circonscrites dont il s'agit.

Pour abréger autant que possible l'énoncé de ces propositions, je vais les faire précéder par quelques

Définitions.

- 1. La figure rectiligne de plus de quatre côtés s'appelle polygone, ou figure polygonale.
- 2. Le prisme droit, à base régulière, s'appelle prisme régulier.
- 3. Une pyramide est appelée régulière, lorsque sa base est régulière et la perpendiculaire abaissée de son sommet sur le plan de sa base passe par le centre de cette base.
- 4. Secteur rectiligne est la figure plane composée de deux ou d'un plus grand nombre de triangles isocèles égaux et semblables, joints les uns aux autres dans le même plan de manière que le précédent et le suivant aient le sommet et l'un des côtés égaux communs.

- 5. La base d'un secteur rectiligne est la ligne formée des bases de ses triangles isocèles; ses rayons sont les deux droites qui le terminent de l'autre côté; son angle est l'angle compris entre ses rayons, considéré au dedans du secteur; son sommet est le sommet de son angle; et son apothème est la perpendiculaire abaissée de son sommet sur une des droites qui composent la base.
- 6. Secteur conique est le solide engendré par la révolution d'un secteur rectiligne autour de son rayon, continuée jusqu'à ce qu'il revienne à sa première position.
- 7. L'axe d'un secteur conique est le rayon immobile du secteur rectiligne qui l'a engendré; sa base la surface engendrée, pendant le mouvement du secteur rectiligne, par la base de ce secteur; son sommet le sommet du secteur rectiligne; et son angle l'angle de ce secteur.
- 8. La hauteur de la base d'un secteur conique est la partie de son axe (prolongé, s'il le faut, du sommet du secteur) retranchée du côté de la base par le plan du cercle dont la périphérie termine la base.
- 9. Secteurs coniques semblables sont ceux qui sont engendrés par des secteurs rectilignes semblables.
- 10. Un prisme droit est *inscrit* dans un cylindre, si sa base est inscrite dans celle du cylindre et sa hauteur est égale à celle du cylindre.

- 11. Un prisme droit est *circonscrit* à un cylindre, si sa base est circonscrite à celle du cylindre et sa hauteur est égale à celle du cylindre.
- 12. Une pyramide est *inscrite* dans un cône, si sa base est inscrite dans celle du cône et son sommet coïncide avec celui du cône.
- 13. Une pyramide est circonscrite à un cône, si sa base est circonscrite à celle du cône et son sommet coïncide avec celui du cône.
- 14. Un secteur rectiligne est inscrit dans un secteur de cercle, lorsque leurs rayons respectifs coïncident, et les angles de la base du secteur rectiligne sont inscrits dans l'arc du secteur de cercle.
- 15. Un secteur rectiligne est circonscrit à un secteur de cercle, lorsque leurs rayons respectifs coïncident et les droites qui composent la base du secteur rectiligne sont toutes tangentes à l'arc du secteur de cercle.
- 16. Un secteur conique est inscrit ou circonscrit à un secteur sphérique, lorsque le secteur rectiligne qui l'a engendré est respectivement inscrit ou circonscrit au secteur de cercle qui a engendré le secteur sphérique.

Les théorèmes en question, dont aucun, que je sache, ne se trouve dans les ouvrages publiés sur ce sujet, sont les suivants:

- I. Deux prismes réguliers à bases polygonales semblables, dont l'un est inscrit et l'autre circonscrit au même cylindre, diffèrent entre eux d'une quantité moindre que le parallélipipède rectangle dont la hauteur est celle du cylindre et la base le carré du côté de la base du prisme inscrit.
- II. Les surfaces latérales des mêmes prismes diffèrent entre elles d'une quantité moindre que le rectangle de la hauteur du cylindre et du double côté de la base du prisme inscrit.
- III. Deux pyramides régulières à bases polygonales semblables, dont l'une est inscrite et l'autre circonscrite au même cône, diffèrent entre elles d'une quantité moindre que le parallélipipède rectangle dont la hauteur est le tiers de celle du cône et la base le carré du côté de la base de la pyramide inscrite.
- IV. Les surfaces latérales des mêmes pyramides diffèrent entre elles d'une quantité moindre que le rectangle du côté du cône et du double côté de la base de la pyramide inscrite.
- V. Deux secteurs coniques semblables dont l'angle n'excède pas deux angles droits et dont l'un est inscrit et l'autre circonscrit au même secteur sphérique, diffèrent entre eux d'une quantité moindre que le parallélipipède rectangle dont la base est le carré du rayon du secteur sphérique et la hauteur le quadruple de chacune des droites qui composent la base du secteur rectiligne qui a engendré le secteur conique inscrit.

VI. Les bases des mêmes secteurs coniques diffèrent entre elles d'une quantité moindre que le rectangle du rayon du secteur sphérique et de l'octuple de chacune des droites qui composent la base du secteur rectiligne qui a engendré le secteur conique inscrit.

Ces propositions s'établissent, au moyen de quelques lemmes que nous allons d'abord démontrer, comme il suit.

Lemme A.

Le périmètre d'une sigure rectiligne régulière de m côtés, circonscrite à un cercle, est plus grand que celui d'une sigure rectiligne régulière de m + 1 côtés, circonscrite au même cercle.

Le rayon du cercle étant désigné par r, le périmètre de la première figure sera

$$2r.m \operatorname{Tg} \frac{\pi}{m}$$
,

et celui de la seconde

$$2r.(m+1)^r \Gamma g \frac{\pi}{m+1}$$

Or, en posant

$$Tg \frac{\pi}{m(m+1)} = a_1,$$

$$Tg \frac{2\pi}{m(m+1)} - Tg \frac{\pi}{m(m+1)} = a_2,$$

$$Tg \frac{3\pi}{m(m+1)} - Tg \frac{2\pi}{m(m+1)} = a_3,$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$Tg \frac{\pi\pi}{m(m+1)} - Tg \frac{(m+1)\pi}{m(m+1)} = a_m,$$

$$Tg \frac{(m+1)\pi}{m(m+1)} - Tg \frac{m\pi}{m(m+1)} = a_{m+1},$$

on aura, en vertu de la 3 prop. du Livre VI des Élém. d'Euclide,

$$a_2 > a_1, \ a_3 > a_2, \ a_4 > a_3, \dots a_m > a_{m-1}, \ a_{m+1} > a_m,$$

et par conséquent

$$m a_{m+1} > a_1 + a_2 + \dots a_m,$$

c'est-à-dire

$$m(a_1 + a_2 + \dots + a_{m+1}) > (m+1)(a_1 + a_2 + \dots + a_m),$$

 $m \operatorname{Tg} \frac{\pi}{m} > (m+1) \operatorname{Tg} \frac{\pi}{m+1},$
 $2r, m \operatorname{Tg} \frac{\pi}{m} > 2r, (m+1) \operatorname{Tg} \frac{\pi}{m+1}.$

Corollaire. La surface d'une figure rectiligne régulière de m côtés, circonscrite à un cercle, est plus grande que celle d'une figure rectiligne régulière de m+1 côtés, circonscrite au même cercle.

Lemme B.

Une figure rectiligne régulière de m côtés, et une autre de m+1 côtés, étant inscrites dans le même cercle, le rapport de l'excès du rayon du cercle sur l'apothème au côté de la figure sera dans la première figure plus grand que dans la seconde.

Le rayon du cercle étant représenté par r, le côté et l'apothème de la première figure par 2c et a, et ceux de la seconde par 2c' et a', on aura

$$r^2 = a^2 + c^2 = a'^2 + c'^2$$

(0) * (-1911)

$$\frac{r-c}{2c} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r-c}{r+a}}, \quad \frac{r-a}{2c} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r-a}{r+a}},$$

el par conséquent, parce que a < a,

$$\frac{1}{1-\epsilon}>\frac{1}{1-\epsilon}.$$

Lemme C.

Deux polygones réguliers semblables, dont l'un est inscrit et l'autre circonscrit au même cercle, différent d'une quantité moindre que le carré du côté du polygone inscrit *).

Le rayon du cercle étant désigné par r, l'apothème du polygone inscrit par a, son côté par 2c, sa surface par s et la surface du polygone circonscrit par s, on aura

$$r^{2} : a^{2} = s' : s,$$

$$r^{2} : r^{2} - a^{2} = s' : s' - s,$$

$$r^{2} : c^{2} = s' : s' - s,$$

$$s' - s = \frac{s}{r^{2}} \cdot c^{2} = \frac{s}{4r^{2}} \cdot (2c)^{2}.$$
Ur (lemme A)
$$s' < 4r^{2}.$$
Donc
$$s' - s < (2c)^{2}.$$

^{*)} Dans les "Elements of Geometry by Thomas Simpson, 5 Edit, London 1800, p. 155," il y a quelque mention faite de cette vérité, mais elle y est démontrée fort incomplétement, savoir pour le cas seul, où le nombre des côtés des deux polygones est une puissance de 2.

Lemme D.

Les périmètres de deux polygones réguliers semblables, dont l'un est inscrit et l'autre circonscrit au même cercle, diffèrent d'une quantité moindre que le double côté du polygone inscrit.

Les r, a et 2c ayant la même signification que dans le théorème précédent, le périmètre du polygone inscrit étant désigné par p et celui du polygone circonscrit par p', nous aurons

$$r: a = p': p,$$

$$r: r - a = p': p' - p,$$

$$p' - p = \frac{p'}{r}(r - a) = \frac{p}{r} \cdot \frac{r - a}{2c} \cdot 2c.$$

Or (lemme A)

et (lemme B)

$$\frac{r-a}{2c} < \frac{r-r\sqrt{\frac{1}{2}}}{2r\sqrt{\frac{1}{2}}}.$$

Done

$$p'-p < \frac{8r}{r} \cdot \frac{r-r\sqrt{\frac{1}{2}}}{2r\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot 2c,$$

$$< 2 \cdot 2c,$$

Théorèmes I, II, III.

Ces trois théorèmes se déduisent si facilement des lemmes C et D, les I, III de C et le II de D, qu'il n'est pas nécessaire de nous y arrêter.

Théorème IV.

Soient k et r le côté et le rayon de la base du cône, a et 2c l'apothème et le côté de la base de la pyramide inscrite, 2c' le côté de la base de la pyramide circonscrite, d la distance entre le sommet du cône et le point du milieu du côté 2c, et s, s' les surfaces latérales de la pyramide inscrite et circonscrite. On aura alors

$$c'k:cd=s':s.$$

Or

$$c': c = r: a$$
.

et par conséquent

$$c'k : cd = kr : ad.$$

Done

$$kr:ad=s:s.$$

$$kr: kr - ad = s: s' - s$$

$$s'-s=\frac{s}{kr}(kr-ad).$$

Or (lemme A)

$$s < 4kr$$
.

Done

$$s'-s < 4(kr-ad),$$

$$< 4(kr-\sqrt{r^2-c^2},\sqrt{k^2-c^2}),$$

$$< 4(kr-\sqrt{k^2r^2-c^2(k^2+r^2-c^2)}),$$

$$< \frac{4c^2(k^2+r^2-c^2)}{kr+\sqrt{k^2r^2-c^2(k^2+r^2-c^2)}},$$

$$< \frac{4c^2.2k^2}{kr+\sqrt{k^2r^2-c^2(k^2+r^2-c^2)}}.$$

$$c^{2} < \frac{1}{2}r^{2},$$

$$\frac{1}{2}r^{2} + c^{2} < k^{2} + r^{2},$$

$$\frac{1}{4}r^{4} - c^{4} < \frac{1}{2}r^{2}(k^{2} + r^{2}) - c^{2}(k^{2} + r^{2}),$$

$$c^{2}(k^{2} + r^{2} - c^{2}) < \frac{1}{2}r^{2}(k^{2} + \frac{1}{2}r^{2}),$$

$$< \frac{1}{2}r^{2}, \frac{3}{2}k^{2},$$

$$k^{2}r^{2} - c^{2}(k^{2} + r^{2} - c^{2}) > \frac{1}{4}k^{2}r^{2},$$

$$kr + \sqrt{k^{2}r^{2} - c^{2}(k^{2} + r^{2} - c^{2})} > \frac{3}{2}kr.$$
Done

$$s - s < \frac{4c^2 \cdot 2k^2}{\frac{3}{2}kr} \cdot$$

$$< \frac{8c}{3r} \cdot 2ck,$$

$$< \frac{8r\sqrt{\frac{1}{2}}}{3r} \cdot 2ck,$$

$$< 2.2ck,$$

Théorème V.

Soit r le rayon du secteur sphérique, d la droite dont un nombre quelconque composent la base du secteur rectiligne qui a engendre le secteur conique inscrit dans le secteur sphérique. e l'excès du rayon r sur l'apothème du secteur rectiligne cité, h la hauteur de la base du secteur conique circonscrit au secteur sphérique (défin. 8), et soient s, s' les solidités du secteur conique

inscrit et circonscrit. Ces deux secteurs étant, par l'hypethèse, semblables, on aura

$$r^{3}: (r-e)^{3} = s': s,$$

$$r^{3}: 3er^{2} - 3e^{2}r + e^{4} = s: s - s,$$

$$s' - s = \frac{s'}{r^{3}} (3er^{2} - 3e^{2}r + e^{3}).$$
Or
$$s' = \frac{1}{3}r \cdot 2\pi r \cdot h,$$

et h ne pourra évidemment excéder la disgonale du carré circonscrit au cercle du rayon r, c'est-à-dire 2\sqrt{2.r.} Donc

$$s = < \frac{1}{4}r. 2\pi r. 2\sqrt{2.r}$$

De plus

$$3er^{2}-3e^{2}r+e^{3}<3er^{2},$$

$$<\frac{3e}{d}\cdot dr^{2},$$
et (lemme B)
$$\frac{c}{d}<\frac{r-rr^{2}}{2rr^{2}}.$$
Donc
$$s'-s<\frac{4\pi\sqrt{2}}{3}.\frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}.dr^{2},$$

$$<4d.r^{2}.$$

Théorème VI.

Les r, d, e et h ayant la même signification que dans le théorème précélent et b. b représentant les bases du secteur conique inscrit et circonscrit, nous aurons

$$r^{2}$$
: $(r-e)^{2} = b'$: b ,
 r^{2} : $2er - r^{2} = b'$: $b' - b$,
 $b' - b = \frac{b'}{r^{2}}(2er - r^{2})$.

Or

$$b' = 2\pi r.h,$$

$$= < 2\pi r.2\sqrt{2.r},$$

et

$$2er - r^{2} < 2er,$$

$$< \frac{2e}{d} \cdot dr,$$

$$< \frac{2(\sqrt{2} - 1)}{2} \cdot dr.$$

$$b' - b < 4\pi\sqrt{2} \cdot (\sqrt{2} - 1) \cdot dr,$$

$$< 8d.r.$$

Donc

Pour montrer l'usage des théorèmes précédents, je vais fonder sur le théorème IV une démonstration simple et rigoureuse de la vérité connue, que la surface convexe du cône équivaut à un triangle dont la hauteur est égale au côté du cône et la base à la circonférence de sa base. L'emploi de quelques axiomes particuliers étant à cet effet indispensable, je choisirai les suivants dont l'évidence paraît satisfaisante:

- 1. Le périmètre du cercle est plus grand que celui d'un polygone y inscrit, et plus petit que celui d'un polygone y circonscrit.
- 2. La surface convexe du cône est plus grande que la surface latérale d'une pyramide y inscrite, et plus petite que celle d'une pyramide y circonscrite.

Cela posé, soient, s'il est possible, la surface convexe et le triangle en question inégaux. Leur différence sera, dans ce caslà, égale à quelque rectangle déterminé dont les côtés soient a et b. Le côté du cône étant désigné par c, soit d la quatrième proportionnelle des c, b, a, et inscrivons dans la base du cône un polygone régulier d'un côté moindre que \$d, ce qui peut se faire par la bisection suffisamment continuée de sa circonférence. Circonscrivons à la même base un polygone semblable à celui qui a été inscrit, et menons par le sommet du cône et tous les côtés des deux polygones des plans, lesquels, d'après les définitions 12° et 13° ci-dessus, formeront avec le plan de la base du cône une pyramide inscrite dans ce solide et une autre y circonscrite, dont res surfaces laterales, en vertu du théorème IV, différeront d'une quantité moindre que le rectangle dont les côtés sont a, b, c'est-àdire de moins que ne diffèrent la surface convexe du cône et le triangle en question. Or, d'après le second axiome ci-dessus, la surface du cône est plus grande que la moindre de ces surfaces laterales, et plus petite que la plus grande, et, d'après le premier, le triangle est évidemment de même plus grand que la moindre surface latérale et plus petit que la plus grande. Donc la différence des surfaces latérales des deux pyramides sera nécessairement plus grande que celle de la surface convexe du cône et du triangle: résultat directement contraire à celui qui a été tiré plus hant du thordeme IV, d'où s'ensuit l'impossibilité d'une différence quelconque, quelque petite qu'elle soit, entre la surface conique et le triangle.

UNTERSUCHUNG

DER THEILUNGSFEHLER DES REICHENBACH-ERTELSCHEN MERIDIANKREISES DER STERN-WARTE IN HELSINGFORS,

VON

FRIEDRICH WOLDSTEDT.

(Vorgetr. d. 6 April 1852.)

1.

Da Herr Professor Argelander keine directe Bestimmungen der Theilungsfehler des Meridiankreises der Finnländischen Sternwarte veröffentlicht hat *), entschloss ich mich eine Untersuchung derselben auszuführen, indem ich ähnliche von Bessel **), Struve ***), und Peters †) gemachte Bestimmungen zu Rathe zog.

^{*)} Observ. Astronomicæ in specula Universitatis litterariæ Fennicæ factæ. Tom II. Aboæ. Seite XXV.

^{**)} Astron, Beobachtungen in Königsberg 1821, von Bessel. 7:te Abth.

^{***)} Strave, Ohserv. Astron. Dorpatenses. Vol. VI seu novæ seriei Vol. III

^{†)} Untersuchung der Theilungsfehler des Ertelschen Verticalkreises der Pulkowaer Sternwarte von Peters. Mémoirs de l'académie Imp. des Scietices de St. Petersbourg. VI Serie. Sciences Mathem. Phys. et Natur. Tome VIII.

Methode erst die Theilungsfehler für alle um Vielfache von 15 vom Anfangspunkte entfernte Punkte der Theilung absolut — und nachher einige zwischenliegende relativ — zu bestimmen. Zu Anfangspunkt nahm ich 340°0′, weil, wie Struve in N:o 344 der Astronomischen Nachrichten erwähnt. Reichenbach die Theilung aller seiner Meridiankreise an diesem Punkte angelangen hat.

Ehe ich die Untersuchung begann, wurde den 4 dazu bestimmten Pistorschen Microscopen vom unseren Mechaniker Wetzer eine solche Einrichtung gegeben wie die, welche in "Description de l'observatoire Astronomique central de Poulkova "par Struve", Seite 43 et 44 beschrieben ist. Darauf mass ich mit den 4 Microscopen die gegenseitigen Abstände der Striche für 0', 3' und 6' jeden 15:ten Grads von 340° an, und indem ich den Werth eines Microscopentheils in der Voraussetzung dass der mittlere aller 48 Abstände genau = 180" wäre bestimmte, bekam ich die Correctionen für die einzelnen Strichabstände gegeben, welche ich nachher bei der jedesmaligen Bestimmung der Werthe der Microscopentheile berücksichtigte. Diese Werthe wurden vor und nach einer Messungsreihe bestimmt, und wenn bedeutende Unterschiede sich zeigten, wurde die Veränderlichkeit derselben bei der Berechnung berücksichtigt. Die mögliche Veränderlichkeit der Abstände der Microscope wurde auf derselben Weise wie vom Herrn Peters entweder eliminist oder

ermittelt. So wie dieser ausgezeichnete Astronom habe ich auch die Theilungsfehler für 5 auf einander folgende Striche bestimmt, so dass der Anfangspunkt bei jedem Microscopenabstande nach einander 340° 0′, 340° 3′... 340° 12′ war. Meine Untersuchung wurde den 4:ten September begonnen und den 11:ten November 1849 beendigt. Jede Reihe der Messungen dauerte im Durchschnitt 4 Stunden. Ich bestimmte Correctionen für alle Punkte, welche um Vielfache von 3° 45′ von 340° 6′ abstehen, indem ich wie Bessel für relative Bestimmungen je zwei Microscope erst 7° 30′ und nachher 11° 15′ von einander entfernt sein liess. Diese Bestimmungen sind auch besonders für jeden von 5 Strichen mit 2 um 180° von einander abstehenden Microscopenpaaren und in 2 um 180° verschiedenen Lagen des Kreises gemacht worden.

2.

Da nach der von mir befolgten Methode die Correctionen von u'— u, (wenn u und u' Punkte des Kreises sind), nicht gefunden werden sondern die mittlere Correction von u'— u und von 180°+ u'— (180°+ u), so ist der Anfangspunkt jedes Bogens, dessen Correction gesucht wird, sowohl u als 180°+ u, und also kam es darauf an, 180° in verschiedene gleiche Theile zu theilen, und je zwei Microscope in einer Entfernung von einander zu stellen, die gleich einem dieser Theile wäre. Nach Herrn Peters's Beispiel sind meine Microscopenabstände nach einander

90°, 15°, 30°, 45° und 60 gewesen. Da meine Messungen und Berechnungen auf der Sternwarte verwahrt werden, wird es hinlänglich sein, dass ich hier nur die im Mittel aus 5 Strichen mit 2 Microscopenpaaren und in den beiden Lagen des Kreises gefundenen Correctionen der verschiedenen Bögen mittheile.

Anfangspunkt	Correction des Bogens von							
des Bogens.	90	15	30'	45*	60"			
340 6', 160° 6'	+0:796	-0:123	- 0.550	- 0;763	= 01500			
355 6, 175 6	+ 0.203	- 0.333	- 0.247	- 0.509	+0,103			
10 6, 190 6	-0.020	+ 0.125	+ 0.005	+ 0.464	- ().55()			
25 6, 205 6	-0.592	- 0.172	+ 0.307	+ 0.900	4 0.237			
40 6, 220 6	+0.160	+0.675	+ 0.984	+ 0.637	+ 0.435			
55 6, 235 6	-0.234	+0.160	-0.067	- 0.493	- 0,200			
70 6. 250 6		- 0.537	- 0.902	- 0.525	- (),5 } }			
85 6, 265 6		- 0.448	-0.234	- 0.205	- (),2()2			
100 6. 250 6		- 0.227	+ 0.082	+ 0.752	+ 0.371			
115 6, 295 6		+ 0.343	+ 0.813	+ 0.052				
130 6, 310 6		+ 0.827		+ ().14()				
145 0, 325 6		- 0.291	- 0.573	0.723	- 0.499			

3.

Aus diesen Bestimmungen müssen nun nach der Methode der kleinsten Quadrate die wahrscheinlichsten Correctionen aller Bögen von 15°, deren Anfangspunkt $340^{\circ}6' + n \times 15^{\circ}$ ist, (wo n eine ganze zwischen 0 und 11 enthaltene Zahl bezeichnet), gesucht werden. Da aber die Summe der Correctionen aller 12 in 180° enthaltenen Bögen von 15° nothwendig = 0 sein muss, so habe ich nur 11 Unbekannte zu bestimmen. Aus ähnlicher Ursache sind auch einige in obiger Tafel angegebene Correctionen schon in den übrigen enthalten, und müssen aus der Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeschlossen werden nach dem allgemeinen Grundsatz, den Herr Gauss in "Theoria motus corporum coelestium", Art. 180 anführt. Bei den Correctionen der Bögen von 90° sind die überflüssigen schon weggelassen worden. Unter den Correctionen der Bögen von 15° muss z. Beisp. die letzte weggelassen werden, unter den Correctionen der Bogen von 30° z. B. die zwei letzten, u. s. w. Ueberhaupt dürsen in der obigen Tasel, wenn der Abstand je zweier Microscope = $\frac{180_0}{150}$ ist, n Correctionen, die in den übrigen schon enthalten sind, in der Behandlung nach der Methode der kleinsten Quadrate nicht in Betracht kommen. Die Tafel giebt also zur Bestimmung von 11 Unbekannten 44 Gleichungen, nach deren Auflösung ich folgende Correctionen und wahrscheinliche Fehler gefunden habe:

Bogen.									Corr.	1	V, F
355°	6'—	340°	6',	175°	6'—	160°	6'	-	0.194	± (0.071
10	6 —	355	6,	190	6 —	175	6	_	0.353	± (0.066
25	6	10	6,	205	6 —	190	6	+	0.121	± (0.062
40	6 —	25	6,	220	6 —	205	6		0,272	± (0.059
55	6 —	40	6,	235	6 —	220	6	+	0.683	± (0.058
70	6 —	55	6,	250	6 —	235	6	+	0.395	土	0.058
85	6 —	70	6,	265	6	250	6	_	0.518	士	0.058
100	6 —	85	6,	280	6	265	6	_	0.362	土	0.059
115	6 —	100	6,	295	6 —	280	6	_	0.122	土	0.062
130	6 —	115	6,	310	6	295	6	+	0.158) ±	0.066
145	6	130	6,	325	6 —	310	6	+	0.600	土	0.071

Der wahrscheinliche Fehler einer Bestimmung oder der Länge eines gemessenen Bogens, der auf Messungen der 5 neben einander liegenden Theilstriche mit 2 um 180° von einander abstehenden Microscopenpaaren und in zwei um 180° verschiedenen Stellungen des Kreises beruht, fand sich = \pm 0°.12675. Die Summe der Quadrate der 220 Abweichungen der auf die einzelnen Striche sich beziehenden Correctionen von den 44 Mitteln, aus welchen die obigen wahrscheinlichsten Werthe hergeleitet sind, wurde = 51.23290 gefunden; also ist der wahrscheinliche Fehler eines durch je zwei um 180° von einander abstehenden Striche gemessenen Bogens = \pm 0°.3639. Der von Beobachtungsfehlern herrührende Theil dieses Fehlers ist = \pm 0°.12675 \times $\sqrt{5}$ = \pm 0°.2834,

also der wahrscheinliche Einfluss der zufälligen Theilungsfehler auf einen durch 4 Striche bestimmten Winkel zwischen zwei Durchmesser = \pm 0°.2216. Diese Zahl drückt auch, wie man leicht findet, den wahrscheinlichen zufälligen Theilungsfehler eines Strichs aus, welchen Bessel für einen ganz ähnlichen Kreis in Königsberg = \pm 0°.3251 und Struve in Dorpat = \pm 0°.1308 gefunden haben.

4.

Um die Correctionen der Ablesungen an den Punkten des Kreises, deren richtige Abstände von einander auf oben dargestellter Weise gefunden worden, zu bestimmen, muss eine willkührliche Constante eingeführt werden. Ich hade die Correctionen der genannten Punkte der Bedingung unterworfen, dass die Summe der 12 Correctionen = 0 sein soll, und finde demnach folgende

Correctionen

340° 6′, 160° 6′ +0.257355 6, 175 6 + 0.06310 6, 190 6 -0.28925 6, 205 6 -0.16940 6, 220 6 -0.44155 6, 235 6 +0.24270 6, 250 6 +0.63785 6, 265 6 + 0.119

Correctionen

 $100^{\circ}6, 280^{\circ}6 - 0.243$

1156, 2956 - 0.365

130 6, 310 6 - 0.207

145 6, 325 6 + 0.394

Je zwei Microscope wurden darauf in einer Entfernung von 7° 30' von einander gestellt, und der Theilungsfehler jedes in der Mitte zwischen den oben angeführten Punkten gelegenen Punkts durch Vergleichung mit sowohl dem folgenden als dem vorhergehenden bestimmt. Darnach wurden auf derselben Weise mit einem Microscopenabstaud von 11° 15' alle schon bestimmten Bögen von 22° 30' halbirt, so dass die Correctionen aller um Vielfache von 3° 45' von 340° 6', 160° 6' entfernten Punkte des Kreises entweder absolut oder relativ bestimmt worden sind. Ich werde alle durch Messungen erhaltenen Correctionen hier zusammenstellen.

Punkte der Theilun	ng Corr.	Punkte der Theilung Corr.
2° 36′, 182° 36′	+ 0″.397	92° 36′, 272° 36′ + 0″.155
6 21, 186 21	+ 0.189	96 21, 276 21 +0.181
10 6, 190 6	-0.289	100 6, 280 6 - 0.243
13 51, 193 51	-0.188	103 51, 283 51 - 0.214
17 36, 197 36	- 0.466	107 36, 287 36 + 0.818
21 21, 201 21	+0.424	111 21, 291 21 +0.366
25 6, 205 6	-0.169	115 6, 295 6 -0.365
28 51, 208 51	- 0.313	118 51, 298 51 -0.288
32 36, 212 36	+0.975	122 36, 302 36 + 0.556
36 21, 216 21	+0.181	$126\ 21,\ 306\ 21\ +0.452$
40 6, 220 6	-0.441	130 6, 310 6 - 0.207
43 51, 223 51	+0.570	133 51, 313 51 + 0.377
47 36, 227 36	+0.343	137 36, 317 36 + 1.106
51 21, 231 21	+0.478	$141 \ 21, \ 321 \ 21 \ +0.583$
55 6, 235 6	+0.242	145 6, 325 6 +0.394
58 51, 238 51	+0.491	$148\ 51,\ 328\ 51\ +0.688$
62 36, 242 36	+0.766	152 36, 332 36 +0.485
66 21, 246 21	+0.459	156 21, 336 21 -0.052
70 6, 250 6	+0.637	160 6, 340 6 +0.257
73 51, 253 51	+0.466	$163 \ 51, \ 343 \ 51 \ -0.152$
77 36, 257 36	+0.286	$167 \ 36, \ 347 \ 36 \ -0.368$
81 21, 261 21	+0.037	171 21, 351 21 -0.050
85 6, 265 6	+0.119	175 6, 355 6 +0.063
88 51, 268 51	+0.125	178 51, 358 51 + 0.976
		107

Da der Abstand zwischen 339° 57' und 340° 0' von den folzen ein Strichabständen nicht merkhar verschieden ist, war es nicht nöttig auf den Anfangspunkt der Theilung weiter Rüsksicht zu nehmen, und deswegen habe ich in der ebigen Zusammenstellung von der kleinsten Gradzahl angefangen.

Weil auch die relativen Bestimmungen, wie oben erwähnt worden, für jeden der 5 neben einander liegen len Striche unabhängig gemicht worden sind, so war es mir auch hier inöglich den aus Beobachtungsfehlern und zufälligen Theilungsfehlern zusammengesetzten wahrscheinlichen Fehler zu finden. Bei Messungen mit dem Microscopenabstande von 7130 ist der wahrscheinliche Fehler eines mit 2 Microscopenpatren in 2 um 180 verschiedenen Lagen des Kreises gemessenen Bogens = \pm 0.3020, und mit dem Abstande von 1115 = \pm 0.2884, also beide kleiner als der oben für die Hauptpunkte des Kreises gefundene warsch. F. = \pm 01.3639.

5.

In den drei ähnlichen Untersuchungen, welche ich bei der Meinigen zum Vorbild genommen hatte, sind vers hiedene Methoden angewandt worden um aus den durch Messungen bestimmten Theilungsfehlern diejenigen, welche einem Gesetze folgen, und welche an einem Kreise, der mit Nonien abgelesen wird, allein in Betracht kommen, herzuleiten. Ich bin hierheistruve's Beispiel gefolgt, und habe den Theilungsfehler sinemit u bezeichneten Punkts des Kreises =

$$p + p \cos 2 u + q^{T} \sin 2 u + p^{T} \cos 4 u + q^{T} \sin 4 y + p^{TT} \cos 6 u + q^{TT} \sin 6 u + p^{TT} \cos 8 u + q^{TT} \sin 8 u$$
 gesetzt.

So habe ich gefunden:

Correction =
$$+0''.2258 - 0''.0655 \cos 2 u - 0''.0080 \sin 2 u$$

 $-0''.1482 \cos 4 u - 0''.1629 \sin 4 u$
 $+0''.4944 \cos 6 u + 0''.0791 \sin 6 u + 0''0661 \cos 8 u$
 $+0''.0794 \sin 8 u$

oder nach einer gewöhnlichen Umformung:

Correction =
$$+0$$
".2258 + 0".0660 Sin (2 u + 263°0')
+ 0".2202 Sin(4u + 222°18')
+ 0".0933 Sin (6 u + 31°59'.5)
+ 0".1033 Sin (8 u + 39°47')

Die Summe der Quadrate der Abweichungen der Formel von den Beobachtungen finde ich = 5.82860 und daraus den wahrsch. Fehler der Formel = \pm 0'. 2223, sehr nahe gleich dem von Struve gefundenen = \pm 0". 244.

Da jeder der Nonien sich über 4°27' am Limbuskreise erstreckt, muss in der obigen Formel u + 2°13'.5 statt u gesetzt werden, damit die Correction für die Mitte der Nonien gelte. Nach dem das gethan worden, bekommt man:

Correction =
$$+0$$
". $2258 + 0$ ". $0660 \text{ Sin } (2 \text{ u} + 267^{\circ} 27')$
+ 0 ". $2202 \text{ Sin } (4 \text{ u} + 231^{\circ} 12')$
+ 0 ". $0933 \text{ Sin } (6 \text{ u} + 45^{\circ} 20'.5)$
+ 0 ". $1033 \text{ Sin } (8 \text{ u} + 57^{\circ} 35')$.

Die Vergleichung der aus dieser Formel folgenden Reduction des Mittels der Ablesungen der Nonien I und III zum Mittel des Ablesungen aller Vieren mit der von Argelander) gefundenen giebt nicht so befriedigende Resultate, wie die sind, welche Struve am Dorpater Kreise bekommen hat. Ich finde nämlich aus obiger Formel diese

Reduction = +0".0660 Sin (2u + 267° 27') + 0".0933 Sin(6u + 45° 20'.5)

Argelander dagegen = -0.2125 + 0.1847 Sin (2 u + 116 21). Wenn man aus dem ersten Ausdruck den von 6 u abhängigen, und aus dem zweiten den constanten. Theil weglässt, so wird der Unterschied der beiden =

0'.1847 Sin $(2 u + 116^{\circ} 21) - 0.0660$ Sin $(2 u + 267^{\circ} 27) = 0'.2445$ Sin $(2 u + 108^{\circ} 51'.6)$,

also ist der grösste Unterschied = 0".2445.

6.

Um aus dem obigen Ausdrucke der Correction wegen Theilungsfehler, welche für 2 Nonien gilt, die Correction für 4 Nonien zu finden, muss man das Mittel aus den für u und für u + 90° geltenden Correctionen nehmen, und man hat also für 4 Nonien die

^{*)} Observationes Astronomica in specula Universitatis litterariae Fennicae factae. Tom. II. Seite XXI.

Correction =
$$+0^{\circ}.2258 - 0^{\circ}.2202 \text{ Sin } (4\text{ u} + 51^{\circ} 12^{\circ}) + 0^{\circ}.1033 \text{ Sin } (8\text{ u} + 57^{\circ} 35^{\circ}),$$

aus welchem Ausdrucke ich es am bequemsten finde den constanten Theil ganz wegzulassen. Aus den 2 übrigen Gliedern ist die folgende Tafel berechnet worden.

ū	Corr.	и	Corr.	u	Cerr.	п	u Corr.		Corr.
0.	- 0.08	20:	- 0!23	40:	+ 0.15	60:	+ 0.21	80°	- 0.05
1 2	- 0.00	55	- 0.23	42	+ 0.20	62	+ 0.17	82	-0.08
+	- 0.10	24	- 0.22	44	+0.24	64	+ 0.12	84	- 0.05
1)	- 0.11	26	-0.20	46	+ 0.27	66	+0.08	86	- 0.08
3	-0.13	28	<u> </u>	48	+0.30	68	+ 0.04	88	- 0.05
10	- 0.15	30	— 0.13	50	+ 0.31	70	+ 0.01	90	- 0.08
12	-0.17	32	- 0.05	52	+0.31	72	- 0.02		
1-1	- 0.19	34	- 0.02	54	+0.30	74	- 0.05		
16	-0.21	36	+0.03	56	+0.25	76	- 0.07		
18	-0.22	38	+ 0.09	58	+ 0.25	78	- 0.08		

In dieser Tafel gilt jede Correction natürlich nicht nur für u sondern auch für 90°+ u, 180°+ u und 270°+ u.



MINNES-TAL

ÖFVER

JOHAN JACOB NERVANDER,

Philosophiæ Doctor, Ordinarie Professor i Physiken och Föreståndare för Magnetiska och Meteorologiska Observatorium vid Keiserl. Alexanders-Universitetet i Finland, Riddare af Keiserl. S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class och Ledamot af flere Lärda Samfund,

BÅLLET

på Finska Vetenskaps-Societetens Årshögtid den 29 April 1848

AF

HENR. GUST. BORENIUS.





Till Finska Vetenskaps-Societetens vid dess stiftelse antagna stadgar gjordes redan under första året af dess tillvaro, utaf en för densamma smärtande anledning, det tillagg, att Societeten på sin Års- och Högtidsdag genom en kort framställning skulle fira miunet af hvarje dess under det förflutna året hadangångne Ledamots lefnadsöden och vetenskapliga förtjenster. Samme man, som på Societetens första årshögtid, den 29 April 1839, tolkade detta Samfunds saknad och bittra smärta öfver Chemiæ Professoren P. A. v. Bonsdorffs tidiga död, höll på Societetens vägnar sex år sednare, den 29 April 1845, ett minnes-tal öfver en af Societetens, den Finska Högskolaus och Fosterlandets utmärktaste medlemmar, Senioren ibland Universitetets Professorer, Doctor G. G. Hallström. Sedan dess hafva blott tre år förflutit och åter fire vi en sorgefest lika bitter och sniärtansfull som de begge föregående, men af en vida mera oförmodad anledning. Så litet har den önskan gått i fullbordan, som talaren den 29 April 1839 vitrade, att det måtte vara länge innan Vetenskaps-Societeten åter skulle nödgas utse någon, för att utföra ett lika sorgligt värf, som han sig då åtagit. Han sjelf, som med snillets kraft och teckningens fulländade sauping framställt de stora förluster, som Societeten och Fosterlandet

hidit genom pamode atmärkte vetenskapsidkares beriglieg, han solf ar nu icke mera bland de lesvande. Vi fire i dag hans minne, minuet af en ildand Finska Vetenskaps-Societetens stiltare och most nitiska medlemmar, minnet af Societetens under året assidne Ordforunde, Professoren i Physiken vid Kejserl. Alexauders-Universitetet, Ledamoten af flere Vetenskapliga Föreningar, Riddaren af Kejserl. Sa Wladininsorders 4 de Class Padusophie Doctoren Johan Jacob Nervander, och mig bligger grunn Societetens vordede appelreg den singliga plige, att framställe den hildenglognes fotoad och literara verksamhet, samt dymedelst den högst smärtsamma och måbanda för en lång framtid oersättliga förlust, som nu åter, for tredje gången icom den korta tidrymden af nio år, drabbat särdeles Naturvetenskaperne uti vårt Fosterland, hvilket annu icke huppit glimma den gram Professoren Argelanders brothyttill g till sitt forra beinland två är dessförinnan lidna i högsta mån känbara sakuaden.

Johan Jacob Nervander föddes i Nystad den 23 Februarii 1805, af föräldrarne, Apothekaren i nämnde stad Johan Nervander, och dess ännu lefvande maka Beata Bergbonn. Efter åtnjuten undervisning, först i Uleåborgs Trivialskola och sedan uti Kathedralskolan i Åbo blef han är 1820 inskrifven såsom Student vid Universitetet derstädes. Disputerade 1822 pro exercitio, under sin minhaus, illivata de Philos phile Adjuncten Bergtons praside. Undergick 1827 Philos phile Cand late vinnen und det arbiblios vitsordet Dignissimus. Disputerade pro gradu samma år under

Professorea von Bonstorffs præsidio. Blef samma år den 10 Julii promovered till Philosophiae Doctor och Artium Liberalium Megister, vid hvilket tillfälle första hedersrummet vid Promotionen honom tillfüll. Speciminerade vir-termin 1800 für Dicentur i PLvsiken. Blef den 1 Julii samma år utnämnd till Docens. Förordnades 1829 att noder den tid, Professoren Hallstrom genom sina Rectors alleganden var Lindrad ett sjelf bestrida fürelesningarna i Physiken, foresta lians Profession, hvilken befattning fortfor till slutet af vartermin 1832. - Blef 1829 vald till Curator för Österbottuiska Afdelningen, hvilken befattning han innehade till år 1837. Speciminerade 1832 den 22 Februarii fur Adjuncturen i Mathematiken och Physiken, och utuåmades samma är den 19 Maj till Adjunct i dessa vetenskaper. Erhöll, ester derom gjord ansökning, det då nyligen för resor i veteuskapligt afseende siifiade understödet, hvarester han om hösten 1832 reste ösver till Sverige. samt sedermera till Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien. Under sin vistelse i Frankrike lemmade han till Franska Vetenskaps Academien en Mem tre Ofver den af honom då nyligen uppfunn: Galvanometern. På sin återresa genom Tyskland beslöt han att droja ragon tid i Munchen, for att derstädes under egen ledning lata furfurdiga nyssuamoda instrument. Men som detta arbete fordrade en längre tid, än som ban först hade beräknat, kunde han icke förr än i början af år 1836 återvända till hemmet. Då härigenom kostunden for rosan betydligen kom att öfverstiga det till sådant andamil bestamde beloppet, beriljades samma resestipendium Nervander om våren 1837 ytterligare, emot förbindelse af honom, att under loppet af trenne somrar göra utländska resor, dels för att practicera vid något Magnetiskt Observatorium, dels för att under egen uppsigt låta af skickliga Mechanici förfärdiga de apparater, som voro behöfliga för fortsättningen af hans påbörjade electromagnetiska undersökningar, och för de i sådant afseende nödiga experimenter; hvarefter han åren 1837—39 under sommarferierne i nyss uppgifna ändamål gjorde tre särskildta resor till Tyskland.

Medan Nervander under sina resor utomlands hesokte de Magnetiska Observatorierna i Milano, Muuchen Gottingen Berlin. m. fl. uppstod hos honom en lislig onskau, att asven hos oss sa en dylik inrättning å bane. Med största värma och en honom, då det gällde att genomföra en plan, egnad att befordra vetenskapens tillväxt, egen ihärdighet, omfattade han nu denna angelagenhet, och det lyckades honom slutligen, att se sina önskningar krovas af framgång. Universitetet underrättades nemligen genom ett Kauslersbref af den 19 Martii 1838 derom, att, "då det ofverensstämmer med Hans Kejserliga Majestats Nådiga afsigter, att intet, som kan befordra vetenskapernas framsteg, hör vara fremmande för Finlands högsta Läroaustalt, Hans Majestät i Nåder velat bifalla till igrättande vid Alexanders-Universitetet af ett Magnetiskt Observatorium." Till uppköp af de nödvändigaste instrumenter blef en summa af 2600 Rub. Bico Ass. sastställd, och ett arligt anslag at 1000 Rub. Ithale his Bigo Assignationer, while the Observatorii inrattnings underhåll, dels till instrumenters och andra redskaps uppköp, äfvensom till instrumenternas reparation, beviljad.

Med outtröttlig ifver ledde Nervander uppresandet af Observatorii bygguad, och hvarken mödor eller obehag, för hvilka han ofta var utsatt, kunde förlama hans krafter. Han styrktes dervid af hoppet, att 'snart se sig vid målet af sina lifligaste önskningar. Innan kort var äfven ett Magnetiskt Observatorium uppfördt; men den ostörda glädjen deröfver unnades Nervander icke länge. Den med så stor omsorg inrättade, och först nyss förut fulländade byggnaden blef nemligen natten emellan den 18 och 19 Januarii 1845 ett rof för lågorna. Väl beviljades, genom ett Nådigt Kejserligt Rescript af den 22 April 1846 uppförandet af ett nytt Magnetiskt Observatorium i det nyligen afbrunnas ställe, äfvensom det fastställdes, att den dertill erforderliga och förslagsvis till 3139 Rubel 57 kopek Silfver beräknade kostnaden, uppå i mån af behofvet skeende requisition, skulle af Statsmedel till Universitetets disposition ställas. Men äfven denna gång skulle våra förhoppningar, på ett lika smärtsamt som oväntadt sätt, svikas. Det nya Observatorium var till sin inre inredning ännu icke till alla delar fulländadt - då Nervander sjelf hvilade i jordens sköte, uti sin krastigaste mannaålder bortryckt af en sjukdom, hvilken, ehuru i början ausedd såsom föga farlig, likväl hastigt slutade hans verksamma lif.

Att Nervanders rastlösa bemödanden för inrättandet af ett Magnetiskt Observatorium, som i alla afseenden kunde motsvara

tidens kraf, och hans omsorg om dess förseende med dugliga instrumenter, alvens in hans liver for uppnaende af storsta noggranhet vid observationers anställande, icke undfallit en högsint styrelses uppmatksamhet, derem vittnar icke mindre det fortroeude, hvarmed Nervander hedrades, och de utmarkelser, hvilka tid efter annan honum tilldelades, an den utemordentliga frikostighet, hvarmed anskassandet af alla för observationers anställande och fullkommande erforderliga hjelpredor at en fiderlig regering understoddes och befordrades. Tv likas im Rysslands Central-Observatorium i Pulkova under Struves ösverinseende, och äsven vårt Astronomiska Observatorium, medan Argelander sasom dess foreständare inn hade ledningen deraf, voro foremal för vår upplyste Monorks synnerliga valvilja, icke mindre har Finlands Magnetiska Observatorium under Nervanders uppsigt och vard ilerfaldiga gingor blifvit huguadt med nya vedermålen af Kejserlig vonest och nad. Till adagalaggande håraf vill jag har i konthet upptaga innehallet af nagra under de seduare aren till Alexanders-Universitetet från dess Hoge Kansler ankomna skrifvelser. Salunda innehaller det ofvan aberopade Kanslersbrofvet af den 19 Martii 1838 om uppforande af ett Magnetiskt Observatorium, afv usom Loningshus for Observatore, som nodvandigt måste stadse vistas a stallet, bland annat, att Hans Kejserliga Majestat genom Nadigt Rescript, som blifyit till Kejserliga Senaten for Finland i vanlig ordning ofverlemnailt, fumnit godt utnamna och forordna Nervander att vara Extraordinarie Professor vid Alexanders-Universitetet och förestå dess

7

Magnetiska Observatorium; kommande Nervander, som ägde bibehålla sin dittills innehafda Adjuncts lön, att, utom redan nämnda fria boningsrum vid Observatorium, personelt åtnjuta ett lönetillskott af 1500 Rubel Banco Assignationer om året; dock att dessa särskildta förmåner för Nervander skulle upphöra, så snart en lämpelig Ordinarie Professors beställning och lön kunde honom tillgodo komma.

Kanslersbrefvet af den 15 Martii 1841 innehåller: det Hans Kejserliga Högher, Alexanders-Universitetets Höge Kansler, i betraktande af Professor Nervanders nitiska bemödanden, att, innan Magnetiska Observatorium hunnit uppföras, bringa denna inrättning provisionelt till stånd, funnit godt tillägga bemälte Professor en emot ett och ett halft års anslag till ved, ljus och betjening för Observatorium svarande summa af 450 Rubel Banco Assignationer.

Kanslersbrefvet af den 12 April samma år meddelar, att Hans Kejserliga Majestät, i betraktande af Föreståndarens för Universitetets Magnetiska Observatorium, Extra-ordinarie Professoren Nervanders ådagalaggda nit och vetenskapliga bemödanden i Nåder velat bevilja Nervander ett ytterligare lönetillskott, stort 250 Rubel Silfver om året, räknadt ifrån början af år 1841 intill dess han vunnit befordran till Ordinarie Professor vid Universitetet.

Ett annat nådigt bref, äfvenledes af den 12 April 1841, meddelar, att Hans Kejserliga Höghet, Alexanders-Universitetets Höge Kansler funnit godt bifalla dertill, att de Magnetiska observationerna under loppet af tre år å det vid Alexanders-Universitetet inrättade Magnetiska Observatorium finge efter samma utvidgade plan anställas, såsom desamma ifrån början af år 1841, till närmare utredande af lagarne för jordmagnetismen, på en i England i sådant
afseende till sydpolen utrustad expeditions föranstaltande redan å
flere orter förehades; äfvensom att Hans Kejserliga Majestät till
aflonande af Tolf Amatuenser och till erforderliga expense-medel
under förberörde tid Nådigst velat af Finska allmänna medel bevilja en emot det sammanraknade kostnadsbeloppet svarande summa
at 2830 Rubel Silfver, att under loppet at tre år, raknadt ifrån och
med år 1841, utgå.

I skrifvelse af den 19 Julii samma år meddelas, att Hans Kejserliga Hoghet, Universitetets Hoge Kansler funnit godt hifalla till uppförande af en flygelbyggnad vid det for Observatorn bestamda boningshus, innehållande en sal för observationers anstallande å jordmagnetismens inclinations variationer, jemte ett rum för Amanuenserne, samt att Hans Kejserliga Höghet till Consistorium öfverlemnat, att om detta byggnads arbetes bringande till verkstallighet draga försorg.

Kauslersbrefvet af deu 29 November samma år innehåller, att som de 1000 Rubel Bauco Assignationer, hvilka under den 19 Martii 1838 blifvit af Hans Kejserliga Majestat i Nåder auslagne till det vid Alexanders-Universitetet inrättade Magnetiska Observatorium befunnits vara för behofvet otillräckliga, Hans Majestät Kejsaren velat af allmänna medel i Nåder bevilja, icke allenast 1000 Rubel till uppköp af de vid Observatorium ännu felande apparater och inventarier, utan och ett årligt anslag af 150 Rubel, allt Silfver, till Magnetiska instrumenters inköp och reparation.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Reskript af den 9 April 1845 innehåller, att Hans Kejserliga Majestät, på det de vid Alexanders-Universitetets i Finland Magnetiska Observatorium tre år dessförinnan påbörjade och sedermera oafbrutet fortgående observationerne öfver jordmagnetismen måtte kunna ytterligare fortsättas intill den 1 Augusti 1846, funnit godt af Finska Statsmedel bevilja en summa af 1180 Rubel Silfver, att för nämnda ändamål användas.

Uti Nådigt Reskript af den 15 Julii 1846 meddelas, att, sedan Hans Kejserliga Majestät i Nåder anbefallt, att de i afseende å närmare utredande af lagarne för jordmagnetismen i Ryssland anlagde Observatorier skola än vidare med sin verksamhet fortfara intill 1848 års utgång, samt, uppå Kanslerns för Alexanders-Universitetet framställning tillåtit, att jemväl det i Helsingfors befinteliga Magnetiska Observatorium, hvilket enligt Nådigt förordnande skulle intill den 1 Augusti 1846 i berörde observationer deltaga, finge ytterligare fortsätta i fråga varande observationer intill 1848 års slut, Hans Kejserliga Majestät i Nåder funnit godt för sagde ändamål af Finska Statsmedel bevilja en summa af 2278 Rubel 60 kopek Silfver, dels till arfvoden åt tolf vid observationerna behöflige Amanuenser, dels till bestridande af de i och för detta företag vid Magnetiska Observatorium ökade afgifter för expenser.

Kanslersbrefvet af den 5 April samma år meddelar, att Hans Kejserliga Majestät vid skedd underdånig föredragning af Consistorii Academici förslag till återbesättande af ledigblefne Professionen i Physiken vid Alexanders-Universitetet, funnit godt att till Professor i berörde vetenskap utnämna Adjuncten, Extraordinarie Professoren, Doctor Nervander; kommande Professoren Nervander att jemväl framdeles fortfara med dess befattning såsom Föreståndare för Universitetets Magnetiska Observatorium; äfvensom, att Hans Kejserliga Majestät derjemte, uppå Universitetets Höge Kanslers framställning velat tillåta, det må Nervander af de lönetillskott, utgörande tillsammans 678 Rubel 57 kopek Silfver om året, hvilka han i och för sistnämnde befattning dittills åtnjutit, framdeles bibehålla 500 Rubel sagde mynt årligen.

Af det föregående finner man, att Nervanders förtjenster för befordrande af vetenskap äfven å högre ort blifvit erkända. Att Nervander äfven varit en i ganska många afseenden utmärkt personlighet, visar sig annu tydligare vid en mera detaljerad granskning af den hådangångnes person, och hans verksamhet, både såsom Författare och Lärare vid det Finska Lärosätet. Af naturen begåfvad med vackra, ädla anletsdrag, hela hans yttre väsen vittnande om ungdomlig helsa och kraft, till lynnet öppen och glad, och af en stundom till lättsinne gränsande munterhet, saknade han likväl icke fasthet, allvar och värdighet, vid tillfällen, der dessa egenskaper togos i anspråk. Hvad som hufvudsakligen utmärkte Nervander var en utomordentlig mångsidighet i kunskaper och bildning, icke mindre sällsynt bland vetenskapsidkare, än bland andra samhallets medlemmar, och der en sådan mångsidighet fore-

finnes, är den i de flesta fall förvärfvad på bekostnad af grundlighet. Sådant var likväl icke förhållandet med Nervander; tvertom voro just en de minsta detaljerna genomletande grundlighet i förening med ett ovanligt snille och en outtröttelig arbetsförmåga hans mest framstående egenskaper.

Ester Nervanders inträde såsom Studerande vid det Finska Universitetet tyckas isynnerhet de klassiska språken allraförst hafva ådragit sig hans uppmärksamhet; och äfven den Heliga Skrifts hebraiska grundtext studerades af honom med icke ringa ifver. Jag har hört honom sedermera yttra, att dervid isynnerhet skildringen af Jephtha uti Domare Boken i hög grad fängslade hans intresse, och enskildta partier af hans sedermera under titel Jephthas Bok utgifna ninnessång lära redan då af honom hafva blifvit poetiskt bearbetade. Philosophin och isynnerhet Historien voro de studier, som dernäst af honom med förkärlek omfattades. De sista åren af sin studii-tid egnade han hufvudsakligast åt Physiken, och de dermed beslägtade vetenskaperna: Kemin och Mathematiken. Med hvilket allvar äfven studium af sistnämnda veteuskap af honom bedrefs, kunna alla de intyga, hvilka jemte honom och mig bivistade vår gemensamme Lärares såväl offentliga som enskilda lärotimmar.

Med de kunskaper Nervander sålunda förvärfvat, hade han innan kort kunnat vara färdig, att beklada nästan hvilken lärostol som helst vid Universitetet. Hans då väckta håg för studium af

Det är bekant, att Galvanometern, eller den Galvaniska Multiplikatorn, är ett ibland de vigtigaste instrumenter vid electromagnetiska undersöhningar. I hörjan åtnöjde man sig med, att uti de Galvaniska Multiplikatorerne ega mycket kánsliga Electroskoper. det ar instrumenter, som tydligt tillkånnagifva närvaren af electriska strömmar, äfven då dessa äro mycket svaga. Men de resultater man erhöll genom skilda Multiplikatorer voro sinsemellan icke jemförliga; man hade till och med ännn icke funnit någon lag, hvaraf förhållandet emellan electromagnetiska krafters intensitet, och amplituden af magnetuâlens motsvarande deviation berodde. En forbåttrad inrättning erhöll detta instrument först genom Nobili; likvål uppnåddes ändamålet af honom icke fullståndigt. Detsamma gäller äfven om den vid Naturforskare- och Läkaresammanträdet i Stuttgard of Dir Neef forevisade, så kallade allmanna Multiplikatorn. Den af Nervander uppfunua, och uti omförmälda afhandling beskrifna inrättningen af instrumentet skiljer sig ifrån de foregående hufvudsakligast deruti, att trådapparaten icke är såsom vanligen parallelipipedisk, utan cylindrisk. Härigenom vinnes den fördel, att magaetnålen alltid förblir på lika afstånd ifrån trådarne, hvilket eljest icke är fallet. Nervander fann, hvilket äfven sedermera af sakkannare befunnits vara öfverensstämmande med verkliga förhållandet, att för declinationer, som icke öfverstiga 30 grader, nålens declinations-vinklars tangenter blifva proportionella emot de verkande electriska strömmarnas styrka. Kunde nu äfven något visst normalmått uppgifvas såsom enhet för styrkan af den electriska strömmen, och skilda Multiplikatorers resultater sålunda göras sinsemellan jemförliga, så skulle denna apparat, såsom en full-komligen noggran electrometer, kunna utvisa den electriska strömmens intensitet.

Nervander förevisade detta instrument allraförst, och höll deröfver ett föredrag vid Naturforskare- och Läraremötet i Bonn i September 1835; samt sedermera den 20 Julii 1840 härstädes vid Finska Vetenskaps-Societetens då under Jubelhögtidligheterna hållna sammanträde.

Uti den af Kejserliga Vetenskaps-Academien i S:t Petersburg utgifna Bulletin Scientifique förekomma följande tvenne afhandlingar af Nervander:

Untersuchungen über die tägliche Veränderung der magnetischen Declination. Heft I (föredr. den 2 Augusti 1839) et II (föredr. den 4 September 1840), och

Lettre de M. le Professeur Nervander de Helsingfors à M. Hess (föredr. den 19 Januari 1844).

Dessa afhandlingar, hvilka hvardera i hög grad äro förtjenta af uppmärksamhet, hafva till föremål: den förra, att ådagalägga, att utom de tvenne förut redan kända undulationerna uti de magnetiska declinations-variationernas allmänna gång, ännu flere sådana förefinnas, hvilka, ehuru till storleken mindre än de tvenne förstnamnda, dock lika som dessa regelbundet återkomma på samma

Det är bekaut, att Galvanometern, eller den Galvaniska Multiplikatoro, ar ett ibland de vigtigaste instrumenter vid electromagnetiska undersöhningar. I horjan åtnöjde man sig med, att uti de Galvaniska Multiplikatorerne ega mycket känsliga Electroskoper, det ar instrumenter, som tydligt tillkannagifva närvaron af electriska strömmar, afven då dessa aro mycket svaga. Men de resultater man erhöll genom skilda Multiplikatorer voro sinsemellan icke jemförliga; man hade till och med ännu icke funnit uigon lag, hvaraf förhållandet emellan electromagnetiska krafters intensitet, och amplituden af magnetnålens motsvarande deviation berodde. En forbattrad infattning erhöll detta instrument först genom Nobili; likvål uppnåddes ändamålet af honom icke fullständigt. Detsamma galler afven om den vid Naturforskare- och Lakaresammantrådet i Stuttgard of Dir Neef forevisade, så kallade allmanna Multiplikatorn. Den af Nervander uppfunna, och uti omförmålda afhandling beskrifna inrattningen af instrumentet skiljer sig ifrån de foregående hufvudsakligast deruti, att trådapparaten icke är såsom vanligen parallelipipedisk, utan cylindrisk. Harigenom vinnes den fördel, att magoetnålen alltid förblir på lika afstånd ifrån trådarne, hvilket eljest icke år fallet. Nervander fann, hvilket afven sedermera af sakkannare befunnits vara öfverensstammande med verkliga förhallandet, att for declinationer, som iche ösverstiga 30 grader, nålens declinations-vinklars tangenter blifva proportionella emot de verkande electriska strommarnas styrka. Kunde nu äsven något visst normalmätt uppgifvas såsom enhet for styrkan af den electriska strömmen, och skilda Multiplikatorers resultater sålunda göras sinsemellan jemförliga, så skulle denna apparat, såsom en full-komligen noggran electrometer, kunna utvisa den electriska strömmens intensitet.

Nervander förevisade detta instrument allraförst, och höll deröfver ett föredrag vid Naturforskare- och Läraremötet i Bonn i September 1835; samt sedermera den 20 Julii 1840 härstädes vid Finska Vetenskaps-Societetens då under Jubelhögtidligheterna hållna sammanträde.

Uti den af Kejserliga Vetenskaps-Academien i S:t Petersburg utgifna Bulletin Scientifique förekomma följande tvenne afhandlingar af Nervander:

Untersuchungen über die tägliche Veränderung der magnetischen Declination. Heft I (föredr. den 2 Augusti 1839) et II (föredr. den 4 September 1840), och

Lettre de M. le Professeur Nervander de Helsingfors à M. Hess (föredr. den 19 Januari 1844).

Dessa afhandlingar, hvilka hvardera i hög grad äro förtjenta af uppmärksomhet, hafva till föremål: den förra, att ådagalägga, att utom de tvenne förut redan kända undulationerna uti de magnetiska declinations-variationernas allmänna gång, ännu flere sådana förefinnas, hvilka, ehnru till storleken mindre än de tvenne förstnamnda, dock lika som dessa regelbundet återkomma på samma

timmar af dygnet; och den sednare, att visa, att uti temperaturförändringen, utom den årliga och dagliga perioden, äfven en tredje, af solens geocentriska omhvälfningstid omkring sin axel beroende, periodicitet förefinnes. Kan un denna sednare genom temperaturobscrvationer bestämmas, så är derigenom äfven solens geocentriska omhvälfningstid funnen. Sålunda finner Nervander ur
temperaturobservationer, att solen, för att engång rotera omkring
sin axel, behöfver 27,26 dygn, i stället för 27,23 dygn, såsom
Laugier sednast genom observation af solfläckar funnit. Peterlungska Vetenskaps-Aca lemtens Physico-Mathematiska Class yttrar
med anledning häraf, uti ett af dess Ledamöter Struve, Lenz och
Hess undertecknadt utlåtande af den 5 April 1844, följande:

"Om man betänker, att den astronomiska bestämningen alltid lemnar en osäkerhet öfrig, för solfläckarnes rörlighets skull, så
kan man icke draga i betänkande, att såsom riktigt antaga det
värde af solens rotationstid, hvilket bäst öfverensstämmer med de
meteorologiska observationerna; och här inträffar sålunda för första
gången det markvärdiga factum, att en till vårt solsystem hörande
företeelse blifvit bestämd genom meteorologin, den osäkraste af
alla vetenskaper, med större noggranhet än den, som genom astronomiska observationer har kunnat uppnås." Detta ofvannämnde
namnkunnige vetenskapsmäns yttrande antyder tillräckligen vigten
af ifrågavarande afhandling.

Uti Finska Vetenskaps-Societetens Acter förekomma, utom de tvenne redan omnämnda Minnes-talen öfver Professorerne von Bonsdorff och Hällström, följande uppsatser af Nervander. Uti Tom. I.: Ueber das Vorkommen einer bisher übersehenen Undulation im Gange der täglichen Temperatur-Curve (föredr. den 14 Martii 1842).

Uti Tom. II.: Berechnung von Beobachtungen des täglichen Ganges der Temperatur in einigen arctischen Gegenden (föredr. den 24 April 1846).

Utom dessa hafva ännu följande afhandlingar af Nervander blifvit anmälda, såsom ämnade att framdeles uti Societetens Acter offentliggöras. Den 7 April 1845 anmältes en afhandling Om de oregelbundna variationerna i Magnetiska Declinationens dagliga gång; den 24 April 1846 en afhandling Öfver minsta qvadratmethodens användning till beräknande af observationer öfver temperaturens dagliga variation; den 12 April 1847 tvenne arbeten på Franska språket, det ena innehållande en Beräkning af observationer å Magnetiska Declinationens variation, anställda i Helsingfors hvar tionde minut, ifrån den 1 Juli 1844 till samma tid året derpå, och det andra en Framställning af några ovanliga Meteorologiska fenomener, iakttagna i Helsingfors år 1846.

Utom dessa förekommer ännu en år 1844 enligt Nådigt förordnande utgifven Kurs i Arithmetiken för Elementar-Läroverken uti Storfurstendömet Finland; äfvensom uti Morgonbladet för år 1832 en Nekrolog öfver Anders Gustaf Simelius, Leeter vid Gymnasium i Åbo, och slere mindre uppsatser i åtskilliga i Fiuland utkomne tidningar.

Afven har dels vid Societetens årsdagar, dels vid dess ordinarie sammanträden ett större antal föredrag af Nervander blifvit hållet, afvensom experimenter med nyare Physiska apparater af honom anställts, såsom Webers Magneto-Electriska apparat, en modell till Jacobis Magneto-Electriska drifhjul, m. fl. I sammanträdet den 26 April 1841 anställde Nervander inför Societeten det intressanta och här icke förut sedda experimentet med det ifrån tvenne planspeglar reflecterade ljusets interferens, hvilket, af Fresnel allraforst gjorda experiment, for ljus-theorin är af högsta vigt, emedan det anda hittills ännu icke lyckats att förklara detsamma enligt den for sin större enkelhets skull förut mera allmant fölida Newtonska emanations-theorin, och emedan sålunda den Eulerska undulations-theorin hufvudsakligast genom detta försök i nyare tider tillvunnit sig en icke bestridd seger. Vid Societetens årsdag den 29 April 1841 lemuade Nervander en af experimenter upplyst framställning af Galvanismens användande i techniskt afseende, vid hvilket tillfälle äfven åtskilliga utmärkt lyckade galvanoplastiska aftryck, gjorda af galvanoplastikens uppfinnare Jacobi i S:t Petersburg, af honom förevisades.

Tiden medger icke, att här ingå i uppräknande af alla dessa föredrag och experimenter *). Må det endast vara mig

^{*)} Bland de isrån Vetenskaps-Societetens stistelse till och med år 1847 hållna 89 föredrag förekomma 23 af Nervander; ett högre belopp, än

tillåtet, att ännu särskildt fåsta mina Vördade Åhörares uppmärksamhet på en af Vetenskaps-Societeten under de sednaste åren på
Nervanders förslag och tillstyrkan vidtagen åtgård, hvilken icke
kan undgå, att i en framtid för vetenskapen lemna de vigtigaste
resultater.

Det var nemligen Nervander, som först gjorde Societeten uppmärksam på nyttan af i större autal utdelade formulärer för klimatologiska observationers anställande. Bland de fenomener, som närmast bero af klimatet såsom dess verkningar, är vextligheten ett bland de vigtigaste. Klimatologer hafva derföre på sednare tider begynt genom noggranna observationer bestämma tiden för vexters löfsprickning och löffällning, blomning och utblomning, fröbildning och frömognad m. m.; vidare tiden för allmänt kända flyttfåglars ankomst och bortflyttning; tiden för floders och sjöars isläggning och islossning o. s. v. Deras tidigare eller sednare inträffande i ett land är att anses såsom en följd af jordmånens, temperaturens, ljusets, lufttryckningens, luftfuktighetens och luftelectricitetens, jemte flere andra ännu outredda omständigheters sammansatta verkningar, och måste således bidraga att lemna en bild af landets klimat. Då Finland i anseende till sitt nordliga läge, sin stora vidd och sin skogiga, af sjöar och karr genombrutna yta måste lemna högst intressanta resultater, har Vetenskaps-Societeten, som anser

som af någon annan bland Societetens Ledamöter under denna tid blifvit hållna.

for ett af sina vigtigaste åligganden, att använda den vetenskapliga forskningen på föremål, som mera specielt angå Fåderneslandet, så mycket hellre delat Nervanders åsigt i detta ämne, som hon kunde vara öfvertygad, att öfverallt i landet finna upplysta och för vetenskapens bästa intresserade personer, som med nöje skulle omfatta detta och hvarje tillfälle, att bidraga till Fosterlandets kännedom och vetenskapens framsteg. Företaget har äfven haft all den framgång, som man med billighet deraf kan begära. Årligen har ett stort antal formulärer till Societeten blifvit återskickadt, innehållande en mångd iakttagelser, gjorda i alla delar af landet; och vi kunna häraf uti en framtid för Finlands klimatologi vänta de vigtigaste resultater.

Nervander kallades till Ledamot af Physikalischer Verein in Frankfurt år 1835: af Kejserliga Finska Hushållningssallskapet 1837, och af Kejserliga Vetenskaps-Academien i S:t Petersburg 1844. Han var Ledamot af Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica, samt af Finska Literatur-Sällskapet från deras stiftelseår, och en bland Stiftarene utaf Finska Vetenskaps-Societeten och Finska Konstforeningen. Till Riddare af Kejserliga S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class utnämndes han i Nåder den 23 December 1843; och ännu den 19 dennes har Komitén för utdelande af Demidoffska priserne, för hans Magnetiska Observationer, hvaraf en del åro tryckta och en annan i manuskript till S:t Petersburg inskiekade, illigkommit hans familj med halfva Demidoffska priset.

Nervander var gift med en dotter till framlide Ledamoten i Kejserl. Regerings-Conseillen för Finland, Lagmannen Ahr. Öhman. Han öfverlefves af henne, äfvensom af två söner och tre döttrar. Han afled härstädes den 15 sistlidne Martii, och jordfästades den 20 i samma månad. Ett Minnes-tal öfver honom har blifvit hållet den 17 April af Rector Scholæ, Docens i Historien vid Kejserliga Alexanders-Universitetet Fredrik Cygnæns.



MINNES-TAL

ÖFVER

JOHAN GABRIEL LINSÉN,

PHIL. DOCTOR, ORDINARIE PROFESSOR I VÄLTALIGHETEN OCH SKALDEKONSTEN VID KEISERLIGA ALEXANDERS-UNIVERSITETET I FINLAND, RIDDARE AF KEISERLIGA KONGL. S.T STANISLAI
ORDENS ANDRA OCH KEISERLIGA S.T VLADIMIRS
ORDENS FJERDE CLASS, SAMT LEDAMOT AF
FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN,

BÅLLET

på Finska Vetenskaps-Societetens Årshögtid
den 29 April 1849

AF

NILS ABRAHAM GYLDÉN.





De gamla Grekerna, hvilka i smak och skönhetssinne ännu icke af något annat folk blifvit upphunne, än mindre öfverträffade, ansågo, att för de sälla, odödliga Gudarne ej fanns någon skönare, någon herrligare anblick än den af en stor och ådel mans strid och kamp emot det obetvingliga ödet. De tillskrefvo sålunda sina Gudar, till hvilkas förherrligande och för hvilkas åskådande de skapade sina odődliga konstverk, den smak, som egentligen var deras egen. Och deras smak, hvem vill väl jäfva den, så väl i detta som andra afseenden? Det tyckes ju tvärtom höra till de i sjelfva menniskonaturen grundade, eviga sanningarne, att en hvar, som icke är alldeles känslolös för sina medmenniskors öden och lidanden, med intresse och deltagande betraktar dens lefnad, som mer än vanligt pröfvat lifvets bitterhet. Och har en sådan lefnad derjemte varit förenad med den själens adel, som afskyr all dålighet och låghet så i tanke som handlingssätt, samt med den hjertats värme och godhet, som väcker kärlek och tillgifvenhet, så störes detta deltagande icke af några vidriga känslor, utan, medan det för vår blick visar den himmel, som hvilar i ett ädelt hjerta, uppmanar det oss till allvarliga betraktelser öfver lifvets djupare betydelse samt höjer oss sålunda öfver oss sjelfva och våra småaktiga hvardagsbekymmer.

Dessa tankar hafva ofta sväfvat för min själ vid minnet af den man, af hvars lefnad och verksamhet jag nu går att, på Vetenskaps-societetens anmodan, utkasta en om ock endast flygtig bild. De hafva hos mig hufvudsakligen framhallats vid betraktandet så väl af hans yttre lefnadsöden som at hans inre lif, men kunna äfven, såsom mig tyckes, tillämpas på hans literåra verksamhet. Ty om det funnits någon, som i alla dessa afsenden lemnat oss ett djupt rörande, ett sorgligt skönt skidespel. så var det — så vidt jag förmått bedöma förhållandet — Johan Gabriel Linsén.

Redan vid betraktelsen af hans barndomslagar motes vår blick af en sorglig, men skön tafla. Eller ges det någon skönare tafla än den, då ett barn i omedveten oskuld smeker sin grätande moder, utan att ännu hafva någon aning om den bittra sorg, som träffat och söndersliter hennes hjerta, eller någon mera rörande än den, då barnet, myss vaknadt till medvetande, vid anblicken af sin mors tårar visar de första technen af hjertats rörelser, af deltagande och sorg? Det är engeln, som ingjuter tröst i ett blödande hjerta. Och hvardera af dessa taflor tycka vi oss se i Linséns barndomshistorie. Han hade nemligen ännu icke fyllt sitt femte lefnadsår, då hans far i striden för faderneslandet af en väldsam dod hortrycktes från maka och tvenne söner, af hvilka vår Linsén var den äldre. Af kärleken och sorgen

emottog derföre hans unga sinne sitt första intryck. Dock lyckligtvis tränga barndomens sorger icke djupt, och barnets tårar borttorkas snart, likasom den låtta morgondaggen bortkysses af den uppgående solens första strålar. Det faderliga stöd, Linsén sålunda beröfvades, blef dock till en del ersatt, då hans moder ingick ett nytt äktenskap; äfven blef han derigenom redan i sin ålders första vår från stadens laster och flärd bortflyttad till landtbygdens oskuld och enkelhet, der han åtnjöt sin stjuffaders undervisning i skolvetenskaperna, medan hans hjerta emottog outplånliga intryck af naturen, hvilken på barnasinnet plägar göra ett så underbart, hemlighetsfullt och välgörande intryck. Här uppväxte han derjemte skiljd från de frestelser, för hvilka så mången gosse blir ett olyckligt offer, hvilken tidigt lösslites från fädernehemmet och skickas till skolan, för att der möjligen vinna i kunskaper, hvad han i hjertats värme och renhet förlorar. Huru högt Linsén sjelf i sin mannaålder skattade den enskilda uppfostran, synes af de herrliga tankar, hvarpå han bygger sin öfvertygelse om falskheten i den åsigten, att den offentliga uppfostran gagnar barnen mer än den enskilda. "O det kan aldrig uttryckas med ord", säger han bland annat, "hvad inflytande hemmets fristad med sina omgifningar har på den unga själen och det unga hjertat! De obetydligaste föremål äro här så betydelsefulla. Här är den tempelgård, inom hvilken oskuld och glädje vandra säkra och emottaga outplånliga intryck af allt skönt och heligt. Om Gud och Naturen för menniskan skola vara mer än toma ord, så böra de tala till barnet genom en fader och framförallt — en moder. Äfven fosterlandskärleken slår här sina djupare rötter: under den laga hyddans tak ammades verldens största hjeltar."

Det är bekant, att då Linsén vid en ålder af närmare sjutton ar ifrån föräldrahuset och den enskilda uppfostran begaf sig till Universitetet, han dit icke medförde särdeles grundliga eller vidsträckta kunskaper; men såsom en rik ersättning för denna brist medförde han en lefvande kärlek till studier, hvilken sedermera blef hans beständiga följeslagare i lifvet: han medförde vidare — hvilket är ännu vigtigare — ett rent och af inga laster förderfvadt hjerta, ett hjerta, uti hvilket kärleken till Gud och Naturen redan slagit djupa rötter.

Sådan var Linsén, då han beträdde den akademiska banan, en bana, hvilken eljest är så slipprig och farlig, att äfven sjelfva studierna, om de icke idkas i den rätta andan, kunna, i stället för att upplysa förståndet och förädla hjertat, tvärtom framkalla och rotfästa egenkärlek, fäfänga, ärelystnad och andra moraliska lyten af samma natur. Ju lättare det är för ynglingen att i hjertats rena värme förlora hvad han vinner i kunskaper, desto mera upplyftande och lärorik måste, isynnerhet för honom, en betraktelse af det sätt blifva, hværpå Linsén användt sin studiitid, äfvensom af de frukter han deraf skördat. Att han med ovanlig flit och ihärdighet skött sina studier, är genom hans ännu lefvande studentkamrater tillräckligen kändt.

Vigtigare är dock det, att han planterade sitt kunskapstråd, icke i ärelystnadens och fåfängans maskfulla jordmon, utan på Sånggudinnornas invigda tempelgård. Den gamla literaturen, historien och philosophien voro isynnerhet hans älsklingsstudier, och han idkade dem med den framgång, att icke blott hans intellectuella förmögenheter deraf utbildades och stärktes, utan äfven hjertats förädling och phantasiens renhet befordrades. Den kärlek till Gud och natur, som han redan i sin barndom insupit, utvidgades nu till en lefvande kärlek till allt skönt och heligt. Denna kärlek utgjorde i sjelfva verket den egentliga kärnan i hans charakter, var den brännpunkt, hvarifrån hufvudsakligen åfyen undet hans återstående lefnad strålarne af hans andliga verksamhet utgingo. Utom hans studier bidrog till utbildandet af detta älskvärda skönhetssinne framför allt det faderliga hägn och det förtroliga umgänge, hvarmed han omfattades af Finlands dåvarande förste skald Franzén, hvars ljusa blick lätt upptäckte hans herrliga anlag och ädla charakter.

Men kärleken är oegennyttig, och sådan var äfven Linsens. Icke nöjd att både med den äldre och nyare literaturens skönaste alster tillfredsställa sin egen själ, önskade han äfven — och denna önskans uppfyllande utgjorde målet för hans lefnads varmaste sträfvande — att efter sin förmåga och i sin verkningskrets inom fosterlandet väcka sinnet för det sköna och sålunda befordra en ädel själsbildning. Redan såsom Student hade han tagit kännedom om den oöfverträffliga undervisningsmethod, som

Pestalozzi, en af den nyare tidens ädlaste menniskor, hade uppfunnit, och intagen af denna methods förträfflighet började han att äfven sysselsätta sig med pådagogiska studier, för hvilket åndamal kan flitigt ej blott hörde de pådagogiska förelåsningar, hvilka den tiden höllos vid Universitetet, utan äfven bivistade öfningarne i det dåvarande seminarium, hvarefter han undergick den för erhållande af skolläraretjenster föreskrefna examen i pådagogiken. Hans afsigt tyckes då hafva varit att på skolbanan verka på det uppväxande slägtets bildning. Men då genom den at Universitetet år 1811 allernådigst förlånade nya stat flera nya lärareplatser inrättades, öppnades äfven för Linsén utsigt till en vidsträcktare verksamhet vid detta lärosäte, ock denna utsigt förvandlades till verklighet, då han 1812 blef Docens samt följande aret Adjunct i Romerska literaturen derstädes. På denna plats inskränktes hans verksamhet dock icke till den Romerska literaturen, utan han lifvades fortfarande af hoppet att hos allmänheten kunna väcka sinne för den högre själsodling, som hufvudsakligast genom konsten och den sköna literaturen framkallas. Han deltog derföre med några andra yngre literatörer uti utgifvandet af Aura, som innehåller en samling skrifter dels på prosa dels på vers. Denna samling afbröts dock redan följande året 1818 med det andra häftet, och derföre började han att i förening med en aktningsvärd collega *) utgifva ett dagblad, som

^{*)} Framlidne Phil, Prof., dåvarande Adj. Fr. Bergbom.

hade samma syftemål och under namn af Mnemosyne utkom i fem års tid. De uppsatser, hvilka deri förekomma af honom sjelf författade, äro väl icke många, men dessa få af ett så mycket högre värde. De förekomma mig såsom en klar spegel, hvarur hans ädla och älskvärda charakter framlyser i hela sin glans. "Till ett. ideal", säger han deri på ett ställe, "till någonting bortom verklighetens gräns bör menniskan trakta, om hennes varelse ičke skall blifva en färglös tvinande blomma på den sandbetäckta heden". Detta ideal var för honom en på Religionen bygd sedlig odling, förädlad af konsten och det sköna; detta var derjemte icke utifrån lånadt eller lärdt, utan var sammanvuxet med hela hans innersta väsende, dess realiserande utgjorde den egentliga lifsprincipen i hans verksamhet och sträfvanden. Om allt detta vittna förberörde uppsatser på ett ojäfvigt sätt; än uttalar han deri den innerligaste, varmaste kärlek till allt, som bår oskuldens och enkelhetens sköna stämpel, än åter höjer han en kraftig röst emot det, som tyckes strida emot detta hans ideal. Så använder han hela kraften af sin vältalighet emot dem, som den tiden ifrade för den så kallade folkupplysningen, och hans åsigt i detta ämne hvilar på en, kanske mera skön än sann föreställning om folket, hvilken han sålunda framställer: "Det finnes hos menniskor, hvilka pläga kallas obildade, men likväl icke genom ofördelaktiga omståndigheters inflytande sjunkit i verklig råhet, en viss skön enfald, en ontsägligt intagande naturoskuld, i anseende hvartill de ej utan skäl kunna jemfőras med sådana

barn, hos hvilka ingen forvand uppfostran fatt utplana barndomens rorande naivitet och alskvarda lynne. Det ena alvensa val som det andra år ännu en ölverlelva af menniskans paradisiska oskuldsalder, och en osviklig grund for hoppet, att hon en dag skall komma deri tilllaka." Han befarar derföre, att genom all annan än en enkel religionskunskap folkets naturliga oskuld och rena seder skola forderlyas, hvarföre han åfven om utgifvaren af Turan II ukko-Sanomat säger: "jag misstager mig grufligt, om icke verkningarna af hans bemödanden ato for hans fosterland forderfliga". Om vi också nu omkring trettio år sednare betrakta saken något annorlunda, så ligger uti hans åsigt dock den djupa sanning, att folket af kunskaper, om de utan all högre vishet meddelas, verkligen kan fordertvas. Icke mindre modigt drog han i harnad emot de författare, hvilka, såsom hans ord lyda, "vilja begagna pennan och bokprässame till bildandet af hvad man kallar opposition, ett slags corps af skarpskyttar, som på sina smygstigar anfalla hvem de behaga, så snart de hos honom finna nagot klanderligt, och detta finna de hos — alla". Denna hans ovilja emot alla sa kallade oppositionsmän har blifvit missförstadd samt hos en och annan gifvit anledning att misstänka honom för servilism och orättyisa. För servilismen var han dock för högsinnad, och åfvenså var orättvisan oförenlig med hans charakter, om han ock nagongang af en naturlig välvilja blifvit hanford att utöfver den verkliga fortjensten bedöma aflagda kunskapsprof. Men den verkliga grunden till forenämnde ovilja lag

uti hans i sjelfva verket sanna åsigt om ett samhälles bestånd. Han insåg nemligen, att detta bestånd helt och hållet hvilade, icke på physiska krafter, utan på en moralisk grund, och att kärleken vore det band, som ifrån den lägsta hyddan ända upp till thronens glans sammankedjar menniskor med hvarandra. Denna kärlek, "denna enda och osvikliga källa till en sann mensklig lycka, detta hufvudvilkor för allt enskildt och allmänt välstånd" skulle i hans tanke förstöras af oppositionen. "Detta oupphörliga tadel", säger han, "af öfverhetens och embetsmäns handlingar, detta utställande inför allmänhetens ögon af de misstag och felsteg, man hos dem tror sig hafva upptäckt, huru kan man deraf vänta några välgörande följder"? Vi se således, att det icke var en föraktlig servilism, utan idéen om en allmän, hela samhället genomgående kärlek och farhågan för dess förstörande, som gjorde honom så hätsk emot oppositionen. Det är dock äfven lätt förklarligt, att han stundom kunnat begå misstag, att han trott sig se en oppositionsanda, der en sådan verkligen icke fanns, samt derigenom låtit förleda sig till yttranden och omdömen, hvilka gifvit anledning till mindre fördelaktiga tankar om hans känsla af rättvisa.

MM. Herrar! jag kan ej smickra mig af hoppet, att härmed hafva lemnat en åskådlig, än mindre en i alla detaljer fullståndig bild af framl. Prof. Linséns charakter. En sådan kan icke heller så lått med ord framstållas, den måste läsas ur hans

eona skrifter. Men jag vågar dock hysa det hopp, att vid denna charaktersteckning, åtminstone icke hafya begått något väsendtligt misstag; annu mindre befarar jag, att hafva sett och framställt honom i för mycken rosenglans. Jag kan i sådant afseende åberopa hans förberörde skrifter, övertygad derom, att en hvar, som med uppmärksamhet och känsla genomläser dem, skall känna sig betagen af det ljusa förstånd, den djupa känsla och ädla charakter, som så klart och bestämdt uttala sig deri. Jag kan vidare aberopa alla dem, som närmare kände honom; de skola säkert instämma i det vittnesbörd, att han hade en af de ädlaste och älskvärdaste charakterer som finnas. Slutligen kan jag äfven åberopa alla dem, hvilka öfverkufvud äga förmågan att, likasom läkaren af pulsen bedömer kroppens tillstånd, älvenså af hjertats pulsslag sluta till själens beskaffenhet. Om desse blott veta, att det ideal, hvilket Linsén omfattade med hela sitt hjertas värme, var en religiös, sedlig och af konsten förådlad bildning och derpå grundad sållhet inom fosterlandet, så skola de lätt inse, att på en så skon grund icke några oådla drag kunna finnas; de skola medgifva, att flård och fåfånga, egennytta och en falsk årelystnad samt andra dylika passioner icke ens konnat vinna insteg, än mindre blifva rotfästade uti en sådan själ, men framför allt skola de inse, att kärleken till fosterlandet i ett sådant hjerta brann i sin skonaste, renaste låga. I tan syarighet skola de tro, att hela Linséns lefnadsvandel varit så ren och obelläckad, som den verkligen var.

Den som alfvarligen behjertar den älskvärda charakter, som ovedersägligt var Linséns skönaste prydnad, kan väl icke utan en känsla af det djupaste vemod erfara, att denna charakter dock icke för honom grundlade den lefnads sällhet, hvilken eljest trifyes bäst hos naturer af sådan anspråkslös älskvärdhet. Man vore frestad för den tron, att det var af farhåga, att se sin egen oskuld och enkelhet flyttad i ett menniskobröst, som Naturen, då hon utrustade honom med så herrliga själsgåfvor, deri äfven inblandat egenskaper, hvilka för honom blefvo en rik källa till stora lidanden. Hon hade nemligen vid sidan af hans finkänslighet, grannlagenhet och hjertlighet ställt omtåligheten, retligheten och häftigheten, samt åt dessa gifvit en sådan styrka, att han ej förmådde motstå deras anfall. Ofta, ach alltför ofta hänfördes han af dem att handla emot och såra den känsla af grannlagenhet, som eljest var ett så vackert och bestämdt drag i hans charakter. Detta känner verlden mer än väl, men den har sällan blickat i hans inre och sett dess tillstånd efter sådana öfverilningar. Likväl känner man, att äfven under de sednaste åren af Linséns lefnad ett förhastadt utlåtande i den grad grämt honom, att han tillbragt flera somnlösa nätter under svåra samvetsqval öfver detta sitt förhastande. Den som af egen bitter erfarenhet känner samvetsqvalens, dessa afgrundsandars förfärliga marter, och som känner, huru desamma oaktadt allt bemödande att lösslita dem från det arma hjertat, dock orubbligt sitta der, sitta och gnaga obarmhertigt på dess finaste och känsligaste fibrer, han endast kan göra sig en lefvande föreställning om det tillstånd, i hvilket Linsén befann sig under sådana tider. Det var en tragedi, som utfördes i hans inre, och hvem finner icke, att detta inre ofta måste hafva varit en tummelplats för sådana tragiska upptråden. Håri ligger utan tvifvel åfven en af orsakerna till den svåra och mörka sinnesstämning, som mer och mera tog öfverhanden hos honom samt fördystrade hans lefnadsdagar. Måtte derföre alla de, som anse sig på ett eller annat sätt hafva blifvit kränkta af hans häftighet, vid hans minne icke fästa någon känsla af bitterhet, betänkande att det icke fanns eller kunde finnas någon som skarpare såg samt strängare bedömde och straffade hans öfverilningar, än han sjelf, hans eget samvete: måtte de snarare endast ihågkomma den himmel, hvilken så klar och så mild hvilade i hans bröst, då den ej bortskymdes af jordiska vätskor. Matten äfven J, vördade Ahörare, med deltagande, och kärlek till hans minne följa den framställning af hans verksamhet, till hvilken jag nu öfvergår.

Jag har redan ordat något om Mnemosyne och de artiklar, hvilka deri finnas af Linsén. Jag har betraktat dem såsom en källa till hans charakteristik. Jag ville här tillägga, att desamma, äfven utan afseende på denna egenskap, antingen man betraktar tankarnes klarhet, eller känslans djup, eller språkets kraft och behag, hafva ett högt, af vexlande tidsåsigter oberoende värde; de höra öfverhufvud till det förträffligaste, som i vårt land blifvit författadt, samt äro den skönaste och varaktigaste minnesvård, som för honom kunnat

uppresas. Dock, äfven här öfverväldigas vi af en sorglig känsla, då vi mot slutet af Tidningen läsa följande förklaring: "Mitt ephemera ringa författarlif, säger han, har nått sitt slut. När för fem år sedan Mnemosyne lofvades Allmenheten, såg jag med glada blickar dess framtid till möte: Jag djerfdes hoppas, att fosterbygdens Litteratur skulle också genom mig vinna. Tusende dystra förställningar öfverväldiga NU min själ, och säga mig att detta hopp har ljugit". Hvilken tafla! det vackraste oegennyttigaste sträfvande afbrutet under dystra föreställningar om ändamålslösheten af hela sträfvandet!

Såsom skald har Linsén väl icke förvärfvat sig något varaktigt namn, dels derföre, att han författat endast mindre, till en del tillfällighetsdikter, dels ock emedan, han, såsom mig tycktes, saknade den inspiration, som stämplar den verkliga skalden. Hans poesier äro dock ingalunda utan värde;de utmärka sig tvärtom genom en varm känsla, en ädel själsriktning samt en ren diction, och torde derföre alltid läsas med nöje och intresse.

Större framstår han såsom författare i vältagligheten. Det påstående jag hört någon yttra, att han ej kunnat skrifva något, som ej bar vältaglighetens stämpel, tyckes mig ingalunda vara ogrundadt. Åtminstone röjde han, äfven i det minsta, en så ren och enkel smak, att densamma måste betraktas såsom en verklig naturgåfva hos honom. Vore det ock för vågadt att ställa honom i bredd med de utmärktaste Talare, så kan dock det påståendet ingalunda anses öfverdrifvet, att han i detta afseende var en

verklig, utmärkt prydnad för sitt fosterland och dess Universitet. Också var han ganska productif på detta fält; ty vid alla de tillfällen, vare sig af glad eller sorglig anledning, då Universitetet ville offentligen uttala sina känslor, var det alltid Linsén, som med största beredvillighet utförde detta värf.

Wändom oss nu till Linséns verksamhet såsom vetenskapsman och lärare. Skulle man bedöma hans förtjenster i detta alseende efter den mattsock, som hans i form af disputationer utgifna skrifter erbjuda, så kulle desamma visserligen icke kunna uppskattas allt för högt. Tv af dessa skrifter är endast det ringare antalet af egenteligen vetenskapligt syfte, och äfven ibland dem endast tvenne, af mindre omfang, fulländade. Men man skulle då betrakta saken ifrån en oriktig synpunkt och följaktligen begå en stor orättvisa emot hans minne. Jag anser det derföre för en kår pligt att vid detta tillfälle efter förmåga söka framställa den synpunkt ur hvilken hans förtjenster i omförmäldt afseende hulvudsakligast böra bedömas. En sådan synpunkt vinnes säkrast ur sjelfva historien af de klassiska studierna, hvarlöre en betraktelse af hulvudpunkterna i densamma här torde vara på sitt ställe. Jag tager mig derföre friheten, MM. IIII. att vånda Er blick tillbaka till den i menniskoslägtets kulturhistorie minnesvårda period, då efter Constantinopels eröfring af Turkarne flera lärda Greker med sina räddade skatter af forngrekisk literatur flydde till Italien och der funno, icke blott skydd för sig sjellva, utan åfven en bördig jordmån för emottagandet af

denna literatur, hvilken sålunda för andra gången gjorde sitt inträde i Italien, samt derifrån småningom utbredde sig till det öfriga Europa. Samtidigt och i sammanhang dermed började man äfven att med utomordentlig ifver ur sin tusenåriga hvila i jordens sköte uppgräfva de konstverk, hvilka ännu der qvarfunnos ifrån forntiden. Så vål den gamla literaturens som konstens mästarverk studerades och betraktades då med en enthusiasm. som hvarken förut eller sednare i sådan grad egt rum på detta fält. "Ty, säger en nyare författare, då formernas skönhet i Greklands och Roms klassiska mästarverk nu likasom med ett trollslag öppnade sig för den förvånade blicken, så grep denna skönhet alla åskådare genast med en magt, för hvilken allt annat måste vika, så att det nu blef tidsåsigt, att sann mensklig bildning endast af de gamla kunde läras". Också hafva dessa studier sällan, man kan säga aldrig haft ett så mägtigt inflytande på bildningen, som under denna tid. Det voro ju de, hvilka hufvudsakligast förskingrade det barbariska mörker, som under medeltiden hvilade öfver Europa, och hvilka derigenom lade grunden till hela den nyare tidens bildning. Och allt detta, utan att dessa studier då ännu understöddes af någon vidsträckt lärdom eller behandlades efter någon vetenskaplig princip. Småningom började man dock känna behofvet af en mängd kunskaper, såsom medel till att bättre förstå och förklara så väl literaturens som konstens verk; denna lärdom tog under tidens lopp så öfverhanden, att förhållandet emellan ändamål och medel aldeles omvän-

des. Da man förut med tillhjelp af lärdomen studerade den gamla literaturen och konsten för att derigenom bilda sig, så började man nu tvårtom att betrakta lärdomen såsom det egentliga målet, till hvilket man stråfvade genom studium af de gamla författarene. De frön till en human bildning, hvilka i början blifvit utsådda och lofvade en så herrlig växt, borttorkade sålunda småningom under lärdomens börda. Man hade förlorat allt sinne för det sköna i den gamla literaturen och således äfven förmågan att uppfatta detsamma. Denna lärda behandling af de gamles skrift- och konstverk, som tillbakahöll och qväfde all högre lyftning och ådlare bildning fortfor till omkring medlet af förra seklet. Då uppträdde, utgången ifrån en fattig handtverkares ringa hydda i norra Tyskland, en man, som började att med sitt snilles kraft bortskaka det sekelgamla skoldammet och pudret ifrån de lärdas peruker och inblåsa i dem en frisk och lefyande anda. Denne man var Johan Joachim Winckelmann. Drifven af en oemotståndlig kärlek till konsten hade han efter mångfaldiga svårigheter banat sig väg ända till den eviga staden, och der omgifven af de skönaste konstverk, hvilka återstå från forntiden, upptäckte han den enkla och naturliga skönhet, som utmärker dem, en skönhet hvilken väl några sekler förut hänryckt en Raphael, en Michel Angelo och andra den tidens stora mästare, men sedermera varit likasom undangömd för verldens ögon. Det är otroligt, hvilket inflytande så väl de antika konstmonumenterna, som Winckelmanns odödliga konsthistorie sedermera hast icke blott på behandlingen af den klassiska literaturen utan äsven på hela den moderna konsten och den moderna literaturen. Det vaknade åter en enthusiasm för den sköna Grekiska forntiden, och dennn enthusiasm, äsvensom den genom antikens förnyade studium bildade smak har på mångsaldigt sätt ingått äsven i den nyare literaturen under dess mest blomstrande period.

Den vunna insigten uti de gamlas skona anda hade på den klassiska philologien det inflytande, att man förkastade lärdomen, såsom dess högsta mål, hvilket mål man nu satte uti sjelfva den esthetiska bildningen, som genom kännedomen af den gamla verlden säkrast skulle vinnas; den humanistiska principen blef således åter gållande. "Icke derföre, såger en snillrik philolog från denna tid, egnar sig den sanna philologen åt studium af forntiden, för att förskaffa sig lärda kunskaper om de gamla folkslagens historie, om deras konster och vetenskaper, deras seder, bruk o. s. v.; eller för att läsa de gamles för vissa konster och vetenskaper brukbara verk, för att förstå de från de gamla språken lånade konsttermer o. s. v. alltså hvarken för den döda lärdomens och det mechaniska vetandets, eller för språkkunskapers skull studerar Philologen de klassiske författarenes verk, utan för att få en sann och lefvande åskådning och kunskap om den classiska forntiden; ty denna är såsom klassisk verld mönstret för den äkta bildningen". Den äkta bildningen är således det

mal, till hvilket man, enligt denna åsigt, skall komma genom den klassiska forntiden. Denna asigt har dock redan gifvit vika för en nyare. Likasom den äldre humanistiska principer utträngdes af lärdomen, så har den nyare blifvit utträngd af den vetenskapliga. Enligt denna princip kan, såsom en anhängare af densamma yttrar sig, icke den subjectiva förädlingen, d. ä. den inre och yttre menniskans harmoniska bildning vara det enda och högsta ändamalet med forntidsstudierna, om och dessa studier, medan de gora oss bekanta med det mest ideala menniskolif, alltid maste betraktas sasom den enda sanna grundläggningen dertill; detta ändamål skall fastmera, då det måste vara ett för alla tider oföränderligt, ligga utom menniskan "d. ä. vara ett objectivt, d. ä. rent vetenskapligt." Skillnaden emellan dessa båda principer har ganska tydligt röjt sig uti sjelfya den philologiska literaturen; då nemligen uti de humanistiska philologernas skrifter vanligen en flägt af den sköna antika andan genomgår, och dessa skrifter således tala icke blott till förståndet utan äfven till kanslan och phantasien, så träffas hos de vetenskapliga philologerna sällan något af allt detta, utan endast en modern vetenskaplig anda och grundlighet. Den väsendtligaste skillnaden är dock den, att da enligt den vetenskapliga principen en philologs högsta sträfvande och förtjenst ligger uti att forska uti forntiden och salunda samla materialier till den vetenskapliga byggnaden, så äro enligt den humanistiska principen sadana forskningar väl icke utan vårde, men dock nagonting underordnadt, och det våsendiligaste ligger deri, att så begagna sig af de redan gjorda forskningarna, att en sann bildning derigenom verkligen befordras. Tiden medgifver icke att nu anställa en kritik af dessa olika principer; detta tyckes afven vara mindre nodigt; ty jag tror mig kunna antaga, att bland Eder, MM. HH., ganska fa skola finnas, hvilka icke utan befänkande skänka företrädet at den humanistiska principen och inse, att men-klig bildning måste vara af vida högre värde än uppresandet af en vetenskaplig byggnad, till hvilken endast högst lå kunde halva tilltråde. Det vore derföre, for att återkomma till Linsén, både ensidigt och orättvist att mata hans förtjenster efter den vetenskapliga principen. Väl är hans första, i form af disputationer utgifna arbete, om det Latinska språkets uppkomst och tillväxt, af en rent vetenskaplig tendence. Men den omständigheten, att af detta arbete under loppet af mer an 7 år endast sex ark utkommit och detsamma icke blifvit fulländadt, bevisar, att hans sinne egentligen icke var böjdt för vetenskapliga forskningar. Af naturen begåfvad med ett lefvande konstsinne hade han äfven hufvudsakligast och företrädesvis ifrån den esthetiska sidan uppfattat formiden och dess literatur. Denna uppfattning afvensom hans utmärkta förmåga att i sådan anda behandla de Romerska författurne utgöra den egentliga medelpunkten af hans literara förtjenster, och måste utan tvifvel aktas högre än en mängd forkningar, hvilka, om de ock ega vetenskapligt värde, dock icke alltid ibja den själens lyftning och den bildade smak som först gifva det rätta

värdet åt all sysselsättning med den klassiska forntiden. Hvad han såsom lärare framförallt åsyftade, synes tydligt af den method han i sina förelåsningar följde vid förklaringen af Romerska författare. Man har sagt om hans föreläsningar, att de ej voro vetenskapliga, och deri har man visserligen haft rätt; men man har förbisett, hvad han hufvudsakligast med dem åsyftade; det var påtagligen icke att bilda några vetenskapliga forskare; utan hans högsta afsigt var att bilda menniskor i ordets vackraste betydelse, savidt sådant medelst den Romerska literaturen kunde åstadkommas. För sådant ändamål ansåg han tjenligast att lemna en ordagrann öfversättning af den författare, han företog till tolkning, samt att till det minsta möjliga inskränka förklaringarne, på det sammanhanget icke för mycket måtte afbrytas. Hans stora förtjenst skall dervid hafva varit en oyanlig förmåga att både troget och träffande på svenska återgifva skönheterna uti originalet. Hans föredrag måste derföre hafva haft samma inflytande på ynglingen, som det, hvilket denne plägar erfara vid umgånget med en högtbildad man, som med klarhet och behag uttalar sina åsigter öfver vigtiga ämnen.

Till samma mål sträfvade han med sina akademiska disputationer, af hvilka de flesta innehålla öfversättningar af spridda stycken ur Romerska skalders arbeten. Goda och lyckade öfversättningar af de gamla författarene hafva onekligen ett ganska högt värde. Genom desamma blir det äfven för dem, hvilka antingen alldeles icke känna de gamla språken eller och icke i

den grad, att de utan svårigheter kunna läsa de gamles skrifter på originalspråken, möjligt att göra bekantskap med de skönaste produkterna af den fornklassiska literaturen, på samma sätt som man genom gipsaftryck kan vinna en åskådlig kännedom om forntidens skulpturverk. Linséns förtjenster i detta afseende äro derföre af icke ringa värde; ty han egde en särdeles lycklig förmåga att äfven i bunden stil återgifva de gamles dikter.

Uti sina öfriga lärda skrifter afhandlar han åter sådana ämnen, hvilka i ett eller annat afseende kunna vara intressanta och bildande. Icke den grundliga, vetenskapliga forskningen, utan sjelfva det intressanta ämnet och den behagliga framställningen voro det hufvudsakligaste i dessa skrifter; och detta bevisar, att han äfven genom dem sökte väcka hågen för den gamla literaturens studium.

Om vi nu likasom till en slutdom sammanfatta de betraktelser vi anställt öfver Linséns verksamhet såsom lärare och skriftställare, så kan denna dom icke blifva annan än den, att likasom han såsom menniska var ädel och älskvärd, han äfven såsom lärare och författare var i hög grad utmärkt och aktningsvärd. Utmärkt var han igenom sitt ljusa förstånd och sin ovanliga förmåga att i ett behagligt språk ikläda sina tankar; aktningsvärd åter genom det höga mål, dit all hans verksamhet syftade.

Men likasom han såsom menniska förenade en ådel charakter med stora lidanden, så var åfven hans varma sträfvande för bildning och kultur förenadt med en tragisk sida; detta vill

jag fórsóka att hár nármare forklara. Lycklig, trefallt lycklig prisar jag den vetenskapsman, för hvilken den sanning han söker år det högsta målet for hans sträfvande. Har han löst sitt problem och funnit eller trott sig finna sanningen, är han fullkomligt belaten; det är för honom likgiltigt, om den lunna sanningen för menskligheten och det menskliga litvet har nagot värde ellericke. Om den blott hör till omlånget af hans vetenskap, så har den ett vetenskapligt värde, ett värde, som for honom är det högsta. Huru annorlunda forhåller det sig icke deremot med den vetenskapsman, för hvilken det högsta målet icke ligger uti sjelfva sanningen utan utom densamma. Han är ej nöjd med att blott hafva upptäckt en sanning; det är for honom till och med tullkomligen likgihigt, om han sjelf eller nagon annan gjort denna upptickt. Hans strafvande går ut på att göra sanningen fruktbårande for menskligheten, vare sig till befordrande af hennes materiella välständ eller af hennes andliga förädling. Han anser sig derföre först då hafva uppnått sitt mål, då han sett frukter af detta sitt strafvande. Uteblifva da dessa, sa ofvervaldigas han af den bittra, den tryckande tanken, att alla hans mölor blifvit förgälves använda. Fragade Linsén sig hvilka frukter han kunnat mårka at sina anstrångningar, att befordra mensklighetens förådling, att inverka på hjertat och känslorna, så torde svaret blifvit foga tillfredsstillande. Han visste ju, att hans stråf**v**ande af sjelfva den moderna vetenskapen icke mera erkändes såsom det hogsta, utan sasom underordnadt den förmiltiga vetenskapligheten. Han har ju, äfven på nära håll kunnat märka, att det går en kall, en isande kall flägt genom tidehvarfvet, som ifrån den moderna bildningens luftiga och kyliga höjder sänkt sig ner ända till dalens undangömda hyddor samt till och med hos ungdomen afkylt den hjertats milda värma, som är ett nödvändigt vilkor för emottagandet af en högre kultur. Ty utan ett varmt hjerta är ingen högre bildning möjlig; det är fullkomligen grundadt, hvad Schiller så träffande säger i anledning af antikerna i Paris:

Der allein besitst die Musen, Der sie trägt im warmen Busen; Dem Wandalen sind sie Stein.

Huru är det väl då möjligt, att Linsén under inflytandet af en sådan tids anda kunnat se några glada frukter af sin verksainhet, och sitt sträfvande krönt af den framgång, som han önskade? Utan tvifvel bidrog äfven detta till att föröka hans dysterhet.

I förening med sin profession hade Linsén praefecturen öfver Universitetets Mynt-Medaille- och Konstkabinett. Man har i detta afseende, och med skäl anmärkt, att han saknat intresse för denna samlings ordnande och studerande. Af den vackra början som är gjord med myntens ordnande, kan man dock sluta, att endast hans långvariga sjuklighet hindrat honom att fullända detta åliggande. Nekas kan dock icke, att han saknade intresse för detta slags studium, men detta böra vi ej lägga honom till last, utan snarare äfven deri se yttringen af hans fria, höga ande, som ej kunde sysselsätta sig med ett studium, hvilket ej hade

nagot annat intresse än lärdomens. Denna samling är nemligen icke, som namnet tyckes antyda, utsträckt äfven till den sköna konstens alster, hvilka likväl såsom i hög grad bildande, borde utgöra den väsendtligaste beståndsdelen i densamma; för dessa hade Linsén ett varmt intresse; såsom man lätt kan sluta icke blott af hans utmärkta skönhetssinne, utan äfven deraf, att han med sårdeles värma omfattade bildandet af den Finska Konstföreningen, bland hvars stiftare han äfven var.

Finska Vetenskapssocieteten, som i Professor Linsén förlorat en af sina ådlaste medlemmar, beklagar jemte denna hårda forlust, afven det oblida ode, att han af en mangarig, tärande sjukdom varit urståndsatt att flera än engång skånka Societeten nojet hora hans snillrika föredrag. Societeten beklagar detta så mycket mer, som hon varit öfvertygad, att han, med en starkare helsa, hade fägnat henne med många sköna frukter af sitt snille och sin lärdom. Isynnerhet hade det för Societeten varit en sårdeles glådje att se glansen af sina årsdagar förhöjd af samma vältalighet, som ihran detta stället så ofta förtjusat talrika åhörare. Dock, detta glada hopp har förvandlats till ett sorgligt minne. Ja. sorgligt år detta minne åfven derfore, emedan det paminner om lefnadsöden, så tragiska, att vid betraktandet af desamma alven det hardaste hjerta maste djupt röras. Hans lefnadsöden utgöra likasom en enda stor dram, hvars medelpunkt år sjelfva den tragiska katastrophen, och allt det föregaende likasom en forberedelse, vål icke till sjelfva de sorgliga håndelserna, men dertill, att dessa händelser hos honom väckte en så djup, så bitter smärta, en smärta, hvars småningom för sig gående upplösning utgör den tredje och sista afdelningen uti dramen.

Ett så varmt och känslofullt hjerta som Linséns måste djupt känna behofvet af den lycka, som endast vinnes i skötet af en älskad familj. Derföre hade han, då hans yttre ställning sådant medgaf, ingått det förbund, hvarpå han byggde sitt hopp om en framtida huslig sällhet. Detta hopp var bygdt på den fastaste grund, som finnes för de dödliga, nemligen kärlekens, och hans makas älskvärda dygder lefva ännu i deras minne, hvilka känt henne. Den rena sällhet, som sålunda förljufvade hans lefnad, växte och förstorades med hvarje arfvinge, hans maka skänkte honom. Ack det kan ej finnas någon som djupare känt fadersfröjden än Linsén, han som skrifvit, att "af all glädje på jorden ingen är skönare, än den som skänkes oss af våra barn, af deras första ålders änglalika tjusning, af den framtida salighet, hvarom de gifva så rika löften, af den blomsterskord for minnet, hvilken så doftrik räckes oss ännu då lifvets öfriga fägring för vårt öga försvunnit, och oändligt friskare än hagkomsten af vår egen så väl barndom som ungdom - rosenklär den dystra grafvens bräddar". Hans sällhet hade sålunda uppnatt sin högsta höjd, da han vid slutet af år 1826 emot sitt fadershjerta tryckte sin fjerde arfvinge, det nya hoppet om fortfarande och framtida fröjder. Men ack huru grymt, huru ovän-

tadt gåckades icke detta hopp! Jorden hade ännu icke fyra gånger vändt sig kring sin axel under det nya året, då döden lade sin kalla hand på hans maka, och sönderslet det band, som var fästadt i djupet af hans hjerta. Tvenne dagar sednare följde hans dotter sin moder i grafven, och med hvardera nedsänktes hans lyckas sol. Då åter våren kom, och naturen fick ett nytt föryngradt lif samt spred glådje och fröjd nti menniskosinnet, funno hans tvenne soner, uti hafvet en oväntad alltförtidig graf. Kom sen den fasansfulla branden, som till grus och aska förvandlade största delen af Finlands gamla hufvnd- och Universitets-stad. Vid första underrättelsen härom ilade han från skären, der han besökte sina soners dödsställe, tillbaka till den brinnande staden. Ej bekymrade honom hans hus och hans egendom, hvilka blifvit ett rof för de allthärjande lågorna; sin son, endast sin son hade han i tankarna; med outsäglig ångest sökte han honom kring den ödelagda stadens omgifningar, och fann, men endast för att ater några månader sednare för alltid förlora honom, detta enda lefvande minne af en förfluten lefnads sällhet. Så hade inom en kort tiderymd det ena grymma slaget efter det andra träffat och sönderslitit hans hjerta. Såsom en afgvistad trädstam stod han nu ensam, öfvergifven af sina käraste, öfverlemnad at sig sjelf och åt en gränslös sorg, åt en sorg, som för honom var så mycket bittrare, som hans förgångna sållhet var ljuf, och hans förhoppningar om dess fortfarande och tillväxt så glada. Tiden sjelf, hvilken eljest säges bota allt, tyckes här icke ensam varit tillräcklig, den behöfde till sitt biträde äfven andra medel; och den milda försyn, som sänder oss både våra sorger och fröjder, förunnade äfven Linsén sådana mildrande medel för hans blödande hjerta. Först sökte en annan maka att med sin varma tillgifvenhet, sina stilla och anspråkslösa dygder ingjuta tröst uti hans lidande hjerta, och dernäst bidrog äfven en resa, som han 1833 om sommaren företog till Sverige och Danmark till en del att skingra den svårmodighet som ännu tryckte hans sinne; men isynnerhet skänktes honom en stor glädje af de barn, hvilka — för att nyttja hans eget uttryck — rosenklädt hans dystra graf, och hvilka nu jemte sin moder sörja den ömmaste fader — deras lefnads stöd. Måtte fadrens ädla charakter blifva deras arfyedel!

Vördade Åhörare! Den finska fosterjorden förvarar utan tvifvel i sitt moderliga sköte, män, hvilka genom vetenskapliga forskningar utmärkt sig framför Linsén; hon förvarar äfven sådana, hvilka inom andra kretsar af mensklig verksamhet varit i tillfälle att mera gagna fosterlandet än han; men hon förvarar der icke någon, hvars hjerta brunnit af en varmare och renare låga för fäderneslandets ädlare bildning, hon förvarar ingen som med så upphöjda tänkesätt, med en så ädel charakter förenat så djupa så bittra lidanden som han, hvilken, såsom skalden sjunger:

Bar himmel och afgrund uti sitt bröst, Och derföre äfven endast fann tröst —

uti grafven!

Personalier.

Johan Gabriel Linsén föddes i Helsingfors den 27 December 1785, af foråldrarne, Kofferdi-Capitainen Jacob Johan Linsén och dess hustru, Brita Christina Salovius. Fadren hade under 1788 års krig blifvit såsom Fanjunkare anställd på linietartyget En igheten, hvilket den 3 Julii 1790 af vada rakade i brant i sundet vil Björko samt jemte hela besättningen sprängdes i luften. Enkan gitte sig den 18 October 1791 med dåvarande Pistors Adjuncten i Tyrvis och Kiikka, sedermera Pastorn derstådes, Presten Johan Magnus Limon. Efter atnjuten undervisning af denne sin stjuffader blef han

- År 1802, den 16 October inskrifven sasom Student vid Universitetet i Åbo.
- 1510, disputerade pro exercitio under Prof. F. M. Franzens praesidium, undergick Philosophiae-Candilat-Examen, disputerade pro gradu under samme Praeses samt promoverades den 6 Juli till Philosophiae Doctor och Artium Liberalium Magister.
- 1812, den 9 Juni, Docens och
- 1813, den 17 Februari Adjunct i Romerska literaturen.
- 1815, hösttermin och 1816 v. t. bestridde Eloquentiae Professorns offentliga föreläsningar.
 - Samma år höll i Universitetets namn ett svenskt tal i anledning af freden i Paris den 20 November 1816.
- 1818, Ledamot af Finska Hushâllnings Sällskapet.

- År 1819, Framställde Phil. Magisterfrågan vid promotionen.
- 1822, h. t. 1826 v. t. bestridde Eloqu. Prof. offentliga föreläsningar. Vicar. Eloqu. Prof. vid slutet af v. t. 1826 h. t. samma år samt 1827.
- 1828, den 13 Februari, Eloquentiae Professor samt installerad i Helsingfors den 3 October.
- 1830, h. t. och 1831, v. t. Decanus i Phil. Faculteten.
- 1831, Ledamot i Finska Liseratur-Sällskapet.
- 1832, den 16 April, Ordförande i sists. Sällskap ända till den 16 April 1841.
- Inspector för Nylandska Afdelu. (intill hösten 1840).
- Höll på Universitetets vägnar svenskt tal vid invigningen af Universitetets hufvudbyggnad.
- 1833, den 3 April, Riddare af Kejs S:t Vladimirs Ordens
 '4 Class.
- 1833, den 29 October, Ledamot af Kongl. Nordiska Fornskrift-Sällskapet i Köpenhamn.
- 1834, Höll svenskt Tal i anledning af H. K. H. Cesarevitsch's och Thronföljarens inträde i sin myndighetsålder, samt svensk Parentation öfver Ärkeb. Tengström.
- 1837, h. t. och 1833 v. t. Decanus i Phil. Fac.
- 1838, Ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten.
- 1839, den 19 Junii, Riddare af K. K. S:t Stanislai Ordens 2 Class.
- 1840, Höll svenskt Tal vid Universitetets jubelfest.

Är 1841, Parenterade på Svenska öfver Universitetets f. d. Tjenstf. Canceller, Grefve Rehbinder.

Dess utgifna literara Arbeten aro följande:

1:0 Akademiska Disputationer.

1-7. De ortu & incrementis Linguae Latinae. P. I-VI. Aboae 1811-1817.

7-10. Cephalus & Procris, Fabula ex Ovidio svethice reddita. P. I-IV. Ab. 1818.

11-12. De Roma aeterna. P. I, II. Ab. 1820.

13-18. Psyche, Fabula Apuleji. P. I-VI. Ab. 1822.

19-20. De Hortensio oratore, Ciceronis aemulo. P. I, II. Ab. 1823.

21-22. De Cicerone historico. P. I, II. Ab. 1825.

23-24. Dialogus de Oratt., sveth. redditus. P. I, II. Ab. 1826.

25. De Albio Tibullo Ovidii Elegia, sveth. reddita. Ab. 1827.

26. Ovidius Albinovano, Epist. ex Ponto, Lat. et sveth. Helsingf. 1835.

27. Fama Poetarum, Elegiae Propertii & Ovidii sveth. redditae. Helsingf. 1835.

28-29. De ratione civili Ciceronis & Taciti. P. I, II. Helsingf. 1837.

30—31. Loci Sophoclei a Cicerone conversi commentarius.
P. I, II. Helsingf. 1838.

- 32-33. Phoenix, Idyllium Claudiani. P. I, II. Helsingf. 1838.
- 34-37. Anthologiae latinae exempla. P. I-IV. Helsingf. 1839.
 - 38. Momenta vitae M. Tullii Ciceronis. Helsingf. 1839.
- 39-41. Theodosius & Honorius, Ecloga Claudiani. P. I-III. Helsingf. 1841.

Dessutom utgifvit 6 ggr Stipendiattheser genom trycket, och praesiderat för en af Respondenten författad Disputation.

2:0 Andra Skrifter.

- 1. Ungdoms-idealen. Promotionspoem. Åbo 1816.
- 2. Tal i anledning af Freden i Paris 1815, inf. i Tidskr. Mnemosyne. Åbo 1822. Uti samma Tidskr. finnas af honom följande uppsatser:
 - 3. Om Finsk nationalitet. 1819.
 - 4. Om folkupplysning. 1820.
 - 5. Litterära utsigter. 1821.
 - 6. Tankar om föräldrarått. 1821.
 - 7. Om språkstudier. 1821.
 - 8. Något om Ossian och hans sånger, 1821.
- 9. Anmärkningar vid en Anonyms förslag till sedlighetens vårdande i församlingar på landet 1821.
 - 10. Tiden och författarne. 1822. Dessutom utgifvit:
- 11. Nyårshyllning. Poem, inf. i Tidn. Åbo Underrättelser 1824 (öfvers i A. Oldekopps S:t Petersburgische Zeitschrift).

- 12. Sång öfver Högsts. H. M. Kejsar Alexander den Förstes död. Införd i samma Tidning 1825, och åfven sårskildt tryckt. Äbo 1825.
- 13. Tal vid invigningen af K. Alex. Univ. nya Hufvudbyggnad, tryckt i Handlingar rörande invigningen af Kejs. Alex. Univ. i Finl. nya Hufvudbyggnad. Helsingf. 1833.
- 14. Ord till Musiken vid nästnämnde tillfälle, tryckta i fören. handlingar.
- 15. Tal vid Minnesfesten öfver Ärkeb. Tengström. Helsingf. 1834.
- 16. Tal vid Minnesfesten öfver Minister-Statssekreteraren Grefve Rehbinder. Helsingf. 1841.

Flera smärre poemer, införda i Aura. Åbo 1817, 1818, i Mnemosyne samt i flera Tidningar.

Linsén var tvenne gånger gift: 1:0 den 1 Nov. 1814 med Amalia Carolina Forssell, dotter till Klockaren Erik Forssell. Hon afled den 4 Januarii 1827, och efterlemnade 4 barn, hvilka alla samma år följde henne i grafven. 2:0 den 1 Sept. 1829 med Wilhelmina Petronella Höckert, dotter af Kyrkoherden i Nousis, Prosten Josef Höckert. Så vål hon sjelf som sju barn efterlefva honom.

MINNES-TAL

ÖFVER

NILS ABRAHAM AF URSIN,

Phil. och Med. Doctor, Kollegii-Råd, f. d. Professor i Anatomien och Physiologien vid Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finland, och Riddare af Kejserl. S:t Annæ
Ordens Andra, Kejserl. Kongl. S:t Stanislai
Ordens Andra samt Kejserl. S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class,

HÅLLET

på Finska Vetenskaps-Societetens Årshögtid den 29 April 1852

ΔF

CARL DANIEL VON HAARTMAN.

. Coldinary

Imprimatur:

G. F. Aminoff.



M. H.

For Eder har blifvit omnämnd, och J kännen, den förlust Finska Vetenskaps-Societeten gjort under det sistforflutna aret genom en af dess Stiftares, Collegii-Radet af Ursins bortgang. Enligt Societetens beslut bora nagra korta minnesord om den aflidne tolkas på Societetens Högtidsdag, och, då jag fått detta uppdrag, går jag att för Eder, M. H., teckna den hådangångne, ehuru föga mäktig att kunna intressera Eder såsom sig borde, men likvål såker, då jag följt Ursins vägar från hans vngre år allt igenom hans mannaalder, att icke mindre än nagon annan hafva uppskattat hans förtjenster. Utan tvifvel finnes ibland Eder, M. H, mangen - jag tror det - jag vet det - som till min teckning skulle kunna tillägga flere drag, hvaraf densammas dagrar skulle få en skönare - en varmare - colorit, ty afven uti Eder krets har Ursin sa ofta aterfort lugnet och gladjen, da sjukdomar hotande sväfvade öfver Eder sjelfve eller någon af Edra älsklingar - åtminstone alltid skänkt Eder trösten af det deltagande, hvaraf han ständigt så varmt lifvades vid andras sorger och bekymmer, och jag är derom förvissad, att J uti den krans jag gar att åt honom binda af spridda blad, plockade vid hans väg, gerna skolen inflåta vänliga minnesblommor; men jag vet dock en samhällskrets, hvilken, for menniskovånnen icke mindre intresse väckande än någon annan, likväl vid detta tillfälle, såsom vid alla dylika der den högre bildningen firar sina dels glada dels alfvarsamma fester, saknar representanter, en krets som med än större uppmärksamhet skulle höra mig — der hjertan skulle klappa än varmare vid det anspråkslösa och dock sa sköna lof jag vill skänka Ursins minne — der saknaden efter honom måste vara sa mycket säkrare, ju oftare bristen och nöden, sjukdomarne och bekymren der söka sina offer, utan att den hjelp står att finnas — den han — den bortgångne — de fattiges vän — så villigt, så vänligt erbjöd dem.

Collegii-Rådet Nils Abraham af Ursins föräldrar voro Prosten och Kyrkoherden i Ithis socken af dävordne Kymmenegårds nu Nylands Lan, Magister Jacob Johan Ursinus och
dennes maka Engel Christina Nohrström, dotter till Brukspatronen Abraham Nohrström, hvilken från Dalarne i Sverige öfverflyttat till Finland, och han föddes i nämnde socken
den 17 Augusti 1785. Tidigt måste han i föräldrahuset hafva
sett det goda hjertats sköna exempel, då det icke är möjligt att
han for den behofvandes nöd kunnat få det varma deltagande,
som utgjorde hans grundväsende, om icke barnets och den börimde ynglingens hjerta redan tidigt omhuldats af menniskokärlehens milda genier. Han atnjot forst privat undervisning, genomgick sedan Borga Gymnasium och inskrefs vid Åbo Academie
som Student den 21 Martii 1805, hvarefter han den 17 Decem-

ber 1807 responderade pro exercitio under Professor Fredr. Wilh. Radloff, för femte delen af dennes beskrifning om Åbo Academies trädgård, tog Philosophiæ Candidat-examen om våren år 1809, och, efter att hafva den 4 Julii 1810 responderat pro gradu under Professor Johan Gadolin, för tredje delen af hans disputation de Cupro albo Sinensi, promoverades i Abo till Philosophiæ Doctor och Artium Liberalium Magister den 7 Julii 1810. -Ursin hade på sådant sätt, ehuru under tiden ständigt som informator sysselsatt med andras undervisning, hastigt nog slutat sin Philosophiska kurs, men redan straxt efter sin Candidat-examen vändt sig åt Läkarekonstens studium, dervid han, såsom äfven annars, utmärkte sig genom en ihärdig flit äfven på Collegier, hvilken af en hans van och studii-kamrat, med anledning af initialbokstäfverne till hans namn, N. A. U., tecknade på de annotationer han gjort vid Medicinæ Professorernas föreläsningar, så väl uttrycktes med de latinska, med samma bokstäfver begynnande, orden - Non Abfuit Unquam - han försummade alldrig något collegium. I vår tid skall ett sådant beröm icke rätt förstås - åtminstone icke af mängden af mina yngre åhörare — jag vet det. Endast de utmärktaste lärares — knappt deras — föreläsningar följas med sammanhang; och huru många kunna de vara? För en större försumlighet vid de öfriga föreläsningar till hvilka man antecknat sig, söker och finner man så lått en ursäkt i ämnets eller föredragets tråkighet: det är så nutidens sed; men på den tid det nämnda berommet tilldelades

Ursin - att alldrig hafva försummat ett collegium, så att hans mteckning ir vid dem utgjorde fullståndiga uppfattningar af hvad larmene transfellt - betydde det ilradig flit och ofentrutet allvar i studier: något som väl måste väga lika mycket i slutpröfningens vigtskål, om icke mera, ån de lätta, snart bortblåsta, milligr ms-vigterna at approberande suffragier, dem visst icke alla - dock ganska många - dertill kanske i betydlig mån, om icke heh och hillet, forledde af begår efter de siffror – hvarför icke pund och marker - till hvilka kunskaperna äro evalverade mi etterstrufva, och till hvilkas erhållande hvarken sa trägen flit eller så noggrunn uppmärksamhet erfordras vid Professorernas foreläsningar, hvilka, om de ock icke alla kunna tänkas så rika, att ahörarene utur dem skola kunna ösa åt sig visheten - liksom Californiens lycksökare ösa guldet utur dess rika jord - dock, med sällsynta undantag, måste förmodas innebåra här och der ett korn rikt nog att belöna den trägna mödan; ty få äre vål de Larare som icke i sina collegier, om de skulle besökas af ungdomen, skulle nedlägga sin tankes och forsknings hela förmåga, för att ditsamla, den ena mera den andra mindre - alla dock något - vishetens guldstoft, vårdt att uppsökas och gömmas af den vettgirige, och det han annars kanske alldrig skulle finna.

Om våren år 1811 tog Ursin sin theoretiska Mediciniska examen och öfverreste derefter till Stockholm, för att tjenstgöra vill bevent de Semphimer-Lazarett och Allmanna Barnhördshus, samn seden vill och nudvandigheten det fordrade for Medicinæ

Studerandes vid Abo Academie practiska utbildning, innan Universitetet erhöll sitt eget Cliniska Institut. Hemkommen samma år om hösten, tog han Licentiat-examen den 5 Junii 1812, responderade den 12 Martii 1813 pro gradu medico under Professor Joseph Pipping — sednare adlad med namnet Pippingsköld för förra delen af dennes disputation: De morbis viarum lacrymalium cognoscendis et curandis, samt promoverades till Medicinæ Doctor vid promotionen i Åbo den 4 November 1817, vid hvilket tillfälle han såsom Primus besvarade Doctors-frågan. Ursin var nu väl utrustad för att bestrida de värf honom efter hans bildning kunde uppdragas, eller dem pligten af honom fordrade, och dem jag för att lättare kunna framställas, vill indela i Statens — i Academiens eller, som denna Högskola sedermera kallades, Universitetets, då densamma efter den olyckliga branden i Abo ar 1827 bortflyttades från Auras i de Finska häfderna vidtfrejdade, i de Finska sångerna så mildt ljudande, i de Finska hjertan så lifligt, så gerna återkallade, stränder - och, för det tredje, i de nödlidandes värf, - väl vetandes att de icke egentligen kunna eller böra átskiljas, utan att alla rätteligen hafva blott ett mål - mensklighetens utveckling.

Sedan Åbo Academie genom Kejsar Alexanders — oförgätelig i minnet — frikostighet år 1811 fått en utvidgad Stat, bestämde Ursin sig för den Academiska tjenstemanna-banan: de Statens värf han bestridde kunde således icke blifva många, och sysselsatte honom också derföre i allmänhet mindre — och tillfälligt.

Da Finland sent omsider, medelst ett Kejserligt Rescript af den 14 November 1811, erhöll hvad det redan langt förut bordt få, men förgåfves önskat sig - en egen Styrelse för varden af landets Medicinal-angelägenheter — ett Collegium Medicum, utnämndes Ursin d. 3 Martii 1812 till Cancellist i detsamma, och fortfor med denna befattning, jemte hvilken han flere gånger - sednast continuerligt från 1822 till 1824 - bestridde Secreterare-tjensten i samma verk, ända till dess han år 1825, utnämnd Anatomiæ Professor, sjelf tog säte och stämma såsom ledamot derstädes. År 1813 kallades Ursin, i början af äret, till allmän Vaccinatör i Finland, hufvudsakligast med uppdrag att undervisa och examinera blifvande vaccinatörer, och att öfverallt i landet sprida kokoppmaterie för ympningarne, med hvilket sysslande han fortfor sa länge Vaccinations-väsendet stod under Kejserl. Hushållnings-Sällskapets i Abo nårmaste ledning, eller ända till slutet af ar 1824, da genom Kejserliga Rescriptet af den 17 Februarii Collegium Medicum tog hand med denna angelägna sak, som dervid erhöll en helt och hållet förändrad, nästan i alla afseenden förbättrad, organisation. Samma år, eller den 7 September 1813, utnämmdes Ursin till Slottsläkare i Abo, ifrån hvilken befattning han dock, på derom gjord anhallan, den 19 Martii 1814 erhöll afsked. Då Ursin äfven under år 1813 blifvit utnämnd till Chirurgiæ et Artis Obstetriciæ Adjunct, som längre fram kommer att nämnas, bestridde han således på en gång, jemte det han var en mycket anlitad praktiserande Läkare

i Åbo, sem dels ordinarie tjenster, dels tillfälliga besattningar, nemligen Cancellist- och Secreterare-tjensterna i Collegium Medicum, allmänna Vaccinatörs-besattningen, Slottsläkaretjensten och Chirurgiæ Adjuncturen. Detta förhållande är eget, och förtjenar att anmärkas, ty det visar Ursins drift och verksamhet, men tillika de ringare pretentioner man förr, i jemförelse med nu sörtiden, hade af tjenstemän, eller, kanske rättare, huru tjenstebesattningarne nu äro oändeligen mera complicerade än förr, så vida nu omöjligen någon, om än alldrig så driftig och duglig, skulle kunna sköta några af dessa besattningar, ännu mindre alla, och tillika vara praktiserande läkare.

Som Medicinæ Professor var Ursin sjelfskrifven Ledamot i Collegium Medicum, ett förhållande som allt sedan detta verks första organisation ämnu gäller om alla Medicinæ Professorer, men i synnerhet då var en nödvändighet; och, såsom sådan, deltog Ursin i Collegii alla sysslanden. Sedan, genom Kejserliga Rescriptet af den 7 April 1830, Medicinal-Styrelsen fått en i betydlig mån förbättrad organisation genom General-Directeurs Embetets inrättande, functionerade Ursin, såsom äldsta Professor i Medicinska Faculteten, nästan alltid, vid General-Directeurens frånvaro på resor, i dennes ställe för behandlingen af ärender som icke tålte något längre uppskof. I alla dessa befattningar visade Ursin samma nit, som utmärkte honom i allt hvad han företog sig, hvarvid han, — om ock någon gång litande alltför mycket på andra samt stundom förledd att gå för långt, hvilket

ofta är fallet med personligheter sadane som hans, hos hvilka en medfödd godhet är förenad med en större naturlig eller forvärfvad caractersfasthet — dock alltid ådagalade kraft och förmåga att utföra en god sak.

Men vigtigare vårf alågo och utfördes af Ursin vid Universitetet. Den 20 November 1813 blef han utnämnd till Chirurgiæ et Artis Obstetriciæ Adjunct, hvilken sin forsta Academiska tjenst han innehade till den 8 Januarii 1818, da han utnämndes till Anatomiæ Prosector; hvarester han den 27 Januarii (8 Februarii) 1825 emottog Anatomiæ et Physiologiæ Professionen. For dessa tjenster utgaf han vederbörliga specimina, ibland hvilka det för Anatomiæ Prosectoratet - de Angina Polyposa sårskildt förtjenar att nämnas såsom till språk (ty Ursin var stark latinare), till framställningssätt och det gedigna i utredningen af sjukdomens så väl orsak som väsende, äfvensom i afseende a therapien, langt öfver en stor del dylika arbeten, sammanskrifna ensamt for att uppfylla en vanligen tom formalitet. Ifragavarande arbete — ett resultat af den rika erfarenhet Ursin samlade under en svår strypsjuks-epidemie, hvilken året förut herrskade uti Abo Stad der han då var praktiserande låkare - skall alltid behålla en plats i den gagneliga litteraturen. Utom dessa befattningar var Ursin Wiborgska Nationens Inspector ifrån Maji månad 1825, såsom han redan under sin studenttid varit samma Nations Curator ifrån våren 1809 till hösten 1814; och fortfor han med Inspectoratet till och med höstterminen 1832, då han afsade sig detsamma, — ett steg, det en man med hans alfvarliga och bestämda tänkesätt måste taga, emedan han, och det med skäl, icke ansåg sig kunna fortfara att heta ledare — Inspector — för en Nation, som icke lyssnade till hans erfarna råd. Han var Mediciniska Facultetens Decanus Academiska åren 1825—26, 1828—29, 1832—33 och 1836—37, samt Inspector Stipendiariorum åren 1831 och 1833.

Ursin, hvilken Acad. året 1831-32, samt oafbrutet ifrån höstterminen 1834 varit Universitetets Pro-Rector, valdes den 1 Junii 1839, och sedermera af Hans Kejserliga Höghet Thronföljaren, Universitetets Höge Canceller, utnämndes, till Rector på tre år, hvilken befattning, vid deras slut, ytterligare uppdrogs honom på lika lång tid. Det är ifrån denna tid - året 1839 minnesteckningen af Ursin får en friskare färg, samt dagrar här och der så vackra, att jag ingalunda kan tviffa derpå, att J, M. II., liftigt skolen följa min framställning, äfven med den ringare teckningsförmåga jag eger. Det äro dessa partier i taflan, hvilka måste väcka största intresset. Bottnet - grunden - huru jag må kalla det - eller den Rectorliga myndighetens utöfvande har skuggor, dem mången skulle finna, och mången funnit, alltför osäkra — här och der skarpa: de ifrågavarande partierna framstå derföre här för alla så mycket ljusare och behagligare. Ursins kraftfulla ledning af öfverläggningarne i Consistorium och af ärenderne å Rectors-Cancelliet, hans kännedom af Univer-

sitetets angelagenheter, dem han i langvariga tider med odelad uppmärksamhet följt och äfven som Pro-Rector ledt, hans medlande formaga einellan Universitetet och ej mindre dess högste Styresman an Regeringen i allmanhet, made of alla erkannas; och med Ursins fasthet - jag ville nästan säga envishet att utfora en ging fattade beslut, samt den sjelfbeherskning han " i så hög grad egde, miste han alltid i dessa hänseenden vara en utmärkt Rector. Men afven utom Rectors-Cancelliet och Consistorium — särdeles i afseende å disciplinen vid Universitetet denna stötesten i alla, kanske ändock mest i våra, tider - visade Ursin samma kraft som alltid: det var likväl just der tadlet träffade honom - om med rätta - det vore vål värdt att utredas, men skulle leda mig for langt från mitt ämne. Ordning och stillhet radde emedlertid i allmänhet vid Högskolan under hans Rectorat, och de selande hade straffet tätt ester sig, då de sillan kunde undga Rectors ständiga — kanske illand nog strånga — uppmärksamhet — och hvem skulle icke gilla detta, då skillnud gores emellan den af orent hjerta, eller nia, orena seder eller trotsighet mot forman och lärare alltid straffvärdige och föraktlige, och den forlatligt af ungdom, oerfarenhet, må till och med vara af ungdomsyra, felande renhjertade, blygsamme ynglingen. Men jag lemnar gerna dessa beskuggade ställen på den tafla jag har framfor mig, och vänder mig heldre till de gladare partierna af densamma, ibland hvilka Jubelfesten ar 1840 samt Hans Kejserliga Hoghet Thronfoljarens forsta besök i Finland och vid

Universitetet år 1842, framstå såsom ljuspunkter, icke blott i Ursins lif, utan fastmera uti Finlands häfder. - Kännen J icke, M. H., Edra hjertan klappa lifligare vid tanken på dessa sköna fester; gömmen J icke alle ännu från dem någon minnesblomma, sjelf plockad eller åt Eder skänkt af dem, som lyckligare än J fingo vara med om dessa glada jubel? Jag hoppas det! Den förra, en hyllning åt den seger upplysningen 200 år förut vann i Finland öfver mörkret, och den emancipation det Finska folket erhöll i intellectuelt afseende, var tillika en skördefest, i hvilken vi, som nu inberga frukterna af Christinas och Brahes Stiftelse, med tacksamma hjertan måste deltaga, men till hvilken ock slöt sig så mången utländning - sa mången af det stora Keisaredőmets ädlaste litteratörer, och äfven den då gamle, vördnadsvärde, fordom så tjusande Selmas Sångare vid Auras strand — alla, för att fira ljusets fest - för att deltaga i den glädje som ljöd kring hela vårt fosterland - icke blott bland de unga, hvilka då från den blomsterprydda Parnassen fingo emottaga lönerna för sina mödor, utan äfven bland de gamla, som tacksamt påminnande sig sina fordna glada dagar i Sanggudinnornas tjenst, välsignade vår store, ädle Kejsare, som förunnade oss denna fest. Den sednare var ju åter den skönaste vårfest - en hoppets fest.

> "När Maj had' löfvat våra lindar, Och lärkan sjöng på Suomis strand, Då kommer Han med vårens vindar, Med svanorna till Sagans land."

Han - den Efterlängtade - kom, och unga och gamla, och rika och fattiga, alla skyndade ut den Nykomue till mötes. O! det var en kirlekens fest, da tusendes - ja ett helt folks kärlek vanns af den Adle! I minnens det annu - atminstone de fleste af Eder, M. H. - huru vi med gladjen och hoppet i hjertat otaligt vantande och fragande hvarandra om icke Han snort kommen, unlieligen med fortinsning oformodelt sigo den Hoge Gasten midt ibland oss - hurn de som sjelfve icke då kunde njuta af denna lycka, eller som ännu icke kunde ana hvad den betvede for oss, med nyfikenhet hörde omtalas den hoppfulle Furste-Sonens milda - adla - drag. J minnens visst allt detta, och huru nedlåtande han var mot alla, och sedan, då han obemärkt ville lämna den krets som sista aftonen fick Nåden samlas omkring honom - huru i ett nu hela denna krets af damer och herrar, blandande sig med den ordlinerig, misse af menniska of alla stad san omgat samlingsremmet, och glammande all rong our emprette, i brekigt hvimmel skynlide mil till stranden, dit den Saknade begifvit sig, for att ombord på det utanför på redden våntande angfartyget återvånda till Kejsarestaden huru då åter unga och gamla, rika och fattiga, men icke såsom tvenne dagar förut med glådjen, utan med saknaden, i hjertat samlades for att annu en gang fa se den adle Thronfoljaren och huru han ännu från fartyget vinkade åt oss med huldhet hvarföre skulle jag icke våga såga med kärlek - då Han äfven sedermera så mången gång visat oss prof på denna kånsla, sed-

nast vid det besök Han - den Adle - förlidet år gjorde här och hvilket - ovärderligt i Nåd - alldrig borde af oss och aldraminst af Universitetet och dess ungdom kunna glömmas. Säkert minnens J allt detta, M. H., och J måsten då med mig instämma - visst var det en vårens - en hoppets - en kärlekens fest, som då firades ej blott vid Universitetet, utan för hela fosterlandet! Men med minnet af dessa oförgätliga Högtider är ock Ursins namn oskiljaktigt förenadt. Han inböd som Rector, med ett vackert programm, vetenskapernas gynnare och vänner till den fest Universitetet, i hela landets namn, skulle fira, det var han som var ordnaren vid denna fest och som stod främst bland representanterne af landets upplysning, och var deras tolk vid densamma. Det var också han, som vid Hans Kejserliga Höghet Thronföljarens oförgätliga besök var medlaren emellan Universitetet och dess Höge Canceller, som ständigt fick nalkas Hans person, och som njöt så många bevis af Hans godhet och nåd. Också äro dessa tillfällen i Ursins lefnad glanspunkter sådane icke många kunna få dem; och de stodo ofta lifligt för hans minne — och visst strålade ock då hans öga af glädje! — Men äfven andra glada fester än de nämnde firades af Universitetet under Ursins Rectorat, hvilka höra till den taflas ljusa partier jag framställt för Eder, M. H. - Hans Kejserliga Höghet Thronföljarens förmälning år 1841, och Hans Kejserliga Höghet Storfursten Nicolai Alexandrowitsch's födelse — glädjande — hoppfulla fester, icke blott för Universitetet utan för hela Finland, likasom för det

Ryska Riket! I dessa Universitetets glada fester blandade sig dock, under Ursins Rectorat, en sorglig, till hvars firande Ursin ar 1841 måste utfärda kallelse, då vid Universitetet parentation hölls öfver dess länge bepröfvade förespråkare hos sa väl Kejsar Alexander, som hos vår nu regerande Allernådigste Kejsare — öfver Grefve Rehbinder, som sagde år afled i S:t Petersburg — ett slag, hvilket lika hårdt träffade hela Landet som Universitetet.

År 1845 nedlade Ursin sitt Rectorat, och erhöll i början af året derpå afsked som Professor Emeritus. Han hade då kunnat vinna det lugn för sin ålderdom, som så begärligt efterlängtas och sökes af de fleste; men hans bepröfvade embetsmannaduglighet, och hans vana vid ledningen af Universitetets ärender föranledde dock, att han, elter eget begifvande, oaktadt för lifstiden förunnad tjenstledighet från professionen, förordnades att som ledamot fortfarande hafva säte och stämma, i Consistorium, äfyensom att han, churu såsom Professor Emeritus skiljd ifrån ledamotskapet i Collegium Medicum, också förordnades att i detsamma fortfara — för hvilket sednare sysslande honom, af Hans Kejserliga Majestäts Finska handeassa, i Nader tilldeltes ett arligt arfvode, lika stort med det han sasom äldste ledamot i Collegium förnt atnjutit. Med dessa tvänne befattningar fortfor Ursin ända till sin död, sålunda egnande sina sista tankar lika lifligt — sina sista krafter lika manligt som i de raskaste åren, dels åt den Laroanstalt, hvars nitiska befordrare han alltid varit, och hvars styresman han var under dess i sednaste tider betydelsefullaste och

skönaste dagar, dels åt det Verk, vid hvilket han 39 år före sin död begynte sin tjenstemannabana. Som en af Finska Vetenskaps-Societetens stiftare, valdes han år 1841 till Societetens vice ordförande, och ådagalade städse ett varmt nit för hennes trefnad och fortkomst. Dessutom blef Ursin de tvenne sista åren af sin lefnad af medborgares förtroende kallad till ordförande i Helsingfors stads Sparbank och Fattig-direction, i hvilken sednare befattning han, trotts alla de svårigheter som dervid mötte, med otrolig möda införde ordning och kraft; men i hvilken han också troligen ådrog sig sin sista sjukdom.

Många, ansvarsfulla och arbetsdryga voro sålunda de värf Ursin bestred, och under hvilka han städse åtnjöt höga förmäns förtroende samt derpå erhöll flerfalldiga bevis, då han i Nåder utnämndes till Riddare af Kejserliga S:t Wladimirs Ordens 4:de Klass den 23 April (5 Maji) 1829, af Kejserliga Kongl. S:t Stanislai Ordens 2:dra Klass den 30 December 1837 (11 Januarii 1838) och af Kejserliga S:t Annæ Ordens Andra Klass den 21 Junii (3 Julii) 1840, äfvensom den 18 (30) April 1842 erhöll Collegii-Råds namn och värdighet, den 29 Maji samma år af Hans Kejserliga Höghet Thronföljaren, vid dess besök i Helsingfors, begåfvades med en brillanterad gulddosa, och den 15 (27) April 1845 blef med barn och efterkommande upphöjd i finskt adeligt stånd, dervid han antog nämnet af Ursin, samt den 3 (15) December 1847 hugnades med Utmärkelse-tecknet för 35 års oförvitelig tjenst.

Men så många och vigtiga befattningar Ursin än bestridde i Statens och Universitetets tjenst, så solbelysta dessa partier ock aro på hans lefnadstalla af högheten och lyckan och de glada festerna, så belönad för dem med jordens glitter han ock my af mig är framställd — så afundad han derföre af mången var så kan jag dock, M. H., föra Edra blickar till än skönare punkter i denna tafla, väl icke som de förra upplysta af jordens solsken, men omstralade af ett sken, mildare och herrligare än sjelfva den i dagens panna sittande stjernans - strålar kommande langt, langt bort ifrån de ljusa rymder, dit själen trängtande blickar i saliga stunder, och jag gör det så gerna, ty der kan jag visa Eder Ursin sådan han verkligen var - oförvillad af verldens många anspråk och beräkningar - ensamt följande sitt goda hjertas ingifvelser; men då måsten J, M. H., tänka Eder in i de fattigas kojor — de nödlidandes boningar, der sjukdomar herrska bland behofvens icke alltid i trasor klädda offer. Kanske har dock mången ibland Eder alldrig besökt dessa olyekliga! J skolen då icke rått kunna uppfatta hvad jag om Ursin vill såga; men hafven J lärt känna dem - der sett plägans tärda barn ntan — jag vill icke säga läkemedel för att lindra smärtan det vore öfverflöd - men utan tillräckligt skygd mot kölden, utan főda tjenlig att uppehålla de svigtande krafterna, utan passande dryck då törsten bränner, utan en vänlig hand till hjelp, en vänlig röst till tröst - men väl mången gång med lastens stoj till sållskan — då kunnen J – då skolen J – förstå hvilken välgörare Läkaren är, hvilket herrligare sken än någon jordisk glans omger honom, om han, såsom Ursin, alldrig ryggande för oväder och mörker, knappt för egna lidanden, men trogen den vackra Ed han en gång aflagt, att "ingen för dess fattigdom hjelp och råd förneka," sent och bittida, då han kallas, gerna besöker de usla — der ingen jordisk belöning föresväfvar honom — och för dem alltid har ett läkemedel, en tröst, åtminstone ett vänligt råd; då skolen J ock förstå, hvarföre jag satt Ursin så sysslande hos de fattige, så vårdande dem, i en klarare dager, och hvarföre han härvid kände sig mest belåten, men ock så betryckt, då han, hvilket så ofta hände, beklagade sig för mig öfver de fattiges nöd.


Sådan var den man, hvars lif och verksamhet i det Allmänna jag med flygtiga drag framställt. Ännu skulle det återstå att teckna honom i en krets — hans närmaste — men hvad han der var, hör till en annan tafla, till hvilken jag icke kan — icke bör — göra utkast. Ännu hänger ock sorgens dok öfver dem, som der så oförmodadt miste hans stöd, då det än syntes så fast — och hvarföre — då jag ännu ser tårar i de ögon, uti hvilka han alltid, vid den husliga härden, ville tända glädjen — upplyfta den förlåt, som döljer sorgen der innanföre! Med sin maka, Gustava Wilhelmina Barck, Dotter till framlidne Hof-Rätts-Rådet i Åbo Hof-Rätt Johan Barck och dess Fru Hedvig Sophia Smalén, hade Ursin, under 37 års sammanlefnad, fem barn — fyra söner

och en dotter. En af de förra har valt Fadrens våg — måtte han ock följa sin Fars sköna exempel — måtte han, och alla som vandra Läkarens visserligen tunga och svåra, men ock herrage, sen viksignelserik, hans, tillja t Ursins forspor, seden han gadt i le fattigas i mingar! Triden och sillheten skola di all-drig saknas i deras bröst! Frid vare ock öfver hans — den bortgångnes — stoft!

THE RESERVE OF STREET PRINTED AND ADDITIONS




































Filmonial literamen









INDEX COMMENTATIONUM.


1
L. J. Bonsborff, 1. Det arteriella kärlsystemet hos Paddan,
och II. Om ett accessoriskt vensystem hos Paddan 447.
E. J. Bonsdorff, Nervi cerebrales Corvi Cornicis
E. J. Bonsborff, Portvensystemet has Gadus Lota
F. J. BONSDORFF, Nervi cerebrales Gruis cinerez 54.
II. G. BORENTUS, then to transfer som knowkapen om detd- magnetismen gjort, i synnerhet under de sednaste decennierna (2).
F. W. PIPPING, Nagra historiska underrättelser om Boktryc-
keriet i Finland (Tredje, Fjerde och Femte Stycket)
N. G. DE SCHULTEN, Remarque sur le principe relatif à 12
théorie des paralléles proposé p. 351 et suiv. de ce Tome 783.
N. G. DE SCHULTEN, Note sur la théorie des parallèles 741.
E. J. BONSDORPF, Naturalhistoriska observationer, anställda
under solförmörkelsen den 28 Julii 1851
W. E. NEOVIUS, Härledning af en sats för beräkningen af en sferisk zon
N. G. DE SCHULTÉN, Note sur une modification récemment pro-
posée à la sormule barométrique de Laplace
A. F. THORELD, Beskrifning på ett mineral, funnet i Kuusamo
socken af Uleaborgs Län
N. G. DE SCHULTEN, Déduction analytique de quelques théorè-
mes géométriques nouveaux relatifs à la théorie des trois
Corps rouds
1. WOLDSTEDT, Untersuchung der Theilungssehler des Rei- chenbach-Ertelschen Meridiankreises' der Sternwarte in Hel-
singfors
H. G. BORENIUS, Minnes-tal ofver JOHAN JACOB NER-
VANDER, hållet vid VetSocietetens årsfest d. 29 April 1848.
N. A. Gylden, Minnes-tal ofver Johan Gabriel Lin- sen, hållet vid VelSocietetens årsfest d. 29 April 1849.
C. D. von HAARTMAN, Minnes-tal öfver NILS ABRAHAM
AF URSIN, hållet vid Vet Societetens årsfest d. 29 April 1892


சமாச மதன் சுற்ற சுற்ற சுற்ற சிருந்த திருந்த திருந்த சிருந்த சிருந்தில் இதிருந்தில் கிருந்த சிருந்த சிருந்த சிர செருந்த திருந்த திருந்த திருந்த திருந்த திருந்த திருந்த சிருந்த சிருந்தில் திருந்து திருந்த திருந்த திருந்த சி

Constant of the constant of th









New York Botanical Garden Librar

